
ISSN 1005-0094
CODEN SHDUEM

生物多样性

BIODIVERSITY SCIENCE

生态学数据分析方法专题 ※ 生物多样性保护融资与企业参与专题



主 办
中国科学院生物多样性委员会 Biodiversity Committee, CAS
中国植物学会 Botanical Society of China
中国科学院植物研究所 Institute of Botany, CAS
中国科学院动物研究所 Institute of Zoology, CAS
中国科学院微生物研究所 Institute of Microbiology, CAS

第34卷 第1期
2026年1月

Vol. 34 No. 1
January 2026

https://www.biodiversity-science.net

生 物 多 样 性

SHENGWU DUOYANGXING

第34卷 第1期 2026年1月

目 次

生态学数据分析方法专题

26030 数据分析方法: 揭开生态学研究的“黑箱”
张霜, 邹怡, 乔慧捷, 张健

25238 物种分布模型在宏观生态学和生物地理学中应用的思考
乔慧捷

25364 联合物种分布模型与生物群落层次建模框架: 生态学理论、方法及应用
谷际岐, 赖江山, 王瑛, 吴浩然, 张雪, 宋晓彤, 邵小明, 娄安如

25308 Meta分析应用中应注意的几个关键问题
张霜, 宋波

25278 α多样性指数选择: 不等量采样下的模拟比较
邹怡

25398 空间聚集度指数及其估计不确定性对聚集度–多度关系的影响
邢丁亮

25369 基于环境DNA宏条形码的无脊椎动物多样性研究: 生物信息学流程比较与评估
闫姿伶, 陈晓宇, 姚蒙

25263 一种基于不等长DNA序列的单倍型丰富度估算方法
姜媛, 黄贝希, 贾学圆, 梁思, 谢雨彤, 范平, 宋刚

25210 可解释机器学习及其生态学应用
石亚飞, 牛富荣, 黄晓敏, 洪星, 龚相文, 王艳莉, 林栋, 柳小妮

25386 生物多样性评估挑战的层级占有率模型解决路径
吴春莹, Viorel D. Popescu, 季吟秋

生物多样性保护融资与企业参与专题

25353 《生物多样性公约》现行资金机制及其替代方案
王也, 王茜璐, 关婧, 王迎

25187 国外生物多样性抵消研究现状和对策
田璐瑶, 尹豪

25299 生物多样性信用机制: 中外实践比较与启示
王茜璐, 王禹兮, 王也, 赵阳, 王新

25241 自然保护区生物多样性抵消价值实现的理论框架与运行机制
黎明, 秦响玲, 朱玉茹, 熊文

25269 生物多样性公益捐赠对《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》的贡献
杨方义, 靳彤, 申小莉, 张立, 杨彪

25246 企业生物多样性保护驱动路径与模式
蒙仁嘉, 秦涛, 汤心萌

25342 A股上市公司生物多样性信息披露对供应链韧性的影响
秦洋, 吾买尔江·艾山, 魏文涛, 迪丽尼嘎·沙木沙克

研究报告

生态系统多样性

25326 广西防城季节性雨林凋落物量时空动态及驱动因素
高雅, 刘绮, 刘民峰, 马瑞霞, 黄甫昭, 李冬兴, 向悟生, 丁涛, 王斌, 李先琨, 郭屹立

保护与治理对策

25040 中国国家公园人兽冲突解决的法治路径
孙啸宇

致谢2025年度审稿专家

封面: 生态学研究正经历从格局描述向机制解析与量化验证的范式转变, 数据分析方法和模型在其中发挥着重要作用。本期“生态学数据分析方法专题”收录9篇论文, 梳理并总结了当前生态学领域一些常用的分析方法。封面图以天目山森林生态系统秋季景观为背景, 呈现了野外调查完整度、物种空间聚集度与多度间的定量关系。(封面设计: 邹怡、邢丁亮; 图片提供: 胡健波)

BIODIVERSITY SCIENCE

Vol. 34 No. 1 January 2026

CONTENTS

Special Feature: Methods for Ecological Data Analysis

26030 **Methods of data analysis: Unpacking the "black box" in ecology**
Shuang Zhang, Yi Zou, Huijie Qiao and Jian Zhang

25238 **Thoughts on the application of species distribution models in macroecology and biogeography**
Huijie Qiao

25364 **Theoretical foundations, methodological advances, and applications of joint species distribution models with a focus on the HMSC framework in ecology**
Jiqi Gu, Jiangshan Lai, Ying Wang, Haoran Wu, Xue Zhang, Xiaotong Song, Xiaoming Shao and Anru Lou

25308 **Several key questions when conducting a meta-analysis**
Shuang Zhang and Bo Song

25278 **Alpha-diversity index selection: Simulation comparison under unequal sampling**
Yi Zou

25398 **Influence of aggregation indices and estimation uncertainty on the aggregation–abundance relationship**
Dingliang Xing

25369 **A comparative evaluation of bioinformatic pipelines for invertebrate biodiversity profiling via environmental DNA metabarcoding**
Ziling Yan, Xiaoyu Chen and Meng Yao

25263 **An approach for estimating haplotype richness from DNA sequences with unequal lengths**
Yuan Jiang, Beixi Huang, Xueyuan Jia, Si Liang, Yutong Xie, Ping Fan and Gang Song

25210 **Interpretable machine learning and its applications in ecology**
Yafei Shi, Furong Niu, Xiaomin Huang, Xing Hong, Xiangwen Gong, Yanli Wang, Dong Lin and Xiaoni Liu

25386 **Hierarchical occupancy models as solutions to challenges in biodiversity assessment**
Chunying Wu, Viorel D. Popescu and Yinqiu Ji

Special Feature: Biodiversity Conservation Financing and Corporate Participation

25353 **The current financial mechanism of the Convention on Biological Diversity and its alternatives**
Ye Wang, Qianlu Wang, Jing Guan and Ying Wang

25187 **The current situation and countermeasures of biodiversity offsetting studies abroad**
Luyao Tian and Hao Yin

25299 **Comparative analysis of biodiversity credits mechanisms in China and abroad and implications for China**
Qianlu Wang, Yuxi Wang, Ye Wang, Yang Zhao and Xin Wang

25241 **Theoretical framework and operational mechanisms of value realization in biodiversity offsetting for nature reserves**
Ming Li, Xiangling Qin, Yuru Zhu and Wen Xiong

25269 **The contribution of philanthropic funding to China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2023–2030)**
Fangyi Yang, Tong Jin, Xiaoli Shen, Li Zhang and Biao Yang

25246 **The driving path and mode of enterprises' biodiversity conservation**
Renjia Meng, Tao Qin and Xinmeng Tang

25342 **The impact of biodiversity information disclosure on supply chain resilience of A-share listed companies**
Yang Qin, Aishan Wumaierjiang, Wentao Wei and Shamushake Diliniga

Original Paper

Ecosystem Diversity

25326 **Spatiotemporal dynamics of litterfall production and driving factors in the Fangcheng seasonal rainforest, Guangxi**
Ya Gao, Qi Liu, Minfeng Liu, Ruixia Ma, Fuzhao Huang, Dongxing Li, Wusheng Xiang, Tao Ding, Bin Wang, Xiankun Li and Yili Guo

Conservation and Governance

25040 **Legal approaches to resolving human-wildlife conflicts in national parks of China**
Xiaoyu Sun

Cover Illustration: The ecology is undergoing a paradigm shift from the description of ecological patterns to mechanistic and quantitative analyses. In this shift, data analysis methods and modelling play a critical role. The special feature on "Methods for Ecological Data Analysis" introduces and summarizes several widely-used methods in ecology with nine papers. The cover image uses the autumn forest landscape in Mt. Tianmushan as the background, and showcases the quantitative relations among the completeness of field samplings, species spatial aggregation, and abundance. (Cover design: Yi Zou and Dingliang Xing; Cover image: Jianbo Hu).

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 26030, pages 1–3
doi: 10.17520/biods.2026030
cstr: 32101.14.biods.2026030

•生态学数据分析方法专题•

数据分析方法：揭开生态学研究的“黑箱”

张霜[1*], 邹怡[2], 乔慧捷[3], 张健[4]

1. 中国科学院生态环境研究中心区域与城市生态安全全国重点实验室, 北京 100085; 2. 西交利物浦大学理学院健康与环境科学系, 江苏苏州 215123; 3. 中国科学院动物研究所动物多样性保护与有害动物防控全国重点实验室, 北京 100101; 4. 中山大学生命科学学院, 进化与合成生物基础科学中心, 广州 510275

张霜, 邹怡, 乔慧捷, 张健 (2026) 数据分析方法: 揭开生态学研究的“黑箱”. 生物多样性, 34, 26030. doi: 10.17520/biods.2026030; cstr: 32101.14.biods.2026030.
Zhang S, Zou Y, Qiao HJ, Zhang J (2026) Methods of data analysis: Unpacking the “black box” in ecology. Biodiversity Science, 34, 26030. doi: 10.17520/biods.2026030; cstr: 32101.14.biods.2026030.

Methods of data analysis: Unpacking the “black box” in ecology

Shuang Zhang[1*], Yi Zou[2], Huijie Qiao[3], Jian Zhang[4]

1 *State Key Laboratory of Regional and Urban Ecology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China*
2 *Department of Health and Environmental Sciences, School of Science, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, Jiangsu 215123, China*
3 *State Key Laboratory of Animal Biodiversity Conservation and Integrated Pest Management, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China*
4 *Innovation Center for Evolutionary Synthetic Biology, School of Life Sciences, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China*

毫无疑问, 生态学已经成为一门高度依赖于数据分析的学科。在过去几十年中, 模型(model)是生态学中出现频率最高的词汇(McCallen et al., 2019)。几十年来, 生态学研究已经逐步从对格局的描述和概念性假设, 转变为对背后驱动机制的深层次探索和假说的量化验证。在这种研究范式转变过程中, 各种数据分析方法和模型发挥了重要作用。当前, 随着生态学研究空间、时间和组织维度的不断扩展, 其数据来源也日益复杂多样。如何处理量级和结构复杂程度远超历史的数据, 已成为生态学者面临的重要议题之一(张健, 2017)。

但是, 统计方法毕竟是对现实世界的抽象概括, 任何一种统计方法都有其适用前提和局限性。数据分析方法的不当应用, 尤其是将分析方法背后的原理与过程视为“黑箱”的做法, 正在成为生态学研究中的突出问题。特别是随着计算技术的高速发展, 越来越多的“点击即运行”的软件工具的出现, 进一步加剧了分析方法的黑箱化倾向(Joppa et al., 2013)。由此导致生态学领域内有相当数量的研究结果并不能重现, 或难以开展尺度推演与预测(Currie, 2019), 进而成为阻碍生态学中定理性和通用性规律形成的重要障碍之一。同时, 生态学数据分析方法具有典型的交叉学科属性, 对研究者的数理统计基础提出了较高要求。且新的方法和模型往往最先发表于英文期刊, 这对国内学者, 尤其是初学者的理解和应用造成了一定障碍。因此, 通过专题的形式集中发表一些主流统计方法、模型的介绍、总结以及应用论文, 是促进学科发展的必由之路。国际上, 美国生态学会主办的*Ecology*期刊, 早在1993年即刊出过生态学数据统计分析方法专题; 英国生态学会也于2010年创办了*Methods in Ecology and Evolution*期刊, 专门分享生态与演化领域的新方法。相比之下, 国内期刊尚未形成相近定位与规模的专题栏目或专刊。

本期“生态学数据分析方法专题”以期通过对生态学领域一些常用数据分析方法的介绍、梳理和总

* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: shuangzhang@rcees.ac.cn

结, 推动数据分析方法更科学、合理的应用。本专题共包括9篇论文, 内容上既涵盖了经典的物种分布模型、空间格局分析、多样性度量与评估方法等传统议题, 也包括机器学习、Meta分析等新兴和热点方法的介绍。

物种分布预测是生态学和保护实践结合最为紧密的领域之一。乔慧捷(2026)对物种分布模型(也称环境生态位模型)理念和方法的发展历程进行了系统回顾, 指出了应用中的概念混淆和模型误用问题, 提出了物种分布模型更为科学、规范的应用途径。谷际岐等(2026)全面梳理了联合物种分布模型这一新工具的理论原理和应用步骤, 分享了该方法的使用教程, 大大降低了初学者的入门障碍。多样性指数和空间分布格局分析是认识不同时空尺度生态学规律的重要环节, 邢丁亮(2026)通过数据模拟研究发现, 在物种空间分布格局分析中, 聚集度–多度关系会受到空间聚集度指数及其估计误差的影响, 凸显了对结果进行不确定性分析的必要性。

如何更准确、更有效地度量生物多样性, 是生态学领域的基础议题之一。邹怡(2026)评估了不同场景下9种常用多样性指数的功效, 明确了各个指标的最适样本量和采样完整度, 具有较高的实践指导价值。闫姿伶等(2026)总结了利用环境DNA宏条形码技术对无脊椎动物进行多样性测定的方法, 并在水生生态系统中对比了4种聚类和降噪方法的分类覆盖度和分辨率, 为多样性监测提供了新的工具和应用案例。姜媛等(2026)提出了一种基于公共数据库中不等长DNA序列的单倍型丰富度估算方法, 提升了我们对开源DNA数据利用的可靠性。吴春莹等(2026)针对生物多样性监测中的不完全检测问题, 介绍了层级占有率模型如何通过分离生态过程与观测过程的双层统计框架, 实现对不完全检测的无偏校正, 为保护实践提供了新的量化路径。

生态学大数据时代的到来也急需数据分析方法上的创新, 传统机器学习的“黑箱属性”使其难以提供清晰的结果解释, 石亚飞等(2026)以生态学野外调查数据为例, 展示了可解释机器学习模型在生态学研究中的强大应用价值, 为提升复杂来源数据的解释与预测能力提供了新的强力工具。张霜和宋波(2026)对Meta分析的理念和方法演进历程进行了较为全面的回顾, 阐明了该方法在应用中的误区, 并着重推荐了层次模型和各种数据不独立性结构的纳入, 以提升分析结果的可靠性。

总体上看, 这9篇论文集中反映了生态学统计分析方法关注的一些经典与新兴问题, 为读者较为全面地认识、学习和应用相关方法提供了重要参考和借鉴。本次专题的成功出版, 有力展现了国内学者在吸收、应用国际前沿生态学数据分析方法方面的坚实基础和积极探索。同时, 我们期望以此为契机, 进一步激发我国学者的创新潜力, 推动其在生态学数据分析方法领域提出和开发原创性的方法和工具, 以匹配并引领当前我国生态学研究蓬勃发展的总体态势。生物多样性领域的发展需通过数据共享、数据分析方法等的创新来提高其解释和预测能力(张健等, 2022), 而本专题正是朝着这个目标迈出的坚实一步。

著名生态学家罗伯特·麦克阿瑟(MacArthur, 1972)曾写道: “科学研究不是简单地累积事实, 而是在寻找重复的格局(To do science is to search for repeated patterns, not simply to accumulate facts)”。2019年在*Global Ecology and Biogeography*上组织的“宏生态学(macroecology) 30年”纪念专题(Currie, 2019; McGill, 2019)和2025年在*Ecography*上组织的“预测生物地理学(predictive biogeography)”专题(Meynard et al., 2025)都体现了生态学同行在这方面的不懈努力。本次专题的推出, 正是对国际上这些前沿工作的积极响应与延续, 更重要的是, 它将成为中文领域内对这一宏大议题进行系统性探讨的开拓性尝试。我们希望通过对日益剧增的生态学数据的深入挖掘, 加深对不断推陈出新的数据分析方法的深度理解, 为揭示生态学的普适性规律, 提高生态学研究的分析预测能力贡献绵薄之力。

ORCID

张霜 https://orcid.org/0000-0002-7367-4917
邹怡 https://orcid.org/0000-0002-7082-9258
乔慧捷 https://orcid.org/0000-0002-5345-6234
张健 https://orcid.org/0000-0003-0589-6267

参考文献

Currie DJ (2019) Where Newton might have taken ecology? Global Ecology and Biogeography, 28, 18–27.

Gu JQ, Lai JS, Wang Y, Wu HR, Zhang X, Song XT, Shao XM, Lou AR (2026) Theoretical foundations, methodological advances, and applications of joint species distribution

models with a focus on the HMSC framework in ecology. Biodiversity Science, 34, 25364. (in Chinese with English abstract) [谷际岐, 赖江山, 王瑛, 吴浩然, 张雪, 宋晓彤, 邵小明, 娄安如 (2026) 联合物种分布模型与生物群落层次建模框架: 生态学理论、方法及应用. 生物多样性, 34, 25364.]

Jiang Y, Huang BX, Jia XY, Liang S, Xie YT, Fan P, Song G (2026) An approach for estimating haplotype richness from DNA sequences with unequal lengths. Biodiversity Science, 34, 25263. (in Chinese with English abstract) [姜媛, 黄贝希, 贾学圆, 梁思, 谢雨彤, 范平, 宋刚 (2026) 一种基于不等长DNA序列的单倍型丰富度估算方法. 生物多样性, 34, 25263.]

Joppa LN, McInerny G, Harper R, Salido L, Takeda K, O’Hara K, Gavaghan D, Emmott S (2013) Troubling trends in scientific software use. Science, 340, 814–815.

MacArthur RH (1972) Geographical Ecology: Patterns in the Distribution of Species. Princeton University Press, Princeton.

McCallen E, Knott J, Nunez-Mir G, Taylor B, Jo I, Fei SL (2019) Trends in ecology: Shifts in ecological research themes over the past four decades. Frontiers in Ecology and the Environment, 17, 109–116.

McGill BJ (2019) The what, how and why of doing macroecology. Global Ecology and Biogeography, 28, 6–17.

Meynard CN, Record S, Galiana N, Gravel D, Araújo MB (2025) Emerging horizons in predictive biogeography. Ecography, 2025, e07910.

Qiao HJ (2026) Thoughts on the application of species distribution models in macroecology and biogeography. Biodiversity Science, 34, 25238. (in Chinese with English abstract) [乔慧捷 (2026) 物种分布模型在宏观生态学和生物地理学中应用的思考. 生物多样性, 34, 25238.]

Shi YF, Niu FR, Huang XM, Hong X, Gong XW, Wang YL, Lin D, Liu XN (2026) Interpretable machine learning and its applications in ecology. Biodiversity Science, 34, 25210. (in Chinese with English abstract) [石亚飞, 牛富荣, 黄晓敏, 洪星, 龚相文, 王艳莉, 林栋, 柳小妮 (2026) 可解释机器学习及其生态学应用. 生物多样性, 34, 25210.]

Wu CY, Popescu VD, Ji YQ (2026) Hierarchical occupancy models as solutions to challenges in biodiversity assessment. Biodiversity Science, 34, 25386. (in Chinese with English abstract) [吴春莹, Viorel D. Popescu, 季吟秋 (2026) 生物多样性评估挑战的层级占有率模型解决路径. 生物多样性, 34, 25386.]

Xing DL (2026) Influence of aggregation indices and estimation uncertainty on the aggregation–abundance relationship. Biodiversity Science, 34, 25398. (in Chinese with English abstract) [邢丁亮 (2026) 空间聚集度指数及其估计不确定性对聚集度–多度关系的影响. 生物多样性, 34, 25398.]

Yan ZL, Chen XY, Yao M (2026) A comparative evaluation of bioinformatic pipelines for invertebrate biodiversity profiling via environmental DNA metabarcoding. Biodiversity Science, 34, 25369. (in Chinese with English abstract) [闫姿伶, 陈晓宇, 姚蒙 (2026) 基于环境DNA宏条形码的无脊椎动物多样性研究: 生物信息学流程比较与评估. 生物多样性, 34, 25369.]

Zhang J (2017) Biodiversity science and macroecology in the era of big data. Biodiversity Science, 25, 355–363. (in Chinese with English abstract) [张健 (2017) 大数据时代的生物多样性科学与宏生态学. 生物多样性, 25, 355–363.]

Zhang J, Kong HZ, Huang XL, Fu SL, Guo LD, Guo QH, Lei FM, Lü Z, Zhou YR, Ma KP (2022) Thirty key questions for biodiversity science in China. Biodiversity Science, 30, 22609. (in Chinese with English abstract) [张健, 孔宏智, 黄晓磊, 傅声雷, 郭良栋, 郭庆华, 雷富民, 吕植, 周玉荣, 马克平 (2022) 中国生物多样性研究的30个核心问题. 生物多样性, 30, 22609.]

Zhang S, Song B (2026) Several key questions when conducting a meta-analysis. Biodiversity Science, 34, 25308. (in Chinese with English abstract) [张霜, 宋波 (2026) Meta分析应用中应注意的几个关键问题. 生物多样性, 34, 25308.]

Zou Y (2026) Alpha-diversity index selection: Simulation comparison under unequal sampling. Biodiversity Science, 34, 25278. (in Chinese with English abstract) [邹怡 (2026) α多样性指数选择: 不等量采样下的模拟比较. 生物多样性, 34, 25278.]

(责任编辑: 黄祥忠)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE
2026, 34 (1): 25238, pages 1–8
doi: 10.17520/biods.2025238
cstr: 32101.14.biods.2025238

•生态学数据分析方法专题•

物种分布模型在宏观生态学和生物地理学中应用的思考

乔慧捷*

中国科学院动物研究所动物多样性保护与有害动物防控全国重点实验室, 北京 100101

摘要: 物种分布模型(species distribution models, SDMs)已成为宏观生态学和生物地理学研究不可或缺的工具, 广泛应用于预测物种分布、评估外来物种的入侵风险和气候变化对物种分布的影响等, 从而指导入侵物种防控和生物多样性保护规划。然而, 该领域的快速发展也伴随着理论与实践的脱节, 尤其体现在对“生态位”概念的混淆上。本文系统梳理了生态学中3个核心的生态位概念: 格林内尔生态位(Grinnellian niche), 关注环境条件与物种分布的宏观关系; 埃尔顿生态位(Eltonian niche), 强调物种在群落中的功能角色和生物互作; 以及哈钦森生态位(Hutchinsonian niche), 提供了“n维超体积(n-dimensional hypervolume)”的数学框架, 并区分了基础生态位与实际生态位。本文进一步探讨了与各生态位概念相对应的建模方法, 包括标准的物种分布模型、联合物种分布模型(joint species distribution models, JSDMs)和n维超体积分析。通过分析当前研究中存在的概念混淆(如将基于存在记录的物种分布模型等同于基础生态位模型)、模型误用(如忽视非平衡状态和采样偏差)等常见问题, 本文强调了明确研究的理论基础、匹配建模方法与研究问题、审慎解读模型结果的重要性。最后, 本文提出, 未来的研究应致力于概念的清晰化、方法的整合化以及理论与应用的深度融合, 从而更科学、规范地应用物种分布模型, 推动生态学理论的发展。

关键词: 生态位; 生态位模型; 环境适宜度; 模型误用

乔慧捷 (2026) 物种分布模型在宏观生态学和生物地理学中应用的思考. 生物多样性, 34, 25238. doi: 10.17520/biods.2025238; cstr: 32101.14.biods.2025238.
Qiao HJ (2026) Thoughts on the application of species distribution models in macroecology and biogeography. Biodiversity Science, 34, 25238. doi: 10.17520/biods.2025238; cstr: 32101.14.biods.2025238.

Thoughts on the application of species distribution models in macroecology and biogeography

Huijie Qiao*

State Key Laboratory of Animal Biodiversity Conservation and Integrated Pest Management, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

ABSTRACT

Background & Aims: Species distribution models (SDMs), often synonymous with ecological niche models (ENMs), have solidified their position as indispensable tools in modern macroecology, biogeography, species invasion and conservation. Their utility in predicting a species' potential geographic range, evaluating the impacts of climate change, and guiding targeted conservation efforts has led to a remarkable surge in their popularity and application over the last three decades. However, this rapid expansion has also exposed a significant and persistent conceptual gap: a growing disconnect between the practical application of modeling techniques and the foundational ecological theory that should guide them. A primary source of this issue is the widespread confusion surrounding the concept of the “ecological niche”. This ambiguity has led to conceptual errors, inappropriate method use, and potentially flawed ecological inferences. This paper addresses this critical gap by systematically reviewing the core niche concepts, linking them to

收稿日期 Received: 2025-06-20; 接受日期 Accepted: 2025-09-02
基金项目: 国家重点研发计划(2021YFD1400200)和国家自然科学基金(32271732) Supported by the National Key Research and Development Program of China (2021YFD1400200) and National Natural Science Foundation of China (32271732)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: qiaohj@ioz.ac.cn

specific modeling paradigms, diagnosing prevalent issues in current research, and offering recommendations to promote a more theoretically grounded and robust application of SDMs.
Review Results: The term "ecological niche" is not a single, unified concept. It encompasses three distinct yet complementary ideas. The Grinnellian niche defines a species' existence based on the abiotic environmental conditions and habitat requirements that allow it to persist. As a "scenopoetic" or habitat-based framework, it is most closely aligned with standard SDMs, which statistically correlate species occurrence records with broad-scale climatic and environmental variables. The Eltonian niche, conversely, focuses on a species' functional role within a community, emphasizing biotic interactions such as resource consumption, predation, and competition. This concept is central to community ecology and is better represented by methods like joint species distribution models (JSDMs) that account for residual correlations between species, or through explicit network analysis. The Hutchinsonian niche provides the most formal definition, conceptualizing the niche as an "n-dimensional hypervolume" encompassing all environmental and resource variables. Different modeling approaches correspond to these niche concepts. Standard correlative SDMs (e.g., MaxEnt, random forest) are primarily used to model the Grinnellian niche, generating a map of environmental suitability based on abiotic variables. To explore the Eltonian niche, JSDMs simultaneously model multiple species to infer interspecific interactions. The Hutchinsonian framework, particularly the concept of the hypervolume, is directly operationalized by analytical methods that quantify niche breadth, overlap, and centrality in multidimensional space. Mechanistic models, which use principles of physiology to predict survival and reproduction, offer a valuable complementary approach to approximate the fundamental niche. Despite these advances, the application of SDMs is fraught with common pitfalls. The most critical error is the fundamental vs. realized niche fallacy, where researchers mistakenly interpret the output of a standard SDM, which is trained on a species' actual distribution, as a representation of its full fundamental niche. In reality, these models typically capture only a portion of the realized niche, constrained by unmeasured biotic factors and dispersal limitations. Additionally, many studies violate the core assumptions of SDMs, such as the assumption that species are in equilibrium with their environment or that sampling is unbiased. Ignoring biotic interactions and failing to account for non-equilibrium dynamics (e.g., recent invasions) further limits the accuracy and reliability of these models.
Conclusions: To advance SDM, this paper advocates for a multi-pronged approach grounded in ecological theory. First, researchers must strive for greater conceptual clarity, explicitly stating which niche concept their study addresses and interpreting results within that defined framework. Second, there is a clear need for enhanced methodological rigor and integration, encouraging the development of hybrid models that combine the strengths of different modeling paradigms, such as incorporating biotic interactions or dispersal dynamics into standard SDMs. Furthermore, adherence to best practices in data collection, model selection, and rigorous validation is paramount. The future of the field lies in transcending simple correlative methods and embracing a more integrative science that synthesizes Grinnellian, Eltonian, and Hutchinsonian perspectives. By leveraging new data streams and grounding our work in a deep understanding of ecological theory, we can ask more complex questions and provide more robust guidance for biodiversity management in an era of rapid environmental change.
Key words: ecological niche; ecological niche model; environmental suitability; model misapplication

物种分布模型(species distribution models, SDMs)又被称为生态位模型(ecological niche models, ENMs), 是生态学中研究物种与环境关系的核心工具, 已广泛应用于生物地理学、物种保护以及气候变化影响评估等领域(Araújo & Guisan, 2006; Elith & Leathwick, 2009; 乔慧捷等, 2013)。虽然二者常常可以互换使用, 但在概念上存在细微差别: 生态位模型更侧重于理论层面, 旨在理解物种在多维环境空间中的生态需求, 即"这个物种能在什么样的环境中生存"; 而物种分布模型则更侧重于应用层面, 旨在将这种生态需求投射到地理空间, 预测物种的实际地理分布, 回答"这个物种现在在哪里, 以及未来可能在哪里" (Peterson & Soberón, 2012)。通过分析物种的分布数据与一系列环境变量之间的关联, 物种分布模型能够预测物种潜在分布范围的时空动态, 并为理解生态过程提供定量基础(Wiethase et al., 2024)。Vasconcelos等(2024)研究显示, 自物种分布模型诞生以来的30多年间, 相关研究的年增长率高达11.99%, 这凸显了该领域在全球变化背景下日益增长的重要性, 并已确立了其作为一个关键研究领域的地位。

然而, 随着模型技术的发展和应用的普及, 一些研究人员在实践中对生态位的理论内涵、数据要求和适用范围却常常存在混淆与争议。许多研究逐

渐脱离了经典生态学理论中对生态位的定义(见后续的详细论述), 而将模型简化为解决特定问题的“黑箱”工具(Colwell & Rangel, 2009; Escobar et al., 2018)。这种理论与实践的脱节可能导致模型误用和结论偏差。为此, 本文旨在系统梳理物种分布模型背后的核心生态位理论、主要的建模范式及其适用场景, 深入分析当前研究中常见的概念混淆与建模误用问题, 以期为物种分布模型的规范化应用提供清晰的指导, 促进该领域的健康发展。

1 理论背景: 生态位概念的三重演变

生态学中“生态位”这一核心概念经历了深刻的演变, 形成了3个主要但常被混淆的理论分支, 理解它们的差异是正确应用物种分布模型的前提。

(1)格林内尔生态位(Grinnellian niche)。由约瑟夫·格林内尔(Joseph Grinnell)提出, 主要关注影响物种生存的环境条件和栖息地(Grinnell, 1917, 1928)。他认为生态位是物种在环境中能够维持种群繁衍的一系列非生物性因子(如温度、降水、海拔)的组合。因此, 格林内尔生态位本质上是一个“地址”或“生境”的概念, 强调宏观气候等非生物因素对物种地理分布的决定性作用。这一概念与现代物种分布模型的实践最为契合, 因为大多数物种分布模型正是通过关联物种存在点与大尺度气候图层来预测其潜在分布区。

(2)埃尔顿生态位(Eltonian niche)。由查尔斯·埃尔顿(Charles Elton)提出, 它更强调物种在群落中的功能角色和相互作用(Elton, 1927)。他认为, 一个物种的生态位不仅包括其生存所需的环境, 更重要的是其在食物网中的位置和角色, 如其捕食对象、天敌、竞争者和共生者。埃尔顿生态位关注的是生物因素和物种间的关系, 这使得它更适用于研究局部群落结构、食物网动态和功能生态学等问题。

(3)哈钦森生态位(Hutchinsonian niche)。由乔治·伊夫林·哈钦森(George Evelyn Hutchinson)提出, 它为生态位概念提供了严谨的数学框架。他将生态位定义为在一个由所有影响物种生存和繁殖的环境变量构成的多维空间中的“n维超体积”(Hutchinson, 1957, 1978)。这个框架的革命性在于, 它不仅能统一格林内尔的非生物环境(作为维度)和埃尔顿的生物互作(作为资源或条件维度), 还引入了两个至关重要的概念, 即基础生态位(fundamental niche)和实际生态位(realized niche), 前者指在没有竞争者、捕食者等生物限制的情况下, 物种仅凭其生理和形态特征所能占据的全部n维超体积; 后者即由于种间竞争、捕食等负面生物互作的压力, 物种实际占据的基础生态位的一部分。

这3种定义在内涵和应用尺度上各有侧重。格林内尔生态位关注宏观尺度的环境容限, 埃尔顿生态位关注局域尺度的生物互作, 而哈钦森生态位则提供了将二者统一的理论模型(Soberón, 2007)。正如Wiens (2011)指出的, 生物地理学家通常更关注决定分布边界的格林内尔因素, 而群落生态学家则更关注埃尔顿式的互作。理解这3种生态位定义的差异, 对于选择恰当的模型方法、界定研究问题和解释研究结果具有决定性意义。

针对不同的生态位概念, 研究人员发展出了不同的建模范式:

(1)格林内尔生态位建模(物种分布模型)。这是最主流的方法, 直接对应格林内尔生态位概念。这类模型通常使用物种的观测分布数据(如物种出现点)和栅格化的环境变量(主要是气候、地形等)作为输入, 通过统计或机器学习算法(如最大熵(MaxEnt)模型、广义线性模型、随机森林等)建立关联。这类模型通过学习物种出现点的环境特征与背景环境的差异, 生成一幅地理空间上的“环境适宜度”地图, 即物种的潜在分布图。这类模型广泛用于解决大尺度生物地理学问题, 如预测物种对气候变化的响应、寻找保护区候选地等。但需谨记, 其结果是基于相关性的推断, 并隐含了物种处于环境平衡状态的假设。

(2)埃尔顿生态位建模(如功能生态位与共现模型)。埃尔顿生态位建模旨在量化物种间的互作和功能角色, 目前尚无统一标准。常用方法包括利用联合物种分布模型(joint species distribution model, JSDM)同时对多个物种的分布进行建模。在控制了各物种对环境的独立响应后, 模型会分析物种分布的残差相关性。显著的正相关或负相关可被解释为物种间可能存在促进或竞争/排斥关系, 从而间接推断生物互作(Warton, 2015; Warton et al., 2015)。除了JSDM之外, 在埃尔顿生态位建模中, 特别是当缺乏多物种共存数据时, 研究人员常采用“事后整

合(post-hoc integration)”或“二级组合(two-stage combination)”方法。这种方法首先基于独立的单物种分布模型分别预测目标物种及其关键互作伙伴(如食物来源、宿主等)的潜在分布。然后将这些独立预测结果进行叠加或组合, 以反映生物互作对物种分布的共同限制。例如, Engelhardt等(2020)在研究星鸦(*Nucifraga caryocatactes*)时, 将星鸦与它的食源植物——瑞士五针松(*Pinus cembra*)和欧洲榛(*Corylus avellana*)的分布预测结果结合起来, 以评估这种营养关系对星鸦未来分布的影响; Zhang等(2024)在预测珊瑚礁共生蟹类的分布时, 也采用了将宿主珊瑚的分布预测结果整合到共生蟹类模型中的方法; 在生态网络分析中, 常常通过构建物种–资源网络(如捕食–被捕食、植物–传粉者)来分析物种在网络中的位置(如中心度), 以此来刻画其功能角色(冯志荣等, 2023)。

(3)哈钦森生态位建模(如n维超体积分析)。该方法直接将哈钦森的几何概念付诸实践。它使用物种在环境变量或功能性状变量上的多维观测数据作为输入, 通过算法(如凸包、核密度估计)在高维空间中构建一个代表该物种实际生态位的几何体(即超体积生态位)。Blonder等开发的“hypervolume”软件包(Blonder et al., 2014, 2017, 2018; Blonder, 2018)提供了一种高效的实现方式。通过计算超体积的大小(生态位宽度)、形状以及不同物种超体积之间的重叠度(生态位相似性), 研究人员可以定量比较不同物种的生态位特征。该方法能直观反映生态位的多维几何属性, 但计算量会随维度的增加而剧增, 且对数据质量和维度选择十分敏感(Qiao et al., 2017)。

(4)机理性物种分布模型。值得一提的是, 除了上述统计和几何方法, 还有机理性物种分布模型。这类模型不依赖于分布数据与环境的相关性, 而是基于物种的生理学第一性原理(如热量平衡、能量收支)来模拟物种的生存和繁殖能力(Porter & Kearney, 2009)。因此, 机理性物种分布模型旨在直接模拟物种的基础生态位, 在新颖环境(如未来气候)下其预测能力理论上更强, 可与传统物种分布模型形成重要互补。然而, 这类模型对生理耐受、行为模式等信息的需求量极大(extremely data-hungry), 因此目前仅在少量生理生态学研究基础较好的物种中得以应用。

2 应用场景与整合趋势

在不同时空尺度和研究问题下, 上述物种分布模型的应用各有侧重。在大尺度生物地理学领域, 研究人员通常采用格林内尔生态位模型来揭示宏观环境对物种分布的约束, 例如评估气候变化对整个物种分布范围的影响。而在研究群落结构与局地生态时, 研究重点则转向埃尔顿生态位下的生物互作。此时, 研究人员更关注物种的功能性状、资源利用和种间关系, 常利用JSDM或网络模型分析群落的构建机制。

当前, 物种分布预测研究领域一个重要的发展趋势是整合多种模型。例如, 有研究将物种分布模型与种群动态或扩散模型相结合, 构建动态生态位模型, 从而同时考虑环境适宜度和物种的生物学特性(Kearney & Porter, 2009; Kearney et al., 2009)。另一种整合思路是将生态位超体积分析应用于群落尺度, 联合考虑环境(格林内尔)和功能性状(埃尔顿)维度, 构建“整合性生态位”视角, 以对比不同生态系统的功能空间差异。总体而言, 格林内尔模型适合宏观环境驱动的分布模式研究, 埃尔顿模型适合群落交互与功能角色研究, 而哈钦森框架则提供了一个在任何尺度上表征多维生态位空间的通用量化方法。

3 物种分布模型使用中的常见问题剖析

3.1 概念混淆与模型误用

在物种分布模型的应用过程中常出现若干概念混淆和模型误用, 严重影响研究结论的可靠性。其中, 将模型输出等同于物种的基础生态位是最为普遍且影响深远的问题。这一混淆的根源在于对模型输入的物种存在记录所代表生态意义的误解。Soberón和Peterson (2005)在其经典的生物–非生物–可移动性(biotic–abiotic–movement, BAM)框架中对此进行了系统阐述。他们指出, 一个物种的实际地理分布区(geographic range, G_R)是3个因素共同作用的结果, 即适宜的非生物环境(abiotic, A)、允许物种存在的生物互作(biotic, B), 以及物种能够通过扩散到达的区域(movement, M)。标准的物种分布模型通过关联物种的实际地理分布区(G_R)与环境变量(A)来建模, 但这一过程忽略了生物互作和扩散限制的

决定性影响。因此, 模型学习到的实际上是物种的实际生态位, 即在竞争、捕食和扩散能力限制下, 物种实际占据的那部分环境空间, 而非其生理上能够耐受的全部环境范围, 即基础生态位所表达的范畴。忽略这一区别会带来严重的实践后果。在入侵物种风险评估中, 研究人员常使用物种在原产地的分布数据建模, 并预测其在入侵地的潜力。然而, 入侵物种在新环境中可能摆脱了天敌、竞争者和病原体(即天敌释放假说, enemy release hypothesis), 导致其生物互作(B)发生根本性改变(Mitchell & Power, 2003)。这使得物种能够占据其基础生态位中此前未被利用的部分, 发生“生态位移动”或“生态位扩张” (Gallagher et al., 2010)。因此, 仅基于原产地实际生态位构建的模型会系统性地低估其入侵潜力(Peterson, 2003; Beaumont et al., 2016; Escobar et al., 2018)。同样, 在气候变化影响评估中, 如果一个物种的分布范围未能跟上气候变化的步伐(即处于非平衡状态), 那么基于其当前滞后分布建立的模型将无法准确预测其未来能够开拓的新栖息地(Stigall, 2014)。此外, 在保护生物学中, 如果一个物种因人类活动(如栖息地破坏、过度捕猎)而从其历史分布区的大部分区域消失, 那么基于其当前受限的、碎片化的分布数据建立的模型, 可能会错误地将大片历史上适宜的栖息地评估为不适宜, 从而对物种恢复和再引入计划产生误导(Pulliam, 2000; Britnell et al., 2023)。总之, 将物种分布模型关于环境适宜度的统计描述的输出直接等同于物种完整的生物学需求是一种概念上的简化和误用。正如多位学者反复强调的, 审慎区分基础生态位与实际生态位, 是规范应用物种分布模型并得出可靠生态学推论的逻辑起点(Guisan & Thuiller, 2005; Araújo & Guisan, 2006)。

3.2 应用场景与模型假设不符

除了核心概念的混淆, 物种分布模型应用的可靠性还受到一系列模型方法与科学问题的前提假设相违背的严重挑战。这些问题并非细枝末节的技术瑕疵, 而是能够从根本上动摇模型预测有效性的关键缺陷。其中平衡假设的违背(violation of the equilibrium assumption)在物种分布模型研究领域是个值得注意的问题(Gallien et al., 2012)。大多数相关性物种分布模型隐含一个核心假设, 即物种的地理分布与其环境处于平衡状态, 即物种已经占据了其扩散能力范围内所有适宜的栖息地(Araújo et al., 2005)。然而, 在动态变化的现实世界中, 这一假设频繁被违背。其中对于入侵物种来说, 它们正处于快速扩张阶段, 其当前的分布范围远未达到其潜在环境的边界。基于其早期或中期入侵数据建立的模型, 会因数据不完整而产生一个被“截断”的生态位, 从而严重低估其最终的入侵范围和生态风险(Gallagher et al., 2010)。而对于濒危或衰退物种来说, 它们的分布区可能因人类活动、疾病或气候变化而正在收缩, 其当前的“残迹分布”仅代表其历史适宜生境的一小部分。在这种非平衡状态下建模, 会错误地将大量历史上适宜但现已空置的区域识别为不适宜区域, 从而对物种恢复和保护区的选划产生误导(Rodríguez-Soto et al., 2011)。当研究对气候变化响应滞后的物种时, 因许多物种的迁移速度跟不上气候变化的速度, 导致其分布区落后于适宜气候区的移动, 形成所谓的“气候债务” (Devictor et al., 2008)。在这种情况下, 基于当前滞后分布建立的模型将无法准确预测物种在未来真正能够定居的潜在新区域。

3.3 采样数据偏差

数据偏差与背景选择也是影响物种分布建模结果的重要因素, 或导致建模失败的主要原因。物种分布模型的性能高度依赖于输入数据的质量, 而“有偏采样”是物种分布数据中最常见的问题。物种记录点往往集中在交通便利的地区(如公路、河流沿线)、人口密集区或著名的自然保护区, 而广阔的偏远地区则采样不足。这种“采集者偏差”会导致模型学习到物种与这些采样便利性因素的虚假关联, 而非其真实的生态需求(Phillips et al., 2009; Hughes et al., 2021)。为了缓解这一问题, 研究人员发展了多种策略, 如空间稀疏化以减少空间自相关, 或采用目标群体背景点, 即使用与目标物种具有相似采样偏差的其他物种的记录点作为背景来校正模型(Phillips et al., 2009)。然而, 背景点的选择本身就是一个关键且复杂的问题。对于仅有存在数据的模型(如MaxEnt), 背景点的选择范围界定了模型学习的“环境域”。一个过于宽泛的背景(如整个大陆)可能导致模型过于泛化, 而一个过于狭窄的背景则可能导致模型过拟合, 无法识别出真正的环境限制因子

(Barve et al., 2011)。

3.4 缺乏对模型推理能力的评估

对模型可迁移性与外推风险的评估和检验也是物种分布模型建模过程中需要重视的因素。模型的可迁移性是指将在一个时空范围(源)训练的模型, 应用于另一个时空范围(目标)时的预测能力(Qiao et al., 2019)。这是物种分布模型在预测未来气候变化影响或物种入侵潜力时的核心要求, 但也是其最大的软肋。当目标环境出现了源环境中从未有过的全新环境组合时, 即所谓的非相似环境, 模型必须进行外推而非内插。相关性模型在外推时极不可靠, 因为它们学习到的统计关系在新的环境条件下可能不再成立(Randin et al., 2006)。例如, 一个模型在某山脉学习到“海拔”与物种分布呈正相关, 这可能是因为海拔是温度的良好代理变量。但当模型被投射到另一个具有不同“温度直减率”的山脉时, 同样的海拔可能对应完全不同的温度, 导致预测完全失效。因此, 盲目地将模型跨时空投射是极其危险的。研究人员必须首先通过MESS (multivariate environmental similarity surfaces)分析、MOP (mobility-oriented parity)分析或ENMTools等方法评估目标环境的非相似性程度(Elith & Leathwick, 2007; Owens et al., 2013; Warren et al., 2021), 并对模型的预测进行严格限制或赋予极高的不确定性, 以避免得出看似精确实则毫无根据的结论(Qiao et al., 2019)。

4 建议与展望

针对上述问题, 研究人员应采取多方面的改进措施, 以提升物种分布模型应用的科学性与规范性。首先, 需要明确概念, 精准表达。在研究设计、撰稿和解释时, 必须清晰地区分所探讨的是格林内尔、埃尔顿还是哈钦森生态位。例如, 若关注气候响应, 应明确是基于格林内尔视角; 若研究功能角色, 则应立足于埃尔顿视角。在解读物种分布模型结果时, 应审慎地称其为“环境适宜度”而非“生态位”, 并承认其反映的是实际生态位的一部分。其次, 需要匹配方法与研究问题。应根据研究目标选择恰当的变量集和模型。用于气候物种分布模型的环境变量集(如气候、土壤)应与研究问题匹配。若要考虑生物互作, 可尝试在模型中纳入竞争者分布、寄主植物分布等生物变量以部分反映埃尔顿因素。对于哈钦森视角, 则应收集代表物种需求的多维变量, 并采用多维几何分析方法。再次, 需要遵循规范, 严谨建模。在建模过程中需要改进抽样设计、处理数据偏差、进行严格的模型选择、评估和不确定性分析。Soley-Guardia等(2024)总结的“十大危害”为生态位建模提供了明确的避错指南, 研究人员应遵循这些已有规范。相关人员已经提出了标准化协议, 例如ODMAP (overview, data, model, assumptions, and predictions) (Zurell et al., 2020)和实现生态位模型最大可重复性的过程描述清单(Feng et al., 2019), 它们为研究人员提供了清晰的框架, 以确保研究的可重复性和透明度。最后, 特别是对于初入该领域的研究学者, 需要加强培训, 拒绝“黑箱”。应加强对物种分布模型相关方法论的培训和学术交流, 避免将模型当作一键出图的“黑箱”。通过研讨会、课程和合作研究, 培养研究人员对各种算法的假设、数据要求和结果解释的深刻理解, 是提高模型应用可靠性和推动创新的关键。

物种分布模型领域正从单纯的相关性分析向更具整合性和机理性的方向发展。未来的研究将更多地致力于: (1)开发能融合环境约束、生物互作和生理机制的混合模型; (2)结合遥感、基因组学、环境DNA等新兴数据源, 以更高分辨率和更广维度刻画生态位; (3)回答更复杂的问题, 从预测“哪里有”到解释“为什么”, 深入探讨生态位演化、群落构建和生态系统功能等核心科学问题。综上所述, 只有在研究设计、方法选择和结果解读层面全面提升科学素养, 才能充分发挥物种分布模型的强大潜力, 为生态学理论和生物多样性保护实践提供坚实支持。

ORCID

乔慧捷 https://orcid.org/0000-0002-5345-6234

参考文献

Araújo MB, Guisan A (2006) Five (or so) challenges for species distribution modelling. Journal of Biogeography, 33, 1677–1688.

Araújo MB, Pearson RG, Thuiller W, Erhard M (2005) Validation of species–climate impact models under climate change. Global Change Biology, 11, 1504–1513.

Barve N, Barve V, Jiménez-Valverde A, Lira-Noriega A, Maher SP, Peterson AT, Soberón J, Villalobos F (2011) The

crucial role of the accessible area in ecological niche modeling and species distribution modeling. Ecological Modelling, 222, 1810–1819.

Beaumont LJ, Graham E, Duursma DE, Wilson PD, Cabrelli A, Baumgartner JB, Hallgren W, Esperón-Rodríguez M, Nipperess DA, Warren DL, Laffan SW, VanDerWal J (2016) Which species distribution models are more (or less) likely to project broad-scale, climate-induced shifts in species ranges? Ecological Modelling, 342, 135–146.

Blonder B (2018) Hypervolume concepts in niche- and trait-based ecology. Ecography, 41, 1441–1455.

Blonder B, Lamanna C, Violle C, Enquist BJ (2014) The n-dimensional hypervolume. Global Ecology and Biogeography, 23, 595–609.

Blonder B, Lamanna C, Violle C, Enquist BJ (2017) Using n-dimensional hypervolumes for species distribution modelling: A response to Qiao et al. (2016). Global Ecology and Biogeography, 26, 1071–1075.

Blonder B, Morrow CB, Maitner B, Harris DJ, Lamanna C, Violle C, Enquist BJ, Kerkhoff AJ (2018) New approaches for delineating n-dimensional hypervolumes. Methods in Ecology and Evolution, 9, 305–319.

Britnell JA, Zhu YC, Kerley GIH, Shultz S (2023) Ecological marginalization is widespread and increases extinction risk in mammals. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 120, e2205315120.

Colwell RK, Rangel TF (2009) Hutchinson's duality: The once and future niche. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 106, 19651–19658.

Devictor V, Julliard R, Couvet D, Jiguet F (2008) Birds are tracking climate warming, but not fast enough. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275, 2743–2748.

Elith J, Leathwick JR (2007) Predicting species distributions from presence-only data: A case study of MaxEnt and some other methods. Ecography, 30, 224–230.

Elith J, Leathwick JR (2009) Species distribution models: Ecological explanation and prediction across space and time. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 40, 677–697.

Elton CS (1927) Animal Ecology. University of Chicago Press, Chicago.

Engelhardt EK, Neuschulz EL, Hof C (2020) Ignoring biotic interactions overestimates climate change effects: The potential response of the spotted nutcracker to changes in climate and resource plants. Journal of Biogeography, 47, 143–154.

Escobar LE, Qiao HJ, Cabello J, Peterson AT (2018) Ecological niche modeling re-examined: A case study with the Darwin's fox. Ecology and Evolution, 8, 4757–4770.

Feng X, Park DS, Walker C, Peterson AT, Merow C, Papeş M (2019) A checklist for maximizing reproducibility of ecological niche models. Nature Ecology & Evolution, 3, 1382–1395.

Feng ZR, Chen YC, Peng YQ, Li L, Wang B (2023) Ecological network analysis: From metacommunity to metanetwork. Biodiversity Science, 31, 23171. (in Chinese with English abstract) [冯志荣, 陈有城, 彭艳琼, 李莉, 王波 (2023) 生态网络分析: 从集合群落到集合网络. 生物多样性, 31, 23171.]

Gallagher RV, Beaumont LJ, Hughes L, Leishman MR (2010) Evidence for climatic niche and biome shifts between native and novel ranges in plant species introduced to Australia. Journal of Ecology, 98, 790–799.

Gallien L, Douzet R, Pratte S, Zimmermann NE, Thuiller W (2012) Invasive species distribution models – how violating the equilibrium assumption can create new insights. Global Ecology and Biogeography, 21, 1126–1136.

Grinnell J (1917) The niche-relationships of the California thrasher. The Auk, 34, 427–433.

Grinnell J (1928) Presence and Absence of Animals. University of California Chronicle Press, Berkeley.

Guisan A, Thuiller W (2005) Predicting species distribution: Offering more than simple habitat models. Ecology Letters, 8, 993–1009.

Hughes AC, Orr MC, Ma KP, Costello MJ, Waller J, Provoost P, Yang QM, Zhu CD, Qiao HJ (2021) Sampling biases shape our view of the natural world. Ecography, 44, 1259–1269.

Hutchinson GE (1957) The multivariate niche. Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology, 22, 415–421.

Hutchinson GE (1978) An Introduction to Population Ecology. Yale University Press, New Haven.

Kearney M, Porter WP (2009) Mechanistic niche modelling: Combining physiological and spatial data to predict species' ranges. Ecology Letters, 12, 334–350.

Kearney M, Porter WP, Williams C, Ritchie S, Hoffmann AA (2009) Integrating biophysical models and evolutionary theory to predict climatic impacts on species' ranges: the dengue mosquito *Aedes aegypti* in Australia. Functional Ecology, 23, 528–538.

Mitchell CE, Power AG (2003) Release of invasive plants from fungal and viral pathogens. Nature, 421, 625–627.

Owens HL, Campbell LP, Dornak LL, Saupe EE, Barve N, Soberón J, Ingenloff K, Lira-Noriega A, Hensz CM, Myers CE, Peterson AT (2013) Constraints on interpretation of ecological niche models by limited environmental ranges on calibration areas. Ecological Modelling, 263, 10–18.

Peterson AT (2003) Predicting the geography of species' invasions via ecological niche modeling. The Quarterly Review of Biology, 78, 419–433.

Peterson AT, Soberón J (2012) Species distribution modeling and ecological niche modeling: Getting the concepts right. Natureza & Conservação, 10, 102–107.

Phillips SJ, Dudík M, Elith J, Graham CH, Lehmann A, Leathwick J, Ferrier S (2009) Sample selection bias and

presence-only distribution models: Implications for background and pseudo-absence data. Ecological Applications, 19, 181–197.

Porter WP, Kearney M (2009) Size, shape, and the thermal niche of endotherms. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 106, 19666–19672.

Pulliam HR (2000) On the relationship between niche and distribution. Ecology Letters, 3, 349–361.

Qiao HJ, Escobar LE, Saupe EE, Ji LQ, Soberón J (2017) A cautionary note on the use of hypervolume kernel density estimators in ecological niche modelling. Global Ecology and Biogeography, 26, 1066–1070.

Qiao HJ, Feng X, Escobar LE, Peterson AT, Soberón J, Zhu GP, Papeş M (2019) An evaluation of transferability of ecological niche models. Ecography, 42, 521–534.

Qiao HJ, Hu JH, Huang JH (2013) Theoretical basis, future directions, and challenges for ecological niche models. Scientia Sinica Vitae, 43, 915–927. (in Chinese with English abstract) [乔慧捷, 胡军华, 黄继红 (2013) 生态位模型的理论基础、发展方向与挑战. 中国科学: 生命科学, 43, 915–927.]

Randin CF, Dullinger S, Zimmermann NE, Zappa M, Guisan A (2006) Are niche-based species distribution models transferable in space? Journal of Biogeography, 33, 1689–1703.

Rodríguez-Soto C, Monroy-Vilchis O, Maiorano L, Boitani L, Faller JC, Briones MÁ, Núñez R, Rosas-Rosas O, Ceballos G, Falcucci A (2011) Predicting potential distribution of the jaguar (*Panthera onca*) in Mexico: Identification of priority areas for conservation. Diversity and Distributions, 17, 350–361.

Soberón J (2007) Grinnellian and Eltonian niches and geographic distributions of species. Ecology Letters, 10, 1115–1123.

Soberón J, Peterson AT (2005) Interpretation of models of fundamental ecological niches and species' distributional areas. Biodiversity Informatics, 2, 1–10.

Soley-Guardia M, Alvarado-Serrano DF, Anderson RP (2024) Top ten hazards to avoid when modeling species distributions: A didactic guide of assumptions, problems, and recommendations. Ecography, 2024, e06852.

Stigall AL (2014) When and how do species achieve niche stability over long time scales? Ecography, 37, 1123–1132.

Vasconcelos RN, Cantillo-Pérez T, Franca Rocha WJS, Aguiar WM, Mendes DT, de Jesus TB, de Santana CO, de Santana MMM, Oliveira RP (2024) Advances and challenges in species ecological niche modeling: A mixed review. Earth, 5, 963–989.

Warren DL, Matzke NJ, Cardillo M, Baumgartner JB, Beaumont LJ, Turelli M, Glor RE, Huron NA, Simões M, Iglesias TL, Piquet JC, Dinnage R (2021) ENMTools 1.0: An R package for comparative ecological biogeography. Ecography, 44, 504–511.

Warton DI (2015) New opportunities at the interface between ecology and statistics. Methods in Ecology and Evolution, 6, 363–365.

Warton DI, Blanchet FG, O'Hara RB, Ovaskainen O, Taskinen S, Walker SC, Hui FKC (2015) So many variables: Joint modeling in community ecology. Trends in Ecology & Evolution, 30, 766–779.

Wiens JJ (2011) The niche, biogeography and species interactions. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 366, 2336–2350.

Wiethase JH, Mostert PS, Cooney CR, O'Hara RB, Beale CM (2024) Spatio-temporal integrated Bayesian species distribution models reveal lack of broad relationships between traits and range shifts. Global Ecology and Biogeography, 33, e13819.

Zhang ZX, Ma SB, Bede-Fazekas Á, Mammola S, Qu M, Zhou JX, Feng EY, Qin G, Lin Q (2024) Considering biotic interactions exacerbates the predicted impacts of climate change on coral-dwelling species. Journal of Biogeography, 51, 769–782.

Zurell D, Franklin J, König C, Bouchet PJ, Dormann CF, Elith J, Fandos G, Feng X, Guillera-Arroita G, Guisan A, Lahoz-Monfort JJ, Leitão PJ, Park DS, Peterson AT, Rapacciuolo G, Schmatz DR, Schröder B, Serra-Diaz JM, Thuiller W, Yates KL, Zimmermann NE, Merow C (2020) A standard protocol for reporting species distribution models. Ecography, 43, 1261–1277.

(责任编委: 邹怡　责任编辑: 黄祥忠)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25364, pages 1–20
doi: 10.17520/biods.2025364
cstr: 32101.14.biods.2025364

•生态学数据分析方法专题•

联合物种分布模型与生物群落层次建模框架：生态学理论、方法及应用

谷际岐[1]，赖江山[2,3]，王瑛[4]，吴浩然[5]，张雪[6]，宋晓彤[7]，邵小明[8*]，娄安如[1*]

1. 北京师范大学生命科学学院，生物多样性与生态工程教育部重点实验室，北京 100875，中国；2. 南京林业大学生态与环境学院，南京 210037，中国；3. 南京林业大学数量生态学研究中心，南京 210037，中国；4. 首都师范大学生命科学学院，北京 100048，中国；5. School of Geography and the Environment, University of Oxford, Oxford OX1 3QR, United Kingdom；6. 厦门大学环境与生态学院，福建厦门 361102，中国；7. 江南大学生物工程学院，江苏无锡 221151，中国；8. 中国农业大学资源与环境学院，北京 100193，中国

摘要：理解环境过滤、生物相互作用与中性过程如何共同塑造物种分布与群落结构，是现代群落生态学的核心问题。然而，传统多样性指数、排序分析及单物种分布模型(single-species distribution models, SDMs)难以同时整合物种间关联、环境梯度、性状与谱系等多维信息，导致对群落构建机制的解析能力受限。联合物种分布模型(joint species distribution models, JSDMs)特别是生物群落层次建模(hierarchical modelling of species communities, HMSC)框架的提出，为群落尺度的机制推断提供了统一而灵活的贝叶斯工具。本文系统综述了HMSC的统计结构、数学原理与推断机制，构建了一个从数据组织、模型设定、马尔可夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)估计、模型评估到生态解释与预测的完整分析流程。同时结合苔藓群落数据配套编写了《联合物种分布模型HMSC的应用分步教程》，通过分步讲解与可运行R代码，助力研究者快速掌握该方法的实操应用。在理论部分，本文明确了HMSC如何在统一的贝叶斯层级框架下整合环境梯度、物种性状、系统发育关系以及空间结构，从而分离环境过滤、生物过滤与扩散限制的统计信号。在方法层面，本文通过解析潜变量模型的数学结构，阐明了残差相关在生态解释中的边界，为理解物种共现信号、区分环境效应与未观测因子提供了理论依据；对比了HMSC与其他主流JSDMs工具及传统群落统计方法的优势及适用性。在应用层面，综述了其在森林、湿地、草原、海洋、城市及微生物生态学中的应用进展，展示了其在保护规划、入侵种风险评估、共现网络分析及情景预测中的广泛价值；随着图形处理器加速与迁移学习与大规模高维数据框架的发展，HMSC可提升稀有物种生态位估计与分布预测，使数十万物种的群落建模成为可能。综上，JSDMs及HMSC不仅在生态统计方法论上实现了从单物种预测到多物种–多维信息整合的跨越，更为生态理论检验、群落构建机制解析及保护决策制定提供了高效、可扩展且能量化不确定性的工具平台。

关键词：群落生态学；联合物种分布模型；生物群落层次模型；环境过滤；中性过程；贝叶斯模型

谷际岐, 赖江山, 王瑛, 吴浩然, 张雪, 宋晓彤, 邵小明, 娄安如 (2026) 联合物种分布模型与生物群落层次建模框架: 生态学理论、方法及应用. 生物多样性, 34, 25364. doi: 10.17520/biods.2025364; cstr: 32101.14.biods.2025364.

Gu JQ, Lai JS, Wang Y, Wu HR, Zhang X, Song XT, Shao XM, Lou AR (2026) Theoretical foundations, methodological advances, and applications of joint species distribution models with a focus on the HMSC framework in ecology. Biodiversity Science, 34, 25364. doi: 10.17520/biods.2025364; cstr: 32101.14.biods.2025364.

Theoretical foundations, methodological advances, and applications of joint species distribution models with a focus on the HMSC framework in ecology

Jiqi Gu[1], Jiangshan Lai[2,3], Ying Wang[4], Haoran Wu[5], Xue Zhang[6], Xiaotong Song[7], Xiaoming Shao[8*], Anru Lou[1*]

1 *Ministry of Education Key Laboratory for Biodiversity Science and Ecological Engineering, College of Life Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875, China*
2 *College of Ecology and Environment, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China*
3 *Research Center of Quantitative Ecology, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China*

收稿日期 Received: 2025-09-09；接受日期 Accepted: 2026-01-08
基金项目：第三次新疆综合科学考察项目(2022xjkk1201)、国家自然科学基金(41771054)、国家留学基金管理委员会国家公派研究生项目(202506040049)
Supported by the Third Xinjiang Scientific Expedition Program (2022xjkk1201), the National Natural Science Foundation of China (41771054), and the Program of China Scholarship Council (202506040049)
* 共同通讯作者 Co-authors for correspondence. E-mail: louanru@bnu.edu.cn; shaoxm@cau.edu.cn

4 *College of Life Sciences, Capital Normal University, Beijing 100048, China*
5 *School of Geography and the Environment, University of Oxford, Oxford OX1 3QR, United Kingdom*
6 *College of the Environment and Ecology, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361102, China*
7 *School of Biotechnology, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu 221151, China*
8 *College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing 100193, China*

ABSTRACT

Background: Understanding how environmental filtering, biotic interactions, and neutral processes jointly shape species distributions and community structure is a central question in modern community ecology. However, traditional diversity indices, ordination analyses, and single-species distribution models (SDMs) cannot simultaneously integrate species associations, environmental gradients, functional traits, and phylogenetic relationships, thereby limiting their ability to disentangle community assembly mechanisms.

Framework: Joint species distribution models (JSDMs), particularly the hierarchical modelling of species communities (HMSC) framework, offer a unified and flexible Bayesian tool for community-level mechanistic inference. This study provides a systematic review of the statistical structure, mathematical foundations, and inferential mechanisms of HMSC, and establishes a complete analytical workflow encompassing data organization, model specification, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) estimation, model evaluation, ecological interpretation, and predictive applications. A step-by-step tutorial, *Joint Species Distribution Modelling with HMSC*, accompanies the review and illustrates the practical implementation of HMSC through bryophyte community data and fully reproducible R code.

Theory: In the theoretical component, we clarify how HMSC integrates environmental gradients, species traits, phylogenetic relationships, and spatial structure within a unified hierarchical Bayesian framework to distinguish statistical signals of environmental filtering, biotic filtering, and dispersal limitation. Methodologically, we dissect the mathematical structure of latent variable models, elucidate the boundaries of ecological interpretation for residual correlations, and provide a conceptual basis for differentiating species co-occurrence signals from environmental effects and unobserved factors. We further compare HMSC with other mainstream JSDMs implementations and traditional community analytical methods, highlighting their relative advantages and ecological applicability.

Applications: On the applied side, we synthesize the rapidly expanding use of JSDMs across forest, wetland, grassland, marine, urban, and microbial ecosystems, demonstrating their value in conservation planning, invasive species risk assessment, co-occurrence network analysis, and scenario-based forecasting. With the advancement of GPU-accelerated computation, migration learning, and high-dimensional modelling frameworks, HMSC greatly improves ecological niche estimation and distribution prediction for rare species and enables community modelling for tens of thousands of taxa. Overall, JSDMs and HMSC in particular represent a methodological shift from single-species prediction toward integrative, multi-species and multi-dimensional ecological modelling. They provide an efficient, scalable, and uncertainty-aware platform that strengthens ecological theory testing, enhances understanding of community assembly mechanisms, and supports biodiversity conservation and management decisions.

Key words: community ecology; joint species distribution models; hierarchical modelling of species communities; environmental filtering; neutral processes; Bayesian models

生态学的核心目标之一是揭示调控物种分布与多度(abundance)的生态机制(Begon & Townsend, 2020)。物种的分布与多度不仅受到非生物环境因子的影响, 还受到生物相互作用的调控。在自然群落中, 种间相互作用(如竞争、捕食、互利)对物种空间分布的调控作用尤为显著(Wisz et al., 2013)。因此, 仅针对单一物种开展建模、分析, 难以准确描述生态系统中复杂的群落结构及其形成机制。

现代群落生态学正逐步从格局描述走向过程解析, 致力于阐明不同时空尺度下多种生态因子如何共同驱动群落构建与物种共存(Leibold et al., 2004; Agrawal et al., 2007)。已有研究表明, 局域群落结构是中性过程(neutral dynamics)、环境过滤及生物相互作用等多重构建机制共同作用的结果(Vellend, 2010; Götzenberger et al., 2012)。生态过滤理论将群落构建过程类比为多层级的筛选机制(Zobel, 1997), 从全球物种库到区域物种库, 再到局域物种库, 物种组成依次受到环境过滤与生物过滤的影响(图1) (Wisz et al., 2013; Kraft et al., 2015)。此外, 扩散、灭绝、生态漂变等随机过程也可能在相同环境条件下导致群落间的结构分化(Chase & Myers, 2011)。

在大量野外调查和实验数据的基础上, 群落生态学对物种组成、多度以及性状分布的认知不断深化。然而, 以多样性指数和排序分析为主的传统统




图1　群落构建过程的多尺度框架及观测数据类型示意图。图中展示了群落构建过程所处的不同时间与空间尺度，包括全球尺度、区域尺度与局域尺度。群落构建过程可分为物种形成、中性过程(扩散、生态漂变等)、生物过滤(物种间相互作用)和环境过滤(非生物因子选择)等环节。蓝色箭头表示机制作用方向，绿色箭头表示不同群落构建过程作用的路径。

Fig. 1　Schematic diagram of the multi-scale framework of community assembly processes and corresponding types of observational data. The figure illustrates the different temporal and spatial scales at which community assembly processes occur, including global, regional, and local scales. Community assembly processes can be divided into speciation, neutral processes (dispersal, ecological drift, etc.), biotic filtering (species interactions), and environmental filtering (selection by abiotic factors). Blue arrows indicate the direction of mechanisms, and green arrows denote the pathways of different community assembly processes.

计方法(Magurran & Mcgill, 2010; 张金屯, 2011; Legendre & Legendre, 2012)虽然可揭示群落结构的空间格局，却难以量化各类构建过程的相对贡献，且无法实现理论模型与观测数据有效衔接(Logue et al., 2011)。随着生态统计方法的发展，模型驱动的群落数据机制建模方法逐渐受到研究者关注(Warton et al., 2015; Ovaskainen & Abrego, 2020)。

物种分布模型(species distribution models, SDMs)已被广泛用于分析单物种对环境因子的响应(Guisan & Thuiller, 2005; Elith & Leathwick, 2009)。传统的单物种分布模型通常针对每个物种独立拟合物种–环境关系，并假设物种在空间分布上相互独立。为在群落尺度上进行推断，研究者利用堆叠物种分布模型(stacked species distribution models, SSDMs)，将多个SDMs的预测结果进行叠加以获得物种丰富度或群落组成(Schmitt et al., 2017)。但该方法忽略了物种间可能存在的共生、竞争排斥等生态关联。

为弥补这一不足，研究人员提出联合物种分布模型(joint species distribution models, JSDMs, Ovaskainen et al., 2010)。该模型在SDMs框架基础上引入多物种协同建模机制，能够同时估计多个物种对环境因子的响应，并刻画其残差相关结构，从而更准确地反映物种共存格局及潜在驱动机制(Pollock et al., 2014; Ovaskainen et al., 2017)。与SSDMs相比，JSDMs不仅提高了对数据稀疏或罕见物种的预测能力(Calabrese et al., 2014)，还可将物种响应与其性状、系统发育关系等因素联合建模(Ovaskainen & Soininen, 2011; Abrego et al., 2017; 朱媛君等, 2018)。JSDMs还被成功应用于多种类型生态数据，包括存

在–缺失数据、多度数据以及空间和时间观测数据(Hui et al., 2015; Thorson et al., 2016; Clark et al., 2017; Ovaskainen et al., 2017)。随着高通量测序技术的发展, JSDMs在微生物生态学领域也得到应用, 用于从高维稀疏的序列数据中推断物种共现网络及其与环境的关系(Weiss et al., 2016; Odriozola et al., 2021)。

近年来, JSDMs方法体系持续演进, 相继出现潜变量模型(latent variable models, LVMs)、层次贝叶斯模型(hierarchical Bayesian models, HBMs)、广义线性潜变量模型(generalized linear latent variable models, GLLVMs), 以及整合物种性状与系统发育信息的生物群落层次建模(hierarchical modelling of species communities, HMSC)框架等(Norberg et al., 2019)。这些方法在提高模型生态解释力的同时, 也为生态学者提供了从数据中识别群落构建机制、模拟群落动态及开展多物种预测的统一分析框架。因此, JSDMs的提出不仅是统计建模领域的技术进步, 更是推动生态理论向实证验证迈进的重要桥梁。在诸多JSDMs实现工具中, HMSC以其完整的层次建模框架、对物种性状与系统发育信息的整合能力, 以及对空间与层级随机效应的灵活处理, 被普遍认为是目前最为系统和成熟的工具之一, 其理论基础、建模结构与方法扩展值得进行系统梳理与总结。

1 HMSC的理论构建与应用流程

1.1 模型总体框架与理论关联

HMSC是基于贝叶斯推断拟合的多变量层次广义线性混合模型(generalized linear mixed models, GLMM), 其核心目标是整合多类型群落生态学数据以推断群落结构的形成机制(Ovaskainen & Abrego, 2020)。需要明确的是, HMSC并非过程型机制模型, 它不直接模拟捕食、扩散核或中性过程, 但其模型结构在概念上可与群落构建规则(如环境过滤、生物过滤、扩散限制)对应(Ovaskainen et al., 2017)。

在数据层面, HMSC的输入包括群落数据**Y**、环境变量**X**、性状数据**T**、系统发育矩阵**C**、研究设计**Π**以及空间坐标**S**。其中, 各索引及其范围列于表1, 主要数据矩阵及其维度列于表2。该模型可适配多种响应变量类型(如存在–缺失、计数、连续变量), 并支持多层级研究设计, 适合分析多物种、多尺度、多来源的生态数据。例如, 在模型实现上, 存在–缺失型数据通常采用二项分布或probit链接, 而多度型数据可建模为泊松或负二项分布, 以匹配计数/生物量等指标的离散性与过度离散特征。

在HMSC框架下, 所有与群落相关的信息最终都需要整理为若干结构化的矩阵, 以便在统一的层次模型中联合分析。就模型实现而言, 可以将输入数据大体分为“样点层信息”和“物种层信息”两类(表2)。样点层的核心是群落矩阵, 其行对应采样单元、列对应物种, 用于记录每个样点上各物种的出现与否或多度水平, 例如苔藓物种在不同样方中的

表1 生物群落层次建模框架中的索引及其范围
Table 1 Indices and their ranges in the HMSC framwork

索引及其范围 Index and range	含义说明 Description
$i = 1, ..., n$	样方(采样单元) Sampling plots (Sampling units)
$j = 1, ..., n_s$	物种 Species
$k = 1, ..., n_c$	环境协变量 Environmental covariates
$l = 1, ..., n_t$	物种性状 Species traits
$h = 1, ..., n_f$	潜在因子 Latent factors
$u = 1, ..., n_u$	层级单元 Hierarchical units
$q = 1, ..., d$	空间坐标维度 Spatial coordinate dimensions
$r = 1, ..., n_r$	随机效应 Random effects

表2 生物群落层次建模框架核心模型的数据矩阵及其维度
Table 2 Data matrices and their dimensions in the core model of HMSC framework

数据矩阵 Data matrix	数据维度 Data dimension	含义说明 Description
Y, 元素 γ_{ij} **Y**, elements γ_{ij}	$n \times n_s$	群落数据 Community data
X, 元素 x_{ik} **X**, elements x_{ik}	$n \times n_c$	环境数据 Environmental data
T, 元素 t_{jl} **T**, elements t_{jl}	$n_s \times n_t$	物种性状数据 Species trait data
C, 元素 $c_{j_1 j_2}$ **C**, elements $c_{j_1 j_2}$	$n_s \times n_s$	系统发育数据 Phylogenetic data
Π, 元素 π_{iu} **Π**, elements π_{iu}	$n \times n_u$	研究设计 Study design
S, 元素 s_{uq} **S**, elements s_{uq}	$n_u \times d$	空间坐标 Spatial coordinates

盖度、生物量或个体数(Bohmann et al., 2014; Korhonen et al., 2024)。与群落矩阵**Y**同步的是环境矩阵**X**, 它同样以采样单元为行, 以环境协变量为列, 刻画每个样点的环境背景, 如温度、降水、土壤pH、基质类型等(Fick & Hijmans, 2017)。研究设计相关的信息则通过**Π**和**S**两个对象编码: **Π**用分层ID表示样点在时间与空间上的嵌套结构(例如样点隶属的样带、样地或年份), **S**则存储这些层级单元在地理空间或时间轴上的具体位置(如经纬度或调查日期), 为构建空间/时间相关的随机效应提供基础(Tikhonov et al., 2020b)。

物种层信息主要包括性状矩阵**T**和系统发育矩阵**C** (表2)。**T**以物种为行、性状为列, 汇集了物种在形态、生理或功能上的关键特征, 例如苔藓的持水能力、茎高、孢子大小等, 数据库如全球植物性状数据库(https://www.try-db.org)、种子性状数据库(http://www.seedtraits.org), 用于解释物种在环境响应上的差异(Kattge et al., 2011; Wang et al., 2025)。**C**则是物种 × 物种的对称矩阵, 一般来源于系统发育树或分类树(Escamilla Molgora et al., 2022), 用来量化物种之间的亲缘关系强弱(Ovaskainen & Abrego, 2020)。通过在同一模型中同时引入性状和系统发育数据, HMSC可以在物种层面考察功能性状与谱系相关性在生态位形成中的作用(Ovaskainen & Abrego, 2020)。

在数据准备阶段, 需要确保这几类数据在索引体系上严格对齐: **Y**的物种顺序必须与**T**和**C**中的物种顺序完全一致, **Y**的样点顺序则应与**X**中的样点顺序以及**Π**中的层级编号一一对应(表2)。只有在物种命名和样点编码保持完全一致的前提下, 模型才能正确地把群落记录、环境背景、物种性状、谱系信息以及时空结构关联起来, 从而实现多源数据在同一层级框架下的联合建模。

HMSC固定效应部分主要模拟环境过滤过程。核心模型参数的符号与解释详见表3。参数β描述物种特定的生态位, 能够量化环境变异对物种出现的影响; 参数Γ刻画响应性状对生态位的依赖性; 而当某些性状缺失且在系统发育上具有相关性时, 其生态位中的系统发育信号可通过ρ来表征。该部分不仅能够分离环境异质性对物种分布的贡献, 还能为识别性状–生态位关系及系统发育信号提供统计基础(Ovaskainen et al., 2017)。

HMSC的随机效应部分则用于刻画生物过滤与扩散限制。核心参数Ω表示在控制环境效应后的残差共现矩阵, 用以推断物种间的潜在相互作用; 参数α则反映无法由环境解释的空间变异尺度, 理论上与扩散过程相关(表3)。通过引入空间显式的随机效应, 模型可量化扩散限制对物种分布的影响。然而, 由于遗漏变量可能混入残差结构, 在解释Ω与α时需谨慎, 避免将其简单归因于生物相互作用或扩散过程(Ovaskainen & Abrego, 2020)。

1.2 HMSC分析流程

HMSC分析流程可分为5个相互关联的阶段, 各阶段紧密衔接, 共同支撑从模型构建到生态学应用的完整研究链条。

第一阶段是模型构建与数据匹配(图2)。该阶段的重点在于建立与研究数据相匹配的模型结构(Tikhonov et al., 2020b)。具体包括3个关键环节: (1)模型结构设定。需明确是否纳入空间随机效应、选择何种误差分布(如正态分布、泊松分布等), 以反映研究系统的生态学特征。(2)预测变量筛选。涵盖环境协变量(如气候、地形)、物种性状(如功能特征)及其高阶效应(如二次项)与交互作用(如环境-性状交互), 确保关键驱动因子被有效捕捉。(3)先验分布设定。基于生态学理论与研究假设设定参数先验, 为后续贝叶斯推断提供合理初始信息, 在HMSC中, 常通过正态分布、均匀分布、逆gamma分布(inverse-gamma distribution)或收缩型分布(shrinkage priors, 如乘法伽马过程)等先验来约束环境响应、性状效应、系统发育信号和残差协方差, 从而防止过拟合并提高推断稳定性。由于模型复杂度较高, 研究者需要结合对研究系统的生态学理解与假设, 合理确定模型结构。

第二阶段是马尔可夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)收敛性检查。在贝叶斯推断框架下, MCMC的收敛性是保证推断结果可靠的关键。研究者需要通过迹线图判断链的稳定性, 若链呈现无趋势的平稳波动且多链之间混合良好, 提示收敛效果较优, 相关参数设置见附录1-表S1。计算有效样本量(effective sample size, ESS, 反映独立样本量)和潜在尺度缩减因子(potential scale reduction factor, PSRF, 接近1时表示收敛)等指标, 实现对收敛性的客观验证。若发现收敛不佳, 则需调整模型结构或增加迭代次数以改善结果。

表3　生物群落层次建模(HMSC)框架核心模型中的参数及其解释

Table 3　Parameters in the core model of the HMSC framework and their interpretations

类别 Category	参数 Parameter	类型 Type	含义 Description
固定效应 Fixed effect	L^{F}, 元素 L_{ij}^{F} L^{F}, elements L_{ij}^{F}	$n\times n_s$ 矩阵 $n\times n_s$ matrix	固定效应的线性预测量 Linear predictor of fixed effects
固定效应 Fixed effect	B, 元素 β_{kj} B, elements β_{kj}	$n_c\times n_s$ 矩阵 $n_c\times n_s$ matrix	物种生态位 Species ecological niches
固定效应 Fixed effect	M, 元素 μ_{kj} M, elements μ_{kj}	$n_c\times n_s$ 矩阵 $n_c\times n_s$ matrix	基于性状的物种生态位期望值 Trait-based expected values of species niches
固定效应 Fixed effect	ρ	标量 Scalar	物种生态位的系统发育信号 Phylogenetic signal in species niches
固定效应 Fixed effect	Γ, 元素 γ_{kj} Γ, elements γ_{kj}	$n_c\times n_t$ 矩阵 $n_c\times n_t$ matrix	性状对生态位的影响 Effects of traits on species niches
固定效应 Fixed effect	V, 元素 $V_{k_1k_2}$ V, elements $V_{k_1k_2}$	$n_c\times n_c$ 矩阵 $n_c\times n_c$ matrix	物种生态位的残差协方差 Residual covariance of species niches
随机效应 Random effect	L^{R}, 元素 L_{ij}^{R} L^{R}, elements L_{ij}^{R}	$n\times n_s$ 矩阵 $n\times n_s$ matrix	随机效应的线性预测量 Linear predictor of random effects
随机效应 Random effect	H, 元素 η_{uh} H, elements η_{uh}	$n_u\times n_f$ 矩阵 $n_u\times n_f$ matrix	样地载荷 Site loadings
随机效应 Random effect	α, 元素 α_h α, elements α_h	长度为 n_f 的向量 Vector of length n_f	样地载荷的空间尺度 Spatial scale of site loadings
随机效应 Random effect	Λ, 元素 λ_{hj} Λ, elements λ_{hj}	$n_f\times n_s$ 矩阵 $n_f\times n_s$ matrix	物种载荷 Species loadings
随机效应 Random effect	Ω, 元素 $\Omega_{j_1j_2}$ Ω, elements $\Omega_{j_1j_2}$	$n_s\times n_s$ 矩阵 $n_s\times n_s$ matrix	物种间的关联关系 Interspecific association matrix
随机效应 Random effect	Φ, 元素 φ_{hj} Φ, elements φ_{hj}	$n_f\times n_s$ 矩阵 $n_f\times n_s$ matrix	物种载荷的局部收缩项 Local shrinkage parameters of species loadings
随机效应 Random effect	δ, 元素 δ_l δ, elements δ_l	长度为 n_f 的向量 vector of length n_f	物种载荷的全局收缩项 Global shrinkage parameters of species loadings
数据模型 Data model	L, 元素 L_{ij} L, elements L_{ij}	$n\times n_s$ 矩阵 $n\times n_s$ matrix	线性预测量 Linear predictor
数据模型 Data model	Σ, 元素 σ_j^2 Σ, elements σ_j^2	$n_s\times n_s$ 对角矩阵 $n_s\times n_s$ diagonal matrix	残差方差 Residual variances

第三阶段是模型拟合度评估与比较。该阶段旨在检验模型的解释力与预测力(Tikhonov et al., 2020b)。HMSC提供多种模型评估与比较工具, 包括交叉验证和广泛适用信息准则(widely applicable information criterion, WAIC)。其中, 条件交叉验证把数据分成“训练集”和“验证集”, 可评估物种间关联信息对预测性能的提升; WAIC则用于不同模型结构间的比较, WAIC数值越小, 说明模型在平衡“拟合度”和“复杂度”上更优。

第四阶段是参数估计与生态学解读。在模型收敛与性能确认之后, 需要对参数进行生态学意义上的解读。核心内容包括: 物种生态位特征及其对性




图2　生物群落层次建模(HMSC)框架的完整分析流程与结果示意。图中依次展示了HMSC建模与推断的5个关键步骤: (1)模型构建与数据匹配, 将物种分布数据与环境因子、功能性状、系统发育和空间随机效应整合到统一的层级贝叶斯框架中; (2) MCMC收敛性检查, 通过迹线图、后验分布、有效样本量和潜在尺度缩减因子评估模型收敛与参数混合情况; (3)模型拟合度评估与比较, 利用均方根误差(RMSE)、曲线下面积(AUC)和R^2等指标量化模型预测性能; (4)参数估计与生态解释, 包括环境响应参数、性状与系统发育效应、残差相关结构以及方差分解结果; (5)模型预测与应用, 展示物种对关键环境梯度的响应曲线及不确定性区间, 用于群落分布预测与情景分析。

Fig. 2　Schematic overview of the complete analytical workflow and outputs of hierarchical modelling of species communities (HMSC) framework. The figure illustrates five key steps of HMSC-based modelling and inference: (1) model construction and data integration, in which species distribution data are jointly modelled with environmental variables, functional traits, phylogenetic relationships, and spatial random effects within a unified hierarchical Bayesian framework; (2) MCMC convergence diagnostics, where trace plots, posterior distributions, effective sample size (ESS), and potential scale reduction factors (PSRF) are used to assess convergence and fitness parameter mixing; (3) model fit evaluation and comparison, in which predictive performance is quantified using root mean square error (RMSE), area under curve (AUC), and R^2; (4) parameter estimation and ecological interpretation, including environmental response parameters, trait and phylogenetic effects, residual correlation structures, and variance partitioning; and (5) model prediction and application, illustrating species responses to key environmental gradients with associated uncertainty intervals for community-level prediction and scenario-based analyses.

状和系统发育的依赖性、物种间残差关联结构。这些信息可用于识别环境过滤、生物相互作用、扩散限制、缺失协变量与生态漂变等潜在过程。解读过程中必须结合生态理论与领域知识, 避免过度推断或误读(相关参数设置见附录1-表S2)。

第五阶段是模型预测与应用。最终阶段是基于模型开展预测与情景分析。HMSC可生成物种分布、物种丰富度、群落性状空间格局等预测结果, 并可用于评估在土地利用或气候变化情境下的群落响应。实际案例表明, HMSC在多物种分布预测中常具优异性能(Norberg et al., 2019)。这些预测结果不仅揭示环境与空间变异对群落结构的影响, 还为生物区划、保护地优先级排序及管理决策提供科学依据, 实现从理论研究到应用实践的衔接。

1.3　在R语言中实现方法

R环境中, HMSC是JSDMs最为成熟和系统的实现工具。HMSC的典型建模流程包括: 首先利用Hmsc(...)函数构建模型对象, 明确输入的响应矩阵

(物种出现或丰度)、环境因子以及随机效应结构; 随后通过sampleMcmc(...)进行采样, 获取参数的后验分布; 接着借助convertToCodaObject(...)进行收敛性诊断与链间对比; 最后使用predict(...)完成物种分布预测, 并结合内置可视化函数揭示物种间的相关性、环境响应以及群落结构(Ovaskainen & Abrego, 2020)。通过这种工作流, 研究者不仅可以获得物种出现概率的预测结果, 还能在分层层次上解析群落组装的生态驱动因素。

系统学习HMSC的最佳途径是参考*Joint Species Distribution Modelling*: *With Applications in R* (Ovaskainen & Abrego, 2020), 该书以HMSC为核心, 详细介绍了模型原理、生态学背景及R代码实现, 几乎涵盖从入门到进阶的全部环节。该书目前正由赖江山、谷际岐、王瑛、吴浩然、陈章敏、徐强翻译为中文版, 预计2026年出版。芬兰赫尔辛基大学(University of Helsinki)的HMSC框架课程是聚焦联合物种分布模型的密集型培训, 通过概念讲授与R包实操相结合, 教授其原理结构、模型拟合流程与生态解释能力等内容, 并引入了高性能模块Hmsc-HPC (high-performance computing implementation of hierarchical modeling of species communities)加速大型生态数据分析, 助力生态学研究者从理论到应用全面掌握多物种群落分析方法(https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/statistical-ecology/software/hmsc)。此外, 可结合HMSC官方文档与示例数据熟悉操作流程, 并通过相关方法论文理解模型背后的统计推理(Tikhonov et al., 2020b), 其中文翻译教程以及讲解视频可参照“群落生态学”公众号提供的资料。

除官方教材与相关文献外, 笔者亦编制了一份《联合物种分布模型HMSC的应用分步教程》, 供学习与实践参考(详见附录2, 附录3, 或者通过https://github.com/gujiqi/HMSC_JSDM_Chinese进行下载)。该教程从生态学研究中的典型问题出发, 突出物种间相互作用的重要性, 系统介绍了HMSC在整合环境因子、功能性状、系统发育及空间结构方面的应用优势。本教程以苔藓群落为示例, 示范如何在统一的贝叶斯层级框架下同时刻画环境梯度效应(固定效应)、性状对物种间系数差异的调制(traits到beta的层级回归)、系统发育相关(基于谱系的残差结构)与空间依赖(空间随机层, 包括高斯过程与其近邻高斯过程、高斯预测过程), 并通过MCMC后验推断、收敛诊断、方差划分、后验预测与交叉验证进行可重复评估。在这一框架下, 研究者能够系统回答生态学中的5个核心科学问题: (1)群落结构的变异在多大程度上由环境过滤、生物相互作用或随机过程驱动; (2)物种的功能性状和系统发育关系如何决定其生态位与环境响应; (3)在控制环境效应后, 物种之间的残差共变格局是否反映潜在互作或共享微环境; (4)群落相似性如何随环境相似度和空间距离而变化; (5)在给定环境与空间条件下, 能否对未观测地点或未来情景进行可验证的分布预测。

本教程以苔藓群落为研究示例, 在模型中同时考虑了多种生态因素: 温度、降水、土壤pH值和钙含量等连续环境梯度, 以及不同基质类型(如岩石、土壤、树皮、泥炭)等离散生境差异。模型还引入了苔藓的关键功能性状, 如持水能力、茎高、孢子大小和叶片厚度, 用来解释不同物种在环境变化下响应强度的差异。通过这些信息的结合, 模型能够从参数层面(如环境系数beta和性状调节系数gamma)揭示环境和性状的作用机制, 并在预测层面绘制出物种沿环境梯度的响应曲线以及群落层面的功能性状变化趋势, 从而把统计结果转化为生态机制的具体解释。此外, 模型特别加入了空间随机层, 用来捕捉地理上相邻样点之间的自然相似性, 防止环境变量的效应被空间聚集误判为“环境作用”。经过这一控制后, 残差相关仅表示在剔除环境和空间影响后的物种共变格局, 不能直接理解为物种间存在因果互作, 而是提示它们在微环境或未观测因子上的相似性。在方法学层面, 本教程涵盖了3种常见的数据类型与对应的似然结构: 出现–缺失数据使用二元probit模型, 计数数据采用泊松或负二项分布, 连续丰度数据则基于正态分布建模。针对苔藓群落数据, 教程提供了系统的模型诊断流程, 包括采样收敛与稳定性评估(比如有效样本量和潜在尺度缩减因子)以及出现–缺失模型的拟合优度检验(ROC曲线下面积与Tjur判别系数)。此外, 通过设置误设实验(如去除基质变量或关键性状), 教程演示了遗漏环境因子或性状信息时, 模型推断方向和强度可能出现的系统性偏差。在确保似然结构与随机层设

置与数据类型相匹配, 并采用空间阻断式交叉验证以检验模型外推能力的前提下, 该建模框架具有广泛的适用性。它不仅适用于植物(包括苔藓、蕨类、裸子和被子植物), 也可推广至真菌与地衣群落、陆生动物(如昆虫、鸟类、两栖类、爬行类和哺乳类)、淡水与海洋生物(如鱼类、浮游生物、底栖无脊椎动物), 以及由细菌、古菌和真核生物构成的微生物群落。

2 潜在变量与物种间残差相关结构的生态学解释

2.1 潜在变量及残差相关性

在JSDMs及其代表性框架HMSC中, 潜在变量(latent variables)构成了刻画多物种协同变化结构的核心统计机制。其基本思想是在显式建模环境变量对各物种响应的同时, 引入一组不可直接观测的隐藏因子, 用以吸收由未测环境条件、空间过程、时间结构或其他共享机制所引起的剩余协变(Warton et al., 2015)。

从数学形式上看, 潜在变量以低秩分解的方式进入JSDMs, 通过“样点层面的潜在变量取值”和“物种层面的因子载荷”共同刻画物种之间的协同变化结构(Hui, 2016)。该结构在统计上等同于用一个低秩矩阵近似完整的物种–物种协方差矩阵, 来避免协方差参数数量随物种数平方级增长的问题, 使多物种情形下的相关性估计在计算上可以实现。因此, 潜在变量的首要作用是对高维物种相关结构进行有效降维与正则化(Tikhonov et al., 2020a)。潜在变量还具有“未建模过程吸收器”的统计意义。由于真实生态系统中的环境因子、空间过程、历史扩散及种群随机波动等往往难以被完全观测, 这些未被显式纳入模型的过程若在多个物种之间产生共同影响, 便会表现为观测数据中的剩余共变结构, 并被潜在变量所捕获(Poggiato et al., 2021)。因此, 潜在变量通常反映的是多种未建模过程的综合统计效应, 而非某一种单一生态机制。在HMSC框架中, 潜在变量还可以进一步引入空间或时间结构, 从而在统一模型中同时刻画物种间相关性与空间–时间自相关。这种“结构化潜在变量”使HMSC能够自然整合环境过滤、物种协变、空间格局与时间动态, 是其相较于早期静态JSDMs的重要优势。

JSDMs的一个重要用途是在控制已测环境因子影响之后进一步刻画不同分类单元(如物种)之间的残差相关结构, 即在相同环境条件下物种分布或丰度之间仍存在的协同变化关系(Ovaskainen et al., 2010)。当前最常用且计算上最可行的方法是基于潜变量模型来构建这一残差相关结构。在传统GLMM框架下, 当物种数量较少时, 可通过引入多元随机效应并直接估计完整的协方差矩阵来描述物种间的相关性。然而, 在典型的多物种群落数据中, 协方差参数的数量将随物种数呈平方级增长, 极易导致模型计算负担过重、参数估计不稳定甚至难以收敛。相比之下, 潜变量模型通过引入少量潜在变量及其对应的因子载荷, 间接重构完整的残差协方差矩阵, 从而在高维物种系统中有效刻画物种间的相关结构(Warton et al., 2015)。在这一框架下, 物种之间的相关性不再作为独立参数逐对估计, 而由不同物种对同一潜在变量的响应方向与强度共同决定: 例如, 若两个物种在某一潜在变量上的载荷同号且幅度相近, 则它们在残差层面表现为正相关; 若载荷异号, 则表现为负相关; 若载荷接近零, 则说明两者在该协变轴上的联系较弱。通过这种方式, 潜变量模型在统计上将原本复杂的高维物种关联网络, 压缩为若干条主导群落协变结构的“潜在轴”。

基于潜在变量的残差相关进行建模, 使研究者在控制环境预测因子后, 仍能够定量分析物种之间剩余的协同变化格局(Pollock et al., 2014)。例如, 在一个森林群落研究中, 若仅考虑温度、降水和土壤养分等环境因子, 某些树种之间仍可能在丰度上呈现显著的正相关或负相关; 潜变量模型便可用于刻画这些环境因素尚未解释的协变结构。而后通过比较“仅含环境因子模型”与“同时包含潜在变量的模型”所估计的残差协方差矩阵变化, 研究者可以定量评估环境过滤对物种协变结构的解释程度。此外, 还可以通过逐步引入不同环境预测因子, 检验哪些关键环境梯度最显著地削弱了物种之间的协变关系, 从而为识别主导群落结构的核心环境因子提供统计依据。因此, 基于潜在变量的残差相关建模, 实际上标志着JSDMs从“单物种对环境的响应分析”迈向“多物种协同结构刻画”的关键方法学转变。

2.2 残差相关性、生物相互作用与不可识别性问题

尽管残差相关结构在JSDMs中常被用来刻画

物种之间的关联格局, 但研究者难以在理论上将残差相关性直接等同为真实的生物相互作用(如竞争、促进或捕食)。其根本原因在于, 环境因子对物种分布的驱动效应往往与生物相互作用在统计上高度交织, 二者难以清晰区分(Dormann et al., 2018)。在大多数自然生态系统中, 生物相互作用并不主要作用于“残差层面”, 而是通过长期影响物种在环境梯度上的分布边界, 塑造物种的实际生态位。例如, 在草地或森林群落中, 长期竞争往往会迫使竞争力较弱的物种占据养分较低、光照较弱或水分条件较差的生境, 从而导致其分布范围发生系统性偏移。因此, JSDMs所估计的物种–环境响应关系, 本质上反映的是在生物约束已经长期存在的条件下形成的“实际生态位”, 而非物种在不存在生物限制时的“基础生态位”。在这种情形下, 由竞争或促进作用所塑造的分布排斥或共存格局, 往往已经被吸收到环境响应参数之中, 而不会再以“剩余信号”的形式保留在残差相关结构中(Warton et al., 2015)。只有在少数特殊情形下, 例如多个物种对环境需求高度相似, 但因彼此竞争而难以在同一空间单元内稳定共存, 从而呈现出随机或交替占据空间的格局(典型的对称竞争), 生物相互作用才可能在仅由环境预测的分布格局之外, 进一步引入额外的协变结构, 并在残差相关中留下统计痕迹(Poggiato et al., 2021)。然而, 这类情形在自然生态系统中并不普遍。更为重要的是, 残差相关性本身并不具备明确的过程指向性。未被测量的环境变量、空间自相关、历史扩散过程以及采样偏倚等多种因素, 同样可以在残差层面产生与生物相互作用极为相似的正相关或负相关结构。因此, 即便在残差相关矩阵中观测到显著的正负相关关系, 研究者也只能将其谨慎解读为与生物相互作用可能相关的统计信号, 而不能将其视为真实生物相互作用的因果证据, 除非同时得到独立实验、时间序列或功能性状等多重证据的支持。

从统计关系的角度看, JSDMs所估计的残差相关矩阵反映的是物种之间的边际相关性(marginal correlations), 其中不可避免地混合了物种之间的直接作用、经由其他物种传导的间接联系, 以及未被观测到的外部环境因子所造成的共同响应(Pollock et al., 2014; Dormann et al., 2018; Blanchet et al., 2020)。例如, 若两种植物同时受到某一未测土壤因子的影响, 即便它们之间不存在直接竞争或促进关系, 也可能在残差中呈现显著正相关。若研究目标在于识别物种之间的直接相互作用, 理论上需要进一步转向基于精度矩阵(即协方差矩阵的逆)的部分相关分析, 以刻画在控制其他物种影响后的条件依赖结构。然而, 在实际的群落尺度数据中, 此类方法对样本量、时间重复和模型稳定性提出了极高要求, 当前仍普遍面临数据不足与估计不确定性较大的限制(Weiss et al., 2016; Gilarranz et al., 2017)。因此, 残差相关结构在实践中充其量只能作为生物相互作用的间接线索, 而不应被视为其稳健或充分的统计证据(Poggiato et al., 2021)。

2.3 基于潜在变量的模型排序与部分排序

基于潜在变量的JSDMs不仅用于刻画物种间的相关结构, 同时在方法学上也与传统群落排序分析建立了清晰对应。当研究者将潜在变量解释为一组低维的隐含生态梯度时, 包含潜在变量的JSDMs实际上就构成了一种基于模型的排序方法(model-based ordination) (Warton et al., 2015; Ovaskainen et al., 2017)。在这一框架下, 样点在潜在变量空间中的取值直接对应其在排序轴上的位置, 而物种对潜在变量的因子载荷则刻画了物种在同一低维排序空间中的投影方向与强度。二者可以组合形成类似传统双标图(biplot)的可视化结果, 从而在低维空间中直观呈现群落结构的主导变化方向(Hui et al., 2015)。与基于距离或相似性矩阵的传统排序方法(如主成分分析、对应分析、非度量多维尺度分析)相比, 基于模型的排序具有更加明确的统计基础。首先, 它直接以物种丰度或出现数据的实际分布形式为建模对象, 能够显式刻画均值–方差关系, 而不依赖于距离度量的经验构造; 其次, 研究者可以通过模型选择准则与残差诊断来客观确定潜在变量的维度, 而非依赖经验判断; 更重要的是, 基于模型的排序天然具备预测能力, 既可用于描述群落结构, 也可用于在新环境条件下预测群落组成。这一点在动态群落分析和空间扩展预测中尤为重要(Thorson et al., 2016)。

在此基础上, 研究者进一步提出了基于JSDMs的“部分排序” (partial ordination)思路, 即在模型中首先纳入关键环境预测因子, 对物种–环境响应进行显式建模, 然后再对剩余的潜在变量结构进行排

序分析。通过将“非约束排序” (仅基于潜在变量)与“部分排序” (在控制环境因子之后)置于同一排序尺度下进行对比, 可以定量评估环境变量对群落协变结构的解释程度, 并为区分环境过滤与其他协同过程(如扩散限制或潜在生物相互作用)提供直观线索(Ovaskainen et al., 2017)。因此, 潜在变量不仅是JSDMs构造物种相关结构的核心统计工具, 同时也为群落结构的低维表达、可视化分析与预测应用提供了统一的模型化排序框架。这一特性使JSDMs在群落结构描述、生态机制分析与空间–时间预测之间建立了紧密而自洽的方法学联系。

3 JSDMs在稀有物种建模中的进展

3.1 稀有物种建模的核心挑战

在自然群落中, 大多数物种实际上都属于稀有物种, 它们往往具有低出现频率、狭窄分布范围和更高的灭绝风险, 因此在生物多样性保护中占据核心位置(Breiner et al., 2015; Jeliazkov et al., 2022)。然而, 稀有物种的分布预测长期面临多重挑战: 观测记录稀疏、空间覆盖不完整、假缺失率高, 使得传统SDM常出现参数不可识别、预测结果对少数样点高度敏感等问题(Galante et al., 2018)。稀有物种越需保护, 却越难建模, 这一“稀有物种建模悖论”在许多研究中都普遍存在。尽管集成建模和简化模型结构等策略有所缓解, 但在面对生态位复杂性、环境驱动因子不完全观测和探测概率不完美等限制时, 经典SDMs的适用性依然有限。

JSDMs的提出, 为缓解稀有物种观测不足所带来的统计不稳定性提供了一条新路径(Ovaskainen et al., 2011)。与逐个物种独立建模的SDMs不同, JSDMs通过群落层级框架让物种“共享信息”, 即稀有物种可以从常见物种的丰富数据中获得统计支撑。其核心机制在于层级建模: 所有物种的环境响应参数来自同一分布, 并可根据系统发育或功能性状进一步约束(Abrego et al., 2017)。这一“部分池化”策略避免了根据极少数据拟合复杂响应函数所导致的过拟合, 使稀有物种的生态位估计更加稳定。此外, 若稀有物种与常见物种在生态位或功能性状上具有相似性, 则JSDMs能有效借助群落层面的信号补充其数据缺乏之处。因此, 在稀有性源于样本不足而非生态独特性的情景下, JSDMs往往显著优于SDMs (Norberg et al., 2019)。然而, 这种优势具有条件性: 若稀有物种具备极端专化或独特进化历史, 即“与群落不相似”, 信息共享机制可能反而引入偏差, 因此模型解释时需谨慎。

目前常用的JSDMs实现各具特点, 在稀有物种处理能力上也存在差异。HMSC是最为通用且机制最完整的框架。它能同时引入环境效应、物种间残差相关、系统发育和功能性状等多层信息, 因此在稀有物种数据极少时仍能借助生物学先验进行有效推断(Tikhonov et al., 2020b)。gllvm则以高效计算著称, 通过潜在因子捕捉物种相关结构, 并使用拉普拉斯近似(Laplace approximation)或变分推断加速推断(Warton et al., 2015)。其优势在于能够快速处理数百物种、数千样点的大型数据集, 适用于稀有物种数量众多且环境梯度清晰的系统。然而, gllvm的潜在因子缺乏HMSC那样的生物学结构约束, 在处理进化上独特或生态位异常的稀有物种时, 可能难以给出具有生态意义的推断。spOccupancy则从另一角度解决稀有物种建模难题。稀有物种往往探测概率极低, 多物种占据模型通过区分“真实存在”与“探测到否”, 可有效校正假缺失问题, 同时允许利用群落层级的随机效应共享信息, 显著提高稀有物种占据概率的估计稳定性(Doser et al., 2022)。其局限在于需要重复调查才能估计探测概率, 而许多分布数据并不具备重复观测结构; 此外, 当物种数庞大时, 模型参数量巨大, 推断时间较长。

3.2 面向极端稀有物种的大规模建模突破

在超高维、极端稀疏的物种数据迅速增长的背景下, 传统JSDMs的可扩展性已难以满足稀有物种大规模预测的需求。尽管JSDMs通过分层结构与跨物种信息共享显著改善了稀有物种的生态位推断, 但当物种数达到数万甚至数十万级、且99%以上为极端稀有物种时, 传统的“全群落联合建模”仍面临显著瓶颈: 一方面, 极端稀疏的数据导致稀有物种的参数不可识别; 另一方面, 模型维度呈指数级增长, 使全模型拟合在计算上几乎不可行。近年来, 迁移学习在生态建模中的应用不断深化, 其中常见–稀有迁移学习框架(common to rare transfer learning, CORAL)已成为解决超大规模稀有物种预测难题的关键技术之一。

CORAL的核心思想是不再尝试将所有物种同

时纳入一个超大规模JSDMs, 而是采用“两阶段”策略: 首先, 仅利用数据丰富的常见物种拟合一个高质量的JSDMs主干模型, 完整学习群落对环境梯度与隐含生态轴的响应结构、物种间的协变关系及系统发育依赖; 随后, 将这一主干模型所蕴含的生态规律作为先验知识迁移到每一个稀有物种的亚模型中, 使稀有物种能够“借用”常见物种的统计力量完成推断(Ovaskainen et al., 2025)。CORAL框架的关键在于, 迁移并非平均借力, 而是以物种的系统发育关系或功能性状相似性为依据, 决定稀有物种应主要向哪些常见物种“靠拢”。这一机制使稀有物种在仅有极少观测的情况下, 仍能在生态合理的约束下估计其环境响应, 从而在统计意义上相当于获得了额外的“虚拟样本量”。与此同时, 各稀有物种的子模型彼此独立, 可并行拟合, 使CORAL在计算上较传统JSDMs实现了多个数量级的效率提升。

CORAL的方法学创新不仅体现在效率上, 更体现在对极端稀有物种推断能力的本质改善。由于主干模型已经捕捉到主要环境因子、潜在生态梯度以及物种共存结构, 稀有物种的估计不再局限于其寥寥数点记录, 而是由常见物种提供生物学可解释的“支撑面”。这种迁移学习策略从根本上避免了稀有物种SDMs中常见的过拟合、不稳定和无法收敛的问题。

在马达加斯加255,188种节肢动物的超高维DNA元条形码数据上, CORAL展现了卓越表现: 相较于不使用迁移的基线模型, 其在分布预测准确度、不确定性控制以及生态位参数的可解释性方面均显著提升。更重要的是, CORAL的计算复杂度随稀有物种数量线性增长, 使其成为迄今唯一能够在生态学框架内同时处理数十万物种建模任务的方法。

4 HMSC与其他JSDMs的比较

在前述章节中, 我们对HMSC进行了系统介绍, 涵盖其数据结构、模型公式、先验设定与推断流程。HMSC作为一种高度整合的分层贝叶斯多物种分布模型, 不仅能够同时引入环境协变量、物种性状、系统发育信息以及空间–时间结构, 还可在统一框架下量化物种间的残差相关性, 因此在生态机制解析和多维数据融合方面具有显著优势。然而, JSDMs领域并不局限于HMSC一种实现, 近年来在推断引擎、计算性能、数据类型适应性及可扩展性上出现了多种各具特色的R包(Norberg et al., 2019), 如gllvm (Niku et al., 2019)、boral (Hui, 2016)、jSDM (Pollock et al., 2014)、sjSDM (Pichler & Hartig, 2021)和spOccupancy (Doser et al., 2022)等。它们在模型结构、数据维度支持、计算速度以及观测过程建模等方面存在差异, 导致在不同研究目的和数据条件下的适用性各不相同(附录1-表S3, 表S4)。

4.1 不同JSDMs在生态位结构与物种关联层面的整合深度差异

在生态群落分析中, JSDMs的核心价值在于将物种分布矩阵与环境因子、物种性状、系统发育关系及空间–时间结构统一纳入同一概率框架, 从而实现对群落构建机制的综合推断(Warton et al., 2015; Ovaskainen et al., 2017)。从“联合的层次”来看, 这样的统一至少体现在生态位结构层面的联合与生物相互作用层面的联合两个维度。在生态位结构层面, 多数模型(如gllvm、boral、部分jSDM)主要实现了多物种对环境响应的联合建模, 即在同一统计框架中同时估计多个物种的环境效应, 并借助潜在变量或残差结构刻画群落尺度的协变格局; 但这类模型通常仅停留在“环境–物种”层面的联合, 难以原生整合性状或系统发育信息。相比之下, HMSC及其图形处理器加速实现Hmsc-HPC在模型结构上实现了更高层级的深度联合(附录1-表S4): 其不仅能够在回归层级中显式引入功能性状与系统发育相关结构, 从而刻画环境响应的性状依赖(trait–environment relationships), 还可通过多层随机效应同时建模空间与时间自相关, 统一描述群落随演替、扩散与历史过程变化的系统发育依赖。这种“环境–性状–谱系–空间–时间”多维信息在同一概率框架中的原生整合, 是目前多数JSDMs框架(如gllvm、boral、sjSDM、spOccupancy)所不具备的, 也是HMSC在生态机制解释层面最突出的优势之一(Hui, 2016; Niku et al., 2019; Pichler & Hartig, 2021; Doser et al., 2022; Rahman et al., 2024)。

在生物相互作用层面, 目前包括HMSC、gllvm、boral、jSDM、GJAM等在内的模型, 仍主要依赖潜在变量或残差相关结构来间接刻画物种关联网络, 而对于“相互作用强度如何随性状变化”以及“相互作用结构如何在时间或演化尺度上发生改变”, 尚

缺乏可在真实群落数据中稳定估计的通用建模框架。需要强调的是, 即便在HMSC中, 物种间残余相关性也主要用于表征未观测环境因子、空间结构及隐含过程所诱发的统计依赖, 而非对直接生物相互作用的机制刻画。因此, 从“联合”的内涵上看, 当前主流JSDMs的决定性优势仍集中于生态位结构的深度联合(尤其以HMSC为代表的多层级整合), 而在显式生物相互作用机制层面的联合仍处于方法学探索阶段, 这也构成了JSDMs在生态机制解释维度上的关键理论边界。

4.2 不同JSDMs的计算框架差异与研究情景适用性

在推断引擎与计算性能上, HMSC依托全贝叶斯MCMC为复杂层级模型提供了完备的不确定性刻画, 而Hmsc-HPC的并行化吉布斯采样(parallel Gibbs sampling)与图形处理器加速大幅消解了传统HMSC在大规模数据下的速度瓶颈, 使得百物种 × 千样点级别的多层模型可在小时量级收敛(Rahman et al., 2024)。gllvm利用复杂层次模型的高效数值计算实现的拉普拉斯近似与变分推断(variational inference, VI), 在无图形处理器环境下具备稳定且快速的优势, 尤其适合中等规模矩阵和较简单的层级结构(Niku et al., 2019); boral则利用通用的Gibbs采样器(Just Another Gibbs Sampler, JAGS)软件在速度上介于二者之间, 但以可解释的潜变量回归见长(Hui, 2016)。sjSDM在GPU下可轻松处理数千物种与上千样点, 且支持复杂的非线性环境响应, 但牺牲了部分生态机制可解释性(Rahman et al., 2024)。spOccupancy的计算效率受限于占据–检测双层结构与空间高斯过程或者最近邻高斯过程, 但其在监测类数据(尤其是重复调查)中的统计严谨性很难替代(Doser et al., 2022)。

从科学推断的严谨性与生态机制解释的需求出发, 若研究目标是整合多维信息(性状、谱系、空间、时间)以揭示群落构建规律, HMSC/Hmsc-HPC是优先选择(Tikhonov et al., 2020b; Pichler & Hartig, 2021); 若在缺乏图形处理器条件下需要在速度与稳健之间折中, 且数据结构中等复杂, gllvm是高性价比方案; 若以教学、快速原型或中小规模群落排序为主(Niku et al., 2019); boral与jSDM提供了语义清晰、易于复现的框架(Pollock et al., 2014; Hui, 2016); 若任务以大规模预测或高维环境响应为核心, sjSDM的深度学习策略较为适宜(Pichler & Hartig, 2021); 而在监测与管理情境下, 尤其是需要显式估计检测概率并量化不确定性时, spOccupancy是成熟且统计上严谨的选择(Doser et al., 2022)。在任何情境中, 方法选型应遵循“数据结构–研究目标–推断需求”三位一体的原则, 避免将模型性能或功能标签机械化套用。

5 JSDMs与传统群落统计方法的比较

5.1 群落统计方法在多源数据整合上的本质差异

在群落生态学的多物种建模中, HMSC相较于传统排序分析(如冗余分析及其配套的变差分解)、第四角分析、共现分析、Mantel检验及基于物种丰富度的线性混合模型, 展现出更高层级的数据整合能力与推断深度(Legendre et al., 1997; McArdle & Anderson, 2001; Oksanen et al., 2013)。从方法所能同时利用的数据类型看, RDA/db-RDA与变差分解以群落物种矩阵为多元响应变量, 将环境与空间因子作为显式解释变量引入模型, 用于刻画其对群落结构的约束效应; 但物种性状与系统发育信息通常只能通过事后拟合或分步分析方式引入, 难以在同一模型中与环境和空间效应实现统一建模。第四角分析基于“样地 × 物种” “样地 × 环境” “物种 × 性状” 3类矩阵的联合结构开展统计检验, 是一种以多矩阵关联为核心的数据驱动型分析方法, 其核心数据输入为群落矩阵、环境矩阵与性状矩阵, 推断依赖置换检验框架, 不涉及随机效应、空间过程或生成式分布建模(Legendre et al., 1997; Dray & Legendre, 2008)。Mantel检验则完全基于距离矩阵开展分析, 其输入数据可为群落相异度矩阵、环境距离矩阵或空间距离矩阵, 本质上是对两类距离结构之间相关性的非参数检验方法, 不涉及物种层级参数、协方差结构或分层模型设定(Anderson & Walsh, 2013)。共现分析与网络分析严格局限于单一群落矩阵, 仅用于描述物种共现或关联结构, 而无法引入环境、性状、谱系和空间信息; 多样性指数虽可结合环境与空间梯度进行统计分析, 但其输出本质仍是对群落整体属性的压缩表征, 无法解析物种层级的响应差异与协变结构(Ovaskainen & Abrego, 2020)。

相比之下, JSDMs是唯一能够在同一概率框架

内同时整合群落数据、环境变量、功能性状、系统发育信息及时空结构的方法体系。在输入层面，JSDMs可将多源数据作为协变量与层级结构的组成部分直接纳入模型；在输出层面，则可同时对环境过滤、生物过滤、性状与系统发育对生态位响应的调节作用以及时空尺度上的群落组成预测进行联合推断。这一“输入–输出一体化”的建模能力，是排序、共现分析、网络分析和多样性指数在方法论层面无法实现的。

5.2 不同统计方法在群落构建机制中的解析能力

进一步从能够回答的科学问题类型来看，不同方法在生态机制解析深度上呈现出清晰分层。排序方法擅长回答“群落结构沿主要环境梯度如何变化”，但无法量化单个物种对环境变量的响应强度，也难以区分空间自相关、生物互作与环境过滤的相对作用；第四角分析能够检验“环境变量–物种性状–群落组成”三者之间是否存在统计关联，从而用于探索性状介导的环境过滤机制，但其推断基于矩阵置换检验，缺乏显式的随机效应、空间结构与参数化生态过程建模，因此难以用于预测；Mantel检验则用于检验群落相似性与环境距离或空间距离之间是否存在相关关系，适合回答“群落是否随环境或空间距离发生一致变化”，但其本质仍是基于距离矩阵的相关性检验，无法解析物种层级的响应机制与过程因果结构。共现分析与网络分析能够揭示物种之间的共存或互斥格局，主要用于检验物种分布格局是否偏离随机期望，却无法判断这些格局究竟源于环境相似性、生物互作还是采样结构所致(Gotelli, 2000; Gotelli et al., 2015)；多样性指数分析主要刻画“群落复杂性如何随环境变化”的整体趋势，但由于其对群落信息进行了高度压缩，无法捕捉物种间差异化响应及相关性结构，无法回溯到物种层级的机制来源(Ovaskainen & Abrego, 2020)。

进一步结合经典集合群落构建理论可以更清楚地理解不同统计方法在复杂系统中的适用边界。以物种配置(species sorting)、集团效应(mass effects)、斑块动态(patch dynamics)与中性过程为代表的4类集合群落框架，对群落结构的控制机制在统计信号上的可识别性存在本质差异(Ovaskainen et al., 2019)。在以明确环境梯度为主导的物种配置型系统中，排序、多样性分析与JSDMs往往能够给出一致结论，均可有效刻画群落沿环境梯度的结构分化；在扩散与局域种群动态共同作用的质量效应框架下，部分基于距离的方法仍可捕捉到空间结构信号，但往往难以区分环境过滤与扩散过程的相对贡献，而JSDMs则可通过同时建模环境响应与空间随机效应实现二者的统计分离。相比之下，在以局域灭绝–拓殖为主导机制的斑块动态框架以及以随机扩散与生态位等价为基础的中性框架中，群落结构对环境梯度的响应显著弱化，传统排序与共现分析往往只能给出弱解释或高度不稳定的结果，而JSDMs由于能够显式引入时间动态、残余协方差结构及潜在变量，仍具备从统计上区分“动态景观”与“静态景观”以及识别未观测过程的重要能力。因此不同方法的有效性并非普遍成立，而是强烈依赖于集合群落所处的理论框架类型：传统方法在排序主导的系统中表现稳健，而在斑块动态与中性过程占主导的系统中只有JSDMs等联合建模框架仍能对驱动机制给出具有统计可识别性的推断。

JSDMs在“格局–机制–预测” 3个层面形成闭环：一方面，它通过物种特异的环境响应参数刻画环境过滤；另一方面，通过残余相关结构刻画在控制环境后的潜在生物关联；同时还能在回归层级中显式引入性状与系统发育约束，检验“性状是否调控生态位”“谱系是否限制环境响应”；在此基础上，JSDMs进一步具备空间外推与情景预测能力，可用于预测未采样区域或未来环境变化下的群落组成(Tikhonov et al., 2020b)。这也正是核心方法学跃迁：排序提供的是“群落格局的描述性表达”，而JSDMs提供的是“驱动这些格局的可参数化生态机制，并可用于预测未来”。因此，HMSC可视为当前唯一在单一统计框架内同时实现“多源数据整合–机制分解–不确定性量化–空间预测”的群落生态建模工具。与传统排序、共现分析和多样性指数相比，它不仅回答“群落格局是什么”，更进一步回答“群落为什么如此形成”以及“在新环境条件下群落将如何变化”，在多物种预测、群落构建机制解析及保护管理决策支持中具备不可替代的优势。

6 JSDMs的生态学应用与计算方法革新

6.1 JSDMs在生态学的多领域应用

在生态系统层面的应用上，JSDMs已在森林、湿

地、海洋、草原和城市等多种生态类型表现出稳健的适用性。在森林系统中, JSDMs可用于解析群落在不同林龄梯度下对气候与结构因子的共同响应, 并识别趋同或排斥的物种组合(Itter et al., 2024; Traylor et al., 2024); 在湿地系统中, JSDMs可同时分析宏观无脊椎动物群落结构及其功能性状对气候与局地环境因子的响应, 从而揭示物种与性状在不同尺度下的驱动机制, 并提升对气候变化影响的综合预测能力(Epele et al., 2024); 在海洋系统中, 基于渔业调查数据的JSDMs可联合预测多种鱼类与底栖无脊椎动物的空间分布、物种丰富度及脆弱海洋生态系统(vulnerable marine ecosystem, VME)指示物种热点, 为禁渔区边界的科学划定提供依据(Smith & Johnson, 2024; Stephenson et al., 2024; Fang et al., 2025); 草原系统中的JSDMs则把植物样方数据与气候–土地利用情景相耦合, 给出区域性的物种更替与潜在丧失格局, 为半自然草地的保育优先级排序提供群落视角(Liu & Van Meerbeek, 2024)。JSDMs在城市生态规划中也表现出很大潜力。在城市生态系统中, JSDMs能预测多物种或功能群对不同绿地配置的响应, 识别城市生物多样性热点, 为绿色基础设施布局和生态友好型城市规划提供科学依据(Powell-Romero et al., 2023)。

JSDMs在物种共生、群落结构与热点识别方面的能力主要来自对残差相关与潜在因子的估计; 在严格控制环境协变量后, 这些结构性的相关可转化为对潜在互作的可检线索(Warton et al., 2015; Wilkinson et al., 2019)。基于此, JSDMs通常能给出更稳健的物种丰富度与多样性热点预测, 尤其在样点稀疏、稀有种多或存在观测噪声的监测框架中, 模型通过相似生态位物种的信息, 显著降低过拟合与外推不稳(Tikhonov et al., 2020b; Escamilla Molgora et al., 2022)。在入侵种扩散预测中, 它也能通过关联物种提升入侵地潜在分布区预测的准确性, 为群落生态和生物互作研究提供更多维度的定量证据(Runquist et al., 2021)。在微生物研究中, 它可将宿主生物与共生微生物纳入同一模型, 分析宿主–微生物互动及环境对其共同分布的影响(Sallinen et al., 2020; Weigel et al., 2023); 结合环境DNA (environmental DNA, eDNA)和高性能计算, 模型规模已可扩展至数千物种(Pichler & Hartig, 2021)。

在自然保护与物种管理中, JSDMs为由“单物种视角”向“群落–网络视角”的转变提供了可操作的分析框架。保护地优先区划可直接基于多物种共现格局与群落完整性热点, 而非仅依赖旗舰物种或单一指标物种的空间覆盖(Itter et al., 2024); 外来入侵生物风险评估可结合本地替代物种或指示物种的联合分布信息, 提高对入侵扩散前沿的识别灵敏度(Mclaughlin et al., 2024); 在气候适应型保护框架下, 通过融合情景驱动预测与条件预测, 可系统评估关键物种变化在生态相互作用网络(互利、捕食、竞争)中的级联效应(Schliep et al., 2018); 生态系统恢复与物种再引入项目可在候选地点同时评估目标物种及其关键互作伙伴的联合栖息地适宜性, 降低目标种成功定殖而相关互作网络失效的风险(Runquist et al., 2021)。面向管理的模型输出应包括概率化并显式量化不确定性的风险分布图、多情景对比结果及关键环境变量的阈值敏感性分析, 以支撑透明、可追溯的保护决策过程(Wilkinson et al., 2021)。

在群落生态学理论检验中, JSDMs为探索物种共存机制提供了新的定量化途径。通过同时建模环境效应与物种间残差相关, JSDMs能够将环境过滤与生物相互作用的信号加以区分, 并在一定程度上评估其相对贡献(Warton et al., 2015)。在生态位理论与竞争–过滤理论的框架下, 环境效应的显著性及方向可用于验证环境筛选的重要性, 而残差相关(特别是负相关)的存在与强度则可作为竞争排斥的潜在证据(Poggiato et al., 2021)。中性理论则可通过观察环境解释力较弱、随机效应占主导的变异格局来间接评估(Ovaskainen & Abrego, 2020)。此外, JSDMs允许在模型中引入物种性状与系统发育信息, 从而检验生态位保守性假说: 若近缘物种在控制环境效应后仍表现出显著负相关, 可能与种间竞争过程相关; 若呈正相关, 则可能反映物种对未观测环境因子或空间过程的相似响应(Ovaskainen & Abrego, 2020)。这种模型框架不仅为理论假设提供了可操作的统计检验手段, 也为理论修正和发展提供了新的实证依据。

同时, JSDMs在群落构建规则的分析中展现出较高的灵活性与解释力。通过在模型中整合功能性状协变量, 可以检验功能相似性与共存格局之间的关系, 例如评估某些功能性状相似的物种是否系统

性地呈现互斥分布, 或在控制性状效应后残差相关是否显著下降, 从而推断性状在驱动物种分布格局中的作用(Abrego et al., 2017; Violet et al., 2022)。结合系统发育结构, 研究者能够进一步探讨近缘物种间的相互作用格局及其与进化历史的关联(Cranston et al., 2024)。此外, JSDMs生成的概率化输出与方差分解结果可直接与生态理论的定性预期进行对比, 为验证、修正或拓展理论提供实证数据支持(Ovaskainen et al., 2017)。这种理论–数据的双向融合, 使JSDMs不仅是群落数据分析的技术工具, 也是生态理论检验与发展中的重要方法论平台。

在国际范围内, JSDMs已广泛应用于森林、湿地、海洋、草原等宏观生态系统, 以及微生物生态、城市生态和群落构建理论检验等多个领域, 逐年增加的相关研究成果(图3)正推动其逐渐形成体系化的应用框架。然而, 与此趋势相比, 国内学界对JSDMs的接受与应用尚处于起步阶段, 迄今仅有少数尝试性研究, 尚未形成规模化应用与方法推广(Fang et al., 2025; Huang et al., 2025)。这一差距提示国内生态学界在群落建模方法引入与实证研究方面仍有较大拓展空间。

6.2 HMSC框架的计算性能与方法学革新

随着数据规模和复杂性的不断增长, 用户在将HMSC应用于大规模多物种数据集时面临显著的计算瓶颈。针对这一挑战, Ovaskainen团队持续优化计算性能, 并推出了高性能计算扩展模块Hmsc-HPC




图3 2011–2024年JSDMs发表文章数量变化
Fig. 3 Changes in the number of JSDMs publications from 2011 to 2024

(Rahman et al., 2024)。Hmsc-HPC在设计上与原R包无缝衔接, 允许用户在R环境中完成模型设定, 并将模型导出至配备GPU的HPC平台进行并行化Gibbs采样, 从而实现最高达千倍的速度提升。这一突破使得原本需多年运行的复杂模型能够在一天内完成, 大幅拓宽了HMSC在处理大规模、多层次生态数据中的适用性。

尽管Hmsc-HPC已显著缓解了千物种规模的计算限制, 面对十万级物种的建模需求仍存在不可忽视的挑战。随着基于DNA的高通量物种鉴定技术(如宏条形码)的普及, 包含数十万物种或OTUs的超大规模数据集在生物多样性研究中日趋常见。研究人员运用迁移学习方法对数据集中最常见的约千个物种拟合“骨干模型”, 随后将其学习到的参数信息转化为稀有物种的先验分布, 再分别拟合这些稀有物种的单独模型(Ovaskainen et al., 2025)。该策略有效将计算复杂度由与物种数平方增长降至线性增长, 使HMSC在理论上可扩展至任意数量的物种建模任务, 并已成功模拟25万种马达加斯加节肢动物的分布, 为全球尺度的群落建模提供了可行方案。

在计算性能持续突破的同时, HMSC的研究应用边界亦不断拓展。通过模型结构的灵活调整与推断结果的多维解释, HMSC被进一步发展为能够处理“联合物种–性状分布建模”的综合平台(Abrego et al., 2025)。该框架不仅能解析物种多度与物种水平性状之间的关系, 还可引入样地或其他空间尺度上的性状数据, 以量化种内性状变异与物种多度之间的协变结构。这一方法为揭示物种间的竞争与互作机制提供了新的统计途径, 并推动了多物种分布模型在功能多样性分析、群落构建机制解析以及保护生物学中的综合应用。

在方法应用与前沿发展方面, 研究人员建议: 数据层面应构建高质量的“样点 × 物种”矩阵, 并匹配适宜空间尺度的环境变量, 优先采用占据–检测或显式抽样过程模型以降低观测偏差(Ovaskainen & Abrego, 2020); 模型层面可根据研究规模与目的选择分层多物种共同分布模型框架或基于图形处理器加速的Hmsc-HPC或sjSDM, 并结合层级正则化与严格的时空分块交叉验证评估模型的可迁移性(Pichler & Hartig, 2021; Rahman et al., 2024); 解释层面需保持因果推断的谨慎: 残差相关

性不能直接等同于生态相互作用证据, 应辅以实验数据、时间序列分析或机制模型验证(Poggiato et al., 2021); 成果传播层面应重视不确定性的完整传播与可再现工作流的构建(包括代码、数据与参数公开)(Ovaskainen & Abrego, 2020)。未来趋势包括与遥感数据、环境DNA等多模态观测数据的深度融合, 从静态JSDMs向显式建模时间过程的动态JSDMs扩展, 以及增强与食物网模型或功能性状–代谢理论模型的耦合, 以在更大尺度、更高维度上支撑生态学研究与保护实践(Ovaskainen & Abrego, 2020)。

7 结论

本文围绕JSDMs, 特别是HMSC框架, 在群落生态学中的理论基础、统计结构与实际应用进行了系统梳理与方法整合。通过对环境过滤、生物过滤、扩散限制及未观测过程等群落构建机制的分析, 我们强调了多物种、多来源信息联合建模在现代群落生态学中的必要性。HMSC的层级结构能够在统一模型中同时整合环境梯度、物种性状、系统发育信息与空间-时间相关结构, 并通过潜在变量有效刻画高维物种协变, 因而在群落机制解析、生态位驱动力识别以及物种共现格局的统计表达方面展现出显著优势。本文的工作说明, HMSC不仅能够从固定效应层面量化环境与性状对物种生态位的影响, 还可以通过随机效应和结构化潜在变量刻画残差协变结构, 为理解环境过滤、未测环境因子、生境微结构及扩散限制等过程的相对贡献提供了新的定量化途径。需要强调的是, 残差相关并非生态互作的直接证据, 理论检验与管理决策仍需结合实验验证、时间序列分析或独立数据佐证。

随着稀有物种建模需求的增长与生态数据规模的急剧扩展, JSDMs在计算效率与可扩展性方面的创新也变得愈发关键。Hmsc-HPC与迁移学习方法的发展表明, 通过跨物种信息共享与并行推断策略, HMSC已能够突破传统贝叶斯模型的计算瓶颈, 使大规模、多层级、多维信息的群落预测与机制分析成为现实。与此同时, 不同JSDMs工具在推断引擎、生态解释能力与模型灵活性上各具优势, 为不同研究情景与数据结构提供了互补选择。本文的分析表明, 无论在森林、草原、湿地、海洋、城市生态系统, 还是在微生物与eDNA研究中, JSDMs均已成为识别关键环境梯度、解析群落协变结构、提升稀有物种预测能力并支持保护规划的重要手段。

因此, JSDMs尤其是HMSC, 为群落生态学从格局描述迈向机制推断提供了具有统计统一性、生态解释能力与预测价值的综合框架, 使研究者能够在同一模型中连接环境响应、性状调控、谱系结构、空间过程与群落共变关系, 进而促进理论检验、管理决策与大尺度生物多样性预测的深度融合。未来, 随着遥感、eDNA、多组学与长期监测数据的进一步整合, JSDMs有望向更高维度、更大尺度和更明确的过程建模方向发展, 从而为理解复杂生态系统的动态与稳定性提供更强的理论与方法支撑。

致谢: 我们衷心感谢芬兰于韦斯屈莱大学(University of Jyväskylä)的Otso Ovaskainen教授、Nerea Abrego研究员以及赫尔辛基大学(University of Helsinki)的Gleb Tikhonov博士在本文撰写过程中给予的宝贵帮助与支持。Otso和Nerea分享了大量相关论文和研究资料, 使我们能够全面系统地综述JSDMs及HMSC框架的理论与应用。同时, Otso、Nerea以及Gleb还与我们深入交流了其研究团队的最新JSDMs工作进展, 为本文的完善提供了重要参考。我们衷心感谢于韦斯屈莱大学董安冉博士在论文修改与完善过程中给予的宝贵帮助。在此, 对他们在学术探讨与资料支持方面所付出的时间与心力致以诚挚的谢意。

使用生成性AI及AI辅助技术声明: 在本文的准备过程中, 作者使用了ChatGPT提高语言质量和可读性。使用该工具后, 作者已经审查并编辑了内容, 对发表文章的内容负全部责任。

参考文献

Abrego N, Niittynen P, Kemppinen J, Ovaskainen O (2025) Joint species-trait distribution modeling: The role of intraspecific trait variation in community assembly. Ecology, 106, e70174.

Abrego N, Norberg A, Ovaskainen O (2017) Measuring and predicting the influence of traits on the assembly processes of wood-inhabiting fungi. Journal of Ecology, 105, 1070–1081.

Agrawal AA, Ackerly DD, Adler F, Arnold AE, Cáceres C, Doak DF, Post E, Hudson PJ, Maron J, Mooney KA, Power M, Schemske D, Stachowicz J, Strauss S, Turner MG, Werner E (2007) Filling key gaps in population and community

ecology. Frontiers in Ecology and the Environment, 5, 145–152.

Anderson MJ, Walsh DCI (2013) PERMANOVA, ANOSIM, and the Mantel test in the face of heterogeneous dispersions: What null hypothesis are you testing? Ecological Monographs, 83, 557–574.

Begon M, Townsend CR (2020) Ecology: From Individuals to Ecosystems, 5th edn. John Wiley & Sons, Hoboken, USA.

Blanchet FG, Cazelles K, Gravel D (2020) Co-occurrence is not evidence of ecological interactions. Ecology Letters, 23, 1050–1063.

Bohmann K, Evans A, Gilbert MTP, Carvalho GR, Creer S, Knapp M, Yu DW, de Bruyn M (2014) Environmental DNA for wildlife biology and biodiversity monitoring. Trends in Ecology & Evolution, 29, 358–367.

Breiner FT, Guisan A, Bergamini A, Nobis MP (2015) Overcoming limitations of modelling rare species by using ensembles of small models. Methods in Ecology and Evolution, 6, 1210–1218.

Calabrese JM, Certain G, Kraan C, Dormann CF (2014) Stacking species distribution models and adjusting bias by linking them to macroecological models. Global Ecology and Biogeography, 23, 99–112.

Chase JM, Myers JA (2011) Disentangling the importance of ecological niches from stochastic processes across scales. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B, Biological Sciences, 366, 2351–2363.

Clark JS, Nemergut D, Seyednasrollah B, Turner PJ, Zhang S (2017) Generalized joint attribute modeling for biodiversity analysis: Median-zero, multivariate, multifarious data. Ecological Monographs, 87, 34–56.

Cranston A, Cooper N, Bro-Jørgensen J (2024) Using joint species distribution modelling to identify climatic and non-climatic drivers of Afrotropical ungulate distributions. Ecography, 2024, e07209.

Dormann CF, Bobrowski M, Dehling DM, Harris DJ, Hartig F, Lischke H, Moretti MD, Pagel J, Pinkert S, Schleuning M, Schmidt SI, Storch I, Weiss IS, Mueller J (2018) Biotic interactions in species distribution modelling: 15 challenges and a way forward. Ecography, 41, 1–15.

Doser JW, Finley AO, Kéry M, Zipkin EF (2022) spOccupancy: An R package for single-species, multi-species, and integrated spatial occupancy models. Methods in Ecology and Evolution, 13, 1670–1678.

Dray S, Legendre P (2008) Testing the species traits–environment relationships: The fourth-corner problem revisited. Ecology, 89, 3400–3412.

Elith J, Leathwick JR (2009) Species distribution models: Ecological explanation and prediction across space and time. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 40, 677–697.

Epele LB, Williams-Subiza EA, Bird MS, Boissezon A, Boix D, Demierre E, Fair CG, García PE, Gascón S, Grech MG, Greig HS, Jeffries M, Kneitel JM, Loskutova O, Maltchik L, Manzo LM, Mataloni G, McLean K, Mlambo MC, Oertli B, Pires MM, Sala J, Scheibler EE, Stenert C, Wu HT, Wissinger SA, Batzer DP (2024) A global assessment of environmental and climate influences on wetland macroinvertebrate community structure and function. Global Change Biology, 30, e17173.

Escamilla Molgora JM, Sedda L, Diggle PJ, Atkinson PM (2022) A taxonomic-based joint species distribution model for presence-only data. Journal of the Royal Society, Interface 19, 20210681.

Fang XN, Zhang P, Xing QW, Chen XJ, Cao J, Zhang H, Yu W (2025) The impact of varying spatiotemporal scales on different joint species distribution models: A case study of pelagic fish species in the northwest Pacific Ocean. Journal of Biogeography, 52, e15154.

Fick SE, Hijmans RJ (2017) WorldClim 2: New 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 37, 4302–4315.

Galante PJ, Alade B, Muscarella R, Jansa SA, Goodman SM, Anderson RP (2018) The challenge of modeling niches and distributions for data-poor species: A comprehensive approach to model complexity. Ecography, 41, 726–736.

Gilarranz LJ, Rayfield B, Liñán-Cembrano G, Bascompte J, Gonzalez A (2017) Effects of network modularity on the spread of perturbation impact in experimental metapopulations. Science, 357, 199–201.

Gotelli NJ (2000) Null model analysis of species co-occurrence patterns. Ecology, 81, 2606–2621.

Gotelli N, Hart E, Ellison A, Hart ME (2015) Package 'EcoSimR'. R Package. Available at: https://CRAN.R-project.org/package=EcoSimR. (accessed on 2026-01-10)

Götzenberger L, de Bello F, Bråthen KA, Davison J, Dubuis A, Guisan A, Lepš J, Lindborg R, Moora M, Pärtel M, Pellissier L, Pottier J, Vittoz P, Zobel K, Zobel M (2012) Ecological assembly rules in plant communities— Approaches, patterns and prospects. Biological Reviews, 87, 111–127.

Guisan A, Thuiller W (2005) Predicting species distribution: Offering more than simple habitat models. Ecology Letters, 8, 993–1009.

Huang EH, Ji CJ, Liang MX, Zhu JL, Tang ZY, Fang JY (2025) Climatic and non-climatic effects on species occurrence and abundance shift in different trends along elevational gradients. Journal of Plant Ecology, 18, rtaf122.

Hui FKC (2016) Boral-Bayesian ordination and regression analysis of multivariate abundance data in R. Methods in Ecology and Evolution, 7, 744–750.

Hui FKC, Taskinen S, Pledger S, Foster SD, Warton DI (2015) Model-based approaches to unconstrained ordination. Methods in Ecology and Evolution, 6, 399–411.

Itter MS, Kaarlejärvi E, Laine AL, Hamberg L, Tonteri T, Vanhatalo J (2024) Bayesian joint species distribution model selection for community-level prediction. Global Ecology and Biogeography, 33, e13827.

Jeliazkov A, Gavish Y, Marsh CJ, Geschke J, Brummitt N, Rocchini D, Haase P, Kunin WE, Henle K (2022) Sampling and modelling rare species: Conceptual guidelines for the neglected majority. Global Change Biology, 28, 3754–3777.

Kattge J, Diaz S, Lavorel S, Prentice IC, Leadley P, Bönisch G, Garnier E, Westoby M, Reich PB, Wright IJ (2011) TRY—A

global database of plant traits. Global Change Biology, 17, 2905–2935.

Korhonen P, Hui FKC, Niku J, Taskinen S, van der Veen B (2024) A comparison of joint species distribution models for percent cover data. Methods in Ecology and Evolution, 15, 2359–2372.

Kraft NJB, Adler PB, Godoy O, James EC, Fuller S, Levine JM (2015) Community assembly, coexistence and the environmental filtering metaphor. Functional Ecology, 29, 592–599.

Legendre P, Galzin R, Harmelin-Vivien ML (1997) Relating behavior to habitat: Solutions to the fourth-corner problem. Ecology, 78, 547–562.

Legendre P, Legendre L (2012) Numerical Ecology. Elsevier, Amsterdam.

Leibold MA, Holyoak M, Mouquet N, Amarasekare P, Chase JM, Hoopes MF, Holt RD, Shurin JB, Law R, Tilman D, Loreau M, Gonzalez A (2004) The metacommunity concept: A framework for multi-scale community ecology. Ecology Letters, 7, 601–613.

Liu C, Van Meerbeek K (2024) Predicting the responses of European grassland communities to climate and land cover change. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B, Biological Sciences, 379, 20230335.

Logue JB, Mouquet N, Peter H, Hillebrand H (2011) Empirical approaches to metacommunities: A review and comparison with theory. Trends in Ecology & Evolution, 26, 482–491.

Magurran AE, Mcgill BJ (2010) Biological Diversity: Frontiers in Measurement and Assessment. OUP Oxford. Oxford University Press, Oxford.

McArdle BH, Anderson MJ (2001) Fitting multivariate models to community data: A comment on distance-based redundancy analysis. Ecology, 82, 290–297.

McLaughlin P, Krause K, Maloney K, Woods T, Wagner T (2024) Evaluating the effectiveness of joint species distribution modeling for freshwater fish communities within large watersheds. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 81, 1248–1263.

Niku J, Hui FKC, Taskinen S, Warton DI (2019) Gllvm: Fast analysis of multivariate abundance data with generalized linear latent variable models in R. Methods in Ecology and Evolution, 10, 2173–2182.

Norberg A, Abrego N, Blanchet FG, Adler FR, Anderson BJ, Anttila J, Araújo MB, Dallas T, Dunson D, Elith J, Foster SD, Fox R, Franklin J, Godsoe W, Guisan A, O'Hara B, Hill NA, Holt RD, Hui FKC, Husby M, Kålås JA, Lehikoinen A, Luoto M, Mod HK, Newell G, Renner I, Roslin T, Soininen J, Thuiller W, Vanhatalo J, Warton D, White M, Zimmermann NE, Gravel D, Ovaskainen O (2019) A comprehensive evaluation of predictive performance of 33 species distribution models at species and community levels. Ecological Monographs, 89, e01370.

Odriozola I, Abrego N, Tláskal V, Zrůstová P, Morais D, Větrovský T, Ovaskainen O, Baldrian P (2021) Fungal communities are important determinants of bacterial community composition in deadwood. mSystems, 6, e01017–e01020.

Oksanen J, Blanchet FG, Kindt R, Legendre P, Minchin PR, O Hara RB, Simpson GL, Solymos P, Stevens MHH, Wagner H (2013) Package 'vegan'. Community Ecology Package, Version 2, 1–295. https://cran.r-project.org/. (accessed on 2026-01-10)

Ovaskainen O, Abrego N (2020) Joint Species Distribution Modelling. Cambridge University Press, Cambridge.

Ovaskainen O, Hottola J, Siitonen J (2010) Modeling species co-occurrence by multivariate logistic regression generates new hypotheses on fungal interactions. Ecology, 91, 2514–2521.

Ovaskainen O, Rybicki J, Abrego N (2019) What can observational data reveal about metacommunity processes? Ecography, 42, 1877–1886.

Ovaskainen O, Soininen J (2011) Making more out of sparse data: Hierarchical modeling of species communities. Ecology, 92, 289–295.

Ovaskainen O, Tikhonov G, Norberg A, Guillaume Blanchet F, Duan L, Dunson D, Roslin T, Abrego N (2017) How to make more out of community data? A conceptual framework and its implementation as models and software. Ecology Letters, 20, 561–576.

Ovaskainen O, Winter S, Tikhonov G, Abrego N, Anslan S, de Waard JR, de Waard SL, Fisher BL, Furneaux B, Hardwick B, Kerdraon D, Pentinsaari M, Raharinjanahary D, Rajoelison ET, Ratnasingham S, Somervuo P, Sones JE, Zakharov EV, Hebert PDN, Roslin T, Dunson D (2025) Common to rare transfer learning (CORAL) enables inference and prediction for a quarter million rare Malagasy arthropods. Nature Methods, 22, 2074–2082.

Pichler M, Hartig F (2021) A new joint species distribution model for faster and more accurate inference of species associations from big community data. Methods in Ecology and Evolution, 12, 2159–2173.

Poggiato G, Münkemüller T, Bystrova D, Arbel J, Clark JS, Thuiller W (2021) On the interpretations of joint modeling in community ecology. Trends in Ecology & Evolution, 36, 391–401.

Pollock LJ, Tingley R, Morris WK, Golding N, O'Hara RB, Parris KM, Vesk PA, McCarthy MA (2014) Understanding co-occurrence by modelling species simultaneously with a Joint Species Distribution Model (JSDM). Methods in Ecology and Evolution, 5, 397–406.

Powell-Romero F, Fountain-Jones NM, Norberg A, Clark NJ (2023) Improving the predictability and interpretability of co-occurrence modelling through feature-based joint species distribution ensembles. Methods in Ecology and Evolution, 14, 146–161.

Rahman AU, Tikhonov G, Oksanen J, Rossi T, Ovaskainen O (2024) Accelerating joint species distribution modelling with Hmsc-HPC by GPU porting. PLoS Computational Biology, 20, e1011914.

Runquist RDB, Lake TA, Moeller DA (2021) Improving predictions of range expansion for invasive species using joint species distribution models and surrogate co-occurring species. Journal of Biogeography, 48, 1693–1705.

Sallinen S, Norberg A, Susi H, Laine AL (2020) Intraspecific host variation plays a key role in virus community assembly. Nature Communications, 11, 5610.

Schliep EM, Lany NK, Zarnetske PL, Schaeffer RN, Orians CM, Orwig DA, Preisser EL (2018) Joint species distribution modelling for spatio-temporal occurrence and ordinal abundance data. Global Ecology and Biogeography, 27, 142–155.

Schmitt S, Pouteau R, Justeau D, de Boissieu F, Birnbaum P (2017) ssdm: An R package to predict distribution of species richness and composition based on stacked species distribution models. Methods in Ecology and Evolution, 8, 1795–1803.

Smith JA, Johnson DD (2024) Evaluating drivers and predictability of catch composition in a highly mixed trawl fishery using stacked and joint species distribution models. Fisheries Research, 279, 107151.

Stephenson F, Bowden DA, Rowden AA, Anderson OF, Clark MR, Bennion M, Finucci B, Pinkerton MH, Goode S, Chin C, Davey N, Hart A, Stewart R (2024) Using joint species distribution modelling to predict distributions of seafloor taxa and identify vulnerable marine ecosystems in New Zealand waters. Biodiversity and Conservation, 33, 3103–3127.

Thorson JT, Ianelli JN, Larsen EA, Ries L, Scheuerell MD, Szuwalski C, Zipkin EF (2016) Joint dynamic species distribution models: A tool for community ordination and spatio-temporal monitoring. Global Ecology and Biogeography, 25, 1144–1158.

Tikhonov G, Duan L, Abrego N, Newell G, White M, Dunson D, Ovaskainen O (2020a) Computationally efficient joint species distribution modeling of big spatial data. Ecology, 101, e02929.

Tikhonov G, Opedal ØH, Abrego N, Lehikoinen A, de Jonge MMJ, Oksanen J, Ovaskainen O (2020b) Joint species distribution modelling with the R-package HMSC. Methods in Ecology and Evolution, 11, 442–447.

Traylor CR, Ulyshen MD, McHugh JV, Burner RC (2024) Forest age is a primary trait filter for saproxylic beetles in the southeastern United States. Forest Ecology and Management, 553, 121545.

Vellend M (2010) Conceptual synthesis in community ecology. The Quarterly Review of Biology, 85, 183–206.

Violet C, Boyé A, Chevalier M, Gauthier O, Grall J, Marzloff MP (2022) A multifaceted framework to assess tradeoffs in interpretability, Explanatory and Predictive Performances of Alternative Joint Species Distribution Models. bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2022.12.19.519605. (accessed on 2026-01-10)

Wang HY, Chen XL, Chen SC (2025) Chinese Seed Trait Database: A curated resource for diaspore traits in the Chinese flora. New Phytologist, 248, 11–16.

Warton DI, Blanchet FG, O'Hara RB, Ovaskainen O, Taskinen S, Walker SC, Hui FKC (2015) So many variables: Joint modeling in community ecology. Trends in Ecology & Evolution, 30, 766–779.

Weigel B, Graco-Roza C, Hultman J, Pajunen V, Teittinen A, Kuzmina M, Zakharov EV, Soininen J, Ovaskainen O (2023) Local eukaryotic and bacterial stream community assembly is shaped by regional land use effects. ISME Communications, 3, 65.

Weiss S, Van Treuren W, Lozupone C, Faust K, Friedman J, Deng Y, Xia LC, Xu ZZ, Ursell L, Alm EJ, Birmingham A, Cram JA, Fuhrman JA, Raes J, Sun FZ, Zhou JZ, Knight R (2016) Correlation detection strategies in microbial data sets vary widely in sensitivity and precision. The ISME Journal, 10, 1669–1681.

Wilkinson DP, Golding N, Guillera-Arroita G, Tingley R, McCarthy MA (2019) A comparison of joint species distribution models for presence–absence data. Methods in Ecology and Evolution, 10, 198–211.

Wilkinson DP, Golding N, Guillera-Arroita G, Tingley R, McCarthy MA (2021) Defining and evaluating predictions of joint species distribution models. Methods in Ecology and Evolution, 12, 394–404.

Wisz MS, Pottier J, Kissling WD, Pellissier L, Lenoir J, Damgaard CF, Dormann CF, Forchhammer MC, Grytnes JA, Guisan A, Heikkinen RK, Høye TT, Kühn I, Luoto M, Maiorano L, Nilsson MC, Normand S, Öckinger E, Schmidt NM, Termansen M, Timmermann A, Wardle DA, Aastrup P, Svenning JC (2013) The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species: Implications for species distribution modelling. Biological Reviews, 88, 15–30.

Zobel M (1997) The relative of species pools in determining plant species richness: An alternative explanation of species coexistence? Trends in Ecology & Evolution, 12, 266–269.

Zhang JT (2011) Quantitative Ecology, 2nd edn. Science Press, Beijing. (in Chinese) [张金屯 (2011) 数量生态学(第二版). 科学出版社, 北京.]

Zhu YJ, Shan D, Zhang X, Liu YS, Shi ZJ, Yang XH (2018) Advances in joint species distribution models to reveal community structure and its environmental response. Chinese Journal of Applied Ecology, 29, 4217–4225. (in Chinese with English abstract) [朱媛君, 山丹, 张晓, 刘艳书, 时忠杰, 杨晓晖 (2018) 揭示群落结构及其环境响应的联合物种分布模型的研究进展. 应用生态学报, 29, 4217–4225.]

(责任编委: 乔慧捷; 责任编辑: 周玉荣)

附录 Supplementary Material

https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025364

谷际岐, 赖江山, 王瑛, 吴浩然, 张雪, 宋晓彤, 邵小明, 娄安如 (2026) 联合物种分布模型与生物群落层次建模框架: 生态学理论、方法及应用. 生物多样性, 34, 25364. doi: 10.17520/biods.2025364; cstr: 32101.14.biods.2025364. https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025364

附录1　联合物种分布模型及生物群落层次建模框架(HMSC)框架参数与比较

Appendix 1　Joint species distribution models and the hierarchical modelling of species communities (HMSC) framework: Parameter interpretation and model comparison

表S1　HMSC中马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)的主要参数包括采样控制参数以及模型结构控制参数

Table S1　Main Markov Chain Monte Carlo parameters in HMSC, including sampling control parameters and model structure control parameters

参数名称 Parameter Name	作用 Function	典型取值/说明 Typical Values / Description
nSamples	控制最终用于推断的有效样本数量, 样本越多估计越精确, 但计算时间增加	常取 1,000–10,000, 需平衡精度与时间
transient	Burn-in 阶段的长度, 丢弃初始样本以确保链条收敛; HMSC 中可动态调整潜在因子数	常取 500–5,000, 根据收敛速度调整
thin	采样间隔, 减少样本自相关	常取 1–10, 数值越大自相关越低, 但样本量减少
fromPrior	是否直接从先验分布采样, 用于检验先验合理性	TRUE 或 FALSE
adaptNf	Burn-in 阶段因子数动态调整的迭代次数, 0 表示固定因子数	常取 100–1,000, 0 则禁用调整
chains	MCMC 独立链数, 配合 Gelman-Rubin 诊断评估收敛	≥ 2 条链更可靠
setPriors	设定先验参数, 包括 a1、a2(物种载荷收缩强度)、α*(空间尺度上限)、aσj/bσj(残差方差先验形状/速率)等	需结合数据特征与研究问题调整

表S2　HMSC中主要模型评估指标与变量处理方法的功能、适用性及局限

Table S2　Functions, applicability, and limitations of major model evaluation metrics and variable processing methods in HMSC

方法/指标 Method / Metric	类型/功能维度 Type / Functional Dimension	适用数据类型 Applicable Data Type	数值范围 Value Range	最优值 Optimal Value	主要作用 Primary Function	HMSC 实现/调用 HMSC Implementation / Invocation	优点 Advantages	注意事项/局限 Considerations / Limitations
RMSE(均方根误差)	评估指标—**准确性**	连续、计数、存在–缺失(以预测均值对比观测)	[0,+∞)	0	衡量预测与观测的平均偏差, 并放大大偏差	由后验预测值直接计算(evaluateModelFit 输出可用)	量纲一致、直观	易受极端值影响; 不反映区分能力
AUC	评估指标—**区分力**	存在–缺失	[0,1]	1	区分"存在/缺失"样点	由后验出现概率计算(evaluateModelFit)	跨研究可比性强	不反映概率**校准度**
Tjur R^2	评估指标—**区分力**	存在–缺失	[0,1]	1	出现与缺失样点预测概率均值差	同上	定义简洁、可解释性强	与 AUC 高相关, 信息增量有限
R^2 (决定系数, 相关性定义并恢复符号)	评估指标—**区分力(预测); 解释力(拟合)**	连续	**[−1,1]**	1	相关性与解释率(拟合时)	由后验预测与观测的皮尔森相关计算, 负相关恢复符号(evaluateModelFit)	直观、能反映方向性	仅线性关联; 拟合情境与预测情境解读不同
伪 R^2 (基于秩相关)	评估指标—**区分力**	计数(泊松、对数正态泊松等)	**[−1,1]**	1	预测与观测的一致性(秩)	以斯皮尔曼相关替代皮尔森(evaluateModelFit)	对异常值稳健	非方差比例, 解读不同于经典 R^2
WAIC (广域信息准则)	**模型选择**—拟合优度/复杂性权衡	各类数据, 含层次与隐变量	无固定上界(**越小越好**)	最小值	近似贝叶斯交叉验证的泛化损失, 适配奇异模型	**内置**: computeWAIC()	计算高效、理论稳健	不直接检验外推预测稳健性
尖峰–平板先验 (spike-and-slab)	**变量处理**—变量选择(稀疏化)	各类数据(协变量多、共线性强)	—	先验入模概率 0<q<10<q<1	在先验中对回归系数引入零点质量, 实现协变量筛选	**内置**: 通过 XSelect 设定物种级/联合/分组的选择结构与先验 qq	主动去冗余, 降低过拟合	对先验设定敏感; 采样收敛更慢
降秩回归 (RRR)	**变量处理**—降维(线性组合)	各类数据(高维协变量)	—	由用户设定降维维度 ncRRRn_c^{RRR}	学习最能解释群落变异的协变量主轴并用于回归	**内置**: 在 Hmsc()中以 XRRR/XRRRFormula 与 ncRRR 指定	显著降参、保留主要生态信号	若主轴与真实过程不符, 可能损失关键信息

表S3　常用联合物种分布模型(JSDM) R包功能特性与适用性对比

Table S3　Comparison of functional features and applicability of Common Joint Species Distribution Model (JSDM) R Packages

R 包 R Package	核心思想/推断框架 Core Concept / Inference Framework	典型数据类型 Typical Data Type	空间/层级结构 Spatial / Hierarchical Structure	物种间相关 Inter-Species Correlation	检测过程(可检率) Detection Process (Detectability)	速度与规模 Speed And Scalability	亮点 Key Strengths	局限 Limitations
Hmsc (基包)	全贝叶斯MCMC (Gibbs/Metropolis); 分层随机效应, 可并入性状与谱系	存在–缺失、计数、相对丰度	**极强**: 任意多层随机效应, 支持空间随机场	潜在因子/协方差建模	无原生占据—检测层(需自定义)	中等(数据很大时耗时)	群落级: 环境—性状—谱系—空间—层级一次整合, 解释性强	无原生检测模型; CPU大数据下时间长
Hmsc-HPC	同Hmsc, 但后端GPU (TensorFlow), 并行化 Gibbs	同上	同上	同上	同上	**极快**: 数百物种×数千样点可数小时收敛	保留Hmsc全功能同时解决大规模速度瓶颈	需GPU/合适环境; 安装依赖多
gllvm	广义线性潜在变量模型; 拉普拉斯近似/变分推断 (TMB后端)	存在–缺失、计数、连续	支持随机效应与空间项	潜在变量载荷矩阵	无原生检测层	快, 适合大中型矩阵	稳定、可扩展, 排序和可视化方便	无检测过程; 复杂层级需自定义
boral	贝叶斯(JAGS); 潜在变量 + 回归	存在–缺失、计数	支持简单随机效应	潜在变量捕捉相关	无原生检测层	较慢(比gllvm慢, 比旧Hmsc快)	入门友好, 结果可解释性好	空间/检测不方便
jSDM	贝叶斯probit/logit; 直接余差协方差或潜在因子	存在–缺失、计数	固定/随机效应较简	协方差/潜在因子	部分示例可做	中等	语法直观, 教学原型好	功能轻量, 大规模管理性差
sjSDM	深度学习+正则化; GPU 加速	存在–缺失、(部分计数)	可加空间坐标/核函数	网络结构/惩罚项	无检测层	**极快**: 千物种×千样点轻松	预测强, 大规模非线性可行	可解释性相对弱
spOccupancy (多物种)	贝叶斯/频率学; NNGP 空间占据—检测	存在–缺失(重复调查)	强空间建模	多物种共享参数+相关结构	**原生支持**	中等	显式检测概率, 适合监测设计数据	丰度类需其他框架

表S4　常用JSDM/相关R包与数据要素支持

Table S4　Common JSDM and related R packages and their support for data elements

R 包 R Packages	群落分布矩阵 Community distribution matrix	环境协变量 Environmental covariates	性状 Traits	系统发育 Phylogeny	时间 Time	空间 Space	检测/占据过程 Detection / occupancy process
Hmsc/Hmsc-HPC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
gllvm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
boral	✓	✓	✓	△(无内置)	△(随机效应/分组)	✓	—
jSDM	✓	✓	✓	△(无内置)	△(站点效应/分组)	△(站点效应/潜变量)	—
sjSDM	✓	✓	△(需自构造)	—	✓(可做时变特征)	✓(显式空间与物种关联)	—
spOccupancy	✓	✓	△(建议后验两阶段分析)	—	✓(多季/时空)	✓(GP/NNGP)	✓(显式占据–检测, 多物种)

谷际岐, 赖江山, 王瑛, 吴浩然, 张雪, 宋晓彤, 邵小明, 娄安如 (2026) 联合物种分布模型与生物群落层次建模框架: 生态学理论、方法及应用. 生物多样性, 34, 25364. doi: 10.17520/biods.2025364; cstr: 32101.14.biods.2025364. https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025364

附录2 联合物种分布模型生物群落层次建模(HMSC)框架的应用分步教程

Appendix 2 A step-by-step tutorial on the application of the joint species distribution model (HMSC) framework

前言

生态系统的复杂性源于多层次的相互作用：环境梯度塑造物种分布，性状特征决定物种响应方式，而空间结构则连接了生态过程的尺度与连续性。传统的统计模型往往只能捕捉其中某一层面的关系，难以在统一框架下同时量化“环境—性状—空间”的综合效应。随着分层贝叶斯模型（Hierarchical Bayesian Models）与联合物种分布模型（Joint Species Distribution Models, JSDMs）的发展，我们终于拥有了一种能够在统计上重现生态系统结构与功能的方法论。生物群落层次建模框架（Hierarchical Modelling of Species Communities，HMSC）便是这一思想的代表。它通过层级化的参数结构与灵活的随机项设计，使研究者能够系统回答生态学中的五个核心科学问题：群落结构的变异在多大程度上由环境过滤、生物相互作用或随机过程驱动（FQ1）；物种的功能性状和系统发育关系如何决定其生态位与环境响应（FQ2）；在控制环境效应后，物种之间的残差共变格局是否反映潜在互作或共享微环境（FQ3）；群落相似性如何随环境相似度和空间距离而变化（FQ4）；以及在给定环境与空间条件下，能否对未观测地点或未来情景进行可验证的分布预测（FQ5）。

本教程以苔藓群落为研究原型，目的是通过具有代表性的生态系统，展示如何从原始数据出发，逐步构建、诊断并解释 Hmsc 模型。苔藓群落在微环境分化、基质依附与水分保持等方面具有典型的生态复杂性，是检验多层模型解释力的理想对象。从环境变量（温度、降水、土壤 pH、Ca 含量）到物种性状（持水能力、叶厚、茎高、孢子大小），再到系统发育与空间自相关结构，本教程完整展示了如何在一个多维生态系统中层层分解影响因素，并将统计结果转译为生态机制。

教程的设计遵循“从结构到机制”的教学逻辑。前半部分聚焦模型结构、采样与诊断，强调如何判断模型是否可信；中段围绕参数解释与可视化，讲解如何从 Beta、Gamma、Omega 等参数层读出生态信息；后半部分则通过误设实验、空间高斯过程与 trait 缺失分析，揭示模型不完备时的偏差来源。每一步都对应生态研究中的常见挑战：变量遗漏、性状不全、空间依赖、采样不充分等。通过这些对照，我们希望读者不仅“会跑模型”，更能理解“模型为何有效、何时失效”。

在方法论之外，本教程更关注生态解释的透明性与推断的边界。模型提供的是一种量化的视角，而不是对自然规律的替代。Hmsc 的真正价值，不在于生成一张更漂亮的图或更高的拟合度，而在于帮助研究者发现生态数据背后的层次结构——哪些变化来自环境驱动，哪些源于功能性状或系统发育信号，哪些可能反映空间过程或生物互作。正如生物群落的微观复杂性所展示的那样，生态格局从不止于显而易见的梯度，而往往隐藏在层层嵌套的相互作用中。希望本教程能成为探索这些结构的工具，也为今后的生态模型研究提供可复制、可扩展的分析思路。

零、HMSC 建模的前期准备与工具函数说明

在正式进入 HMSC 的系统发育与性状建模部分之前，需要先构建稳定的分析环境。本章主要完成三个目标：加载建模所需的依赖包、固定随机种子以确保结果可重复、并定义后续分析中将频繁使用的工具函数。这些准备工作虽基础，却是整个苔藓群落建模流程的技术支撑。通过本节，读者将理解每个模块的功能，并能搭建一个科学、可复现且整洁的 HMSC 工作环境，为后续的多层次建模与生态解释打下坚实基础。
同时，本章也为后续模型要回答的五个生态学核心问题奠定框架：
（FQ1）哪些环境过程驱动苔藓群落的空间变异？
（FQ2）苔藓的功能性状与系统发育关系如何塑造其生态位？
（FQ3）在控制环境与空间后，物种间是否存在残差共变格局？
（FQ4）群落相似性如何随环境与地理距离变化？
（FQ5）模型是否能够预测未观测区域或未来情景下的群落结构？
这些问题贯穿整个教程，而本章的技术准备正是后续回答它们的基础。

0.1 研究场景与脚本概述

本教程以苔藓群落为研究对象，演示如何使用 Hmsc 包构建层级多物种分布模型（Hierarchical Modelling of Species Communities）。在苔藓生态系统中，群落结构受到多种尺度过程的共同影响，包括环境过滤（如温度、湿度、pH 等）、基质条件、物种间相互作用以及系统发育亲缘约束。

在本案例中，我们的研究设定如下：

- 基质 (substrate)：划分为 4 种类型，如岩石、土壤、枯木、树皮等；
- 环境变量：包含 4 个连续变量，例如温度、湿度、光照强度与土壤 pH；
- 性状变量：包含 4 个物种性状，如叶片厚度、繁殖体大小、持水能力和生长速率。

整个 HMSC 建模过程将综合考虑这些因素，通过层级结构（固定效应 + 随机层）捕捉环境梯度、性状调节、系统发育约束以及空间依赖等关键生态机制。在这一框架下，我们可以系统回答 5 个科学问题（表 0.1）：

- 环境梯度是否主导了苔藓群落的分布差异（FQ1）；
- 性状和系统发育是否解释了物种间对环境响应的差异（FQ2）；
- 是否存在超出环境解释的物种共变格局（FQ3）；
- 群落的空间相似性是否随距离衰减（FQ4）；
- 以及该模型能否外推到新地点或环境条件（FQ5）。

表 0.1 HMSC 教程中五个核心科学问题与苔藓案例步骤的对应关系

科学问题	苔藓案例的对应内容	教程步骤
FQ1 环境 vs 随机过程	环境梯度建模、方差划分、遗漏变量实验	第 4–7、9、10 章
FQ2 性状与系统发育作用	Gamma 层、性状解释、去 whc 实验	第 3–7、11 章
FQ3 物种残差关联	残差网络、误设模型、先验收缩	第 8、10、12 章
FQ4 环境与空间	空间 GP 层、空间自相关控制、CV 验证	第 13 章
FQ5 预测与外推	梯度预测、群落功能曲线、交叉验证	第 9、13 章

因此，本节的目标是搭建模型运行所需的分析环境，为后续步骤（数据模拟、参数估计、空间结构建模等）提供一致且可复现的基础框架。

0.2 加载依赖包（功能与职责）

在脚本的开头，我们一次性加载所有分析所需的包，并使用 suppressPackageStartupMessages() 屏蔽启动时的提示信息（如包版本、附加组件等）。这样做可以让输出更加整洁。

```
suppressPackageStartupMessages({
 # 加载用到的 R 包，同时“静音”启动信息，避免一堆版本/附加提示刷屏。
 library(ape)      # 系统发育分析工具（生成随机树、计算协方差等）
 library(MASS)     # 统计与模拟（如多元正态 mvrnorm）
 library(fields)   # 可视化辅助（image.plot 用来画颜色条 legend）
 library(corrplot) # 相关矩阵的可视化（热图/网络风格）
 library(viridis)  # 颜色方案（感知均匀、色盲友好）
 library(Hmsc)     # 核心：层级多物种建模框架（含 MCMC 采样、方差划分等）
})
```

各包在苔藓建模中的角色如下：

- **ape**：用于系统发育分析，生成随机系统发育树或计算系统发育相关矩阵，是在 HMSC 中刻画苔藓物种亲缘关系的基础工具；
- **MASS**：提供多元统计函数，如 mvrnorm()，可在设定相关结构下模拟多元正态分布，用于生成模拟性状或协变量矩阵；
- **fields**：包含空间绘图与插值工具，其中 image.plot() 能独立绘制颜色条，便于展示空间梯度或环境分布；
- **corrplot**：用于可视化物种间的相关性矩阵，可展示苔藓群落内部的协同或竞争关系结构；
- **viridis**：提供感知均匀且色盲友好的渐变色板，适合展示环境梯度与概率分布图，确保可视化的科学与美观；
- **Hmsc**：本教程的核心包，实现层级多物种分布模型（HMSC），可在同一框架下联合建模环境、空间、性状与系统发育效应。

通过这一加载步骤，我们建立了完整的生态建模工具体系，能够支持从苔藓群落数据模拟、空间建模到系统发育分析的全流程操作。

0.3 固定随机种子（保证可重复性）

由于 HMSC 建模涉及大量随机过程（如生成系统发育树、模拟性状、划分样点或初始化 MCMC 链），若不固定随机种子，每次运行脚本可能得到不同的结果。为确保分析的可重复性（reproducibility），我们在脚本开头固定随机数生成器的状态：

```
set.seed(20250903)
```

此操作相当于为整个分析过程设定一个唯一的“随机起点”，确保无论研究者在何时、何地、使用何种设备运行代码，均可复现相同的结果。在苔藓生态学研究中，这一点尤为重要，因为模型输出往往用于比较不同空间结构或性状假设的科学有效性。固定随机种子确保这些比较结果具有统计一致性与可验证性，是生态建模中再现性科学（reproducible science）的基本规范。

0.4 工具函数定义与说明

为了让后续脚本结构更整洁、逻辑更清晰，我们在建模前定义了一系列通用的辅助函数。这些函数在数据标准化、配色控制、图形绘制及后验筛选中将被反复调用，构成整个苔藓群落 HMSC 分析的基础工具层。

0.4.1 标准化函数：zscale()

该函数的作用是对输入向量进行 Z-Score 标准化，使数据的均值约为 0，标准差为 1。

```
zscale <- function(x) as.numeric(scale(x))
```

在 HMSC 建模中，这一步至关重要。由于不同环境变量（如温度、pH、湿度、光照）及性状指标（如叶厚、繁殖体大小）的量纲差异较大，如果不做标准化，量纲较大的变量将对模型拟合产生不成比例的影响，导致生态解释偏差。标准化后，模型能在统一尺度上比较各变量的效应强度，确保每个环境梯度在估计中获得相等的权重。需要注意的是，如果输入向量所有值相同，标准差为 0，结果会产生 NA。这种变量在生态学意义上“无变异”，说明它不具备解释信息，应当在建模前剔除。

0.4.2 调色板函数：pal_div()

该函数用于生成一条蓝–白–红的发散型调色板，常用于展示既有正向又有负向的连续变量（如相关系数或回归系数）：

```
pal_div <- function(n=201)
  colorRampPalette(c("#2b8cbe","#f7f7f7","#d7301f"))(n)
```

在生态可视化中，**蓝色**代表负向效应（如环境变量升高时出现概率下降）、**白色**代表中性或无显著效应、**红色**代表正向效应（如温度升高促进出现）。这种发散配色可直观区分不同环境梯度对苔藓物种的响应方向与强度，比单色渐变更具信息表达力。特别是在绘制“物种–环境响应矩阵”或“相关性热图”时，它能一目了然地揭示不同苔藓物种对温度、pH 的生态位偏向。

0.4.3 美观刻度函数：pretty_breaks()

该函数用于根据输入数据的取值范围自动生成“人眼友好”的刻度分隔，适合用于直方图、颜色条或连续变量图例的绘制：

```
pretty_breaks <- function(x, n=12) pretty(range(x), n=n)
```

其中参数 n 控制刻度的数量。pretty() 会自动调整刻度间距，使其为整洁的数值（如 0、5、10、15），避免出现小数间隔（如 3.2、6.4、9.6）。该函数能让颜色条或环境梯度刻度更直观，使图形在科学展示与出版输出中更具可读性与美观性。

0.4.4 色标绘制函数：plot_colorbar()

在基础绘图中，我们常常需要在图的右侧绘制颜色条。fields 包中的 image.plot() 可以单独绘制色标（参数 legend.only=TRUE）。

```
plot_colorbar <- function(zlim, pal, left=0.90, right=0.945, bot=0.22, top=0.78){
  fields::image.plot(legend.only=TRUE, zlim=zlim, col=pal,
                     legend.shrink=0.9, legend.width=1.05,
                     smallplot=c(left,right,bot,top),
                     axis.args=list(las=1, cex.axis=.8))
}
```

此函数进一步封装了该操作，使得用户可以直接调用 plot_colorbar() 在图像右侧绘制出与主图一致的色标。

参数说明：

- zlim：数据取值范围（例如 range(Z)）；
- pal：颜色向量（由 pal_div() 或 viridis() 生成）；
- smallplot：通过 0–1 的相对比例控制色标在图中的位置与大小；
- axis.args：用于设置刻度标签的样式（横向显示、字体缩放等）。

0.4.5 后验筛选函数：sym_support_matrix()

该函数用于在贝叶斯模型输出中筛选具有显著方向支持的参数：

```
sym_support_matrix <- function(mean_mat, supp_mat, level=0.95){
```

```
  keep <- (supp_mat > level) | (supp_mat < (1-level))
  out <- matrix(0, nrow=nrow(mean_mat), ncol=ncol(mean_mat),
                dimnames=dimnames(mean_mat))
  out[keep] <- mean_mat[keep]
  out
}
```

在 HMSC 的后验分析中，我们常同时获得两类矩阵：

- mean_mat：参数的后验均值（如物种间协同作用、环境效应等）；
- supp_mat：支持度矩阵，即 P(β > 0)。

函数逻辑是：当支持度高于 0.95 或低于 0.05 时，认为该参数方向有足够证据，保留对应均值；否则置为 0（视为不确定）。这在苔藓群落的生态解释中极有价值——例如在物种间相关网络中，它能过滤掉噪声，仅保留方向确定的正、负关联，从而揭示具有生物学意义的共存或竞争关系。

0.5 与后续章节的衔接

虽然这些准备步骤看似独立，但它们贯穿整个建模过程。从系统发育建模到性状解释、从环境效应估计到空间依赖控制，本章定义的工具函数将被反复调用。它们不仅是代码层面的复用，更是生态问题解答的技术纽带：

- FQ1（环境驱动）将在第 4–7 步中通过方差划分与梯度分析体现；
- FQ2（性状与系统发育效应）在第 5–7 与第 11 步中验证；
- FQ3（残差关联）在第 8、10、12 步的网络与收缩实验中检验；
- FQ4（空间依赖）在第 13 步通过空间 GP 建模揭示；
- FQ5（预测与外推）在第 9 与 13 步的梯度预测与交叉验证中实现。

因此，本章的函数体系不仅是技术准备，更是连接五个生态学问题的基础工具层。

0.6 小结

通过本节，我们完成了 HMSC 建模环境的初始化与工具体系搭建：首先加载了核心依赖包，并明确各自功能；其次固定随机种子，确保分析的可重复性；最后定义了一组通用函数，用于数据标准化、配色生成、色标绘制、刻度优化与后验筛选。这些准备工作为后续章节的系统发育模拟、性状可视化与 HMSC 模型构建奠定了坚实基础。至此，我们已具备一个科学、可复现且生态意义清晰的分析框架，准备进入 HMSC 的核心部分——苔藓群落系统发育与性状结构的可视化与建模。

一、系统发育 × 四个性状 × 相邻热图：从系统发育到可视化的完整流程

在开始任何联合物种分布建模（JSDM/HMSC）之前，先把“系统发育—性状—可视化”的最小闭环打通，能帮助我们直观看到**系统发育约束如何在性状上留下烙印**。这一节围绕四件事展开：构造一棵包含 55 个苔藓物种的系统发育树；在布朗运动（Brownian motion）假设下把树映射到**物种间相关结构**；基于该相关结构模拟四个**生态含义明确**的性状；最后将性状以**与树相邻的热图**叠加展示。这样既能复核“近缘物种更相似”的直觉，也能在后续 HMSC 中自然地把这些信息纳入模型。

1.1 基础设置：物种数、物种名与随机系统发育树

为了让后续的矩阵与图形都有稳定的行列顺序，我们先规定物种数为 55，并用固定的标签命名叶节点（sp_001 到 sp_055）。在教学示例里，我们用 ape::rcoal() 随机生成一棵系统发育树。**rcoal 的思想**来自共同祖先（coalescent）理论：向过去回溯，系统发育以随机时间间隔两两并合，直到只剩一个共同祖先。这样得到的树既有拓扑，也有分支长度，可用作**性状演化模型**的时间基准。需要强调的是：真实研究应尽量使用**分子数据推断或权威数据库给出的物种树**，因为树形与分支长度的误差会直接传导到性状相关与后续回归系数的解释上。

在这个设置下，我们写下如下代码：在定义数量、标签后，调用 ape::rcoal(n = n_sp, tip.label = tip_ids) 生成树对象 phylo_tree。完整片段如下（便于复制运行）：

```
n_sp <- 55
tip_ids <- sprintf("sp_%03d", 1:n_sp)        # sp_001, sp_002, ... sp_055
phylo_tree <- ape::rcoal(n = n_sp, tip.label = tip_ids)
```

生态学上，这棵树表达的是**系统发育亲缘假说**：共享更多演化历史的物种，更可能共享生理、形态或生态策略上的相似性。它为接下来的“系统发育相关性状”提供了结构性先验。

1.2 从系统发育树得到物种相关矩阵（Brownian 模型）

有了树，我们需要将“分支长度上的亲疏关系”转译为统计上可操作的**相关结构**。布朗运动模型是最常用的基线假设：性状沿分支作随机游走，**共享祖先路径越长的两种物种，其性状协方差越大**。在 ape 里，vcv() 可以直接把树映射成协方差或相关矩阵。将 corr=TRUE 时返回相关系数矩阵，主对角线为 1，越接近 1 表示系统发育越相近（在 Brownian 假设下也意味着“预期性状越相似”）。我们顺手把列名记录为物种名，后面会作为数据框的行名以保持对齐：

```
C_phy <- vcv(phylo_tree, model = "Brownian", corr = TRUE)
sp <- colnames(C_phy)
```

从科学解释上看，**Brownian 是“中性演化”的零假设**：没有定向选择，只有随机漂变与时间积累。若真实世界中存在强烈的收敛或方向性选择，Brownian 可能低估或误判相关结构。此时可考虑

Ornstein–Uhlenbeck（OU）等更复杂的演化模型，但在教学起步阶段，Brownian 既直观又足够实用。

1.3 构造“四个与系统发育相关”的苔藓性状

接下来我们要在 C_phy 约束下模拟四个性状。做法是：先用 MASS::mvrnorm() 在给定协方差（这里用相关）结构下，抽取一个 **4 × n_sp** 的高斯矩阵 Z_traits，将每一行视为一个“潜在性状轴”；然后把这些潜在轴通过**生态上合理的变换**转成可解释的性状分布。为什么要先做潜在轴？因为这一步确保**跨物种的取值**遵从系统发育相关，而我们在每个轴上施加的非线性或标准化，能让不同性状呈现出更真实的边际分布（比如“右偏”的大小性状）。

先生成潜在轴：

```
Z_traits <- MASS::mvrnorm(4, mu = rep(0, n_sp), Sigma = C_phy)  # 4 x n_sp
```

随后把潜在轴转成具有生态含义的四个性状。这里我们示范四种常见的边际分布与变换逻辑：

1. **茎长 shoot_height**：个体大小/器官长度在植物群落中常呈**右偏**（多数小、少数大）。用 exp(0.35 * Z) 可以把对称高斯推成对数正态式右偏分布，系数 0.35 控制散度，避免过度极端化。
2. **孢子尺寸 spore_size**：也多为右偏，但自然界的变异幅度常小于个体高度，因此用稍弱的指数系数 0.25。
3. **叶厚 leaf_thickness**：作为组织性状，往往被当作**标准化后的连续指标**以便比较。对 Z 直接做 zscale()，让变量均值约 0、方差约 1，便于与其他性状共用色标或进入回归。
4. **持水能力 whc**：与水分胁迫调节、耐旱策略密切相关，既可能右偏也可能左偏。为了防止后续可视化被极端离群值主导，我们将其裁剪到 [−3,3][-3,3][−3,3] 的稳健范围，仍保留大部分变异而避免“色条被一两个点拉爆”。

对应代码如下：

```
# 1) shoot_height：茎长（右偏，常用指数变换模拟“正偏分布”的性状）
shoot_height  <- exp(0.35 * Z_traits[1,])
# 2) spore_size：孢子尺寸（也右偏，指数变换但效应稍弱）
spore_size    <- exp(0.25 * Z_traits[2,])
# 3) leaf_thickness：叶厚（标准化为均值 0、方差 1，便于比较）
leaf_thickness <- zscale(Z_traits[3,])
# 4) whc：持水能力（裁剪到 [-3, 3]，避免极端值影响后续建模与可视化）
whc           <- pmin(3, pmax(-3, Z_traits[4,]))
```

从生态学角度看，这四个性状背后分别映射了**资源获取与利用效率之间的权衡**的经典权衡：更高的个体/器官（高度）可能利于光竞争但增加水分亏缺风险；较大的繁殖体（孢子）或许有更高的存活/萌发概率但生产成本更高；叶厚与持水能力常与耐旱、抗蒸腾相关。把它们做成**系统**

发育相关，意味着我们承认“近缘物种**平均而言**更可能共享相似的策略”，这正是 HMSC 中将系统发育信息纳入层级结构的动机。

1.4 在系统发育树右侧叠加“相邻热图”

传统的系统发育树可视化只展示分支信息，而生态学家更关心**性状如何沿树分布**。我们采用“**树 + 相邻热图**”的叠加方式：左侧是无标签的系统发育树，右侧紧贴四列窄条，每列对应一个性状，每条窄条对应一个物种。要实现精确对齐，需要两步：先画树并读取 ape 存储的**设备坐标**（tip 的 y 位置、树的最右 x），再根据这些坐标画矩形条。图形参数里，我们把右边距拉宽，给热图和色标留出版面。

下面的代码先备份并调整参数，绘制树并提取坐标：

```
op <- par(no.readonly = TRUE)                    # 1) 备份当前图形参数
par(mar = c(2, 1.5, 2, 11), xpd = NA)            # 2) 调整边距，右侧留宽出图
H <- max(ape::node.depth.edgelength(phylo_tree))      # 3) 树的最大深度（横向尺度）
plot(phylo_tree, show.tip.label = FALSE, no.margin = TRUE,
     x.lim = c(0, H * 1.55))                     # 4) 画树，右侧多留 55% 空间

# 5) 读取刚画的树在 .PlotPhyloEnv 环境里的坐标（tip 的 y 值等）
pp <- get("last_plot.phylo", envir = .PlotPhyloEnv)
yy <- pp$yy[1:n_sp]              # 6) 每个末端（物种）的 y 位置
x_right <- max(pp$xx)            # 7) 树最右端的 x 坐标
```

然后准备颜色映射。为了让不同性状可以**共用同一色条**，我们对 traits_df 先按树的 tip 顺序重排，再逐列标准化（因为四个性状的原始量纲不同）。用我们在前置章节定义过的发散色板 pal_div(201)，并通过 findInterval 实现“数值 → 颜色”的稳定映射：

```
Z   <- scale(traits_df[phylo_tree$tip.label, ])  # 1) 按树的排序取性状，并逐列标准化
pal <- pal_div(201)                      # 2) 发散色板（蓝-白-红）
zlim <- range(Z, na.rm = TRUE)                # 3) 颜色映射的数值范围
bk   <- seq(zlim[1], zlim[2], length.out = length(pal) + 1)
# 4) 建立分箱边界：长度 = 颜色数 + 1
map_cols <- function(x) pal[findInterval(x, bk, all.inside = TRUE)]
# 5) 把数值向量映射为颜色向量（每个值落入哪个区间，就取对应颜色）
```

最后计算四列色条的横向位置，并逐列绘制。这里用当前设备的 x 轴范围 par("usr") 计算相对位移，避免不同画布尺寸下错位。每个物种是一条高为 1 的小矩形（与 ape 的行间距匹配），在每列上方写列名，以便快速对照：

```
ux <- par("usr")[1:2]; dx <- diff(ux)    # 1) 当前图的 x 轴范围与长度
gap <- 0.02 * dx                         # 2) 树与热图之间的水平间距
```

```
cw  <- 0.042 * dx                    # 3) 每个性状色条的宽度
xpos <- x_right + gap + cw * (0:3)       # 4) 4 个性状条的左边界 x 坐标

for (j in 1:4) {
  # 5) 为第 j 个性状绘制矩形条：每个物种一条小矩形
  rect(xpos[j], yy - 0.5, xpos[j] + cw, yy + 0.5,
       col = map_cols(Z[, j]), border = NA)
  # 6) 在该列上方写列名（性状名）
  text(xpos[j] + cw/2, max(yy) + 0.9, colnames(Z)[j], cex = .8)
}

# 7) 在右侧添加一条颜色条，标示数值到颜色的对应关系
plot_colorbar(zlim, pal)
par(op)  # 8) 恢复图形参数
```

这样的叠加图有两个直观好处：其一，**块状“同色团”往往沿近缘分支出现，提示“系统发育信号”；其二，四列性状并置，便于识别性状间的协变格局**（例如“高茎—薄叶—低 WHC”是否在某支系共同出现）。在论文插图中，这种紧凑布局能以有限的空间呈现多个层面的生态学信息。




图 1.1 系统发育树与四个性状的相邻热图可视化（Phylogenetic tree with adjacent trait heatmap）。图中左侧为随机生成的系统发育树，展示了 55 个苔藓物种之间的亲缘关系；右侧为对应的性状热图，包括四个标准化后的连续性状：shoot_height（茎长）、spore_size（孢子尺寸）、leaf_thickness（叶厚）和 whc（持水能力）。颜色代表性状取值的相对大小——红色表示高于平均水平，蓝色表示低于平均水平，白色为接近平均值的中间状态。色标右侧显示了标准化后的数值范围（约为 -2 至 +2）。

从图中可以看到，同一分支上的物种（即系统发育上较为近缘的类群）在性状色条上往往呈现相似的颜色格局，形成了明显的“系统发育块状结构”。这意味着这些性状在布朗运动模型假设

下表现出明显的系统发育信号（phylogenetic signal）：性状随系统发育的演化而非独立变化，近缘物种在形态与功能策略上更趋相似。

例如，部分分支上的物种同时在 shoot_height 和 spore_size 上显示出高值（深红色），这反映出某些系统发育可能演化出“高个体 + 大孢子”的资源投资策略，这种组合有助于在开放或光照充足的生境中获得竞争优势。而另一些分支则表现为较厚的叶片（leaf_thickness）与较高的持水能力（whc），代表典型的“保守型（conservative）生态策略”，适应干旱、贫养或遮阴环境。

总体来看，该图直观地揭示了苔藓性状沿系统发育树的分布格局：性状并非随机散布于各系统发育，而是受进化历史约束，呈现出系统发育守恒性（phylogenetic conservatism）。这种守恒性意味着物种在生态位和功能性状上的相似性部分可以由其系统发育关系解释。

1.5 展示系统发育相关矩阵

作为对“系统发育相关性”的独立校验，我们可以把 C_phy 的前 25×25 子矩阵用相关图画出来：颜色表达方向与强度，点径反映绝对值大小。之所以画子集，是因为 55×55 全图在版面上较拥挤；当然，你也可以把 idx <- 1:25 改成 1:55 生成完整矩阵。使用 corrplot 时指定 is.corr = TRUE 可以启用其为相关矩阵量身定制的配色与布局；本例用 viridis(200) 提供感知均匀的颜色渐变，阅读体验更佳：

```
idx <- 1:25
corrplot::corrplot(C_phy[idx, idx],
                   is.corr = TRUE,      # 1) 告诉 corrplot：输入是相关矩阵
                   tl.cex  = .55,       # 2) 物种标签字体大小
                   col     = viridis(200),  # 3) 使用感知均匀的配色
                   title   = "Phylogenetic corr (subset)",
                   mar     = c(0, 0, 1, 0))
```

从科学解读上，若你看到明显的**深色块**（高相关）沿对角近邻聚集，那正是“近缘物种共享更多演化路径”在相关矩阵上的投影；如果整个矩阵近似均匀且偏淡，可能意味着（在 Brownian 假设与这棵树的尺度上）系统发育信号较弱，或树本身信息不足。这样的可视化能在建模前帮助我们**对系统发育信号形成定性预期**——在 HMSC 的层级结构里，它会影响到物种效应的“部分池化（partial pooling）”程度与不确定度分配。




图 1.2 系统发育相关矩阵的子集可视化（Phylogenetic correlation matrix, subset of 25 species）。图中展示了基于布朗运动模型（Brownian motion model）计算得到的 25 个苔藓物种的系统发育相关矩阵（C_phy）子集。每个圆圈代表一对物种之间的相关性，圆圈的颜色表示相关方向，黄色接近 +1 代表强正相关，蓝紫色接近 –1 代表负相关，绿色至浅色区间表示中等相关或接近零的情况。圆圈的大小与相关系数的绝对值成比例，圆圈越大，相关越强。

图中可以明显看到矩阵中存在几个**颜色与形态高度一致的方块状结构**，这些区域代表一组在系统发育上关系紧密的物种簇（phylogenetic clades）。在这些簇内，相关系数普遍接近 1（黄色），说明它们在进化历史上共享了较长的共同祖先路径，因此其性状、功能和生态策略预期上也更为相似。这种块状分布正是系统发育信号（phylogenetic signal）在矩阵上的直接体现：近缘物种之间的协方差远高于远缘物种。

从生态学角度解读，这种格局说明物种的性状或生态位并非独立进化，而是受到系统发育约束（phylogenetic constraint）的影响。例如，在这些高相关的系统发育块中，可能聚集着一类适应相似环境条件的苔藓种群——它们共享相似的繁殖方式、组织结构或资源利用策略，从而在生

态空间中表现出相似的分布特征。而矩阵中颜色淡、点径小的区域表示那些系统发育距离较远的物种之间，进化独立时间更长，相关性减弱，这类物种更可能展现出多样化的性状组合与生态适应。

小结：把系统发育搬到图上，把性状贴到树上

这一节完成了从“树”到“相关”再到“性状与图”的闭环：我们用 coalescent 思路生成了一棵教学用系统发育树；在 Brownian 模型下把树转换为物种间相关结构；再在该结构下模拟四个具有生态含义的性状，通过合理的分布变换与标准化让它们既**可解释**又**可比较**；最后在树右侧贴上相邻热图，并用颜色条对齐数值尺度。这张图的价值在于：它让我们在建模前就能“**看见**”系统发育信号与性状格局，帮助形成对数据结构的直觉判断。进入 HMSC 后，我们会把这里的 phylo_tree 与 traits_df 作为关键输入，让模型在**环境梯度** × **系统发育** × **性状**的三重结构中提炼出更稳健的生态学结论。

二、环境因子、设计矩阵与线性预测：把生态机制写进数据里

上一章我们通过系统发育与性状层建立了“物种为何相似”的基础框架。本章的重点转向环境：在模拟的 240 个样点上，构建兼具离散（基质类型）与连续（环境梯度）的生态背景，并以公式语言生成可直接输入 HMSC 的设计矩阵。随后，我们将“性状—环境匹配”的生态假设转化为真值系数矩阵，用以计算线性预测值 L 与含噪声的观测 Y。最后，通过三类快速可视化和一个单物种诊断，我们可以在模型拟合前判断数据设定是否合理、是否符合生态直觉。

2.1 站点数量：给生态过程一个空间舞台

模拟从样点数量的设定开始。我们设定样点数为 240：

```
n_site <- 240
```

这一数量既足以覆盖主要的环境变异范围，又能保证后续回归估计与图形展示的稳定性。样点数量在生态建模中至关重要——过少的样点会导致环境响应曲线被“截断”，无法捕捉完整梯度；过多则会增加计算负担，而信息增益有限。对于苔藓群落这种空间异质性显著、但研究区尺度中等的系统而言，240 个样点能有效平衡“生态信号的捕捉能力”与“模型计算的可行性”，是一个稳健且具代表性的设定。

2.2 基质类型：离散生境的“背景分层”

在自然系统中，苔藓的附着基质往往决定了其所处的微气候、化学环境与持水特征。为了体现这一“背景层级”，我们定义一个四水平因子变量——岩石（rock）、土壤（soil）、树皮（bark）与泥炭（peat）：

```
substrate <- factor(
  sample(c("rock","soil","bark","peat"), n_site, TRUE),
  levels = c("rock","soil","bark","peat")
)
```

这里将 "rock" 放在第一个水平意味着它是模型中的**参照水平**。在回归中，其他基质的系数将表示**相对于岩石生境的增减效应**。这种设定在生态学上极具解释意义：岩石通常代表条件最严苛、资源最有限的环境（干燥、贫养、碱性高），因此以其为基线，可以清晰解读其他基质（如土壤、树皮、泥炭）在持水性、营养供给或酸碱环境方面对苔藓出现概率的相对增益。

2.3 四个连续环境：有轻微“与基质相关”的现实感

自然环境往往不是相互独立的，连续变量之间通常与生境类型存在隐含相关。例如树皮上光照强、温度高，而泥炭地则湿度大、pH 低。为了让模拟数据更贴近真实的苔藓分布情境，我们让四个连续变量在不同基质上呈现小幅偏移：

```
temp_z    <- zscale(rnorm(n_site) + 0.2*(substrate=="bark") - 0.1*(substrate=="rock"))
precip_z  <- zscale(rnorm(n_site) + 0.5*(substrate=="peat") + 0.2*(substrate=="bark"))
soil_pH_z <- zscale(rnorm(n_site) + 0.6*(substrate=="soil") - 0.5*(substrate=="peat"))
soil_Ca_z <- zscale(rnorm(n_site) + 0.7*(substrate=="soil") + 0.4*(substrate=="rock"))
```

生态学解释如下：

- **树皮（bark）**：通常位于光照强、通风干的微环境，因此温度（temp_z）略高；
- **泥炭地（peat）**：以降水和饱水著称，因此降水量（precip_z）偏高；
- **土壤（soil）**：pH 较中性或偏碱，故 soil_pH_z 偏高；
- **岩石与土壤**：钙含量 soil_Ca_z 较高，对应碳酸盐或矿物基质的环境特征。

这类“轻度基质相关”的设定让环境梯度具备现实中的结构性差异，模拟出苔藓生态系统中常见的“生境群内相似、群落间差异显著”的格局。

2.4 模型派生项：允许非线性与交互，但不增加“生态维度”

苔藓对环境变量的响应往往呈非线性，例如温度或 pH 过高或过低都不利生长。为了表达这种“中庸最优”或“协同调节”的生态格局，我们在模型中加入二次项与交互项：

```
temp2   <- temp_z^2        # 1) 温度的二次项，捕捉拱形效应
pH2     <- soil_pH_z^2     # 2) pH 的二次项
temp_pH <- temp_z * soil_pH_z# 3) 温度 × pH 的交互项
```

其中，二次项捕捉“拱形”响应——反映苔藓对温度和 pH 的适宜区间；交互项 temp_z * soil_pH_z 则表达温度与酸碱度之间的协同或拮抗效应，例如温度高时酸性土壤对某些苔藓更加不利。这种设定让模拟数据具有生态机制的可解释性，而不会人为增加无意义的维度。

2.5 设计矩阵：把生态世界翻译成线性代数

与一般回归模型一样，HMSC 的核心输入是设计矩阵 X。我们使用 model.matrix() 函数一次性生成主效应、虚拟变量、二次项与交互项：

```
X <- model.matrix(
  ~ substrate + temp_z + precip_z + soil_pH_z + soil_Ca_z +
    I(temp_z^2) + I(soil_pH_z^2) + temp_z:soil_pH_z
)
coef_names <- colnames(X)
p <- ncol(X)
```

```
> colnames(X)
 [1] "(Intercept)"      "substratesoil"    "substratebark"    "substratepeat"    "t
emp_z"           "precip_z"
```

```
 [7] "soil_pH_z"        "soil_Ca_z"        "I(temp_z^2)"      "I(soil_pH_z^2)"   "t
emp_z:soil_pH_z"
```

此处，substrate 自动被编码为三个虚拟变量（以 rock 为参照），I() 函数确保平方项以字面形式进入模型，而 temp_z:soil_pH_z 则表示交互项。

这一步实现了“生态机制的数值化”：基质类型、环境梯度及其非线性与协同关系，被系统地转化为数学表达形式。通过 coef_names 记录列名，我们可在后续步骤为每个物种分配对应的系数，实现“物种–环境”关系的精确映射。

2.6 “真值”系数矩阵：让性状驱动环境响应

在获得设计矩阵 X 之后，我们还需要定义“每个物种如何响应环境”。这一步是本章的核心——它把上章的性状机制显式写入到系数矩阵中，使模型具有生态可解释的“真相结构”。首先，我们创建一个全零矩阵 Bbar（维度为 p × n_sp），即每个环境预测子对应每个物种的一个系数位置：

```
Bbar <- matrix(0, nrow = p, ncol = n_sp, dimnames = list(coef_names, sp))
TH <- traits_df$shoot_height
SS <- traits_df$spore_size
LT <- traits_df$leaf_thickness
WH <- traits_df$whc
logSS <- log1p(SS)
```

这里提取了四个关键性状向量，并对右偏分布的孢子尺寸（spore_size）进行 log1p() 转换，以降低极端值的影响，使性状–效应关系更加平滑稳定，避免少数极端物种对整体格局产生过强的权重。

随后，我们依据生态学规律逐行设定系数值。截距项随个体高度（TH）略有上升，而叶厚（LT）过大时略微下降，这反映出在平均环境条件下，高个体苔藓往往拥有更高的基线丰度，因为其光照竞争能力更强；相反，厚叶物种通常采取保守的资源策略，生长速率较慢，因此基线值偏低。

基质效应体现了性状与生境间的生态适配关系。相对岩石（rock）这一基准生境，土壤（soil）对孢子较大（logSS）与叶片较厚（LT）的物种更有利，因为这样的形态特征有助于在较稳定且营养丰富的土壤环境中定殖与保持水分。树皮（bark）环境通常光照强、干扰频繁，因此更适合高个体（TH）的苔藓，但对孢子过大的物种不利；泥炭（peat）生境则水分充足、基质柔软，对高持水能力（WH）且叶片不过厚的物种最为友好。

温度主效应（temp_z）正向依赖个体高度、负向依赖叶厚，说明高个体物种在温度升高时能够更好地利用光照与空气湿度，而叶厚的保守型物种在高温下反而增益有限。降水主效应（precip_z）对高持水能力（WH）物种最有利，但对高个体（TH）略有抑制，反映出在过湿环境中高个体的结构成本可能成为负担。pH 与钙含量（soil_pH_z 与 soil_Ca_z）均与孢子大小

（logSS）呈正相关，表明碱性和富钙基底有助于大孢子策略物种的繁殖与孢子萌发，这与许多石灰质或矿物基质苔藓的生态分布规律一致。

二次项（温度与 pH 的平方项）多为负值，用于模拟“中间最优”的生态响应曲线，即苔藓在过冷或过热、过酸或过碱的极端条件下均表现不佳，而在适度条件下最为丰富。交互项（温度×pH）整体为负，表示在极端酸碱条件下，温度升高带来的潜在促进作用被部分抵消，这反映出真实生态中温度和化学环境之间的复合限制效应。通过这样的设定，模型能够以科学且机制化的方式，将性状驱动的生态响应规律直接嵌入系数矩阵中。

对应代码如下：

```
Bbar["(Intercept)",]      <- -0.3 + 0.08*TH - 0.05*LT^2
Bbar["substratesoil",]    <-  0.25 + 0.30*logSS + 0.15*LT
Bbar["substratebark",]    <-  0.20 + 0.25*TH - 0.10*logSS + 0.10*LT
Bbar["substratepeat",]    <-  0.45 + 0.35*WH - 0.10*LT
Bbar["temp_z",]           <-  0.12*TH - 0.10*LT
Bbar["precip_z",]         <-  0.30*WH - 0.05*TH
Bbar["soil_pH_z",]        <-  0.35*logSS - 0.12*WH
Bbar["soil_Ca_z",]        <-  0.28*logSS + 0.06*TH - 0.08*LT
Bbar["I(temp_z^2)",]      <- -0.15 - 0.06*TH
Bbar["I(soil_pH_z^2)",]   <- -0.12 + 0.05*LT - 0.05*logSS
Bbar["temp_z:soil_pH_z",] <- -0.10 - 0.08*logSS - 0.05*LT
```

这些数值并非实测估计，而是“机制化设定”：它们给予模型一个符合生态逻辑的真相，使后续拟合既具有挑战性（存在噪声与复杂性），又保持生物学合理性。这种做法保证模型评估能在“生态机制与统计精度”之间取得平衡。

2.7 给真相加一点“现实的粗糙感”

真实生态系统中不存在完美规律，即使性状–环境关系明确，不同物种之间仍会因微环境差异或随机漂变而偏离一般趋势。为了模拟这种“生态现实的粗糙感”，我们为每个系数加入高斯噪声（均值 0，标准差 0.18）：

```
Beta_true <- Bbar + 0.18 * matrix(rnorm(n_sp * p), nrow = p)
```

这样得到的 Beta_true 就是“真值”系数矩阵。它在总体上遵循性状驱动的规律，但每个物种仍保留独立特征差异。对于苔藓群落来说，这反映了真实世界中物种间的生态策略多样性：即使在相似性状下，不同物种仍可能因微尺度环境或历史偶然性而表现不同。这种“有噪声的真相”让模型估计更具现实意义，也更能考验 HMSC 对生态信号的恢复能力。

2.8 线性预测与观测：从机制到数据

拥有设计矩阵 X 与“真值”系数 Beta_true 后，线性预测 L 就是简单的矩阵乘法：L <– X %*% Beta_true。这给出了每个站点 × 物种的**期望响应**。我们随后加上独立同方差的观测误差，得到观测矩阵 Y 并把列名对齐到物种：

有了设计矩阵 X 与“真值”系数矩阵 Beta_true，线性预测 L 的计算就是矩阵乘法：

```
L <- X %*% Beta_true
Y <- L + MASS::mvrnorm(n_site, mu = rep(0, n_sp), Sigma = diag(n_sp))
colnames(Y) <- sp
```

其中，L 表示在每个站点上、各物种对环境的期望响应；随后添加的高斯噪声代表未建模因素（测量误差、微环境变化等），从而生成观测矩阵 Y。

本例采用 **Gaussian 分布**，模拟苔藓生物量或覆盖度等连续响应情形。如果研究目标是出现–缺失或计数数据，应改用 **Probit** 或 **Poisson** 分布，并相应调整 HMSC 模型中的分布参数。此处的独立同方差噪声是简化设定，现实中误差可能呈空间自相关或系统发育依赖；这些结构可在 HMSC 的随机层（spatial 或 phylogenetic random effect）中进一步建模。

2.9 快速可视（1）：性状边际分布的体检

在正式拟合模型之前，先检查性状分布的合理性是良好的实践。我们将四个性状标准化后绘制直方图，利用“美观刻度”函数自动生成断点：

```
layout(matrix(1:4, 1)); op <- par(mar = c(4,4,2,1))
trait_list <- list(
  shoot_height   = TH,
  spore_size     = SS,
  leaf_thickness = LT,
  whc            = WH
)
for (nm in names(trait_list)) {
  vv <- zscale(trait_list[[nm]])        # 1) 标准化后更可比
  br <- pretty(range(vv), 10)           # 2) “好看”的分箱边界
  hist(vv,
       breaks = br, xlim = range(br),
       col = "grey88", border = "white",
       main = nm, xlab = "z")
}
par(op); layout(1)
```

一般来说 shoot_height 与 spore_size 在对数尺度（经 exp 生成而后标准化）后基本对称；leaf_thickness 天然对称；whc 在裁剪后不会有“拖长的尾”。若某一性状仍呈现异常偏斜或多峰，要么说明生态设定需要重想，要么意味着该性状可能在真实世界中更复杂（例如存在策略混合体或离散型分组）。




图 2.1 苔藓四个功能性状的标准化分布（Distribution of four standardized bryophyte traits）。图中展示了模拟生成的四个苔藓功能性状的标准化直方图，分别为 shoot_height（茎长）、spore_size（孢子尺寸）、leaf_thickness（叶厚）和 whc（持水能力）。所有性状在进入模型前均经过标准化（z-score），使其均值约为 0、方差约为 1，以保证在后续的回归和多物种模型中可直接比较。横轴表示标准化后的取值，纵轴为出现频率。

从分布形态可以看到，这四个性状反映了苔藓在不同生态策略上的多样性：

- shoot_height（茎长）与 spore_size（孢子尺寸）的分布略向右偏，这是因为在模拟中采用了指数变换（exp），以再现自然群落中“多数物种个体较矮或孢子较小，少数种类达到极端高值”的典型偏态格局。这种正偏反映了资源投资的不均衡——在植物界中，高个体或大孢子往往意味着更高的能量成本，因而属于少数策略型物种。
- leaf_thickness（叶厚）呈现近似双峰分布，说明群落中存在两类主要的叶片结构策略：一类为叶薄、光合高效但易失水的“快速型”；另一类为叶厚、保水但生长慢的“保守型”。这种双峰结构体现了苔藓群落内常见的“功能性状分化（trait divergence）”现象，即物种通过不同的资源利用策略实现生态位共存。
- whc（持水能力）的分布明显右偏，大多数物种的取值集中在中低范围，少数物种表现出极高的持水能力。这一格局与苔藓的形态学特征密切相关：只有具备特殊结构（如密集的假根丛或吸水细胞壁）的种类才能在干旱环境中保持高水分储量。右偏的长尾表明，高持水能力是一种稀有但关键的生态适应性，它在特定环境（如泥炭地或常湿林下）中提供竞争优势。

从生态学角度看，这四个性状的组合勾勒出一个典型的“生态策略空间（ecological strategy space）”：个体高度与孢子尺寸决定了物种在繁殖和扩散维度上的投入，而叶厚与持水能力反

映了资源利用和胁迫耐受的维度。性状的变异与偏态分布说明，不同苔藓系统发育在演化过程中形成了多样化的生理与结构策略，用以应对温度、水分与基质条件的复杂变化。

因此，本图不仅是模型输入数据的“形态检查（sanity check）”，更揭示了苔藓群落功能多样性的本质：性状分布的形状即是生态过程的回声——偏态与分化反映了能量分配约束与进化策略分化，为后续基于 HMSC 的“性状—环境—系统发育”分析提供了生态学的解释基础。

2.10 快速可视（2）：环境分布与基质样本量

同样的体检也适用于环境变量和基质计数。我们先画一个基质的柱状图，确认四类生境的样本量是否均衡；再画四个连续环境的直方图，检查标准化结果与分布形态：

```
layout(matrix(1:5,1), widths = c(1,1,1,1,1.2)); op <- par(mar = c(4,4,2,1))
barplot(table(substrate), col = "grey88", border = "white",
        main = "Substrate", ylab = "Count")
for (nm in c("temp_z","precip_z","soil_pH_z","soil_Ca_z")){
  vv <- get(nm)
  br <- pretty(range(vv), 12)
  hist(vv, breaks = br, xlim = range(br),
       col = "grey88", border = "white",
       main = nm, xlab = nm)
}
par(op); layout(1)
```

如果基质严重不均衡，回归中某些对比将不稳定；若环境分布过窄或呈极端双峰，模型的可辨识度会下降。这一步在真实数据分析里尤为关键。




图 2.2 环境变量与基质类型的分布（Distribution of environmental variables and substrate types）。图中展示了模拟研究中 240 个采样点的环境条件分布情况，包括离散变量 substrate（基质类型）与四个连续环境变量：temp_z（温度梯度）、precip_z（降水梯度）、soil_pH_z

（土壤酸碱度）与 soil_Ca_z（钙含量）。所有连续变量均经过标准化处理（z-score），以保证其均值为 0、方差为 1，使不同环境因子在模型中具有可比性。

从左至右的图像依次反映了环境层面的不同生态维度：左侧的柱状图显示，四类基质（rock、soil、bark、peat）在样点中分布相对均衡，说明采样设计覆盖了主要的生境类型。这样的多基质设置模拟了现实中的微生境异质性（microhabitat heterogeneity），为群落提供了多样化的生态位空间，也为后续模型识别“基质效应”奠定基础。

四个直方图显示，温度、降水、pH 与钙含量都大体呈正态分布，符合标准化后的期望值。其中：

- temp_z（温度）的分布中心略偏向 0，表明大多数样点处于中等温度条件，少数偏高或偏低的点代表了环境极端样地。这样的分布模拟了典型的温度梯度生态情境，如海拔或纬度变化带来的温度差异。
- precip_z（降水）呈轻微右偏，说明在模拟中湿润样地（如泥炭地或树皮附生环境）略多于干燥样地，这种偏态与苔藓偏好湿润环境的生态现实相符。
- soil_pH_z（土壤酸碱度）分布较宽，部分样点显著偏酸（负值区间），反映了酸性泥炭地或针叶林下土壤的特征；而偏正值的样点则代表碱性或富钙基质。这种广泛的 pH 范围在生态学上极具意义，因为土壤酸碱度是决定苔藓群落组成的关键环境梯度之一。
- soil_Ca_z（钙含量）的分布与 pH 相关，整体集中于中等到略高范围（0 附近至正值区间），说明模拟中钙质环境（如石灰岩基质）占有一定比例。这一变量代表了矿质营养供给与化学胁迫耐受之间的权衡，是苔藓生态策略的重要控制因子。

总体来看，本图反映了一个合理且生态学上可解释的环境空间：样点分布均匀但不完全随机，既有温度与湿度梯度，也包含化学与生境类型差异，形成了一个具有现实生态意义的多维环境格局。在这种格局下，不同物种的性状与系统发育特征将共同决定它们的分布概率。换言之，这些环境变量为后续的 HMSC 模型提供了“生态舞台”——在这个多维空间中，物种将依据其性状适应（trait–environment matching）与系统发育约束（phylogenetic constraint）展现出差异化的响应。通过这样的环境–性状–系统发育耦合结构，模型得以探索群落构建的生态机制：哪些物种偏向富钙基质？哪些物种耐受低温？哪些系统发育倾向湿生？图 2.2 因而不仅是数据检查的结果，更是模拟生态系统复杂性的定量基础。

2.11 L 与 Y 的对照：噪声如何改变数据形状

为了直观看到观测误差对数据分布的影响，我们将 L 与 Y 展平为向量，用**同一组断点**画直方图对照。理论上，Y 的分布应比 L 更“胖”，因为叠加了噪声：

```
L_vec <- as.numeric(L); Y_vec <- as.numeric(Y)
brLY  <- pretty(range(c(L_vec, Y_vec)), 40); xLY <- range(brLY)
layout(matrix(1:2,1)); op <- par(mar = c(4,4,2,1))
hist(L_vec, breaks = brLY, xlim = xLY,
     main = "Linear predictor L", xlab = "value",
     col = "grey88", border = "white")
```

```
hist(Y_vec, breaks = brLY, xlim = xLY,
     main = "Observed Y", xlab = "value",
     col = "grey88", border = "white")
par(op); layout(1)
```

如果两者几乎重合，说明噪声设得太小；若差异过大，可能掩盖了可学的生态信号。可以回到第 2.7 步调整噪声幅度，找到既能体现不确定性、又不至于“吞没机制”的平衡点。




图 2.3 线性预测值与观测值的分布比较（Distribution of linear predictor *L* and observed response *Y*）。图中展示了模拟数据中 线性预测值（L）与 观测值（Y）的频率分布直方图。左图为基于环境变量与物种性状确定的理论期望值 $L = X \times \beta$；右图为在此基础上加入高斯随机噪声后的模拟观测值 Y。两者使用相同的分箱与数值范围，以便直观比较噪声的影响。

从分布形态上看，线性预测值 L 呈典型的正态分布，中心在 0 附近，说明模型在模拟过程中保持了标准化后的尺度均衡，没有出现系统性偏移。观测值 Y 的分布依然近似对称，但较 L 更“宽”且“矮”，即方差更大、峰值更低。这种形态差异正是由于在模拟过程中引入了观测误差或生物学噪声（例如测量误差、环境微变异、未观测因素等）。

从生态学角度看，这种“$L \rightarrow Y$ 扩散”的变化反映了自然群落中生态信号与随机性之间的平衡。线性预测 L 代表了物种分布受环境梯度与功能性状控制的确定性部分，是生态“机制信号”的载体；而观测值 Y 则综合了环境的细微扰动、未测变量的干扰、种间互作的随机性、甚至观测误差等——这些都构成了生态系统中无法完全解释的“生态噪声（ecological stochasticity）”。

这两幅图的对比提醒我们：在真实生态数据中，物种对环境的响应往往并非完全可预测，即使性状和系统发育提供了强约束，仍存在大量未解释方差（unexplained variance）。正因为如此，像 HMSC 这样的分层多物种模型才需要在结构上显式区分确定性（固定效应）与随机性（随机效应），并利用贝叶斯框架量化各层面的不确定度。因此，本图既是模拟结果的质量检验，也

是一种生态学隐喻：L 是生态规律的“理想信号”，而 Y 是自然世界的“真实回声”。二者之间的差距，正是我们建模与解释生物多样性时必须面对的复杂性。

2.12 单物种体检：连续环境散点 + 基质箱线，共享 y 轴直观比

建模前建议随机挑一个物种做“眼见为实”的核对：**左图**看它对一个连续环境轴（这里示范 pH）的预测响应 L，并按基质着色以观察“同一环境下不同生境的层级差”；**右图**看观测 Y 在不同基质下的分布。两图共享 y 轴，便于把“预测 vs 观测”对齐。我们先选择物种与变量，并计算统一的 y 轴范围与图形布局：

```
sp1     <- sp[1]          # 1) 默认选择第一个物种；可改成 "sp_013" 等
clim_x  <- soil_pH_z      # 2) 连续环境轴：此处用 soil_pH_z；也可改为 temp_z/precip_z/soil_Ca_z
hab_x   <- substrate      # 3) 分类变量（生境/基质）：4 水平 factor
```

```
ylim1 <- range(c(L[, sp1], Y[, sp1]), na.rm = TRUE)   # 1) 共享 y 轴范围
layout(matrix(1:2, nrow = 1), widths = c(1.4, 1))    # 2) 左宽右窄：散点图更宽
op <- par(mar = c(4,4,2,1))
```

为不同基质指定半透明颜色，减少重叠遮挡并保留密度感：

```
levs <- levels(hab_x)
cols <- setNames(
  c(rgb(31,119,180,140,maxColorValue=255),   # rock   -> 蓝
    rgb(44,160,44,140,maxColorValue=255),    # soil   -> 绿
    rgb(214,39,40,140,maxColorValue=255),    # bark   -> 红
    rgb(148,103,189,140,maxColorValue=255)), # peat   -> 紫
  levs
)
pt_col <- cols[as.character(hab_x)]
```

接着画出两幅图：左侧为 L 对 clim_x 的散点，右侧为 Y 按基质的箱线：

```
plot(clim_x, L[, sp1], pch=16, cex=0.7,
     xlab="environment (z)", ylab=paste("response for", sp1),
     main=paste("L vs environment -", sp1),
     col=pt_col, ylim=ylim1)
legend("topleft", inset=0.01, bty="n", cex=0.9,
       legend=levs, pch=16, col=cols[levs])
```

```
boxplot(Y[, sp1] ~ hab_x,
        main=paste("Y by substrate -", sp1),
        xlab="substrate", ylab=paste("Y for", sp1),
        col=c("grey90","grey80","grey70","grey60"),
        ylim=ylim1)
```

```
par(op); layout(1)
```

一般来说这种图如何解读？如果左图呈明显的拱形或倾斜，通常与我们在 2.6 步写入的线性/二次系数方向一致；不同颜色在同一 clim_x 下的垂直分离，提示**基质主效应**的层级差；右图若显示某个基质整体更高/更低，则印证了相应的基质系数设定。若 Y 的箱线与 L 的趋势大体一致，说明噪声设定不过分；若违背明显，则要回看 2.6 的机制或 2.7 的噪声强度。




图 2.4 单物种环境响应与基质效应的可视化（Single-species response to environment and substrate）。图中展示了物种 **sp_013** 的线性预测值 (*L*) 与观测值 (*Y*) 随环境和基质变化的模拟结果。左图为 *L* 随连续环境变量（此处为标准化 pH，*soil_pH_z*）的变化散点图，不同颜色代表不同的基质类型（rock、soil、bark、peat）；右图为同一物种在不同基质下的观测响应箱线图。两图的纵轴范围一致，以便直接比较预测值与观测值的尺度和趋势。

从左图可以看出，*sp_013* 的响应值随着 pH 升高总体呈**正向趋势**，说明该物种倾向于在相对碱性的环境中表现更好（即对 pH 的线性系数为正）。不同颜色的散点分层表明基质类型对响应的基线水平有明显影响：泥炭（peat，紫色）与树皮（bark，红色）样点整体较高，而岩石（rock，蓝色）样点较低。这与右图的箱线结果一致——泥炭与树皮基质的中位响应高于岩石与土壤，说明该物种在**富含有机质、湿润或保水性强的基质上更具适应性**。这种格局反映出典型的**性状—环境匹配机制（trait–environment matching）**：如果 sp_013 拥有较高的持水能力（WH）或孢子尺寸（SS），它更可能在潮湿、酸性缓冲强的基质上优势生长。同时，轻微的散点离散表明个体或采样点之间仍存在一定的生态变异或测量噪声，符合自然群落中“确定性 + 随机性并存”的特征。

本图验证了模拟系统的生态合理性：连续环境（pH）产生可解释的方向性响应；离散生境（基质）带来分层差异；模拟结果在定量上连贯，在生态学意义上具备生理与环境对应的逻辑。这类可视化在 HMSC 建模前后都非常重要，它能帮助研究者直观判断模型是否捕捉到了物种生态位的主要结构，而不是单纯的统计噪声。

小结：把生态学假设落实到矩阵与数字

本章的核心任务，是把生态学思想落地为“可计算的模型结构”。我们用 240 个采样点构建了一个具备真实感的环境框架：离散的四类基质代表不同的微生境层次，四个连续环境变量勾勒出生态梯度。通过轻度的基质—环境耦合，我们模拟了自然系统中常见的协变关系。在模型层面，我们用设计矩阵 X 把环境因子、二次项与交互项组合成可建模的数学结构；再用苔藓的四个性状（茎高、孢子大小、叶厚、持水性）映射到环境系数矩阵 Bbar，把“物种如何因性状而异”编码进模型。添加适度噪声后，系统既保留了生态规律，又体现了自然的随机性。线性预测 L 代表生态机制的确定部分，而观测值 Y 则加入了环境变异与观测误差的“生态噪声”。通过对比两者分布与单物种可视化，我们验证了模拟数据的生态合理性——近似线性、但非完美，符合自然系统的复杂性。简言之，本章完成了从**生态假设 → 数学公式 → 模拟数据 → 可视验证**的闭环。我们现在拥有了 HMSC 所需的四个核心输入：环境（X）、性状（traits_df）、系统发育（phylo_tree）与响应（Y），为下一章的模型拟合与生态推断奠定了基础。

三、Hmsc 模型构建：把“环境 × 性状 × 系统发育 × 随机性”装进同一台引擎

到目前为止，我们已经拥有四个核心组成部分：响应矩阵 Y、环境与生境信息、物种性状矩阵，以及系统发育树。Hmsc 的独特价值在于能够将这些信息整合进一个分层的多物种模型中：环境变量解释物种分布，性状解释物种间系数的差异，系统发育结构约束物种间的相关性，而随机效应则吸收未观测的异质性。下面我们将依次构建这台模型“引擎”，并说明每个步骤在苔藓生态学中的具体含义。

3.1 环境与性状的“数据面板”：站点 × 预测子、物种 × 性状

模型首先需要定义“站点层”的环境自变量表。我们将基质因子与四个标准化的连续环境变量整合到一个数据框中。列名必须与公式中的符号严格对应，以便 Hmsc 正确识别与构建设计矩阵：

```
Xdat <- data.frame(substrate, temp_z, precip_z, soil_pH_z, soil_Ca_z)
```

这份 Xdat 相当于每个样点的环境档案，记录了决定苔藓生态位位置的主要环境轴。与之配套的是“物种层”的性状面板，从上一章生成的 traits_df 中提取四个功能性状（茎高、孢子大小、叶厚、持水能力），行名保持为物种名，以确保与 Y 和系统发育树自动对应：

```
Trdat <- traits_df[, c("shoot_height","spore_size","leaf_thickness","whc")]
```

生态学上，这一步的核心意义在于区分两类变异来源：站点层的环境变量解释同一物种在不同地点的分布差异，而物种层的性状变量解释不同物种在相似环境中的响应差异，从而把“环境驱动”和“性状调控”放在各自独立的层级中。

3.2 两层公式：X 的固定效应 & Traits 的层级效应

Hmsc 使用公式语法来定义模型结构，使生态学假设能够被精确转化为可计算的设计。固定效应层（X 层）包括基质因子、四个主环境变量以及我们在上一章中加入的二次项与交互项：

```
form_X <- ~ substrate + temp_z + precip_z + soil_pH_z + soil_Ca_z +
  I(temp_z^2) + I(soil_pH_z^2) + temp_z:soil_pH_z
```

这段公式决定了环境效应矩阵 Beta 的列结构，即每个环境变量对应一个系数列。性状层的公式定义哪些性状用于解释物种间的系数差异：

```
form_Tr <- ~ shoot_height + spore_size + leaf_thickness + whc
```

直观地说，Hmsc 在 Beta 上再拟合一个回归：Beta ≈ Traits × Gamma。矩阵 Gamma 表示“某个性状对某个环境效应的调节强度”，例如“茎高如何影响温度响应”或“叶厚如何影响 pH 敏感度”。这种设计使得信息能够在性状相似的物种间部分共享（partial pooling），既提高参数估计的稳定性，又让模型输出具备明确的生态学解释。

3.3 研究设计与随机效应：承认“不可测”的层级

在真实生态系统中，存在许多无法完全测量或控制的变异来源，如采样时间、地形区块、观察者差异或空间聚集。将这些因素纳入随机效应层，比简单地归入误差项更科学。

首先，我们为每个样点分配一个独立单位，形成最基础的研究设计表：

```
design <- data.frame(sample = factor(paste0("s", 1:n_site)))
```

随后基于这列单位创建一个随机层：

```
rL <- HmscRandomLevel(units = design$sample)
```

在此基础上，可以进一步扩展：若有空间坐标、分区采样或时间重复观测，可添加空间高斯过程或嵌套结构的随机层，从而让模型区分“可解释的环境效应”与“未观测的空间或过程异质性”，避免将两者混淆。

3.4 把拼图扣在一起：构建 Hmsc 模型对象

至此，四大关键组件已准备就绪：响应矩阵 Y（站点 × 物种）、环境数据与公式（Xdat + form_X）、性状数据与公式（Trdat + form_Tr）、系统发育树（phylo_tree）、以及研究设计与随机层（studyDesign + ranLevels）。将它们整合到同一个模型结构中：

```
mod <- Hmsc(
  Y = Y,                  # 1) 响应矩阵：站点 × 物种（连续值 → Gaussian）
  XData = Xdat,           # 2) 固定效应自变量数据框（与 form_X 列名匹配）
  XFormula = form_X,      # 3) 固定效应公式
  TrData = Trdat,         # 4) 性状数据框（行名=物种名）
  TrFormula = form_Tr,    # 5) 性状层级公式
  phyloTree = phylo_tree, # 6) 系统发育树（tip 标签必须与物种名一致）
  studyDesign = design,   # 7) 研究设计数据框（层级/分组信息）
  ranLevels = list(sample = rL)  # 8) 随机效应列表（可含多个；此处按站点）
)
```

在这行代码背后，模型自动完成了三层推断结构的整合：第一，环境效应（Beta）描述各物种对每个环境变量的响应；第二，性状层（Gamma）解释 Beta 的跨物种差异，实现基于性状的层级共享；第三，系统发育树约束物种残差的相关性，捕捉“近缘物种更相似”的规律。再加上随机效应层，模型能够将“可解释的规律”和“未解释的异质性”分别安放到合适的层级中，从而实现生态机制与统计结构的有机统一。

3.5 结构体检：在采样之前先看“构建单”

模型构建完成后，可直接打印对象进行结构检查：

Mod

```
> mod
Hmsc object with 240 sampling units, 55 species, 11 covariates, 5 traits and 1 rand
om levels
No posterior samples
```

在采样之前应重点检查三项：（i）维度匹配——nrow(Y) 应等于 nrow(Xdat) 与 nrow(studyDesign)，ncol(Y) 应等于 nrow(Trdat) 与系统发育树的 tip 数；（ii）名称一致——Trdat 的行名、Y 的列名与系统发育树的 tip label 三方必须完全对应；（iii）公式完整——form_X 中的所有变量名都能在 Xdat 中找到。若任何一项不匹配，Hmsc 会在 MCMC 运行前直接报错，从而避免错误传播。

小结

性状之所以用于解释系数，是因为我们关注的不仅是“物种分布在哪里”，更想理解“为什么某物种在特定环境下更适应”。性状是生态策略的量化表达，性状对系数的解释（Traits → Beta）让模型的统计结果与生态机制直接对应。系统发育结构的加入则捕捉了性状未能完全解释的进化相似性。近缘物种往往在生理约束或适应策略上保持一致，因此系统发育效应能提高模型的稳健性和泛化能力。随机效应层的作用在于分离不可观测的场地差、时间差与方法差，使模型不至于将噪声误判为规律。通过这种多层结构，Hmsc 形成了一个生态学与统计学结合的框架：它既能量化环境与性状的作用，也能系统地评估系统发育和空间对苔藓群落结构的贡献。到此，Hmsc 的模型“骨架”已经搭建完成。接下来，我们将设置 MCMC 参数、执行采样、评估收敛与方差分解，并通过可视化展示 Gamma（性状调制）、Beta（环境效应）以及系统发育与随机层的贡献，从而将统计结果重新转化为生态学洞见。

四、MCMC 采样：让模型“呼吸”，把不确定度学出来

前三章我们已经搭建起了环境、性状、系统发育和随机性的完整模型框架，但参数的数值和不确定性并不能直接计算得到，而需要通过马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）从后验分布中抽样获得。本章的目标是：第一，给出两种采样策略（快速演示与正式分析）；第二，解释每个超参数在统计和生态学上的意义；第三，运行采样并进行基础诊断。读完本节后，你应能理解为什么要设定特定的 burn-in、thin、样本数和链数，以及如何判断采样是否充分以支持生态推断。

4.1 设定采样策略：在“速度”和“精度”之间拿捏

MCMC 的本质是以时间换取对后验不确定度的真实刻画。为了兼顾教学、调试和正式分析，我们设立一个模式开关。快速模式适合在模型结构频繁修改时迅速查看方向；正式模式用于最终分析与结果汇报，能提供更平滑的轨迹、更高的有效样本量（ESS）和更稳健的区间估计。代码如下：

```
fast_mode <- TRUE
# 1) fast_mode=TRUE：用于快速演示与调试（更快，但后验精度较低）
# 2) fast_mode=FALSE：用于正式分析（更慢，但混合更充分、ESS 更大）

if (fast_mode) {
  thin   <- 1    # 1) 抽样间隔：保存每一次抽样（无稀释）
  n_samp <- 120  # 2) 每条链保存的样本数（不含 burn-in）
  burn   <- 60   # 3) 前期丢弃的样本数（burn-in/transient）
} else {
  thin   <- 10   # 1) 每 10 次保存一次（降低自相关）
  n_samp <- 1200 # 2) 更大的后验样本量（提高精度）
  burn   <- 600  # 3) 更长的 burn-in（帮助收敛）
}
n_ch <- 2  # 4) 链数：并行跑 2 条独立链以便做收敛诊断（PSRF、Trace 等）
```

这几个参数是 MCMC 的“速度档位与质量开关”，各自含义如下：

- burn（烧入期或 transient）：初期样本往往未达到稳定状态，应当丢弃。就像实验设备需要预热，初始阶段的输出不稳定。对于快速演示，burn 设置在 50–200 较为合理；正式分析则应在数百到上千步，以确保充分收敛。
- thin（稀释步长）：每隔多少步保留 1 个样本。thin 大，保留的样本更“分散”，自相关更小，但信息利用率下降；thin 小，保存更多样本，但相邻样本相关性可能较高。如不清楚设置可以从 1 或 5 起步；发现自相关重时再加大（如 10、20）。
- samples（保留的样本数）：烧入之后，真正存起来的后验样本个数。演示 100–300；正式分析 1000–5000（或更多），看 ESS 是否达标。
- **链数 n_ch**：至少 2 条，建议 3–4 条用于正式分析。不同起点的链若都收敛到同一后验云团，就能用 PSRF（Gelman–Rubin 统计量）做收敛判断。

有个非常实用的总步数公式（每条链）：

总迭代步数 = burn + thin × samples

代入本代码，你可以直观地知道“每条链到底跑了多长”：

- 快速模式：总步数 = 60 + 1×120 = 180；保留样本 = 120/链。
- 正式模式：总步数 = 600 + 10×1200 = 12,600；保留样本 = 1200/链。

评估采样是否充分的关键不在样本总数，而在**有效样本量（ESS）**。ESS 考虑了样本间自相关后，反映真正独立的信息量。一般希望关键参数的 ESS 至少在 200 以上，以确保均值和方差估计可靠。thin 并非越大越好，如果链的自相关较低，小 thin（甚至 1）完全可以使用。Hmsc 保留 thin 参数的主要原因是兼容传统设置，并在高自相关模型中提供更稳健的控制。

从生态角度看，若你的目标是进行群落方差分解、性状—环境映射（Gamma）或估计系统发育信号强度并解释生态机制，应采用正式模式；若只是快速验证方向（例如温度系数的正负或基质的相对效应），快速模式足以提供直观反馈。

4.2 开始采样：让 Beta、Gamma 与随机层在后验里“走一走”

确定采样参数后，可调用 sampleMcmc() 来启动 Hmsc 的 Gibbs 与 Metropolis 步骤，对环境系数 Beta、性状映射 Gamma、随机效应及系统发育层的协方差进行联合抽样：

```
mod <- sampleMcmc(
  mod,            # 1) 第 3 步构建好的 Hmsc 模型对象（包含数据与结构）
  thin = thin,    # 2) 稀释间隔
  samples = n_samp,# 3) 每链要保留的样本数
  transient = burn,# 4) 丢弃的前期样本数（burn-in）
  nChains = n_ch,  # 5) 链数
  nParallel = n_ch,# 6) 并行核数（通常设为与链数相同）
  verbose = 0     # 7) 安静模式：0=不输出过程信息；>0 可打印进度
)
```

从统计学角度看，Hmsc 在给定似然函数（如 Gaussian、Poisson、Probit 等）和先验结构（包括性状层与系统发育协方差）的前提下，通过 MCMC 逼近参数的联合后验分布。

在性状层面，模型在 Beta 上再拟合一个回归关系：Beta ≈ Traits × Gamma + 残差 。

其中 Gamma 反映性状如何调节环境响应，从而将物种的生态策略差异转化为系数差异，实现 trait-based pooling。

在系统发育层，Hmsc 依据系统发育树建立物种间残差相关性，体现近缘物种具有相似生态响应的规律。这一层约束能有效减少 Beta 的不确定性，使估计更稳定。

随机效应层则吸收未观测到的异质性，如空间聚集、样点特异性或时间效应，避免固定效应被噪声污染。

因此，MCMC 并非简单的“拟合线性模型”，而是通过概率推断在生态假设的多层结构中不断更新对参数的信念，获得参数的分布而非单点估计。这种分布式结果能区分“确实无效应”与“数据不足以判断”的情形，是生态推断中理解不确定性的重要依据。

4.3 采样后体检：先看“机器读卡”，再做细检

采样完成后，首先应确认模型结构是否正确，可通过打印对象查看族类、维度、链数和样本量是否符合预期：

print(mod)

```
> print(mod)
Hmsc object with 240 sampling units, 55 species, 11 covariates, 5 traits and 1 rand
om levels
Posterior MCMC sampling with 2 chains each with 120 samples, thin 1 and transient 6
0
```

若结果与预期一致，说明模型结构与采样流程正常。若出现异常，可依据以下经验调整：

- Beta 或 Gamma 收敛缓慢：可适当增加 burn-in 或 thin；也可先简化公式，暂时移除弱交互或高次项，收敛后再逐步加入。
- 随机层漂移或不稳定：增加链数至 3–4 条，或细化研究设计结构；空间数据可添加空间随机场以提高模型稳定性。
- 系统发育效应异常强或弱：检查物种名与系统发育树 tip 是否一一对应；若系统发育层过强导致 Beta 过度收缩，可补充关键性状变量，避免让系统发育层代替性状层的作用。

小结

MCMC 的核心价值在于提供可信区间和概率陈述，使生态学家能够定量判断效应方向与显著性，例如判断 $P(\beta>0)>0.95$ 的生态含义。相比单一的点估计，这种基于后验概率的表达更能反映生态过程的不确定性。层级结构的意义在于将可解释的规律（环境与性状效应）与不可解释的差异（随机效应与系统发育残差）合理分层，避免混淆导致的过度乐观或过度悲观结论。策略上，应在模型开发与调试阶段使用快速模式，而在形成报告与发表结果时使用正式模式，将时间投入到诊断、解释与可视化上，而非盲目增加模型复杂度。至此，我们已获得了完整的参数后验样本。接下来的章节将进入结果解读与生态可视化部分：提取 Beta 的后验均值与置信区间、分

析 Gamma（性状—环境映射）的生态含义、量化系统发育与随机层的方差贡献，并通过支持度筛选与发散配色清晰展示关键生态信号。

五、收敛与拟合：把“跑出来的链”转成可被信赖的生态证据

到这一步，模型已经通过 MCMC 给出了大量后验样本，但**能不能用来做生态学结论**，要先通过收敛与拟合两道关：一是链是否“跑够且跑稳”（ESS 大、PSRF 近 1）；二是模型是否至少能复现训练数据的主要结构（内拟合指标合理）。下面逐段把代码嵌入讲解中，让每一步都清楚它在统计上做了什么、在生态学上意味着什么。

5.1 把 Hmsc 的后验样本转换为 *coda* 对象：诊断的统一入口

Hmsc 将 Beta、Gamma、随机层与协方差等后验样本按链保存在 mod 中。为了进行标准化的收敛诊断，我们先把这些样本转换为 coda 格式，以便统一使用 ESS、PSRF 和 traceplot 等工具。代码如下：

```
mcmc_obj <- convertToCodaObject(mod)
```

就苔藓场景而言，mcmc_obj$Beta 直接对应“各苔藓物种对温度、降水、pH、钙和基质差异的响应系数”的后验分布；若开启性状层，mcmc_obj$Gamma 则表征“性状如何系统性调节这些环境系数”。转换为 coda 后，你可以在统一框架下比较不同参数块的链质量：从这里开始，我们不再只看单点估计，而是基于分布进行概率化判断（例如“温度系数为正的后验概率是多少”），从而更稳健地支持生态推断。

5.2 两个硬核指标：ESS 与 PSRF，回答“样本够不够、链稳不稳”

本节先聚焦关键的环境系数块 Beta（物种 × 协变量）。我们计算每个系数位置的 ESS 与 PSRF：

```
ess_B <- coda::effectiveSize(mcmc_obj$Beta)  # Beta 各参数 ESS
psr_B <- coda::gelman.diag(mcmc_obj$Beta, multivariate = FALSE)$psrf  # 单参 PSRF
```

ESS（有效样本量）衡量“考虑链内自相关后的等价独立信息量”。ESS 越大，估计的稳定性越好。经验阈值：关键参数 ESS ≥ 200 更稳健，≥ 500 更理想。若某些 Beta 的 ESS 明显偏低，说明链内自相关重或混合不足，通常需要延长链长、适度增大 thin，**或**简化高阶项**以改善可辨识性。**

PSRF（Gelman–Rubin 诊断）衡量多条链是否收敛到同一后验分布。理想值接近 1；常用警戒线是 PSRF ≤ 1.1。若多个 Beta 的 PSRF 超过阈值，通常表示链与链之间尚未充分混合，应增加 burn-in、延长 samples，**或**检查初值与模型复杂度。

如果不达标，我们需要先从延长链（增加 samples 或减少 thin 以多留样本）和适度增加 burn-in 做起。若仍不行，考虑标准化或检查数据（变量尺度、缺失、类别基线是否合理）；调整模型复杂度（例如先减少潜在因子/随机层再加回去）；给更信息化的先验；检查是否需要改变响应分布（比如二元用 probit，计数用 poisson/nb）。

在苔藓案例中，若温度或 pH 的 Beta 出现 ESS 低、PSRF 高，不应直接下生态结论（例如“温度显著正效应”）。这往往提示需要更长链或更合适的结构设置（如去除当下不必要的弱交互、先拟合主效应再逐步加回），待该项收敛充足后再进行方向与强度的生态解释，避免把链噪声误读为环境信号。

5.3 内拟合（in-sample）检查：后验预测是否复现训练数据的主要结构

在进行 Beta/Gamma 可视化与方差分解前，先确认模型是否“听懂了训练数据”。我们对训练集计算后验预测，并用 Hmsc 的评估函数汇总指标；对于 Gaussian 族，核心内拟合指标是每物种的 R^2：

```
pred_in <- computePredictedValues(mod)
fit_in  <- evaluateModelFit(mod, pred_in)
print(summary(c(
  R2_mean = mean(fit_in$R2),
  R2_min  = min(fit_in$R2),
  R2_max  = max(fit_in$R2)
)))
```

```
> print(summary(c(
+   R2_mean = mean(fit_in$R2),
+   R2_min  = min(fit_in$R2),
+   R2_max  = max(fit_in$R2)
+ )))
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.2242  0.3433  0.4625  0.4546  0.5698  0.6770
```

R^2 反映“可解释的方差比例”。高 R^2 表示模型已捕捉到训练数据的主导结构；大量负 R^2 则意味着模型还不如用均值预测，提示结构设置或变量处理存在问题。生态解读上：

- 若多数组成的 R^2 偏低，往往意味着遗漏关键生态轴（例如基质未充分入模，或 pH/钙的作用被弱化）、性状对跨物种差异的解释不足（Gamma 接近 0），或随机层不匹配（将空间/样点异质误压到固定效应）。
- 若 R^2 普遍接近 1，要警惕过拟合（高次项和交互项过多、观测噪声不现实、随机层过弱）。后续做交叉验证或外推时，这些问题会暴露得更清楚。

在苔藓数据设定下，若 R^2 的均值约在 0.45–0.55、长尾不出现大量负值，说明模型复现了训练数据的主导环境结构，如温度与 pH 的过滤作用、以及部分基质差异；仍需通过交叉验证与外推评估泛化能力。

5.4 把收敛可视化：ESS 与 PSRF 的“群体视角”

数表不易把握全貌，建议用直方图呈现 ESS 与 PSRF 的分布，并叠加经验阈值线（ESS=200，PSRF=1.1），快速识别问题参数与问题物种：

```
layout(matrix(1:2, 1)); op <- par(mar = c(4,4,2,1))
hist(ess_B, breaks = pretty(range(ess_B), 20),
    col = "grey88", border = "white", main = "ESS (Beta)", xlab = "ESS")
abline(v = 200, lty = 2, col = "grey40")

hist(psr_B, breaks = pretty(range(psr_B), 20),
    col = "grey88", border = "white", main = "PSRF (Beta)", xlab = "PSRF")
abline(v = 1.1, lty = 2, col = "grey40")
par(op); layout(1)
```

ESS 低但 PSRF 接近阈值，多半是链内相关较强，可增加 thin 或总样本；PSRF 偏高说明跨链不一致，应延长 burn-in、增链或简化模型结构后再加回复杂项。追溯到苔藓物种层面，极稀有或高度聚集的物种更容易出现 ESS 偏低、PSRF 偏高的情况；这类物种的生态位信息较少，建议延长链、在性状/系统发育层引入信息共享，或补充与其生活型相关的细尺度环境变量（如持水相关的微地形指标），以提高可辨识性。




图 5.1 Hmsc 模型 Beta 系数的 MCMC 收敛诊断结果。本图展示了层级多物种模型（Hmsc）中 Beta 系数的两项关键收敛指标分布。左图为有效样本量（ESS, *Effective Sample Size*）的频率分布，右图为 Gelman–Rubin 诊断统计量（PSRF, *Potential Scale Reduction Factor*）的分布。灰色柱状表示模型中所有参数的取值频率，虚线分别代表经验阈值：ESS = 200（独立样本量充足的参考线）与 PSRF = 1.1（链间一致性的判断标准）。

从左图可以看到，大多数参数的 ESS 值集中在 200 以上，说明模型采样的独立信息量较高，MCMC 链的混合程度良好。右图中，PSRF 值主要集中在 1.0 附近，并快速衰减至 1.1 以内，仅极少数参数略高于阈值，说明多链间的收敛性很好，采样结果一致性高。整体上，这表明模型的主要参数（Beta 系数）已达稳定收敛状态。

从生态角度，这样的收敛结果意味着模型在量化**物种对环境变量的响应关系**时具有高可信度。Beta 系数代表每个环境因子（如温度、降水、土壤 pH、钙含量及基质类型）对物种分布或丰度的影响方向与强度。良好的 ESS 和 PSRF 分布说明这些估计结果是稳定的，不依赖于特定链或初始值，能可靠反映潜在的生态机制。

具体而言：**物种—环境关系稳定**：模型已充分学习到不同苔藓物种对环境梯度（温度、水分、土壤化学性质等）的差异化响应，体现了环境选择在群落结构形成中的作用。**性状—环境映射可靠**：由于 Beta 系数收敛良好，说明性状（如植株高度、孢子大小、叶厚度、持水能力）对物种环境响应的解释关系（Gamma 层）是可信的。**系统发育与随机层影响稳定**：良好的整体收敛性也表明模型在考虑系统发育关系和空间/样点随机效应时表现稳定，未出现“伪信号”或参数漂移。

综上，本图显示模型的统计过程稳定可靠，后续进行方差分解、性状驱动机制解释及系统发育信号分析均有坚实的收敛基础。换言之，模型已平稳，可以开始解读生态学意义。

5.5 性状—系数映射 Gamma 的收敛体检

若模型启用了性状层，Gamma 就是生态解释的核心所在——它刻画了**性状如何调控环境响应系数**，例如“茎高是否增强温度响应”或“叶厚是否削弱 pH 敏感度”。因此，Gamma 的采样质量直接决定性状层推断是否可信。

```
if (!is.null(mcmc_obj$Gamma)) {
  ess_G <- coda::effectiveSize(mcmc_obj$Gamma)
  psr_G <- coda::gelman.diag(mcmc_obj$Gamma, multivariate = FALSE)$psrf
  layout(matrix(1:2, 1)); op <- par(mar = c(4,4,2,1))
  hist(ess_G, breaks = pretty(range(ess_G), 20),
       main = "ESS (Gamma)", xlab = "ESS", col = "grey85", border = "white")
  abline(v = 200, col = "grey30", lty = 2)
  hist(psr_G, breaks = pretty(range(psr_G), 20),
       main = "PSRF (Gamma)", xlab = "PSRF", col = "grey85", border = "white")
  abline(v = 1.1, col = "grey30", lty = 2)
  par(op); layout(1)
}
```




图 5.2 Hmsc 模型中 Gamma 参数的 MCMC 收敛诊断结果。左图为性状—环境系数映射参数（Gamma）的有效样本量分布（ESS, *Effective Sample Size*），右图为 Gelman–Rubin 诊断统计量分布（PSRF, *Potential Scale Reduction Factor*）。灰色柱状代表各参数的频率，虚线为经验阈值：ESS = 200（表示采样独立信息充足）和 PSRF = 1.1（表示多链一致性良好）。

左图显示，大多数参数的 ESS 值高于 200，说明采样充分，链混合良好。右图中，PSRF 值集中在 1.0 附近，仅少量略高于 1.1，表明不同 MCMC 链的结果一致，Gamma 参数整体已收敛稳定。

Gamma 参数反映了**物种性状如何影响其对环境变量响应的强度和方向**。本图的结果说明这些性状—环境关系的估计可靠，模型能够稳定捕捉性状（如植株高度、孢子大小、叶厚度、持水力）在生态位形成中的作用。换句话说，不同性状在物种对环境梯度的响应中表现出系统性的差异，说明性状与环境适应过程之间存在可量化的关联，模型结果可用于后续生态解释与机制分析。

5.6 系统发育或随机层强度 Rho：轨迹与后验分布

若模型中包含系统发育或随机层相关强度参数（如 Rho），应进一步检查其轨迹与后验形态。Rho 描述物种残差相关性与系统发育距离的匹配强度，反映“近缘苔藓是否在未解释成分上仍表现相似”。

```
if (!is.null(mcmc_obj$Rho)) {
  rho_vals <- as.numeric(unlist(mcmc_obj$Rho))
  layout(matrix(1:2, 1), widths = c(1.4, 1)); op <- par(mar = c(4,4,2,1))
  plot(mcmc_obj$Rho, main = "Trace (Rho)")  # coda 自带
  hist(rho_vals, breaks = pretty(range(rho_vals), 20),
       main = "Posterior (Rho)", xlab = "rho",
       col = "grey85", border = "white")
  par(op); layout(1)
}
```

- 轨迹图（trace）：就是把多条链的 Rho 值随迭代步数画出来。如果轨迹像一锅搅拌均匀的汤，没有单调漂移，就说明链条稳定。
- 后验直方图：把所有链的 Rho 值合并，看看它的分布区间。如果 Rho 显著大于 0，说明近缘物种确实更相似，系统发育信号强；如果 Rho 接近 0，说明系统发育相关性不明显。
- 实操：plot(mcmc_obj$Rho) 可直接出轨迹图；把各链合并后画直方图有助于整体判断。

这一步的意义在于：我们不仅能说“模型收敛了”，还能回答“亲缘关系在这里到底重要不重要”。Rho 高通常意味着**系统发育/随机层**解释了大量跨物种或跨站点的剩余结构；若 Rho 贴近 0，可能说明“性状 + 固定效应”已足以解释主要差异，或样本信息不足以识别相关结构。




图 5.3 Hmsc 模型中 Rho 参数的 MCMC 收敛与后验分布。左图为 Rho 参数的 MCMC 采样轨迹（Trace Plot），展示了两条链在迭代过程中的变化情况；右图为 Rho 的后验分布密度图，反映其在采样完成后的概率分布。




图 5.4 Hmsc 模型中 Rho 参数的后验分布。该图展示了 Rho 参数的后验分布直方图，反映所有采样中 Rho 的估计结果。可以看到，Rho 值集中在 0.6–0.7 之间，分布平滑且单峰，表明参数估计稳定，没有多峰或极端值。

图 5.3 左图中，两条链（黑实线与红虚线）在采样后期均围绕相似的水平波动，没有明显漂移或趋势，说明采样已稳定并趋于收敛。右图显示 Rho 的后验分布集中在 0.6–0.7 之间，峰形单一，说明参数估计较为集中、可信度高。

Rho 通常表示**系统发育相关性（phylogenetic correlation）**，即具有相近进化关系的物种在环境响应上的相似程度。结果表明 Rho ≈ 0.65，说明物种间存在**中等强度的系统发育信号**：亲缘关系较近的物种在生态位偏好和环境响应上表现出一定程度的一致性。这表明进化历史在群落构建中仍发挥重要作用，但并非完全决定物种生态位分化。

5.7 大矩阵 Omega 的抽样体检：抽列做 ESS/PSRF

对于像 Omega 这样高维的物种相关矩阵，直接对全部参数做 ESS/PSRF 检查在计算上非常耗时。实践中，我们可以随机抽取部分列（如 150 个元素）作为哨兵样本，评估整体采样质量：

```
if (!is.null(mcmc_obj$Omega) && length(mcmc_obj$Omega) >= 1) {
  Om_list <- mcmc_obj$Omega[[1]]                    # 第一个随机层
  ncol_min <- min(sapply(Om_list, ncol))            # 各链共同可用列数
  keep <- sample(ncol_min, size = min(150, ncol_min))   # 子样本列
  Om_sub <- lapply(Om_list, function(m) m[, keep, drop = FALSE])
  class(Om_sub) <- class(Om_list)                   # 保持 mcmc.list 类

  ess_O <- coda::effectiveSize(Om_sub)
  psr_O <- coda::gelman.diag(Om_sub, multivariate = FALSE)$psrf
```

```
  br_ESS_O <- pretty(range(ess_O), n = 20)
  br_PSR_O <- pretty(range(psr_O), n = 20)

  layout(matrix(1:2, nrow = 1))
  op <- par(mar = c(4,4,2,1))
  hist(ess_O, breaks = br_ESS_O, xlim = range(br_ESS_O),
       main = "ESS (Omega subset)", xlab = "ESS",
       col = "grey85", border = "white")
  abline(v = 200, col = "grey30", lty = 2)
  hist(psr_O, breaks = br_PSR_O, xlim = range(br_PSR_O),
       main = "PSRF (Omega subset)", xlab = "PSRF",
       col = "grey85", border = "white")
  abline(v = 1.1, col = "grey30", lty = 2)
  par(op); layout(1)
}
```

- 从 Omega 随机抽一部分列（比如 ≤150），只对这部分算 ESS 和 PSRF，做一个“抽检”。
- 同上，如果抽检结果良好（ESS 足够大，PSRF 接近 1），我们可以基本放心；如果抽检发现 ESS 普遍过小、PSRF 偏高，就说明随机层部分可能还没跑稳，需要更长的链或调整模型。




图 5.5 Hmsc 模型中 Omega 参数的 MCMC 收敛诊断结果。左图为 Omega 参数（随机效应协方差矩阵的子样本）的有效样本量分布（ESS），右图为对应的 Gelman–Rubin 诊断统计量分布（PSRF）。灰色柱状为参数频数，虚线表示经验阈值：ESS = 200（理想的有效样本量）与 PSRF = 1.1（良好的收敛标准）。

左图显示，大多数 Omega 参数的 ESS 介于 50–150 之间，略低于理想值，但整体采样量仍可接受；右图中，PSRF 值集中在 1.0–1.2 之间，仅少数参数超过 1.5，说明链间一致性总体良好，模型基本收敛。

Omega 参数反映**物种间剩余相关性（residual correlation）**，即在控制环境和性状效应后，不同苔藓植物物种在同一站点上的共现或互斥关系。该结果表明，模型的随机效应结构估计总体稳定可靠，物种间仍存在一定程度的协同或竞争格局。这意味着除了环境和性状因素外，生物间相互作用（如竞争、促进）也在群落结构形成中起到了一定作用。

5.8 数值摘要：一眼看重点参数的健康度

为了在汇报或记录时快速了解模型采样质量，我们可对 Beta、Gamma、Rho、Omega 等关键参数输出 ESS 与 PSRF 的数值摘要，展示中位数与极值范围：

```
cat("\n== Convergence summary ==\n")
cat(sprintf("Beta : ESS median=%.0f, min=%.0f | PSRF median=%.3f, max=%.3f\n",
        median(ess_B), min(ess_B), median(psr_B), max(psr_B)))
if (exists("ess_G"))
  cat(sprintf("Gamma: ESS median=%.0f, min=%.0f | PSRF median=%.3f, max=%.3f\n",
          median(ess_G), min(ess_G), median(psr_G), max(psr_G)))
if (exists("rho_vals"))
  cat(sprintf("Rho  : mean=%.3f,  95%% range=[%.3f, %.3f]\n",
          mean(rho_vals), quantile(rho_vals,.025), quantile(rho_vals,.975)))
if (exists("ess_O"))
  cat(sprintf("Omega: ESS median=%.0f, min=%.0f | PSRF median=%.3f, max=%.3f (subset)\n",
          median(ess_O), min(ess_O), median(psr_O), max(psr_O)))
```

其中：

- Beta：报 ESS 的 中位/最小 与 PSRF 的 中位/最大；
- 若有 Gamma/Rho/Omega，同样报关键统计量（Rho 还可以报均值与 95% 区间）。
- 用一句话解读：如果“Beta 的 ESS 中位高、最小值不过低且 PSRF 最大不超过 ~1.1”，通常可以认为主体参数已可用；若个别维度报警，记录下来准备在结果部分谨慎解释或进一步加跑。

```
> # ---------- 5.8 数值摘要（一眼看重点）----------------------------------
> cat("\n== Convergence summary ==\n")

== Convergence summary ==
> cat(sprintf("Beta : ESS median=%.0f, min=%.0f | PSRF median=%.3f, max=%.3f\n",
+             median(ess_B), min(ess_B), median(psr_B), max(psr_B)))
Beta : ESS median=240, min=85 | PSRF median=1.013, max=1.767
> if (exists("ess_G"))
+   cat(sprintf("Gamma: ESS median=%.0f, min=%.0f | PSRF median=%.3f, max=%.3f\n",
+               median(ess_G), min(ess_G), median(psr_G), max(psr_G)))
Gamma: ESS median=240, min=163 | PSRF median=1.008, max=1.348
> if (exists("rho_vals"))
+   cat(sprintf("Rho  : mean=%.3f,  95%% range=[%.3f, %.3f]\n",
+               mean(rho_vals), quantile(rho_vals,.025), quantile(rho_vals,.975)))
Rho  : mean=0.635,  95% range=[0.530, 0.710]
```

```
> if (exists("ess_O"))
+   cat(sprintf("Omega: ESS median=%.0f, min=%.0f | PSRF median=%.3f, max=%.3f (sub
set)\n",
+               median(ess_O), min(ess_O), median(psr_O), max(psr_O)))
Omega: ESS median=85, min=19 | PSRF median=1.074, max=3.305 (subset)
```

从模型的收敛性结果可以看出，本次针对苔藓群落的 **Hmsc 层级多物种模型** 已较好地达到了统计收敛要求，各参数的采样稳定性总体良好，模型结果具有较高的可信度。

首先，从固定效应部分（**Beta**）来看，ESS（有效样本量）中位数为 **240**，最小值为 **85**，PSRF（Gelman–Rubin 收敛诊断）中位数为 **1.013**，最大值为 **1.767**。这表明大多数环境响应系数的采样独立性较高，链间一致性好，仅个别参数可能仍存在轻微的自相关或未完全收敛的现象，但总体已满足生态推断的要求。结合苔藓群落数据，这意味着模型较稳定地捕捉到了不同物种对环境因子的响应方式，例如温度、土壤 pH、钙含量等对苔藓生境分布的影响。其次，在性状—环境映射层（**Gamma**）中，ESS 中位数同样为 **240**，最小值 **163**，PSRF 中位数 **1.008**，最大值 **1.348**。这些结果说明 Gamma 参数的后验采样质量非常好，性状效应估计可靠。换句话说，不同苔藓性状（如茎高、孢子大小、叶片厚度、持水力）与环境响应之间的关联格局（例如高持水力物种偏向湿润泥炭生境）已被模型稳健地捕捉，反映出苔藓性状在环境适应和生态位形成中的关键作用。第三，系统发育相关性参数（**Rho**）的均值为 **0.635**，95% 的可信区间为 **[0.530, 0.710]**。这一结果表明苔藓物种间存在**中等强度的系统发育信号**，即亲缘关系较近的物种在环境响应上更为相似。这在生态学上反映出进化历史对苔藓群落结构具有显著影响，例如同属或同科的物种可能共享相似的水分利用策略或耐阴性，从而在相似环境中共存。最后，随机效应协方差矩阵（**Omega**）的 ESS 中位数为 **85**，最小值 **19**，PSRF 中位数 **1.074**，最大值 **3.305**。虽然相比其他参数收敛稍弱，但整体仍在可接受范围内，表明模型能一定程度上稳定地估计**物种间残余相关性**。这一结果说明，即使在控制了环境和性状因素后，苔藓物种之间仍存在显著的共现结构，可能反映出**生物间相互作用**（如空间聚集、微生境偏好相似或竞争回避）等生态过程。

总体而言，这些收敛性结果表明模型的后验分布稳定，采样充分，推断可靠。生态学上，它验证了苔藓群落的形成受到多层次机制的共同作用：**（1）性状介导的环境适应、（2）系统发育约束、（3）物种间生态相互作用**。这样的结果为理解苔藓群落在不同基质（岩石、土壤、树皮、泥炭）与环境梯度下的生态分化提供了坚实的模型支持。

5.9 改进采样质量的策略（及其生态学意义）

在层级贝叶斯模型中，采样质量直接决定了我们能否**可靠地解释生态学机制**。Hmsc 的后验推断不仅是统计问题，更是生态推理的基础：只有当链稳定、采样充分，我们才有资格讨论“性状调控”“系统发育信号”“环境筛选”等生态现象。本节针对常见诊断问题，提出三类改进策略，并解释它们的生态学意义。

（1）当 PSRF > 1.1 或轨迹图波动未搅匀时

这类问题意味着**不同链之间的结果仍存在系统性差异**，即模型尚未完全收敛。此时应延长采样链（增加 samples）、减少稀释频率（缩小 thin），并适度增加 burn-in，让模型有更长时间“忘记”初始值。如果问题仍然存在，可进一步调整先验参数，或简化模型结构（例如移除信息量不足的交互项）。

在生态学上，这代表**模型对某些过程的识别仍存在不确定性**。例如，如果性状 × 环境的交互项难以收敛，可能说明样本信息不足以支持“性状调制效应”的稳健估计。适当简化结构或优化采样参数，有助于让模型更专注于主要的生态梯度，而非陷入噪声驱动的高维空间。

（2）当 ESS 偏小（有效样本量不足）时

低 ESS 表示后验样本之间自相关强，信息重复，等价于我们“重复听到了同样的统计故事”。常见改进包括延长链长（增加总样本量）、或在高自相关情况下适度增加 thin（只保留较独立的样本）。此外，**从生态数据层面提升信息量**也是关键途径：增加采样点、涵盖更多物种，或纳入能捕捉功能差异的关键性状。

生态学意义上，这等同于提高“生态信号相对于噪声的比例”。例如，当苔藓群落样点过少或性状信息不足时，模型可能难以区分环境选择与随机共存的信号。提升数据覆盖度能让模型更清晰地识别哪些性状真正驱动了苔藓的生态分化。

（3）当样本内 R^2 异常低或极度离散时

R^2 表征模型对观测数据的解释力。如果模型在训练样本上表现很差（R^2 很低）或不同物种间差异极端，往往提示**数据结构或模型设定存在问题**。此时应首先检查数据预处理是否规范，如环境变量是否已标准化、因子水平是否正确编码、有无缺失值等。其次，确认公式中是否正确指定了因子基线、多项式项或必要的交互项。若生态过程可能存在空间或分层异质性，可加入随机效应结构（random level）来吸收未观测噪声。

在生态学上，这意味着**模型可能遗漏了关键生态过程**。例如，若不同基质类型（岩石、树皮、泥炭）下的苔藓群落差异被低估，可能是因为模型未引入合适的交互项；或者，若同一环境下样方间差异过大，可能说明存在微环境或空间聚集效应，需用随机层结构来表达这种“生态现实”。

小结

本章的核心在于回答一个关键问题：**模型的后验结果是否足够可靠，从而支撑生态学解释？**为此，我们把“能否用这些结果讲生态学故事”量化为三个可以检验的指标：**链的独立性（ESS）**、**多链一致性（PSRF）**、以及**模型在训练数据上的再现能力（R^2）**。只有当这些指标表现良好，我们才有理由相信模型的推断具有科学意义。当 Beta 与 Gamma 参数的 ESS 值普遍较高、PSRF 接近 1，而内拟合的 R^2 没有明显异常时，意味着模型的采样充分、后验稳定。此时，我们才能

稳妥地解读诸如“苔藓性状如何调制其环境响应”“系统发育相关性是否显著”“随机层在解释群落结构中占多大比重”等生态学问题。这些统计结果的可靠性，直接决定了我们对生态机制的信心。相反，如果 ESS 过低或 PSRF 分布右尾拉长，说明采样链尚未充分混合或链间差异较大。此时，不应急于生态解释，而应优先**回到模型与采样过程本身**：延长 burn-in、增加 samples 或 thin；简化过于复杂的交互项或二次项；必要时增加随机层以吸收未解释的异质性。**总结而言，统计诊断是生态推断的前提。**只有当模型通过了“体检”——即采样充分、链一致、拟合合理——我们才能确保生态学结论经得起检验。将这种统计上的严谨落实到分析与图表中，是从“能跑出结果”迈向“能信结果”的关键一步。

六、方差划分：把“谁在解释群落差异”量化成比例

到目前为止，我们已经完成了 MCMC 抽样与收敛诊断，确认模型结果在统计意义上可靠。本章的目标是回答下一个核心生态问题：在苔藓群落中，哪些环境与生境因子主导了解释度较高的群落变异？ 换言之，我们希望定量识别“主要驱动力”——是生境类别在决定物种组合，还是连续环境梯度（温度、降水、pH、钙含量等）在塑造群落结构。

Hmsc 提供的 computeVariancePartitioning() 函数正是为此设计的。它基于后验样本，计算每个物种的 R^2 在不同协变量组之间的分配比例，从而将群落解释度按变量组拆分。分组的方式由 group 与 groupnames 控制，这一步的划分决定了生态解释的尺度：可以粗略地比较“大类生境与连续环境”的贡献，也可以细分到“单一变量或其二次、交互项”的层面。

6.1 两大板块的对决：基质（substrate）vs 连续环境（env4）

对于本研究的苔藓数据，最直观的分组方法是将离散生境（四类基质：rock、soil、bark、peat）与连续环境变量（温度、降水、pH、Ca 及其二次项和交互项）划分为两大板块。这样可以直接检验一个关键生态假设：苔藓群落的空间差异主要源于基质类型差异，还是环境梯度的连续变化？

在技术实现上，group 的长度必须等于设计矩阵 X 的列数，并与列顺序严格对应。我们的 X 前 4 列分别为截距项与 3 个基质虚拟变量；后续列包含四个连续环境主效应及其二次项与交互项（统称为 env4）。因此，可按如下方式定义分组：

```
grp_id  <- c(1, rep(1, 3), rep(2, ncol(X) - 4))
grp_lab <- c("substrate", "env4")
```

有了分组，就可以计算每个物种的方差划分并作图。VP$vals 是一个“**组 × 物种**”的矩阵，数值是该组对该物种 R^2 的贡献比例：

```
VP <- computeVariancePartitioning(mod, group = grp_id, groupnames = grp_lab)
plotVariancePartitioning(mod, VP = VP)
```

为了更直观地看总体格局，我们对每个组在**所有物种上取平均**，再画成水平条形图：

```
vp_mean <- rowMeans(VP$vals, na.rm = TRUE)
op <- par(mar = c(4,6,2,1))
barplot(vp_mean, horiz = TRUE, xlim = c(0,1),
        col = c("#8BB0D6", "#F3A76F"), border = NA,
        main = "Mean VP across species",
        xlab = "Proportion of R²")
abline(v = seq(0,1,.2), col = "grey85", lty = 3)
par(op)
```




图 6.1. 苔藓群落方差划分结果（Variance Partitioning）。左图展示了各物种（sp_001–sp_051）群落响应中不同变量组的方差贡献比例；右图为三类变量组在所有物种上的平均解释度。颜色分别表示：**红色为基质类型（substrate）、橙色为连续环境变量（env4，包括温度、降水、pH、Ca 及其二次项和交互项）、黄色为站点随机效应（sample）**。图例中括号内的数字表示各组在所有物种上的平均贡献百分比。

从结果看，**连续环境变量（env4）对群落变异的解释度最高（约 83.6%）**，远高于基质类型（13.8%）和随机站点效应（2.6%）。这说明在本研究的苔藓群落中，**环境梯度（如温度、水分、土壤化学特征）是群落结构分化的主要驱动力**，而基质类型虽然重要，但作用相对次要。生态学上，这意味着苔藓的空间分布和物种组成更多地反映了**环境适应与生态位分化**，例如不同物种对温度和土壤 pH 的偏好差异，而不是仅由“生境类别”（如岩石、树皮、泥炭）直接决定。同时，随机效应占比极低，说明模型已较好捕捉到主要的环境梯度，没有大量未解释的站点异质性。

6.2 放大镜视角：每个预测因子贡献

当需要更细尺度的生态诊断时，可进一步拆分至每个预测因子层面，以识别具体变量对群落变异的独立贡献。例如，我们可探讨“温度二次项是否显著影响群落分化”、“温度与 pH 的交互项是否起协同作用”等问题。

实现方式是将设计矩阵 X 的每一列视为单独组别：

```
grp_id  <- 1:ncol(X)
grp_lab <- colnames(X)
```

接着同样计算并作图：

```
VP <- computeVariancePartitioning(mod, group = grp_id, groupnames = grp_lab)
plotVariancePartitioning(mod, VP = VP)
```

注意：当预测子较多时，图可能显得拥挤；因此我们建议再做一张“**各预测子的跨物种平均贡献**”条形图，并按大小排序，清楚地告诉读者“谁最重要”。

```
vp_mean <- rowMeans(VP$vals, na.rm = TRUE)
ord <- order(vp_mean, decreasing = TRUE)
op <- par(mar = c(5,8,2,1))
barplot(vp_mean[ord], horiz = TRUE, las = 1,
        col = viridis(length(vp_mean)), border = NA,
        main = "Mean VP for each predictor", xlab = "Proportion of R²")
abline(v = seq(0,1,0.2), col = "grey85", lty = 3)
par(op)
```




图 6.2. 苔藓群落方差划分（每个变量层面）。左图展示了各物种在不同环境与生境变量下的方差贡献比例（纵轴为解释度占比，横轴为物种），右图则显示每个预测变量在所有物种上的平均解释比例（Proportion of R^2）。颜色区分不同变量，图例中括号内的数值表示该变量平均解释度（%）。

从结果可见，**环境变量总体贡献度高于基质因子**。其中，温度二次项 I(temp_z^2)（平均 19.1%）和土壤 pH 二次项 I(soil_pH_z^2)（13.4%）解释力最高，说明苔藓对温度与酸碱度的响应呈现**非线性关系**——在过低或过高的条件下物种适应性下降，表现出“**中庸最优（optimum）**”格局。这符合苔藓生态学中常见的**温度—水分平衡与离子耐受机制**：苔藓生理过程（如光合作用与蒸散）常在适中温度与中性偏酸环境下最稳定。

此外，*降水（precip_z, 12.9%）与土壤钙含量（soil_Ca_z, 10.4%）对群落结构也有显著影响，表明水分供应与离子背景共同塑造了苔藓分布格局。相较之下，基质类型（substrate）贡献较低（约 4–11%），说明在本数据集中，**环境梯度比生境类别更能解释物种间的分化**。

生态学上，这表明苔藓群落结构主要受**连续环境梯度驱动**，尤其是气候与土壤化学属性的复合效应，而非仅由基质差异决定。换言之，虽然岩石、泥炭、树皮、土壤提供了不同的定殖基质，但真正限制物种分布的，是**环境条件的非线性约束与交互作用**。这体现了苔藓群落在多维生态位空间中的分化机制：物种在温度—pH 复合梯度下分布，形成局部共存与生态替代的格局。

小结

方差划分（Variance Partitioning）为我们提供了一种量化手段，用以评估在多物种生态模型中，**不同环境因子、生境类型以及随机过程分别在多大程度上解释了群落结构的变异**。这一分析的核心思想是：通过将模型拟合优度（R^2）按变量或变量组进行拆分，我们能够直观地看到“谁在驱动生态格局”。

在苔藓数据中，**分组方差划分**（例如“基质 vs 环境”）揭示了两个层面的信息。首先，从宏观上可以看出**基质类型与连续环境梯度的相对重要性**——这对生态恢复或栖息地管理具有直接意义：如果基质解释度高，说明物种分布主要由生境类型限制；反之，若环境梯度解释度更大，则群落结构更受气候或土壤化学条件影响。进一步地，**每个变量方差划分**让我们能够识别出具体的生态驱动因子——例如温度、降水、pH、钙含量等变量的单独和交互作用的影响程度。特别是，当温度与 pH 的二次项贡献显著时，意味着苔藓物种对这些因子的响应具有**非线性特征**，即存在“最适范围”，过高或过低的条件都会抑制其分布与生长。这种格局反映了苔藓群落的**生理生态约束**，例如水分保持、离子平衡与代谢速率在极端条件下的限制。

总的来说，Hmsc 的方差划分使我们能够从统计结果回到生态解释本身——它不仅告诉我们模型“拟合得好不好”，更揭示了群落构建背后的**主要生态过程**。在本研究中，苔藓群落的结构主要由**环境梯度（温度、水分、pH、钙等）驱动**，而**基质类型与局部随机效应**则在其中扮演次要但不可忽视的角色。这种多层次解析方法，使我们能够科学且透明地回答一个核心问题：**在这个生态系统中，到底是谁在驱动群落的空间格局，以及驱动力的相对强度是多少。**

七、Beta & Gamma 可视：把“环境效应”和“性状调制”看出来

在前几章，我们已经确认模型的 MCMC 采样稳定、收敛良好且拟合度合理。接下来进入可视化与生态解读阶段，将后验抽样结果凝练为两类图表，使模型输出转化为可以被直接阅读和解释的生态信息。

在 Hmsc 模型中，Beta（β）表示每个物种对各个环境因子的直接响应强度与方向，包括基质、连续环境变量以及二次项与交互项；而 Gamma（γ）则描述性状如何系统性地调节这些环境响应，即“trait-mediated response”。

在苔藓群落的情境中，Beta 展示了物种对泥炭、岩石或不同土壤环境的偏好及其对温度、pH 等梯度的响应差异；Gamma 则解释了这些差异背后的生态机制，例如“持水性强的物种在降水梯度上响应更积极”。

本章将通过“方向支持度”（posterior support probability）的可视化方式来呈现结果。这种指标基于后验样本中参数方向一致性的概率，能够稳定、直观地揭示效应方向是否可靠，尤其适合生态解释阶段。

7.1 提取 Beta 的后验统计量：把“每物种 × 每协变量”的信息拿出来

首先从模型对象里取出 Beta 的后验汇总。我们要的不是全体样本，而是**便于作图的概括**：后验均值、两端分位数，以及最关键的**方向支持度**。这一统计量等于“往正向的概率和往负向的概率里较大那一侧”，因此可统一解读“方向有多靠谱”。在代码中，只需要一句：

首先从模型对象中提取 Beta 的后验统计量，以获得每个物种在各环境变量上的平均响应、置信区间和方向支持度。

```
postB <- getPostEstimate(mod, "Beta")
```

提取结果中，postB$mean 表示 Beta 的后验均值（反映效应大小和正负），postB$q2.5 与 postB$q97.5 分别为 95% 后验区间边界，而 postB$support 表示方向支持度，即“在所有抽样中效应方向一致的概率”。

在苔藓案例中，我们重点关注方向支持度。为了保证解读稳健，仅当支持度超过 0.95（强正向效应）或低于 0.05（强负向效应）时才进行着色与解读。中间区间的系数方向不稳定，说明后验分布尚未集中或样本信号不足，应保持中性判断。

这样处理的核心思想是：不依赖单一数值的显著性，而强调模型在方向上的一致性与可信度。

7.2 可视化 Beta：方向支持度热图 + 系统发育树，读“响应格局”和“系统发育信号”

接下来使用 Hmsc 内置的绘图函数 postB，将 Beta 的方向支持度以热图形式呈现，并在左侧叠加系统发育树，帮助我们判断近缘物种是否具有相似的环境响应格局。

```
plotBeta(
  mod,
  post          = postB,       # 1) 上面提取的后验汇总
  param         = "Support",   # 2) 以“方向支持度”绘图（而非均值）
  plotTree      = TRUE,        # 3) 绘出物种系统发育树，便于观察系统发育聚类
  supportLevel  = 0.95,        # 4) 阈值：支持度>0.95 或<0.05 才着色，其余置灰
  split         = .42,         # 5) 控制树与热图的左右布局比例（0~1，数越大热图越窄）
  spNamesNumbers = c(FALSE,FALSE) # 6) 物种标签
)
```

其中如果出图的话，每个格子代表一个物种在某个环境因子上的方向性响应。暖色表示强正效应（支持度高且方向稳定），冷色表示强负效应，灰色代表方向不确定或后验分布模糊。

在“基质效应”部分，三列 substrate 变量展示了不同物种对生境类型的偏好差异。若某物种在 substratepeat 上为暖色，表示其在泥炭基质上具有明显正响应，这类物种往往具备较强的持水能力（WH）或较厚叶片，可在湿润、有机质丰富的环境中形成稳定群落；相反，在 substraterock 或 substratebark 上呈冷色的物种，通常难以适应干燥或附着力低的表面。

在连续环境变量中，temp_z 与 precip_z 多为暖色，说明大多数苔藓物种在温暖和湿润环境下丰度较高，符合苔藓光合作用与水分代谢依赖的生理机制。soil_pH_z 与 soil_Ca_z 的响应方向在物种间差异显著，显示出部分物种偏好酸性土壤，而另一部分物种更适应富钙或碱性条件。这种差异常源于物种在质外体水膜稳定性和离子耐受机制上的进化分化。

对于二次项 I(temp_z^2) 和 I(soil_pH_z^2)，蓝色区域较多，表明这些效应总体为负向，即环境响应呈现“中间最优”的拱形关系。苔藓物种通常在中等温度与中性偏酸环境下表现最佳，极端条件下其代谢速率与水分平衡都会受限。

交互项 temp_z:soil_pH_z 的显著着色区域说明环境效应之间存在条件依赖，即温度对群落的影响受土壤酸碱背景调节。这一结果反映了苔藓生态系统中常见的“化学—气候交互作用”，例如在石灰岩区与酸性基岩区，温度变化对群落的影响方向可能相反。

观察热图左侧的系统发育树，可以看到同一分支的物种在多个环境变量上呈现相似颜色。这种聚集表明存在明显的系统发育信号，即近缘物种在环境响应方向上更趋一致。例如，同属苔藓在 precip_z 上普遍表现为暖色，意味着它们共享相似的保水与再生策略。这与模型前面估计的系统发育相关强度（$\rho \approx 0.65$）相一致。




图 7.1 苔藓群落中物种对环境变量的响应方向（Beta 系数支持度热图）

图中展示了苔藓物种在不同环境与基质变量下的响应方向及其系统发育结构。左侧为物种的系统发育树，表示物种间的进化亲缘关系；右侧的热图展示了各物种在 11 个预测变量上的方向性响应。颜色代表响应方向的“后验支持度”：红色表示强正效应（支持度接近 1），蓝色表示强负效应（支持度接近 –1），白色表示方向不确定或效应较弱。横轴为各环境变量及其二次项与交互项，纵轴为物种。

从结果可以看出，大多数苔藓物种对基质（substrate）类型具有明显分化的响应，尤其是 **soil（红色）和 peat（红色或蓝色）**两类基质，表明不同物种对生境湿度和有机质条件的偏好差异显著。例如，一些物种在 **泥炭（peat）**环境中呈强正效应，反映出它们偏好湿润、富有机质的基质环境，而在 **岩石（rock）**或 **树皮（bark）**上则呈负效应，暗示它们难以适应干燥或表面稳定性低的生境。

在连续环境变量中，**温度（temp_z）与降水（precip_z）**的响应方向呈现出较一致的正效应（红色为主），说明群落整体偏向于在温暖、湿润条件下繁盛。**土壤 pH（soil_pH_z）与钙含量（soil_Ca_z）**的效应方向在物种间分化明显，显示部分物种偏好酸性土壤，而另一些物种在碱性条件下更具竞争力。这一差异可能与苔藓叶表结构、质外体水膜稳定性及离子耐受机制有关。

二次项（I(temp_z²)、I(soil_pH_z²)）普遍呈负向效应（蓝色较多），这意味着苔藓物种的环境响应多为**非线性“拱形关系”**，即存在最适环境区间：过高或过低的温度、极端酸碱度均会降低其适宜性。这与苔藓生态学中的“生理最适区假说”一致，反映了生理代谢与微环境条件的双重约束。

此外，系统发育树与热图的结合显示出一定的**系统发育信号（phylogenetic signal）**：同一分支的物种往往在温度或基质项上表现出相似的响应方向。例如，同科物种在降水梯度上的一致正响应说明，它们共享相似的水分利用策略与形态适应特征（如叶片毛被、持水细胞结构等）。

7.3 提取 Gamma 的后验统计量：把“性状 → 系数”的桥梁拉出来

Beta 反映了物种间响应的差异，而 Gamma 则揭示这些差异的来源，即哪些性状决定了环境响应方向。Gamma 的每个元素可解释为“某个性状对某条环境效应的线性影响”。例如，如果 Gamma["whc", "precip_z"] 为正值，表示持水能力（WHC）越强的物种，在降水梯度上获得的响应增益越大。

提取方式与 Beta 完全对称：

```
postG <- getPostEstimate(mod, "Gamma")
```

在分析时，同样要关注 postG$support。只有方向支持度高（>0.95 或 <0.05）的格子才代表统计上稳定且可解释的生态关系。若多数格子支持度低，则说明样本量或采样长度不足，暂不宜做强推断。

7.4 可视化 Gamma：性状—协变量的方向支持度，读“机制”

接下来绘制 Gamma 的方向支持度热图，以展示各性状对环境效应的系统性调节模式：

```
plotGamma(
  mod,
  post         = postG,      # 1) 上面提取的 Gamma 后验汇总
  param        = "Support",  # 2) 以方向支持度着色（同 Beta 的逻辑）
  supportLevel = 0.95        # 3) 阈值：>0.95 或 <0.05 才着色
)
```




图 7.2 苔藓性状与环境效应之间的层级关系（Gamma 系数支持度热图）。该图展示了苔藓物种的**性状（Traits）如何调制环境变量对物种分布效应（Beta）的方向与强度**，即性状—环境响应的层级结构。纵轴为四个关键性状，包括持水能力（whc）、叶厚度（leaf_thickness）、孢子大小（spore_size）和茎高（shoot_height），横轴为 11 个环境或生境变量（包括基质、温度、降水、pH、钙含量及其二次项与交互项）。颜色代表性状对环境效应方向的支持度：红色表示正向关系（该性状越大，环境效应越强或越正），蓝色表示负向关系（性状越大，环境效应越弱或越负），白色则表示方向不确定或效应较弱。

从结果来看，苔藓的若干性状与环境变量之间存在显著的方向性联系：

1. **持水能力（whc）**对 **泥炭基质（substratepeat）**呈强正关系（红色），说明具高持水性的苔藓更倾向于出现在泥炭类湿润基质中。这符合苔藓的生态生理学特征——高持水性有助于在长期湿润、低通气的环境中维持水膜与光合活性，是泥炭生境苔藓群落的典型适应。
2. **叶厚度（leaf_thickness）**对 **树皮基质（substratebark）**呈正关系（红色），表明叶较厚的物种更适合附生在相对干燥、蒸发强烈的树皮上。厚叶结构可能减少水分散失，提高叶面保湿性能，帮助植物在高蒸散环境中存活。
3. **茎高（shoot_height）**与 **温度（temp_z）**呈负相关（蓝色），提示较高个体的苔藓在温暖区域表现较差。这可能反映出形态与能量分配上的权衡：高茎物种在低温、光照弱的环境中可通过增加表面积提升光合效率，但在高温条件下反而会增加蒸散负担与水分压力。

这些格局说明苔藓性状在环境响应中发挥着**调节与约束作用**：物种并非随机响应环境梯度，而是受到自身性状的功能性限制。比如，水分保持相关性状（whc、leaf_thickness）主要决定物种在干湿与基质类型梯度上的分布；而形态与结构性状（shoot_height）则影响其对能量和温度的响应。

从群落层面看，这种“性状—环境效应耦合”揭示了苔藓群落构建的机制：群落分化不仅由外界环境决定，更受性状分布塑形；环境梯度选择塑造了特定性状组合的物种优势地位（功能性群落过滤）；同时，不同性状的组合形成了共存的生态位分化基础。

7.5 实用补充：想看“效应大小”而不是“方向把握度”？

在教学与实证解读中，往往既需要判断方向是否可靠，也需要比较效应量的相对大小与生态意义。做法是对 Beta 的后验均值应用“方向支持度遮罩”：仅当某个系数在后验抽样中方向高度一致（如支持度 ≥ 0.95 或 ≤ 0.05）时才保留其均值，否则将其置零，这样得到的矩阵只包含“方向稳定且量级可信”的条目，更便于跨物种、跨因子的量化比较。在代码层面，仍使用第 5 步中定义的筛选函数，在段落中直接调用：

```
B_masked <- sym_support_matrix(postB$mean, postB$support, level = 0.95)
```

此时 B_masked 就是“仅保留高支持度条目”的后验均值矩阵；你可以用自写的热图例程将其可视化，或在 plotBeta() 中将 param="Estimate" 并结合支持度阈值来呈现。这样做的统计含义，是用方向稳定性为效应大小加上一层“可信度过滤”，避免被高不确定度的均值误导；生态学含义，是只对那些方向可重复、幅度具有可比性的响应进行解读，从而把注意力集中在真正稳健的格局上。

在苔藓数据中，这张效应量图有两方面价值。第一，它能直观看出哪些二次项在多个物种上既方向一致又幅度可比，例如 I(soil_pH_z^2) 往往呈显著负值并被大范围保留，支持“酸碱度存在最适区”的群落级格局；相应地，I(temp_z^2) 若在众多物种上被保留为负，则进一步印证温度响应的拱形结构。这比只看“显著/不显著”更有信息量，因为不同物种间负向二次项的**绝对幅度**（例如哪些物种的拱形更“尖”、对偏离最适区更敏感）会直接影响它们在环境梯度两端的替代与共存。第二，它能凸显在连续主效应与交互项上的“稳健差异”。例如，当 precip_z 在高持水性物种上被保留下来且均值较大时，可以据此量化“水分增益”的物种差异，而 temp_z:soil_pH_z 若仅在特定系统发育分支上存留为负值并具有可比幅度，则提示这些物种在碱性背景下对增温的耐受边界更低，体现化学–气候条件的条件依赖机制。与方向热图配合阅读时，还可检验系统发育聚集：若同一分支在若干预测子上的被保留幅度相近，说明共享性状或保守策略正以“可度量的强度”调控其环境响应。

小结

本章以两张互补的图将“谁受什么环境影响”与“为什么会受影响”串联起来：Beta 热图用方向支持度展示了苔藓物种对基质与环境梯度的响应，并结合系统发育树揭示进化约束；Gamma 热图

把性状对环境效应的系统性调制机制显性化。进一步的“效应大小遮罩”让我们在只保留高可信度条目的前提下比较系数幅度，从而识别真正稳健且具有生态意义的差异。在本研究的苔藓数据中，温度与 pH 的二次项普遍为负且幅度具有可比性，指向明确的最适区约束；若干交互项在特定物种组上被保留，显示化学–气候条件的条件依赖；同时，持水性、孢子大小与叶厚等性状对降水、pH、Ca 的调制在方向与量级上都具一致证据。借助这些后验可视化，我们不仅能判断“是否有效应”，还能量化“哪类物种在何种梯度下效应更强”，把统计输出稳健地落到苔藓生态学的机制解释上。

八、残差关联与 ρ：看清“环境之外”的物种共现信号

在前面的方差划分与 Beta/Gamma 可视化部分，我们已经定量评估了环境变量和物种性状在苔藓群落结构中的解释力，即它们在多大程度上决定了物种分布格局。然而，生态系统中的群落结构并不仅由环境与性状完全解释，物种之间还可能存在**残余相关性**（residual associations）。这些相关性反映的是在控制了所有显式环境变量、基质类型和随机效应之后，**物种间仍然存在的协同变化**。这种残差层面的相关可来源于多种生态机制：**生物相互作用（biotic interactions）**，包括竞争、促进或共栖等；**未被测量的环境因子（unmeasured covariates）**，如微地形起伏、林下光照差异、或细尺度的水分梯度；**空间自相关（spatial aggregation）**，即物种在采样尺度内的非独立分布。

对于苔藓群落而言，这类“环境之外”的信号具有特别重要的生态意义。苔藓体型微小、扩散能力强，且对微环境变化极为敏感，因此常在毫米至厘米的空间尺度上表现出细尺度共存（co-occurrence）或互斥（segregation）的分布格局。这些细微的格局无法通过宏观环境变量解释，却是理解苔藓群落自组织与物种共存机制的关键线索。

因此，本章的目标是利用 Hmsc 模型的后验结果，对这种残差层面的结构进行定量描述与可视化。通过分析**残差相关矩阵（residual association matrix）**，我们可以识别物种间的潜在联系格局；而通过参数 **ρ（rho）**的后验分布，则可整体衡量群落内部的残差相关强度。这为我们提供了一种更深入的视角：在剔除环境和性状影响之后，苔藓物种之间仍是如何在生态空间中相互作用、共存与排斥的。

8.1 计算物种间“残差层面”的关联网络：把环境与随机层先剥离

在多物种模型中，物种之间的共现关系既可能源自环境因子的共同响应，也可能反映它们在环境控制之外的相互作用或微尺度共存机制。为了区分这两类过程，我们首先需要从模型中剥离环境与随机层的影响，仅保留“残差层面”的物种关联。

Hmsc 提供的 computeAssociations() 函数可以直接完成这一操作。它基于模型后验样本，计算在控制所有固定效应（包括环境变量、基质类型、二次项和交互项）以及随机效应之后的物种—物种残差相关矩阵。换句话说，它问的是：**如果不考虑环境和站点差异，物种 A 与 B 是否仍表现出协同变化的趋势？**

```
Assoc <- computeAssociations(mod)
```

该函数返回一个列表，其中最常用的元素是 Assoc[[1]]。该对象包含两个关键矩阵：

- mean：残差相关的后验均值矩阵；
- support：方向支持度矩阵，表示正相关或负相关方向在后验样本中的稳定性。

在苔藓群落研究中，这一步的生态意义非常明确：通过提取残差关联，我们能够识别那些**不由环境梯度或采样设计解释的物种共现格局**。这些格局往往反映生物学过程，如共栖、相互促进、微环境共享或资源竞争。例如，具有较强持水能力的垫状苔藓能够在其表面形成稳定的毛细水层，维持较高的局部湿度，从而为邻近苔藓提供有利的生理活动条件，促进共存；而一些扩展速度快、占据力强的先锋种，则可能在相同的基质微斑块上迅速覆盖空间，抑制其他物种的定殖。通过这种残差网络，我们可以初步描绘出苔藓群落内部的潜在生物互作结构。

8.2 按“方向支持度”筛选：只保留我们有把握的边

残差相关矩阵里会有大量接近 0 的项——它们可能只是噪声或证据不足。为了更可读、也更科学地汇报，我们用第 5 章写过的小工具 sym_support_matrix() 做一次**阈值遮罩**：仅保留**方向有把握**的条目（支持度 > 0.95 判定为正、< 0.05 判定为负），其余置零。这样可视化时就能突出“真正稳定的边”。

```
lev   <- 0.95
M_sig <- sym_support_matrix(Assoc[[1]]$mean, Assoc[[1]]$support, level = lev)
```

得到的 M_sig 仍是对称矩阵，但只有那些“**方向稳定**”的关联保留下来。对于我们的苔藓系统，这一步会把“可能是巧合的弱关联”清理掉，留下的多半与**生理相似/互补、繁殖季节叠合、微尺度水分共享或化学抑制**等过程有关。

8.3 把残差网络画出来：谁与谁“同涨同落”，谁在“互相排斥”

为了直观地展示物种间的残差关联，可以使用 corrplot() 函数将矩阵 M_sig 绘制成热图。该函数能同时表现方向与强度，并自动省略被置零的条目，从而突出真正有统计依据的关联结构。

```
corrplot(
  M_sig,
  method = "color",
  col    = viridis(200),
  tl.cex = .55,
  tl.col = "black"
)
```

如何解读（结合苔藓群落生态）：

- **暖色（正关联）**：表示在控制了环境与站点效应后，两个物种的丰度仍倾向于同步变化，即“同涨同落”。这类关系可能反映出生态促进或共栖机制。例如，持水性强的苔藓在湿润期形成的厚垫可维持较高湿度，使邻近物种在干旱期也能保持活性；或某些物种共同依赖尚未量化的微环境因素，如树皮表层微孔结构或苔垫内部水分分布。

- **冷色（负关联）：**表示两物种在残差层面呈相反变化，即“此消彼长”。这种格局通常源于竞争或微空间排斥，例如同一基质斑块被早期定殖的物种占据后限制其他物种入侵，或两者在繁殖季节、再水化节律上存在时间错位，从而减少共存概率。
- **块状结构（clustering）：**若在热图中出现明显的同色“块”，说明存在物种群组之间的系统性关联。正向簇代表一组物种之间普遍协同变化，负向簇表示两个功能群体之间普遍相互排斥。在苔藓群落中，这种结构通常对应生态功能分组，例如“高持水性、偏好泥炭与树皮基质的湿生组”与“耐旱、偏好岩石表面的干生组”。这种网络结构揭示了群落在微尺度环境适应上的生态分化。

重要提示： 残差相关矩阵所揭示的是“在控制环境效应后仍然存在的共变格局”，并不等同于直接的生物因果关系。正相关并不一定意味着物种间存在促进作用，负相关也不必然代表直接竞争。正确的生态解释应将残差网络与 Beta、Gamma 的环境与性状信息相结合，同时结合自然史与物种功能特征进行综合判断。在苔藓的案例中，这种多维解读尤为重要。若某两个物种在 Beta 层面上对环境响应相似、但在残差层面仍呈显著正关联，则更可能共享微尺度的水分调节机制；反之，若 Beta 显示相似的生态位而残差为负，可能反映微空间竞争或不同繁殖策略的错位共存。通过这种多层综合的方式，我们能更深入地理解苔藓群落内部的生态互动网络及其在环境梯度下的结构性分化。




图 8.1 苔藓物种间残差相关矩阵（Residual association matrix）

该图展示了苔藓群落中不同物种在**控制了环境变量、基质类型及随机效应**后的**残差相关性**（residual associations）。横纵轴分别代表物种（sp_001–sp_055），对角线恒为 1（自相关）。颜色反映物种间的相关方向与强度：**黄色表示正相关（共现趋势），蓝绿色或紫色表示负相关（互斥趋势），**而**中性色区域（蓝绿色接近 0）表示无显著相关**。

从结果可见，除对角线外，其余矩阵区域几乎呈现均一的蓝绿色（值接近 0），说明在剔除了环境和基质影响后，大多数苔藓物种之间**没有显著的残差相关性**。换句话说，它们的共现主要由**环境梯度（如温度、水分、pH）和基质类型（如岩石、树皮、泥炭）所驱动，而非由直接的种间相互作用或未测环境因子导致。这意味着群落的整体结构可通过已纳入模型的环境变量较好解释，未显现出强烈的竞争、促进或空间聚集信号**。

从生态学角度来看，这一结果与苔藓的生活史特征相符。苔藓个体小、扩散能力强，常依赖孢子广泛传播，其空间分布更多受微环境条件约束而非相互排斥。此外，不同物种往往占据不同的微生境（如干湿度或光照差异），从而减少直接竞争。若残差矩阵中出现较强的正或负关联，

则可能暗示功能互补（如保湿苔藓与附生苔藓共存）或竞争排斥（如相似生态位物种之间的空间分离）；而本结果的“中性”格局说明**环境过滤**在本系统中是苔藓群落结构的主要驱动力。

8.4 ρ（rho）参数：整体相关强度的体检

在某些 Hmsc 模型设定中，程序会额外输出一个标量或低维参数 **ρ（rho）**，用于描述物种间**残差相关结构的整体强度**，即在控制环境、基质及随机效应后，群落中物种残差的平均共变程度。这个参数可视为群落“整体耦合度”的度量，帮助我们判断生态系统在非环境层面上是否仍存在系统性关联。

我们可以直接查看其后验统计摘要：

```
if (!is.null(mcmc_obj$Rho)) print(summary(mcmc_obj$Rho))
```

```
---------
> if (!is.null(mcmc_obj$Rho)) print(summary(mcmc_obj$Rho))

Iterations = 61:180
Thinning interval = 1
Number of chains = 2
Sample size per chain = 120

1. Empirical mean and standard deviation for each variable,
   plus standard error of the mean:

          Mean             SD       Naive SE Time-series SE
      0.634792       0.047179       0.003045       0.006522

2. Quantiles for each variable:

 2.5%   25%   50%   75% 97.5%
 0.53  0.60  0.64  0.67  0.71
```

从模型输出可见，参数 **ρ（rho）**的后验分布均值约为 **0.635**，标准差为 **0.047**，95% 的后验置信区间范围为 **0.53–0.71**。这个参数衡量的是在剔除环境变量、基质类型以及随机效应之后，**群落中物种间残差相关性的总体强度**。

在统计意义上，ρ 的取值范围通常在 0–1 之间，数值越大代表残差层面上物种的共变程度越强，也就是说，它反映的是“在控制环境之后，物种仍然一起变化的倾向”。在本研究中，ρ ≈ 0.63 属于**中等偏高水平的相关性**，说明尽管环境梯度（温度、pH、水分等）已经解释了群落结构的大部分变异，但**物种之间仍然存在明显的残余协同或互作信号**。

如果 ρ 接近 0，说明群落中的物种在控制环境后几乎独立变化，生态过程以“独立响应型”为主；而 ρ 接近 1 则意味着强烈的共变或潜在互作网络。在本数据中，ρ≈0.63 表明苔藓群落**既非完全独立，也非完全互锁**，呈现出一种典型的“部分耦合系统”状态。

该结果说明，在控制环境与基质影响后，苔藓群落中物种仍保留一定程度的残差共变，反映出潜在的生态协同或微环境效应。这提示研究者在解释群落结构时，除了关注宏观环境因素外，还应重视微尺度生境条件与生物相互作用在苔藓分布格局中的作用。换句话说，环境解释了大方向，而 ρ≈0.63 告诉我们：**在环境之外，苔藓们之间依然有“生态上的默契”。**

小结

本章的分析旨在揭示苔藓群落中**环境与性状以外的生态结构**。通过 Hmsc 的残差相关分析，我们在控制环境梯度、基质类型及随机效应后，量化了物种间的残差共变关系；进一步通过参数**ρ（rho）**的后验分布，评估了整个群落在残差层面的总体相关强度。在苔藓数据中，残差网络呈现出若干较为稳定的**正向关联团簇**，这表明部分物种之间可能存在**功能协同或微环境共享**，即它们倾向于在相似的微生境中共同出现。这类正相关可能由生理互补（如保湿性物种改善邻近湿度条件）或空间聚集（如孢子扩散导致的局部高密度）引起。同时，也观察到少量**负相关关系**，暗示在某些微斑块内，功能相似或生态位重叠的物种之间可能存在**局部竞争与优先占据效应**。这些结果与前一章的 Beta/Gamma 分析形成互补：**Beta 与 Gamma** 模型揭示了物种对环境梯度响应的差异，以及这种差异如何被性状特征所调节；**残差网络与 ρ 参数** 则揭示了在控制这些显式因素之后，群落中仍存在的内在关联结构，反映出微环境、空间或相互作用等隐性过程。通过这种“分层解释”的建模框架，我们不仅能够回答“环境如何决定苔藓的分布”，也能进一步探讨“在相同环境下，苔藓们为何仍以这样的方式共存”。

九、环境梯度响应（以 soil_pH_z 与 temp_z 为例；修正版）

在前述章节中，我们已经在参数层面（Beta、Gamma）理解了苔藓群落对环境与基质的平均响应规律，以及性状对这些环境效应的调制机制。本章的目标是将这种抽象的参数认知转化为直观的生态曲线：在保持其他变量恒定的前提下，沿单一环境梯度连续变化，计算多物种或单物种的预测响应，并以曲线形式展示其生态位特征。

这一部分相当于把“模型中的系数”还原成“生态梯度上的反应”，帮助我们回答诸如“pH 升高时哪些物种丰度上升或下降？”、“温度变化的最适区在哪里？”等问题。对于苔藓群落而言，温度、降水、土壤 pH 和钙含量共同决定了其微环境中的水分保持、渗透压调节与离子平衡，而基质类型则控制了微尺度保水能力与孔隙结构。因此，在固定基质和其它环境变量为对照的条件下考察单一环境梯度，能够更清晰地展现各物种的生态响应曲线与最适区范围。

9.1 以 soil_pH_z 为焦点构造梯度：定义“谁变、谁不变”

梯度预测的关键在于只让一个变量变化，其余变量固定。我们希望考察 pH 变化对苔藓群落的独立影响，因此让 soil_pH_z 沿其观测范围平滑变化，而将其余环境因子固定在常见水平。下面的代码使用 constructGradient() 函数生成一组新的样点：soil_pH_z 取整个数据的范围；substrate 固定为 soil（水稳性中等、离子条件居中），其他连续变量固定为其样本均值。

```
Grad <- constructGradient(
  mod,
  focalVariable = "soil_pH_z",   # 1) 指定要沿着哪个变量画梯度曲线
  non.focalVariables = list(     # 2) 其他变量如何固定（给出对照设置）
    "substrate" = list(2, "soil"),#   a) 因子型变量可用“水平索引”或“水平名”
    "temp_z"    = mean(Xdat$temp_z),    #   b) 连续变量固定为样本均值
    "precip_z"  = mean(Xdat$precip_z),
    "soil_Ca_z" = mean(Xdat$soil_Ca_z)
  )
)
```

这样构造出的 Grad$XDataNew、Grad$studyDesignNew 与 Grad$rLNew 即为后续预测的输入数据集。

生态学意义在于：苔藓对 pH 的响应通常呈现“最适区”格局。过酸会影响细胞膜稳定性与离子吸收，过碱则可能破坏质外体水层的张力并影响代谢平衡。如果同时让温度、降水等变量共同变化，响应曲线将混入多重梯度效应，难以归因。因此，保持非焦点变量在“典型背景水平”是模拟单轴生态响应的基本控制思路。这种方法类似于实验生态学中的“单因素分析”，能让我们纯粹地看到 pH 对群落结构或单个物种的独立作用。

9.2 再构造一个以 temp_z 为焦点的梯度：对比另一条关键轴

为了比较不同环境轴的作用方式，我们再构造一个温度梯度。与上一节相同，我们固定基质在 soil，并保持其他环境变量不变，使温度成为唯一变化因子：

```
Grad1 <- constructGradient(
  mod,
  focalVariable      = "temp_z",          # 1) 此处改为温度作为焦点变量
  non.focalVariables = list(
    "substrate" = list(2, "soil")         # 2) 同上，固定因子为 soil（建议仅用 "soil"）
  )
)
```

这种设定的目的，是观察在相同基质和平均环境背景下，温度变化如何影响物种响应。由于模型中包含了 substrate 的主效应及可能的交互项（例如 temp_z:substrate），不同基质下的温度响应曲线形状可能显著不同。如果研究重点在于同一物种在不同基质上的温度最适范围或生态宽度，可将 substrate 参数依次改为 "rock", "bark", "peat" 等水平，并重复构造梯度，以获得多条对应曲线进行比较。这种跨基质对比在苔藓生态学中十分常见，因为不同基质（如岩石、树皮、泥炭）在保湿性、热惯性与离子通透性方面差异显著，直接影响物种对温度变化的响应强度与最适区宽度。

9.3 在新数据上做预测：从参数走向曲线

构造好梯度样点后，使用 predict() 函数对新样点进行预测，即可得到沿梯度的期望响应值。这里我们选择 expected = TRUE，表示输出为后验均值层面的期望值，从而更稳健、平滑地反映总体趋势：

```
pY1 <- predict(
  mod,
  XData       = Grad1$XDataNew,    # 1) constructGradient 生成的新 X
  studyDesign = Grad1$studyDesignNew, # 2) 与之配套的研究设计
  ranLevels   = Grad1$rLNew,       # 3) 与之配套的随机效应结构
  expected    = TRUE               # 4) 返回期望值（均值）而非逐样本矩阵
)
```

期望值（expected=TRUE）强调平均响应；如需**不确定性带**，可不设 expected，保留样本矩阵再按列计算分位数（本教程聚焦流程演示，故选更简洁的期望值）。

对 Gaussian 族，pY1 是“连续响应”的预测值；若想看“相对组成”意义下的曲线，需要额外标准化（见 9.6）。

这种做法得到的是连续响应（Gaussian 族）下的期望丰度或适宜度，适合本例中模拟的苔藓覆盖度数据。如果希望加入不确定性区间，可以去掉 expected 参数，保留整个后验样本矩阵，再计算列分位数（如 2.5% 与 97.5%），以绘制置信带。但在教学或演示阶段，期望曲线已经足以揭示主要生态趋势。

需要注意的是，在 Gaussian 模型下，预测值代表“绝对响应”；若研究目标是探讨相对组成（composition）的变化，即群落内部的相对权重分布，可在预测后再做标准化或比例化处理，这部分将在第 9.6 节详细说明。

9.4 梯度图（measure="S"）：群落组合指标（更适用于离散族）

plotGradient() 函数提供了多种可视化选项，其中 measure = "S" 用于计算和展示群落层面的组合度量，反映群落整体在环境梯度上的变化趋势。这种指标更适用于离散分布族（如 probit、poisson 等），因为它基于概率或归一化的预测值构建。

```
plotGradient(
  mod, Grad1, pred = pY1,
  measure  = "S",         # 1) S=群落层面的组合指标（依赖概率/softmax 的定义）
  showData = TRUE         # 2) 在背景上叠加原始数据（若可用）
)
```

在该图中，曲线可以理解为“沿温度梯度，群落整体结构如何变化”。对于苔藓系统，这条曲线混合了所有物种的偏好，展示的是群落在升温或降温过程中的整体倾向。例如，如果曲线随温度升高逐渐上升，意味着群落组成偏向“暖适型”组合；反之则表示群落整体更偏向“冷适型”或高湿适应策略。

但需要指出的是，在连续响应族（Gaussian）中，measure = "S" 的计算依赖内部标准化方式，因此其生态解释略为间接，通常不如单物种曲线（measure = "Y"）直观。若主要关注各物种自身的响应格局与最适区范围，建议使用下一节的单物种梯度可视化方法进行分析。




图 9-1. 苔藓群落沿温度梯度的总体响应曲线（measure = “S”）。图中展示了在控制基质类型（固定为 *soil*）及其他环境变量（降水、pH、Ca 等）后，苔藓群落沿标准化温度梯度（*temp_z*）的**综合响应格局**。黑色实线表示群落层面的预测均值，蓝色阴影为 95% 的后验不确定区间，灰点为原始样点在该梯度下的观测响应。顶部标注的概率 *Pr[pred(temp_z = min) > pred(temp_z = max)] = 1.00* 表示：在 100% 的后验样本中，低温条件下的预测响应显著高于高温条件，说明模型对“群落在极端高温下显著下降”的结论具有极强的统计支持。

图中呈现出典型的**单峰型（二次曲线）关系**：苔藓群落在中等温度条件下表现出最高的总体响应（即物种组合的“综合适宜度”），而在温度过低或过高时均显著下降。这一格局说明苔藓群落具有明显的**温度最适区**，与前述 Beta 模型中温度二次项（I(temp_z^2)）的显著性结果一致。

从生态学角度来看，这种格局反映了苔藓群落在能量与水分平衡上的“双重约束”。**在低温端（temp_z < -1）**：代谢速率下降、光合作用受限、冻融频繁导致细胞膜结构受损，从而降低了群落整体的活性与覆盖度；**在高温端（temp_z > 2）**：蒸散增强、表面干燥加速，使得苔藓无法维持稳定的水膜，造成脱水胁迫与光抑制；**在中间温度区间**，既能维持光合速率又有足够的水分平衡，因此多数物种在此区间达到最大适宜度，形成群落层面的“温度最适峰”。

这种曲线的形态还意味着**苔藓群落结构对温度波动高度敏感**：一旦气候升温超过临界点，群落可能整体退化而非逐步适应。对于生态管理而言，这一结果强调了**中温湿润环境对苔藓多样性**

维持的重要性。未来若气候持续变暖，该系统可能出现群落收缩、组成简化或向耐热、保水性强的物种群落转变。

9.5 梯度图（measure="Y"）：单物种的期望响应（Gaussian 推荐）

对于 Gaussian 分布族，最稳健且直观的方式是绘制单物种的期望响应曲线，即直接展示后验期望 E[Y]随环境梯度的变化。

在 plotGradient() 中，通过设置 measure = "Y"，我们可以得到每个物种沿环境变量变化的预测曲线。参数 index 用于指定绘制的物种列号（或通过循环绘制所有物种）。

```
plotGradient(
  mod, Grad1, pred = pY1,
  measure  = "Y",         # 1) Y=直接画响应（期望值），最直观且稳健
  index    = 1,           # 2) 选择第 1 个物种；可循环 index=1:ncol(Y) 批量绘制
  showData = TRUE
)
```

纵轴表示某物种的期望响应，可视为其相对丰度或优势度的连续 proxy；横轴为温度梯度（标准化 z 值）。若曲线随温度上升呈现“先增后降”的单峰形态，说明该物种存在明显的温度最适区，这与模型中温度二次项的负系数一致；若曲线在高温端持续上升，则说明该物种倾向于暖适型（thermophilic）分布。通过改变 substrate 的取值（如 soil、rock、bark、peat），可以进一步比较同一物种在不同基质上的温度响应曲线，从而揭示基质条件对其最适温度范围的调节作用。例如，在保水能力较强的泥炭基质上，温度最适区可能更宽，反映了基质对环境胁迫的缓冲效应。




图 9-2. 代表物种 *sp_013* 沿温度梯度的响应曲线（measure = "Y"）。图中展示了在控制基质类型（固定为 *soil*）及其他环境变量（pH、Ca、降水等）后，苔藓物种 *sp_013* 沿标准化温度梯度（*temp_z*）的预测响应。黑色实线为模型预测的后验均值，蓝色阴影表示 95% 的后验不确定区间，灰点为该物种在原始样点中的观测值。顶部标注的 *Pr[pred(temp_z = min) < pred(temp_z = max)] = 0.95* 表明，在 95% 的后验样本中，高温条件下的预测值高于低温条件，说明该物种对温度上升呈显著的正向响应趋势。

该图反映出 *sp_013* 对温度的响应呈明显的**单峰型非线性关系**。物种在低温条件（*temp_z* < -1）下响应较低，随温度升高而逐渐增加，并在中等温度区间（*temp_z* ≈ 0–1）达到峰值，随后在高温端（*temp_z* > 2）略有下降。这说明该物种最适生长温度位于群落温度梯度的中高值范围，表现为典型的"中温偏暖型"生态位。

从生态机制上看，苔藓作为无维管植物，其代谢和生长速度对温度极为敏感。*sp_013* 的这种响应格局可能与其**光合酶系统的温度最适**以及**水分保持能力**相关：在低温时，细胞代谢受限、光合作用速率下降，导致生长缓慢；随温度升高，代谢与蒸发速率同步上升，促进了生理活动与孢子萌发；但在高温端，水分蒸散增强、组织脱水风险上升，使其生理活性开始下降。

因此，这种曲线体现了典型的"温度-水分平衡"约束：物种在适中温度下达到最佳生理状态，而极端高温或低温都会造成胁迫。这一格局与 Hmsc 模型中温度二次项（I(temp_z^2)) 的显著性一

致，也与群落层面（图 9-1）的总体单峰趋势相吻合，说明该物种的温度响应与群落整体格局具有一致性。

9.6 梯度图（measure="T"）：群落加权性状（CWM）的稳健画法

measure = "T" 的设定用于展示沿环境梯度的群落加权性状（Community Weighted Mean, CWM）变化。该指标反映了群落在不同环境条件下的功能性状结构如何转变，即“哪类功能策略的物种在当前环境中占据主导”。在离散分布族（如二项或泊松模型）下，Hmsc 会自动将物种响应标准化为相对组成并加权计算 CWM；但在 Gaussian 模型中，这一过程可能出现数值不稳定。为确保结果稳健，可以采用手动计算的方式：先将预测矩阵 pY1 中的负值截断为零，再按行归一化为相对丰度权重矩阵 W，最后将其左乘物种性状矩阵，得到每个样点的加权平均性状值（CWM），再绘制随梯度变化的曲线。

```
plotGradient(
  mod, Grad1, pred = pY1,
  measure  = "T",         # 1) T=基于预测的物种组成/丰度，计算群落加权性状
  index    = 2,           # 2) 选择第 2 个性状（如 "spore_size"）进行展示
  showData = TRUE
)
```

如果群落加权平均的持水性（CWM(WHC)）随温度或降水上升而增加，说明群落整体正向偏移至高持水性物种，符合苔藓在湿润环境下的功能策略；若加权孢子大小（CWM(spore_size)）随 pH 上升而增大，则说明碱性基质有利于大孢子物种的建立，这可能与基质的缓冲能力和孔隙结构有关。




图 9-3. 苔藓群落加权平均茎高（shoot_height）沿温度梯度的变化趋势（measure = "T"）。该图展示了在控制基质类型（固定为 *soil*）及其他环境变量（pH、Ca、降水等）后，苔藓群落的加权平均茎高（CWM shoot height）随温度标准化梯度（*temp_z*）的预测变化。黑色实线为模型预测的后验均值，蓝色阴影为 95% 后验不确定区间，灰点为原始样点的观测数据。顶部的概率标注 *Pr[pred(temp_z = min) > pred(temp_z = max)] = 0.90* 表明，在 90% 的后验样本中，低温条件下群落的平均茎高高于高温条件，提示随着温度升高，苔藓群落的平均茎高有较高概率呈下降趋势。

图 9-3 反映了苔藓群落在功能性状层面的温度响应特征：随温度升高，群落的平均茎高（即由物种丰度加权的 shoot height）在中等温度范围略有上升，但在高温端明显下降，表现出**单峰型或偏负向的非线性趋势**。这表明苔藓群落在较冷或适中温度下倾向于由茎体较高的物种占据主导，而在高温条件下，群落逐渐转向以**茎体较矮、贴地生的物种**为主。

从生态机制角度，这种格局具有明确的功能学意义：**在中低温条件下**，环境湿度较高、蒸散压力较小，较高的茎体有利于扩大光合面积与拦截降水，使群落更具立体性与光资源竞争力；**随着温度升高**，水分蒸散增强、表层干燥时间延长，茎高较大的个体更易失水，因此群落结构向低矮、贴地、保水性更强的苔藓种类偏移；这种变化体现出典型的**功能性状过滤效应（trait filtering）**：在高温干燥的胁迫环境中，保水性与抗热性成为主要筛选因子，导致群落平均茎高下降。

此外，曲线在中温区间（*temp_z* ≈ 0）略微上升后下降，说明群落中存在一定的“**生理最适区**”——此时环境兼顾了光照与水分平衡，既支持直立型苔藓的生长，也未对其造成脱水胁迫。整体趋势与前文 Beta/Gamma 模型中“温度与形态性状（如叶厚、持水能力）”之间的关联结果一致：温度梯度不仅直接影响物种分布，也间接重塑了群落的功能结构。

小结

本章将模型的参数结果转化为直观的生态响应曲线，展示了在固定背景下，苔藓群落及其物种如何沿单一环境轴（如 pH 或温度）表现出不同的响应格局。单物种的梯度曲线揭示了温度与 pH 的最适区及基质对响应形态的调节效应，与前文 Beta 模型中的二次项和交互项结果相互印证；而群落加权性状（CWM）曲线进一步表明，随着环境变化，群落功能组成会逐渐偏向特定性状组合（如更高的持水性、特定孢子大小或更矮的形态结构）。这种从“参数—预测—功能”三层递进的分析框架，使我们不仅能明确哪些环境因素影响苔藓群落，还能阐释这些因素在何种范围、以何种方式作用于物种和功能特征，从而将统计结果转化为生态学上具有解释力的结论。

十、模型误设的代价：去掉基质（substrate）后会发生什么？

到目前为止，我们的所有分析都是在“正确设定”的前提下进行的：固定效应中包含基质（substrate）与四个连续环境变量，性状进入层级结构，站点作为随机层参与建模。这一章的目的，是通过一个有意的“错误建模实验”展示模型误设的后果。我们将故意从固定效应中移除基质变量，探讨遗漏关键生态因子会如何放大并扭曲残差相关，从而将“未建模的环境差异”误解为“物种共现或相互作用”。

在苔藓群落中，**基质类型（岩石、土壤、树皮、泥炭）是环境过滤的首要层次**，直接影响苔藓的定殖与生长。不同基质在水分保持、孔隙结构、表面化学性质和微粗糙度方面差异显著。岩石表面易干燥、离子交换快；土壤具有中等保水性和营养供给；树皮表层酸度高、蒸发快；泥炭则提供极高的持水与有机质背景。若在模型中省略这一变量，那么原本由基质差异解释的群落变异将被迫“流入”残差项，使残差矩阵出现大量系统性共变。这种伪相关会表现为“物种间正相关或负相关增强”，但实质上反映的只是它们共同偏好某种基质环境，而非真实的生态互作。

10.1 构建“无 substrate”的 Hmsc 模型：只让错误发生在一个位置

为了清晰地展示“误设的代价”，我们保持模型的其他结构完全一致，仅在固定效应部分移除基质项。这样可以确保后续观察到的差异仅源自“基质被删除”这一因素，而非其他模型设定或采样参数的变化。

```
mod_noSub <- Hmsc(
  Y = Y, XData = Xdat,
  XFormula = ~ temp_z + precip_z + soil_pH_z + soil_Ca_z +
    I(temp_z^2) + I(soil_pH_z^2) + temp_z:soil_pH_z,  # 1) 故意不含 substrate
  TrData = Trdat, TrFormula = form_Tr,                # 2) 仍保留性状层级
  phyloTree = phylo_tree, studyDesign = design, ranLevels = list(sample = rL)
)
```

参数说明如下：

- **Y = Y**：站点 × 物种的响应矩阵（连续型，高斯分布），代表物种丰度或覆盖度。
- **XData = Xdat**：自变量数据框，虽然仍包含 substrate 列，但在公式中不再使用。
- **XFormula = ~ ...**：仅包含四个连续环境因子（温度、降水、pH、钙含量）及其二次项和交互项，有意排除基质项，这即是“误设”的核心。
- **TrData / TrFormula**：性状层级保持不变，确保性状仍可解释物种间系数差异，从而避免误将差异误归为“缺乏性状层”。
- **phyloTree**：系统发育树不变，用于维持物种间的系统发育相关结构。
- **studyDesign 与 ranLevels = list(sample = rL)**：站点随机效应保持一致，以吸收非观测到的空间异质性。

从生态角度来看，这相当于假设不同基质上的样点在生态条件上是同质的，也就是“忽视生境类型”。结果是，原本属于基质效应的解释部分将被动转移到性状层级、随机层或残差项中去，导致模型内部出现错误的结构性依赖。这种人为的省略有助于揭示一个重要的事实：在多物种分布建模中，**遗漏关键环境轴不仅会降低拟合精度，还可能制造虚假的共现格局，使模型错误地推断出不存在的“物种相互作用”。**

10.2 采样策略与“正确模型”一致：保证可比性

为了确保比较具有统计公平性，我们沿用第 4 章中设定的采样策略与 MCMC 参数，包括 thin、samples、burn-in 与链数。这样做的目的是保证两组模型（含 substrate 与无 substrate）在采样效率、后验分布规模和链稳定性上具有可比性，从而确保后续差异仅由模型设定引起，而非技术性因素。

```
mod_noSub <- sampleMcmc(
  mod_noSub,
  thin = thin, samples = n_samp, transient = burn,
  nChains = n_ch, nParallel = n_ch, verbose = 0
)
```

说明如下：

- **phyloTree 与 ranLevels**：完全保持一致，以避免随机层差异影响结果。
- **thin、samples、transient、nChains**：与“正确模型”完全相同，确保链的长度与采样深度一致。
- **nParallel = n_ch**：并行计算与链数相等，提高采样效率。
- **verbose = 0**：静默模式，减少控制台输出，保持日志简洁。

通过严格控制采样与模型结构的一致性，我们就能确保后续对比具有清晰的因果解释：任何残差矩阵中出现的“相关增强”或“网络密度增加”都可以被明确归因于**基质项被遗漏**，而非链的不稳定或随机误差的累积。这是理解“模型误设代价”的关键条件。

10.3 提取误设模型的残差关联矩阵

在这个 “无 substrate”的模型中，我们依然可以调用 computeAssociations() 计算物种间的残差相关矩阵。其逻辑与第 8 章完全相同：在控制固定效应（现仅含连续环境变量）与随机效应后，估计物种之间剩余的共变结构。

```
Om2 <- computeAssociations(mod_noSub)[[1]]
```

这里 [[1]] 通常指主要的残差块，包含两个核心矩阵：

- Om2$mean：物种 × 物种 的残差相关后验均值（表示平均的共变强度）；

- Om2$support：方向支持度矩阵，即每个相关系数为正或负的概率强度。

这一步得到的残差矩阵显示了在仅控制连续环境变量和性状后，物种间仍表现出的共现格局。然而，此时残差中混入了大量本应由基质解释的变异。换言之，这些残差相关并非真正的生物互作，而是被遗漏的环境异质性在残差中的“投影”。

例如，在真实生态系统中，偏好泥炭的高持水性苔藓与偏好岩石的耐旱种往往不会在同一基质共存。但在误设模型中，由于基质效应被忽略，它们在“相似环境但不同基质”的站点上被误判为“互斥”关系；反之，共同偏好湿润基质的物种可能被模型误认为存在“正向协同”。因此，误设模型的残差网络往往表现为伪共现团簇的增加与相关强度的夸大。

这表明，在多物种生态建模中，遗漏关键环境因子不仅会削弱模型的生态解释力，还会通过残差结构制造虚假的生物学信号，从而在后续的生态推断中产生系统性偏差。

10.4 筛选方向稳定的残差关系（用支持度阈值遮罩）

为了确保残差网络只呈现方向一致且后验把握度高的边，我们继续采用与前文一致的支持度阈值 level = 0.95。做法是对残差相关的后验均值矩阵与方向支持度矩阵进行逐元素筛选：高概率的正相关保留为正值，高概率的负相关保留为负值，其余置为 0。这样处理可以有效抑制由抽样波动带来的不稳定信号，使可视化更接近“模型在环境与随机层已控制之后、仍有统计把握的物种共变”。在代码中，直接应用前文的工具函数即可：

```
M2  <- sym_support_matrix(Om2$mean, Om2$support, level = lev)  # lev = 0.95
```

此处的规则可概括为：当支持度大于 0.95 时保留正相关，当支持度小于 0.05 时保留负相关，介于两者之间的条目一律置零。处理后的 M2 仍为对称矩阵，但只包含方向稳定的非零元素，后续可直接用于网络图或相关热图的绘制。对苔藓数据而言，这一步的意义在于：在已故意遗漏基质的前提下，尽可能减少由后验不确定性引起的“假阳性”边，让我们更清楚地观察遗漏关键协变量将如何系统性地放大残差相关结构。

10.5 可视化：遗漏 substrate 时的残差关联变成什么样

将筛选后的矩阵 M2 以相关热图方式呈现，可以直观看到“去掉基质”对残差网络形态的影响。与第 8 章（含基质的正确模型）并排比较时，常见的现象是色块数量显著增加、颜色更深、并形成一到多个块状团簇。在苔藓系统中，这些团簇往往对应对同类基质具有相似偏好的物种群，而非真实的强互作结构。绘图示例如下：

```
corrplot(
  M2, method = "color",
  col = viridis(200), tl.cex = .55, tl.col = "black",
  title = "Residual (missing substrate)", mar = c(0,0,1.2,0)
)
```




图 10.1 遗漏基质变量（substrate）后的残差关联矩阵（Residual correlation matrix under the missing-substrate model）。图中展示了在从 Hmsc 模型中去除基质变量（substrate）后，物种间残差层面的相关结构。颜色表示残差相关系数的方向与强度：**黄色代表正相关（共现趋势），紫色代表负相关（互斥趋势），绿色为接近零的中性关系**。矩阵的行与列均为物种（sp_编号），主对角线为 1。图标题 “Residual (missing substrate)” 指示该结果来源于误设模型（即未包含基质效应的版本）。

当与第 8 章（包含 substrate 的正确模型）结果并排比较时，可以清晰地看到：该图中出现了**大量新增且更深的色块**，并形成若干**块状团簇（cluster）**。这说明残差层面的“物种共变”显著增强，表面上似乎暗示物种之间存在更强的共现或互斥关系，但这种结构变化实际上是**统计上的虚假膨胀**。

这种图像格局背后的机制可以归结为**三个层面的统计与生态学原因**。首先，是典型的**遗漏变量偏差（omitted variable bias）**。当模型中删除了基质（substrate）这一关键环境分组因子，原本应由它解释的群落结构被迫落入残差部分。结果，残差相关系数在数值上被“抬高”，表现为更多显著的正负关系。这些信号并不代表真实的物种互作，而是模型缺乏重要协变量所造成的**伪相关（spurious correlation）**。换言之，模型错误地让残差承担了本应属于环境层的结构信息。

其次，图中出现的大块黄色团簇实际上并非“物种协同作用”的证据，而是“基质同质群”的统计投影。这些团块往往对应偏好相似基质类型的一组苔藓物种，例如喜欢泥炭或树皮的种群被模型视为“经常共现”，而岩石型物种则在另一片区域形成聚团。这样的共现格局源自**生态位相似性（shared habitat preference）**，并非生物间促进或共生协同。由于 substrate 被移除，模型无法识别这些群落差异的环境基础，只能将其误解为“残差正相关”。

最后，图中某些明显的紫色条带代表了**虚假的负相关**。这些负相关大多出现在空间上互不重叠的物种群之间，如岩石型与泥炭型苔藓群。它们的互斥实质上是环境隔离（environmental segregation）的体现，而非竞争或排斥。当基质信息缺失时，模型错误地将这种生态位分化转化为“残差层面的互斥关系”。

因此，这张图直观地说明了**遗漏关键环境因子会严重扭曲残差网络的生态解释**。在苔藓群落中，基质（substrate）决定了微环境的保水性、养分供应和物理附着条件，是决定群落分化的主轴。当模型中去掉 substrate，系统性环境结构就被错误归入残差，导致“残差共现网络”虚高，看起来似乎物种间强烈互作。

从科学角度来看，这一结果清楚地提醒我们：**残差网络不能被直接解释为物种相互作用的证据**。只有当模型中充分控制了关键环境变量（如基质类型、pH、水分等）后，残差层面所揭示的关联才可能反映真正的生物间过程。否则，残差相关中看似显著的共现或互斥，很可能只是环境异质性未被建模的统计投影。此外，这也强调了**模型完备性是生态解释可信度的前提条件**。对于苔藓群落这样对微环境极度敏感的系统而言，若遗漏了像基质这样的高层次过滤因子，模型将不可避免地把环境结构误判为物种间相互作用，从而在机制层面产生错误推断。

小结

本章以去掉基质的对照实验清楚展示了模型误设的代价。在苔藓数据中，基质是环境过滤的首要层次，决定微环境的保水性、孔隙结构和表面化学性质，也是物种生态位的重要投影轴。一旦在固定效应中遗漏，原本由基质解释的结构性变异会被挤入残差，导致残差相关显著膨胀，残差网络看似“热闹”，却难以反映真实的生物过程。结论是明确的：先把关键环境轴建模清楚，再谈残差网络的生态含义。对苔藓这种对微环境高度敏感的类群，这条原则尤为严格。只有在环境与生境因素得到充分控制之后，残差中仍然稳健、方向一致、把握度高的边，才更可能代表细尺度互作、未观测微环境或扩散限制等过程。通过这一“误设演示”，我们为后续的网络解读树立了方法学底线，也为苔藓群落的机制阐释提供了更可靠的证据框架。

十一、性状误设的影响：仅保留茎高（shoot_height）后的推断偏移？

在 trait-based 的 Hmsc 框架中，Gamma 层用于利用物种性状解释 Beta（物种 × 环境响应系数）在物种间的差异，其核心作用在于将“物种对同一环境梯度的不同响应”约束在可解释的功能机制之下。当性状能够真实反映物种的关键生态策略时，Gamma 层不仅提高了模型的生态可解释性（ecological interpretability），也增强了模型在新环境中的可转移性（predictive generality）。

本章通过一个有意设计的**性状误设实验**，考察当性状信息被严重简化时，trait-based 推断将偏向何处。具体而言，我们在性状公式中**去除了除茎高（shoot_height）之外的所有性状**，即移除了持水能力（WHC）、孢子大小（spore_size）和叶厚（leaf_thickness），仅保留一个结构性性状，用以模拟“性状信息极度不完整或仅包含易获取形态指标”的常见情形。

对于苔藓而言，WHC、叶厚与孢子大小直接关联水分保持、再水化能力、扩散策略和微环境适应性，是决定其沿温度、降水、基质湿度和泥炭有机质梯度分布的关键功能性状。相比之下，茎高更多反映的是空间竞争或光截获能力，对水分胁迫和湿度波动的直接指示作用有限。因此，仅保留 shoot_height 相当于使模型在性状层面**失去对苔藓水分生态策略的有效刻画**。

基于这一设定，我们预期：当 Gamma 层仅能利用茎高这一单一、功能指向性较弱的性状时，其对 Beta 差异的约束能力将显著下降。原本由多维性状共同解释的“物种—环境响应差异”，将无法在性状层面被有效吸收，而会被动地转移到环境固定效应、随机效应或残差结构中。统计上，这种偏移表现为 Gamma 层信息量下降、trait-mediated pooling 明显减弱；在结果上，则体现为方差划分中环境变量解释度的表观上升。

11.1 构建“仅保留 shoot_height”的误设模型

为确保推断偏移能够明确归因于性状信息的缺失，本实验仅在性状公式层面进行修改，其余模型结构保持与主模型完全一致。具体而言，我们保留相同的响应矩阵（Y）、固定效应结构（form_X）、系统发育树与随机层设置，仅将性状公式简化为单一性状：

```
mod_only <- Hmsc(
  Y = Y, XData = Xdat, XFormula = form_X,                # 固定效应不变
  TrData = Trdat,                                        # 数据框仍含 whc 列
  TrFormula = ~ shoot_height,                            # 仅保留茎高
  phyloTree = phylo_tree, studyDesign = design, ranLevels = list(sample = rL)
)
```

需要强调的是，虽然 TrData 中仍包含 WHC、叶厚和孢子大小等变量，但它们不再参与 Gamma 层建模。这一设定等价于让模型在统计上“只知道物种的高度差异”，而对其水分调节、组织结构与扩散策略保持盲视。

11.2 采样设置与主模型一致：只让“性状信息”变化

为保证不同模型结果的可比性，我们严格沿用主模型的 MCMC 采样设置，包括链数、采样长度、稀释间隔和烧入期：

```
mod_ only <- sampleMcmc(
  mod_only,
  thin = thin, samples = n_ samp, transient = burn,
  nChains = n_ch, nParallel = n_ch, verbose = 0
)
```

在采样诊断中可以观察到，与完整性状模型相比，仅保留 shoot_height 的模型在 Gamma 层参数上通常表现出较低的有效样本量（ESS），部分参数的 PSRF 也略有升高。这表明当性状维度被极度压缩后，模型在性状层面对 Beta 差异的可辨识性下降，后验分布更依赖于数据本身而非性状约束。

11.3 方差划分：性状缺失将如何“改写解释权分配”？

为了定量评估性状缺失对模型解释结构的影响，我们使用与主模型相同的分组方案进行方差划分（variance partitioning），并对比“完整性状”与“仅保留茎高”两种情形下的结果。无论你在前面第 6 步采用的是“两大板块划分”（如 substrate vs env4）还是细粒度按每个预测变量分组，这里都应保持一致，以确保对比的科学性。

```
VP_only <- computeVariancePartitioning(
  mod_only,
  group = grp_id, groupnames = grp_lab   # 1) 使用与先前相同的分组方案，便于对照
)
```

在仅保留茎高（shoot_height）作为唯一性状的模型中，群落方差的分配结构发生了系统性变化。与包含完整功能性状的模型相比，连续环境变量（如温度、降水及其非线性项）在多数物种中的解释比例明显上升，而性状相关层级的贡献显著降低。这一变化表明，当性状信息被压缩为单一结构性指标时，Gamma 层对物种间环境响应差异的约束能力明显减弱，原本由性状介导的物种差异被重新分配至环境固定效应中。

这种方差重分配在物种层面表现为环境响应结构的趋同。不同苔藓物种在环境变量上的解释比例更加一致，物种间在环境响应上的功能分化被弱化。尽管模型仍能区分不同环境梯度下的出现格局，但其对“哪些物种以不同方式响应同一环境轴”的刻画能力明显下降，反映出仅依赖茎高不足以支撑 trait-based 的物种异质性建模。

与此同时，部分物种的随机层或残差解释比例有所增加，尤其是对湿度与基质条件高度敏感的物种。这表明在缺失关键功能性状的情况下，模型难以将物种差异归因于明确的生理或功能机

制，而只能将这部分变异归入未解释成分。尽管如此，整体模型拟合指标并未出现显著下降，说明性状误设并不会必然削弱模型的预测能力，但会显著改变不同解释层级之间的权重分配。

11.4 可视化与对照

最后，用与第 6 步完全相同的绘图方式展示方差划分结果，以量化仅保留茎高设定下各组解释度。

```
plotVariancePartitioning(mod_ only, VP = VP_only)
```




图 11.1 仅保留茎高后的方差划分结果（Variance partitioning）。该图展示了在仅保留茎高后，模型对各环境变量和基质因子的方差解释比例。每个竖条代表一个物种（sp_编号），不同颜色对应不同预测因子（predictor）的解释度贡献，纵轴为各因子对该物种拟合优度（R^2）的比例。图例中按平均贡献（mean）排列，可看到哪些因子在全体物种中解释力较强。

在仅保留茎高（shoot_height）作为唯一性状的模型中，苔藓群落的方差划分结构与包含完整性状的模型相比发生了明显变化（图 11.1 与图 6.2）。总体上，各物种的方差解释仍主要由连续环境变量及其非线性项所主导，但在仅保留茎高的情况下，环境变量在多数物种中的解释比例进一步提高，不同物种之间的方差划分结构趋于一致。相较之下，包含完整性状的模型中，不

同物种在环境变量、基质类型和残差层之间的解释比例差异更为明显，显示出更强的物种间异质性。

具体而言，在仅保留茎高的模型中，温度、降水及土壤 pH 相关项在各物种中的相对贡献分布更加集中，物种间环境响应的区分度降低。同时，基质类型（如泥炭、树皮和土壤）的解释比例在部分物种中出现下降或重新分配，而随机层与截距项的相对贡献略有增加。这表明在性状信息被简化后，模型对物种差异的解释更多依赖于环境固定效应和未解释成分。

相比之下，在包含完整性状的模型中，不同物种的方差划分结构更为多样，一些物种在特定环境变量或基质类型上的解释比例明显高于其他物种，反映出性状信息对物种环境响应差异具有更强的约束作用。总体来看，仅保留茎高并未显著改变模型对主要环境梯度的识别能力，但削弱了物种间方差分配的差异性，使群落结构在统计上表现得更加同质。

小结

本章通过仅保留茎高（shoot_height）的性状误设实验，系统检验了在性状信息极度简化的情况下，trait-based Hmsc 模型的推断偏移方向。结果表明，原本由多维功能性状共同解释的物种异质性，无法在性状层面被有效吸收，而被动地重新分配至环境固定效应、随机层及残差结构中。仅依赖茎高等结构性性状不足以支撑苔藓群落中基于性状的环境响应建模。关键功能性状的缺失不会简单导致“解释力下降”，而更常表现为解释来源的系统性转移，从而在保持拟合性能的同时削弱模型的生态机制指向性。这一发现强调，在 trait-based 群落建模中，性状选择本身是影响推断结果结构的关键环节。

十二、先验收缩如何塑造残差网络：调 a1/a2 看“信号—噪声”的边界

在 **Hmsc** 框架中，模型的层次结构不仅描述物种与环境的关系（固定效应），还包含一个或多个**随机层**。这些随机层通常代表采样点、空间单元或时间片段，用来**吸收那些未被显式建模的异质性**——也就是那些我们没测到、或没能放入固定效应的环境差异。与此同时，随机层还能**捕捉物种之间的残差共变（residual covariance）**，即“在控制已知环境和性状效应之后，物种响应仍然一起涨落的趋势”。

然而，这个“共变”不是无限制地自由估计的。为了防止模型在信息有限时过拟合，Hmsc 对随机层的共变矩阵设置了一个**先验收缩（prior shrinkage）机制**。其中的两个超参数 **a1** 和 **a2** 决定了收缩强度的大小：当 a1、a2 较小（收缩弱）时，模型更“宽松”，允许出现更多、更强的残差相关；当 a1、a2 较大（收缩强）时，模型更“保守”，倾向于把残差相关压向 0，使网络更稀疏。这种正则化机制相当于为模型加上一个“生态滤波器”：它既能防止虚假的相关泛滥，也可能在过度收缩时抹平真实信号。

在苔藓群落这种典型的**微环境依赖系统**中，这个平衡尤为关键。苔藓的生境往往受毫米—厘米尺度的湿度、基质质地与光照微差控制，导致物种之间可能在极小空间内共存或排斥。若固定效应设定不完整（例如我们在第 10 步中**刻意去掉了 substrate**），那么残差层会被迫吸收这些系统差异，从而产生看似“强烈”的物种共现信号——但它们可能只是**遗漏变量造成的伪相关**。

因此，本节在固定相同的固定效应结构（不含 substrate）的条件下，仅调整先验收缩参数 **a1/a2**，比较不同收缩强度下残差关联图的变化。通过这种方式，我们可以直观地看到：“统计收缩”如何在信号与噪声之间建立平衡，以及在生态学解释中，何时应当信任、何时应当质疑残差网络中的相关。

12.1 固定 X 公式：仅用四个连续环境及其二次/交互

为突出先验收缩强度对残差结构的影响，本节沿用第 10 章“去掉基质（substrate）”的设定，不在固定效应中加入基质变量，仅使用四个连续环境因子及其二次项与交互项作为解释变量：温度（temp_z）、降水（precip_z）、土壤 pH（soil_pH_z）和土壤钙（soil_Ca_z）。

```
bX <- ~ temp_z + precip_z + soil_pH_z + soil_Ca_z +
  I(temp_z^2) + I(soil_pH_z^2) + temp_z:soil_pH_z
```

这种设定有明确的生态学含义：当模型缺失了关键的环境分层（例如基质类型）时，许多由环境差异驱动的群落结构将被动转移到残差层中。因此，残差层的“活跃度”——即物种间残差相关的强度与数量——会显著增加。而先验收缩（prior shrinkage）在此时起到“抑制或放大”这些结构的关键作用：

- 当收缩较弱（先验较松）时，模型更容易保留这些隐含相关，导致残差网络更密集；
- 当收缩较强（先验较紧）时，模型倾向于将这些弱结构压向零，使残差矩阵更稀疏。

因此，本节的核心目标是通过控制收缩强度的参数，探索“在环境解释不足的情况下，先验约束如何塑造我们所看到的残差网络”。

12.2 构造不同收缩强度的随机层：把 a1 与 a2 设为同一个 a

接下来，为了系统比较不同收缩强度下的结果，我们编写一个小函数，用于生成具有指定先验参数 a 的随机层。这里将 a1 与 a2 设为相同的值（即 a1 = a2 = a），以避免因先验结构差异带来混杂效应。

```
mk_rL <- function(a){
  rl <- HmscRandomLevel(units = design$sample)  # 1) 与第 3 步相同的站点随机层
  setPriors(rl, a1 = a, a2 = a)                 # 2) 设置先验超参数：a1=a2=a
}
```

从统计直觉上讲，参数 a 的大小决定了先验对随机层相关性的约束强度：

- a 小（例如 5）表示先验松散，收缩弱，允许随机效应与残差相关具有较大方差；
- a 大（例如 500）表示先验收紧，收缩强，残差相关被强制集中于 0 附近。

在生态学语境下，这种设置与“正则化（regularization）”的思想一致：当收缩弱时，模型更容易将未解释的共变结构解释为“潜在生物互作”；当收缩强时，模型更倾向于压制这些结构，使残差网络更为保守。因此，通过改变 a 的取值，可以测试模型在“数据驱动”与“先验约束”之间的平衡。

12.3 在给定 a 下拟合模型并提取“方向稳定”的残差关联

我们进一步封装一个函数，在指定的 a 下拟合模型、采样参数，并提取物种间残差相关矩阵。流程与主模型一致，包括使用同样的采样长度、稀释间隔和链数，以确保结果可比。

```
fit_with_shrink <- function(a){
  rl <- mk_rL(a)   # 1) 随机层（携带 a1=a2=a 的先验）
  m  <- Hmsc(
    Y = Y, XData = Xdat, XFormula = bX,        # 2) 固定效应采用 bX
    TrData = Trdat, TrFormula = form_Tr,       # 3) 保留 trait 层（保持可比）
    phyloTree = phylo_tree, studyDesign = design,
    ranLevels = list(sample = rl)
  )
  m  <- sampleMcmc(
    m, thin = thin, samples = n_samp, transient = burn,
    nChains = n_ch, nParallel = n_ch, verbose = 0
  )                                            # 4) 采样参数沿用第 4 步
  O  <- computeAssociations(m)[[1]]                # 5) 残差关联（均值/支持度）
  list(
```

```
    a   = a,
    mat = sym_support_matrix(O$mean, O$support, level = 0.95)
  )                                        # 6) 用 95% 支持度筛选显著关联
}
```

在这一步，我们使用支持度阈值 level = 0.95 来筛选方向稳定的残差边，即仅保留后验概率高且符号一致的关联关系。这样处理的目的是剔除那些不稳定、方向反复的边，因为这些弱信号更可能源于抽样噪声或参数不可辨识性问题。

从生态学角度理解，这意味着我们仅关注**统计上稳健、方向明确的残差关系**——也就是那些即使在不同收缩强度下仍保持一致趋势的物种共变结构。

12.4 三档收缩强度：弱（a=5）、中（a=50）、强（a=500）

为了系统比较收缩效应，我们选择三个数量级的 a 值来代表不同强度的先验约束，并分别拟合模型与提取残差矩阵。

```
S5   <- fit_with_shrink(5)    # 收缩较弱 → 容易出现更多/更强的残差相关
S50  <- fit_with_shrink(50)   # 中等收缩
S500 <- fit_with_shrink(500)  # 收缩较强 → 相关被压向 0，更稀疏
```

在苔藓群落数据中，这三档模型的结果通常会呈现清晰的“从密到疏”的梯度变化：当 a = 5 时，残差矩阵中会出现大量高强度色块，且常形成明显的团簇结构；当 a = 50 时，相关性明显减少但仍存在若干稳定群组；当 a = 500 时，色块大幅减少，矩阵趋于稀疏。

这种现象并不意味着群落中真实的生态过程变弱，而是说明**先验收缩强度决定了统计上“能看到多少结构”**。在缺乏关键环境协变量（如基质）时，弱收缩容易“过度拟合”未建模环境异质性；而强收缩则起到“正则化”作用，使模型更保守、更贴近已解释的结构。

12.5 并排作图：用同一配色与阈值直观比较稀疏度

最后把三种收缩强度下的矩阵并排画出来。要求**同一阈值、同一配色、同一标签设置**，确保视觉上的公平可比。

```
op <- par(mfrow = c(1,3), mar = c(0,0,1.5,0))  # 1) 1 行 3 列子图，顶部留出标题空间
for (S in list(S5, S50, S500)){
  corrplot::corrplot(
    S$mat, is.corr = FALSE, method = "color",
    col = viridis::viridis(200), tl.cex = .5, tl.col = "black",
    title = paste0("a1=a2=", S$a), mar = c(0,0,1.5,0)
  )
}
par(op)
```




图 12.1 不同先验收缩强度（a_1=a_2=5、50、500）下的残差关联矩阵比较。该图展示了在相同固定效应设定（不含基质 *substrate*）下，分别使用三种先验收缩强度时（a_1=a_2=5、50、500）所得的苔藓物种残差关联结构。每个面板为一个物种 × 物种的对称矩阵，颜色表示残差相关的方向与强度：黄色代表正关联（物种在控制环境后仍趋于共现），紫色代表负关联（物种倾向于互斥），绿色接近零值表示无显著相关。

从左到右，随着 a_1=a_2 值的增大（即收缩强度增强），残差矩阵的结构显著变化。

（1）a_1=a_2=5（收缩弱）：左图显示大量色块分布，尤其在图的中央形成明显的块状团簇，意味着模型估计出了较多的物种间残差相关。这种情况虽然可能捕捉到一些真实的共存格局，但更多时候反映了**过度放松的先验导致噪声信号被误认为是生态相关**。对苔藓系统而言，这些“团簇”常对应栖于相似基质或湿度条件的物种群，它们的共现并非由直接互作驱动，而是由于未建模的基质效应（我们在此例中故意去掉的 *substrate*）所引起的**伪相关（spurious correlation）**。

（2）a_1=a_2=50（中等收缩）：中间图中的色块明显减少，但仍保留部分稳定的关联结构。这种情况代表一种**平衡状态**：模型在抑制噪声的同时仍保留了部分生态上合理的残差相关。这些较稳定的相关可能反映了苔藓群落中的**微环境共存格局**，例如不同物种对局部湿度或 pH 微差的协同响应，也可能指向**功能相似种的非独立分布趋势**。此时的网络密度适中，既不过度复杂，也未被过分平滑，通常是分析残差生态信号的合理区间。

（3）a_1=a_2=500（收缩强）：右图几乎只剩对角线和极少的散点色块，表明残差相关被强烈压缩至零，网络极度稀疏。这种“过度收缩”虽然避免了虚假相关，但也可能将真实的生态信号一并抹去。对苔藓而言，这意味着模型倾向于假设物种之间在控制环境与随机层后完全独立，忽略了在微环境层面上确实存在的共存、传播或竞争结构。

因此，这组三图共同展示了**先验收缩对生态网络推断的调节效应**：当收缩过弱时，模型会“幻觉式地看到”大量共现团簇；当收缩过强时，又会“听不见”真实的生物信号。因此，合适的收缩强度并非固定值，而应依据数据的信息量与模型结构确定。在本研究的苔藓群落中，中等收缩（a_1=a_2≈50）提供了较稳健的解释：残差相关既不泛滥，也能揭示出若干稳定的共存子群，这些格局可能代表**功能或微环境驱动的群落组织**，而非随机噪声或遗漏变量的投影。

本图强调了**模型正则化是生态推断可信度的重要保障**。在多物种共现建模中，残差网络能否被解释为生态过程的证据，取决于：固定效应是否充分捕捉主要环境梯度；性状层是否提供功能约束；以及收缩先验是否恰当地平衡信号与噪声。对于苔藓这类受微环境强烈调控的系统而言，过弱的收缩容易误把“基质同质群”误判为“共生网络”，而过强的收缩又会掩盖真实的微尺度关联。通过调整 a_1/a_2 并对比残差网络形态，我们能够量化这种不确定性，从而更稳健地解释群落的真实生态机制。

小结

本节以苔藓群落为研究案例，系统阐明了先验收缩参数（a1/a2）对残差关联网络的“显隐调控”作用。在固定效应未充分建模的情况下（例如去除基质 substrate），收缩强度直接决定了残差网络中相关结构的可见性与可信度。当收缩较弱时，模型更容易放大由遗漏变量导致的伪相关，使残差网络看似复杂且充满“互作”信号；这类结构往往反映未建模的环境差异，而非真实的物种共变。相反，当收缩较强时，先验约束能够有效抑制噪声和方向不稳定的弱边，提高残差矩阵的保守性与稳健性，但同时也存在将部分真实生态信号“过度平滑”或压制的风险。

在苔藓数据的应用中，这种平衡尤为关键。由于苔藓群落对微环境湿度、孔隙结构及保水性差异高度敏感，如果固定效应层未充分纳入这些关键变量，弱收缩模型会将环境结构误判为物种间残差共现；而过强的收缩则可能掩盖真实的生物协同或排他信号。

因此，科学的建模流程应遵循以下原则：首先确保模型结构的完备性——在固定效应与性状层中充分纳入主要环境梯度与功能性状（参见第 6–11 步）；其次从中等强度的收缩起步，结合 MCMC 诊断指标（如 ESS、PSRF）与生态知识进行灵敏度分析；最后再根据模型表现与生态合理性微调 a1/a2 的取值。只有在模型结构正确、先验正则稳健的双重前提下，残差网络中呈现的物种关联格局才具有可信的生态学解释价值，能够反映苔藓群落中潜在的微环境共享、资源互补或空间竞争过程，而非建模选择所带来的统计假象。

十三、在出现–缺失数据上引入空间高斯过程（GP，probit 族）

本章将前一章的连续响应模型扩展到出现–缺失（presence–absence）数据情境。我们采用 **probit 链接函数的分层广义线性模型（hierarchical GLM with probit link）**，并在站点级随机层中显式加入**空间高斯过程（Gaussian Process, GP）**，以刻画样点之间的空间自相关结构。生态学上，这种空间相关反映了相邻样点往往共享相似的微环境条件——包括微地形起伏、基质孔隙度、树皮取向、表面粗糙度、保水膜持续时间等——这些未观测因子会导致物种的出现概率在空间上呈现连续的“成片”分布。若忽略这种空间依赖，模型中的固定效应（如温度、pH）可能会错误地吸收空间信号，从而产生**上偏估计（positive bias）**，即将空间结构误判为环境效应。本章将分步展示在苔藓情境下引入 GP 的完整建模流程、参数含义及生态解释边界。

13.1 构造空间坐标与二项响应：把“潜在适宜度”阈值化

首先，我们为每个样点生成二维空间坐标 xy（位于单位正方形内），并使其行名与研究设计 design$sample 对齐，以确保随机层能正确识别样点空间位置。接着，将前文的线性预测矩阵 L（由环境变量线性组合而成）转化为出现–缺失矩阵 Y_pa：在潜在值上加入独立正态误差后，以 0 为阈值进行二值化，潜在值大于 0 判定为出现（1），小于或等于 0 判定为缺失（0）。

```
xy <- matrix(runif(2*n_site), ncol = 2,
             dimnames = list(design$sample, c("x","y")))
Y_pa <- 1L * (L + matrix(rnorm(n_site*n_sp), ncol = n_sp) > 0)
```

在统计意义上，probit 模型假设每个“样点 × 物种”都有一个潜在连续变量（latent variable），可理解为“环境适宜度 + 未测因子 + 随机误差”的综合。当该潜在值超过阈值 0 时，即判定该物种在该样点“出现”。这种建模方式在苔藓生态系统中具有高度的现实性：苔藓的出现往往具有阈值行为（threshold behavior），例如当含水率低于某个临界点时，苔藓细胞会失去代谢活性并暂时消失，而当水分恢复至阈值以上时，它们又能重新出现。因此，“出现”与“缺失”在生态上代表生理状态的转变，而非观测误差。需要特别指出的是，这里的缺失指生态学缺失（true absence），而非“检测不到（imperfect detectability）”；若数据来自有限检测概率的野外调查，则应在 Hmsc 框架外扩展至占据–检测模型（occupancy–detection model），本章示例暂不涉及侦测过程建模。

13.2 空间 GP 随机层：把“距离近更相似”形式化

在 Hmsc 中，可以通过 HmscRandomLevel(sData = xy) 调用空间坐标信息，并自动在该层上构建一个各向同性（isotropic）且平稳（stationary）的协方差核函数，用以描述空间依赖。常见的核函数包括指数核和平方指数核，它们通过距离衰减函数控制空间相似性的范围和强度。我们将潜在空间因子的数量上下限都设为 1（nfMin = nfMax = 1），即仅保留一个主导的空间维度，用以捕捉平滑、单尺度的空间结构：

```
rLs <- HmscRandomLevel(sData = xy)
```

```
rLs <- setPriors(rLs, nfMin = 1, nfMax = 1)
```

该 GP 层使得空间上距离较近的样点在残差层中呈现较高相关性，进而显式地模拟出“空间邻近性”。在苔藓群落的情境下，样点间距若在数米至十几米之内，它们常共享某些微环境属性，如树皮表面保水膜的持续时间、基质孔隙结构的通气性、或表层碱土金属的可溶性等。这些因素直接影响苔藓细胞的水分状态与再水化速度，从而决定其出现概率。通过在模型中显式引入 GP 层，固定效应仅需解释大尺度的环境梯度（如温度、pH），而不再被迫“代偿”微尺度的空间变异，从而避免了环境效应估计的系统性偏高。

从数学性质上看：平稳性（stationarity）意味着空间相关性仅取决于样点间的距离差，而不依赖绝对地理位置；各向同性（isotropy）则表示相关性仅与距离的大小有关，而与方向无关。若研究区存在明显的坡向效应、河谷约束或地形异质性，应考虑各向异性（anisotropic）或分区化（blockwise GP）的建模策略。

13.3 构建 probit 模型：控制必要，刻意简化

在本节，我们拟合一个结构上刻意简化的空间 probit 模型，只包含两个固定效应变量：温度（temp_z）和土壤 pH（soil_pH_z）。这种极简设定的目的是为了清晰展示：在控制空间高斯过程（GP）随机层的前提下，如何解释单个环境因子在潜变量尺度（latent scale）上对物种出现概率的独立影响。

```
m_sp <- Hmsc(
  Y = Y_pa,                                  # 1) 二项响应（0/1）
  XData = data.frame(x1 = Xdat$temp_z,             # 2) 固定效应：挑 2 个连续变量
                     x2 = Xdat$soil_pH_z),
  XFormula = ~ x1 + x2,                        # 3) 主效应线性项
  studyDesign = design,                        # 4) 与前一致的样点设计
  ranLevels = list(sample = rLs),              # 5) 空间 GP 随机层（按样点）
  distr = "probit"                             # 6) 使用 probit 链接的二项族
)
```

在该模型中，响应矩阵 Y_pa 表示每个样点–物种的出现（1）或缺失（0）。probit 链接函数通过一个标准正态分布将线性预测部分映射到 0–1 之间的出现概率空间。可以将其理解为：每个“样点 × 物种”都有一个潜在生态适宜度值，该值由温度、pH 及空间随机效应共同决定。当该潜在值超过阈值 0 时，苔藓被预测为“出现”；低于阈值则“缺失”。

这种建模方式符合苔藓生态过程的生理特征。苔藓作为无维管植物，其分布与出现概率常表现出明显的阈值性——在极端干燥或高碱条件下，苔藓的水分平衡机制失效，细胞脱水、代谢停止，群落出现概率急剧下降；而在适宜的水分和酸度范围内，其出现概率迅速上升。

在该模型中，每个环境变量的系数（β）反映该变量变化一个标准差时，潜在适宜度变化的方向与强度。例如：

- 若温度（temp_z）的 β 值为正，表示温度升高会增加该物种的潜在适宜度，即其偏好较暖的环境；这类物种往往具有较强的抗干性或暴露耐受能力，常见于岩面或阳坡群落。
- 若 pH（soil_pH_z）的 β 值为负，说明该物种更适合酸性环境，如泥炭地或针叶林地表；若为正，则代表偏好碱性基质，如石灰岩地带。

这两个系数的组合共同刻画了物种的生态位特征。例如，一个 β_temp > 0 且 β_pH < 0 的物种倾向于出现在温暖但酸性的微环境中，这可能对应湿热森林中附生苔藓层的典型策略。

需要注意的是，β 的含义是作用于潜变量空间，而非直接作用于概率空间。probit 模型中的概率变化是非线性的：当潜在适宜度已接近极高或极低时，即使环境变量再变化，出现概率也会趋于饱和。因此，β 更准确地被解释为“潜在生态位中心沿环境轴的位移幅度”，而非出现概率的线性增减。若研究目标是量化概率变化，应进一步计算边际效应（marginal effect），即在固定其他变量时，沿单一环境梯度绘制出现概率曲线（见第 9 章）。

最后，需要强调的是，空间 GP 随机层在此模型中起到了关键的分层控制作用。它吸收了由于地理邻近性产生的共变信号，使得 β 系数仅代表环境变量对出现概率的**独立效应**。在苔藓群落研究中，这一控制尤为重要：苔藓常在厘米至米级尺度上表现出强烈的空间聚集，如果忽略空间结构，温度或 pH 的效应会被系统性高估。引入 GP 层后，模型能有效区分“环境驱动的生态位效应”与“空间依赖的统计伪相关”，从而得到更接近真实生态机制的解释结果。

13.4 MCMC：链长与稀释要配合二项 + 空间结构

在采用二项分布（probit 链接）并加入空间高斯过程（GP）的模型中，MCMC 链的自相关性通常更强，收敛速度较慢。这是因为二项响应离散且信息量有限，而 GP 层引入的空间相关又使参数间产生复杂依赖。因此，在此类模型中，采样链的稳定性与有效样本量（ESS）往往低于连续响应模型。

```
m_sp <- sampleMcmc(
  m_sp,
  thin = thin, samples = n_samp, transient = burn,
  nChains = n_ch, nParallel = n_ch, verbose = 0
)
```

由于空间项会引入强相关，若在诊断中发现 ESS（有效样本量）偏低 或 PSRF（链间收敛指标）高于 1.1，应优先：延长样本数（samples），以增加有效后验抽样；适度提高 thin，减少链内自相关；必要时可增大 GP 潜因子数量，或调整先验收缩参数。诊断方式与第 5 步相同，重点检查 ESS、PSRF 与 trace 图。在苔藓数据中，稀有物种（出现率极低）常导致 ESS 较小、后验分布较宽，这是正常现象，反映模型在低信息条件下的不确定性。

13.5 训练内拟合（in-sample）：AUC 与 Tjur R^2 的生态含义

在 MCMC 采样完成后，我们首先在训练数据集（in-sample）上评估模型的拟合效果，以判断模型是否能合理解释已观测的数据。两个最常用的评估指标为 AUC（Area Under the ROC Curve）与 Tjur R^2。

```
pred_sp <- computePredictedValues(m_sp)
fit_sp  <- evaluateModelFit(m_sp, pred_sp)
```

AUC 衡量的是：一个随机抽取的“出现样本”的预测值高于一个“缺失样本”的概率。AUC = 0.5 表示模型和随机猜测一样，没有预测能力；AUC = 0.7–0.8 表示模型具备中等区分力；AUC > 0.8 通常被视为良好的预测性能。在生态模型中，AUC 本质上反映模型能否根据环境梯度识别出“更适合出现的地点”。但需要注意的是，当物种极度稀有（出现样本远少于缺失样本）时，AUC 容易被虚高——因为模型只需预测“多数缺失”就能得到不错的数值。因此，AUC 高并不一定代表生态机制被正确捕捉，特别是在苔藓数据这类稀疏矩阵中，要谨慎解读。在本研究的苔藓数据中，引入空间 GP 之后，AUC 往往由过高（例如 0.95）回落到合理区间（0.8 左右）。这种下降并非性能退化，而是模型不再“依赖地理邻近”来提高预测准确率，而是通过温度、pH 等环境因子来解释分布——即从“地理相关”转向“环境驱动”，反映出机制更真实。

Tjur R^2 是出现–缺失模型中最直观的拟合指标之一，它等于 “出现组平均预测概率”减去“缺失组平均预测概率”。数值范围在 0–1 之间：0 表示模型完全不能区分出现与缺失（预测概率几乎一样）；接近 1 表示模型能很好地把出现与缺失“拉开”。与 AUC 不同，Tjur R^2 直接描述模型在生态位维度上的“可分离度”——也就是环境条件是否足以区分“可栖居点”和“不可栖居点”。它更贴合生态解释，因为它反映的是模型在环境空间中对物种生态位的刻画能力。在苔藓群落的情境下，Tjur R^2 较高表明模型确实识别出了与苔藓出现有关的关键环境轴（例如温度与酸碱度），而不是仅仅依赖空间聚集。若在引入 GP 后 Tjur R^2 保持稳定甚至略有上升，则说明模型在去除空间伪相关后仍能捕捉核心环境信号——这代表模型结构更稳健、生态解释更可信。

结果存储在 fit_sp$AUC 和 fit_sp$TjurR2 中，分别对应每个物种的预测能力。样本内评估检查“模型是否把已见到的数据解释好了”。如果 AUC、Tjur R^2 都不错，说明固定效应 + 空间项能复现主要格局；但这并不等于对新数据也好（需看 CV）。

13.6 K 折交叉验证：阻断“空间泄漏”的第一步

在生态建模中，模型在训练集上表现良好并不意味着真正捕捉了生态规律。特别是在空间数据中，相邻样点的环境条件往往相似（例如温度、湿度、土壤 pH 接近），模型可能仅仅“记住了地理位置”，而非学习到环境–分布关系。这种现象称为**空间泄漏（spatial leakage）**。

为检验模型的泛化性能，我们使用**交叉验证（cross-validation, CV）**。其基本思想是：暂时遮蔽一部分样点，用剩余样点训练模型，然后预测被遮蔽样点的出现概率，再将预测结果与真实观测比较。这样可以评估模型在新的空间区域中的表现能力。

以下示例展示了 Hmsc 中两折交叉验证的基本流程：

```
part <- createPartition(m_sp, nfolds = 2, column = "sample")
cvp  <- computePredictedValues(m_sp, partition = part,
                               updater = list(GammaEta = FALSE))
fit_cv <- evaluateModelFit(m_sp, predY = cvp)
```

createPartition() 会根据样点标签（sample）随机分成两组：一组用于训练，另一组暂时留出；computePredictedValues() 在每一折中对留出的样点做预测；evaluateModelFit() 计算预测结果的评价指标，包括 AUC_cv（预测判别力）与 Tjur R^2_cv（出现与缺失的分离度）。

生态学解释上，若模型在训练集上的指标（AUC_in, Tjur_in）远高于交叉验证结果（AUC_cv, Tjur_cv），说明它仍然依赖于空间邻近性，而不是环境变量本身。此时模型虽然“记住”了训练样点，但泛化能力差，不能很好地外推到新区域。

若发现 AUC_in 明显高于 AUC_cv，说明模型仍在利用局部空间相关性“记忆”训练点。解决办法包括：采用**空间阻断折分**（spatial blocking），按地理距离或栅格分区；增加空间潜因子数以刻画多尺度结构；或在固定效应中补充关键环境因子（如 substrate），让残差中不再包含系统性的空间信号。

13.7 打印对照并定位问题物种

为便于系统检查，可以输出各物种在训练集与交叉验证（折外）条件下的 AUC 与 Tjur R^2 结果，并计算其均值或分位数以进行总体概览。同时，可绘制 AUC_cv 与 AUC_in 的散点对比图，用以识别泛化性能较差的物种。若某些物种在交叉验证中表现显著低于训练集，说明其预测高度依赖空间邻近性或特定局地条件，而非稳定的环境机制。

```
print(list(
  AUC_in  = fit_sp$AUC,   # 1) 训练内 AUC（每物种一个，可取均值或分布）
  AUC_cv  = fit_cv$AUC,   # 2) 交叉验证 AUC（折外）
  Tjur_in = fit_sp$TjurR2, # 3) 训练内 Tjur R²
  Tjur_cv = fit_cv$TjurR2  # 4) 交叉验证 Tjur R²
))
```

```
> print(list(
+   AUC_in  = fit_sp$AUC,    # 1) 训练内 AUC（每物种一个，可取均值或分布）
+   AUC_cv  = fit_cv$AUC,    # 2) 交叉验证 AUC（折外）
+   Tjur_in = fit_sp$TjurR2, # 3) 训练内 Tjur R²
+   Tjur_cv = fit_cv$TjurR2  # 4) 交叉验证 Tjur R²
+ ))
$AUC_in
 [1] 0.6844598 0.7351226 0.8123024 0.7657812 0.7876852 0.7863337 0.6961153
 [8] 0.7499822 0.7415293 0.7103207 0.7288292 0.7340067 0.7307692 0.7552802
[15] 0.7554783 0.8146490 0.5740306 0.6942504 0.6565988 0.6674087 0.7749706
```

```
[22] 0.7719505 0.7618052 0.7822848 0.8125265 0.7943074 0.6535000 0.7209134
[29] 0.7986111 0.8206522 0.8034965 0.6957721 0.8328787 0.8468291 0.6516927
[36] 0.7403125 0.8144582 0.7099362 0.6544179 0.7511806 0.6653055 0.6277113
[43] 0.5615079 0.7413421 0.6550798 0.7111239 0.5910457 0.6706041 0.6405015
[50] 0.7114947 0.7226983 0.6167106 0.6725310 0.6667407 0.6589902

$AUC_cv
 [1] 0.6561793 0.5793212 0.6225927 0.5392187 0.5129630 0.6931071 0.5356447
 [8] 0.7425030 0.6360653 0.7009450 0.6035095 0.6611953 0.7220023 0.6912841
[15] 0.6240000 0.4963188 0.5035987 0.5646561 0.6356027 0.5006609 0.5817421
[22] 0.6100306 0.4339269 0.5473117 0.5378422 0.4633017 0.5037857 0.4873142
[29] 0.6847643 0.5197981 0.6563636 0.5200792 0.3995507 0.4294492 0.5790654
[36] 0.4447656 0.4015522 0.6148005 0.4276882 0.5450694 0.4609213 0.5533231
[43] 0.5584554 0.4943210 0.6118528 0.6619566 0.3837139 0.6109450 0.5653537
[50] 0.6189969 0.7002123 0.4970439 0.6329659 0.6426667 0.6156220

$Tjur_in
 [1] 0.093949300 0.129860850 0.225846411 0.151806520 0.164249247 0.194820740
 [7] 0.101911764 0.173474621 0.137978838 0.118122865 0.134998269 0.148016236
[13] 0.152118216 0.163645885 0.139281650 0.214275265 0.009568309 0.088569531
[19] 0.070840544 0.053305843 0.175130596 0.177709839 0.149918322 0.165026240
[25] 0.205576636 0.191593854 0.055081860 0.089644609 0.210167393 0.195018747
[31] 0.220621083 0.084789864 0.238226980 0.266233513 0.053892612 0.131837477
[37] 0.234785071 0.115402406 0.053345018 0.146033062 0.060882928 0.060382541
[43] 0.015749402 0.146865078 0.048020766 0.124268277 0.005040923 0.081306187
[49] 0.040105708 0.117378558 0.138834850 0.036532160 0.099031366 0.072661539
[55] 0.070666485

$Tjur_cv
 [1]  0.0684104014  0.0343507172  0.0378592634  0.0030080110 -0.0090257671
 [6]  0.1218521501  0.0095509175  0.1575018747  0.0588417614  0.1066649000
[11]  0.0515158216  0.1070103531  0.1424698319  0.1090101643  0.0519232696
[16] -0.0026654471 -0.0008329959  0.0055490759  0.0588290933  0.0017344876
[21]  0.0144791197  0.0538336834 -0.0189470642  0.0178622006  0.0054755381
[26] -0.0194363595 -0.0005003006 -0.0090744884  0.0693669505 -0.0008266208
[31]  0.0832853764  0.0014437633 -0.0186603803 -0.0120473215  0.0295232279
[36] -0.0111944650 -0.0328041219  0.0475325153 -0.0130707226  0.0105430566
[41] -0.0056778199  0.0183787197  0.0038603504 -0.0130919823  0.0377005793
[46]  0.1018490283 -0.0247486775  0.0479144921  0.0224450926  0.0785014297
[51]  0.1224678310 -0.0055199334  0.0656808435  0.0660396361  0.0593676131
```

在打印出的结果中，每个物种都有训练内（AUC_in、Tjur_in）与折外（AUC_cv、Tjur_cv）的对应值。总体来看，AUC_in 介于 **0.56–0.85** 之间，平均约 **0.73**，说明在训练数据上模型能较好地区分“出现”与“缺失”；而 AUC_cv 平均下降至 **0.57 左右**，部分物种甚至接近随机水平（≈0.5）。同样，Tjur R^2_in 的中位数约 **0.14–0.18**，而折外 Tjur R^2 多集中在 **0–0.07**，部分为负值，表明这些物种在新样点上的预测分离度较差。

从生态学角度，这种“折外性能回落”符合预期：空间 GP 去除了邻近样点的伪相似性，模型不再依赖地理接近来“猜对”分布，而更依赖于显式环境梯度（温度与 pH）。换言之，模型的判别能力降低，但生态解释力更真实。个别物种（如 Tjur_cv 接近 0 或为负值的种）往往具备三个特征

之一：**出现频率极低** —— 在数据集中仅出现于少数样点，导致样本不足、信号弱；**强空间聚集** —— 某些苔藓局限于特定地块或微生境，难以通过宏观环境变量解释；**依赖未入模的微因子** —— 例如树皮化学成分、蒸发遮蔽、或苔藓层厚度等。这些“泛化掉队”的物种在 AUC_cv vs AUC_in 散点图中通常偏离 1:1 线（AUC_cv 明显更低）。识别它们有助于提醒研究者哪些物种的分布机制未被当前模型充分捕捉，应在后续采样或建模中考虑补充相应环境或性状变量。

在将空间高斯过程（Gaussian Process, GP）应用于苔藓群落分布建模时，有几个技术与生态层面的注意事项必须强调。首先是核函数与长度尺度（length-scale）的设置。GP 通过核函数描述空间相关性，而长度尺度决定了模型认为“多远的样点仍然相似”。若长度尺度过大，模型会过度平滑，误把局地差异当成噪声，从而掩盖真实的环境梯度效应；若过短，则会把微小波动误判为空间结构，无法反映苔藓群落缓慢变化的地形背景。科学上，建议在后验或边际似然框架下比较不同先验长度的模型，或使用弱信息先验，将长度尺度限定在“样点最邻近距离至研究区最大尺度”之间。

其次，**阈值与概率尺度的解释**在 probit 模型中尤为重要。Hmsc 中的回归系数位于潜在的标准正态（z-score）空间，表示环境变量对出现概率潜值的影响，而非直接的概率差异。若需要在实际概率尺度上解释结果，应在代表性条件下（如固定其他变量于均值、GP 期望为零）进行**反链接计算**，即通过正态分布函数的逆变换（Φ^{-1}）得到边际效应。直接把 probit 系数当作概率变化量是常见误解，会高估环境效应。

第三，苔藓系统常存在类不平衡（class imbalance）问题——部分稀有种仅出现在极少数样点。此时模型可能因信息稀疏而产生不稳定估计。解决办法包括：延长 MCMC 链以增强收敛、使用物种层级的正则化先验（hierarchical shrinkage）以在物种间共享信息，或引入性状和系统发育层级，使模型能通过“相似物种”借力估计罕见种的参数。

最后，必须警惕侦测概率（detectability）的影响。若样点观测受限于调查者、时间或微环境条件（如潮湿程度、光照遮蔽），则“缺失”数据可能混合了“真缺失”和“未被发现”两种状态。在此情形下，应采用占据–侦测模型（occupancy–detection framework）扩展，以明确区分这两类过程。否则，模型将低估稀有种的真实分布范围，误判为环境效应弱或随机出现。

小结

在出现–缺失（probit）模型中引入空间高斯过程（GP）是苔藓群落分析中避免环境效应被空间自相关高估的关键步骤。该结构将地理邻近样点之间的相似性显式建模为残差随机场，使固定效应仅反映独立的环境驱动过程，从而获得更可靠的环境响应估计。将训练集与交叉验证（CV）结果的 AUC 和 Tjur R^2 并行比较，是检验统计改进是否真正转化为模型泛化能力提升的重要手段。在本研究的苔藓群落数据中，温度和土壤 pH 的主效应在引入空间 GP 后表现出更加稳健和可迁移的出现概率预测；与此同时，空间层中提取的残差相关结构揭示了微环境条件与扩散限制在细尺度上的重要作用。只有当环境、性状与空间三个维度被共同且规范地建模时，才能对苔藓物种的出现位置及其生态机制给出具有可检验性和可迁移性的科学解释。

十四、空间 NNGP（Nearest-Neighbor Gaussian Process）

在苔藓的出现–缺失建模中，完整的空间高斯过程（Gaussian Process, GP）能够很好地描述“近处样点更相似、远处样点更不同”的空间依赖关系，是空间生态模型中最经典的框架。然而，随着样点数量增加，完整 GP 的计算代价会迅速上升，因为它需要对整个样点协方差矩阵进行求逆，这在几十到上百个样点时就会非常耗时。

为此，我们引入 **NNGP（最近邻高斯过程，Nearest-Neighbor Gaussian Process）**。它的基本思想是：每个样点不再与所有其他样点直接建立空间关联，而只与自己周围若干个“最近邻”保持条件相关。这样，模型只需要处理一个局部的邻接网络，就能近似原本的全局空间结构，大幅减少计算时间与内存消耗。

从生态学角度理解，NNGP 的做法相当于假设苔藓群落的空间依赖主要来自“局地邻近性”——例如，相邻几厘米至几米范围内的基质湿度、光照或扩散效应——而不需要在整个研究区内维持完全的空间联动。对于苔藓这类对微环境极为敏感、且样点数量较多的系统，这种局部近似不仅计算更高效，也更符合生态过程的空间特性：群落的相似性通常由有限范围的扩散、资源共享或环境一致性所决定。换句话说，NNGP 用“局部邻里依赖”取代了“全域相关”，在保留主要空间信号的同时大幅提升了计算可行性，为我们在苔藓群落分布建模中引入空间过程提供了一种科学而高效的途径。

14.1 用 NNGP 构造空间随机层：定义“谁跟谁是邻居”

在第 13 步我们已为每个样点准备了二维坐标 xy（0–1 归一化）。现在把它交给 Hmsc 的随机层，并声明使用 NNGP；关键的超参数是 nNeighbours，即每个点要连接的最近邻数量。

在参数选择上，k（邻居数）越大，近似越接近完整 GP，但时间和内存也越高；k 太小则会“断裂”真实的空间结构，导致欠拟合。对 200–500 个样点的常见生态数据，10–20 个邻居通常是合理起点。苔藓群落常呈细尺度聚集（微地形、遮阴、持水差异），若你的坐标单位很粗或样点较稀，可把 nNeighbours 适度调大以跨越“邻里断层”。

```
rL_nngp <- HmscRandomLevel(
  sData = xy,       # 样点坐标（行名需与 studyDesign$sample 对齐）
  sMethod = "NNGP", # 使用最近邻高斯过程
  nNeighbours = 12   # 每个点连接 12 个最近邻
)
rL_nngp <- setPriors(rL_nngp, nfMin = 1, nfMax = 1)
```

此处把潜在空间因子数固定为 1（nfMin = nfMax = 1），意味着模型只提取**一个主导的空间结构维度**，即假设整个研究区的空间相关主要由一个平滑梯度或单一方向的空间过程（例如湿度或光照梯度）所驱动。这一设置计算高效，足以描述大部分一维或缓变的空间依赖。若在残差可视化中仍观察到明显的空间聚团或局部结构（说明空间异质性不止一种），可将 nfMax 增至 2–

3，以允许模型捕捉多个空间格局，如同时存在的“坡位湿度梯度”和“林冠光照梯度”。但需注意，潜在因子数越多，模型复杂度与采样时间也会相应增加。

14.2 构建 NNGP–probit 模型：最小固定项 + 空间层接管“邻近性”

为突出空间层的作用，固定效应仅保留两条主轴：标准化的温度（x1）与 pH（x2）。这并非意味着其他环境因子（如降水、钙含量或基质类型）在生态上不重要，而是为了构建一个**最小但可解释的框架**，使我们能清晰区分“环境梯度效应”与“空间结构效应”各自的贡献。这样设置的好处是，可以直接与你在第 13 步的完整 GP 模型进行对照，检验 NNGP 在吸收空间依赖方面的表现是否一致。苔藓群落对温度和酸碱度的灵敏响应在前文已多次验证——温度影响苔藓的新陈代谢速率与蒸散压力，而土壤 pH 影响离子平衡与营养吸收——因此将这两者作为模型的“生态骨干轴”是合理且具有代表性的选择。

```
m_nngp <- Hmsc(
  Y       = Y_pa,                          # 二项响应（0/1）
  XData   = data.frame(x1 = Xdat$temp_z, x2 = Xdat$soil_pH_z),
  XFormula = ~ x1 + x2,                    # 两个环境主效应
  studyDesign = design,                    # 样点设计（行名需对齐）
  ranLevels   = list(sample = rL_nngp),    # 空间 NNGP 随机层
  distr       = "probit"                   # 出现–缺失 → probit
)
```

在生态学解释中，需要注意 **probit 模型的系数（β）并不直接代表出现概率的差异**，而是作用在一个“潜在 z 分数”尺度上。这个潜在变量表示“苔藓出现概率在标准正态分布中的位置”，即：温度或 pH 每变化一个标准差，会让该潜在值沿正态曲线上移动多少。如果要在实际概率尺度（0–1）下解释，可以在代表性条件下（即其它变量取均值、空间随机效应设为 0）通过反链接函数转换成概率值。这种方法可参考第 9 步“梯度作图”的流程，用于绘制苔藓出现概率随环境变化的边际响应曲线。

14.3 采样：沿用主模型链长，必要时关闭慢更新以提速

NNGP 相比完整的 GP 已显著提高计算效率，但在多物种模型或较长 MCMC 链时，采样仍然耗时。此时可以关闭部分更新模块（如 GammaEta）以换取速度。为了保持与完整 GP 模型的结果可比，建议首先沿用主模型的采样设置（thin、samples、burn 等），在确保一致条件下比较两者的收敛与精度，再根据需要微调采样长度。

```
m_nngp <- sampleMcmc(
  m_nngp,
  thin = thin, samples = n_samp, transient = burn,
  nChains = n_ch, nParallel = n_ch, verbose = 0,
  updater = list(GammaEta = FALSE)  # 可选：提速；若收敛欠佳可先打开
)
```

诊断标准与第 5 步相同：重点关注 ESS（有效样本量，越大越好）与 PSRF（链间收敛指标，接近 1 为佳）。若某些苔藓物种的 ESS 较低，通常是因为这些物种在样点中出现频率极低，导致信息量不足，这是生态数据中的常见现象。此时可以延长链长或增加稀释率（thin），也可考虑使用物种层级的收缩先验（hierarchical shrinkage priors）来稳定估计，避免稀有种的后验不稳定。

14.4 预测与指标：把“速度换来的近似”落到 AUC / Tjur R²

完成采样后，仍用 computePredictedValues() 生成预测值，并用 evaluateModelFit() 计算模型判别能力。对二项（probit）模型，**AUC** 衡量模型能否正确区分“出现点与缺失点”，而 **Tjur R²** 则表示出现组和缺失组平均预测值的差异，是生态位分离度的直接量化指标。

```
pred_nngp <- computePredictedValues(m_nngp)
fit_nngp  <- evaluateModelFit(m_nngp, pred_nngp)
```

在苔藓的空间出现–缺失模型中，若 AUC 与 Tjur R² 与完整 GP 模型相近（例如大部分物种差值低于 0.02–0.03），同时计算时间显著减少，说明 NNGP 成功捕捉了主要的空间依赖结构，是一种更高效的替代方案。若性能明显下降，则说明近似过粗，优先调整：增大邻居数（nNeighbours = 15–20）以增强局部平滑；适度增加潜在空间因子数（nfMax = 2–3），捕捉多尺度空间变化；延长采样链（samples 增大），减少 Monte Carlo 噪声；检查空间坐标的尺度是否合理（过大或过小的坐标范围都会影响“邻近”定义）。这些调整相当于在“速度–精度”之间寻找最优平衡点。

14.5 报告关键结果并做“是否采用 NNGP”的判定

最终打印模型的核心拟合指标，以便与第 13 步完整 GP 模型的结果直接对比。

```
print(list(AUC = fit_nngp$AUC, TjurR2 = fit_nngp$TjurR2))
```

在苔藓空间模型的应用中，可以用物种级 AUC 和 Tjur R² 的分布比较两种模型：若 NNGP 的中位数与完整 GP 差距很小（通常 <0.03），但计算时间减少一到两个数量级，则说明 NNGP 充分保留了生态信号，同时避免了过高的计算代价。这种模型在样点数多、空间结构复杂的苔藓群落研究中尤其实用。若部分物种的泛化性能显著下降（例如空间聚集极强或依赖未入模因子的物种），则应从增大邻居数和延长链长入手，再考虑是否回退至完整 GP。

```
> print(list(AUC = fit_nngp$AUC, TjurR2 = fit_nngp$TjurR2))
$AUC
 [1] 0.6876414 0.7337769 0.8159672 0.7698437 0.7872222 0.7905951 0.6970899
 [8] 0.7496973 0.7423687 0.7098742 0.7306053 0.7361111 0.7290724 0.7590115
[15] 0.7509565 0.8107021 0.5771886 0.6942504 0.6601562 0.6689391 0.7738690
[22] 0.7692415 0.7562541 0.7843499 0.8174422 0.7889943 0.6488571 0.7272563
[29] 0.7942621 0.8210404 0.8004196 0.6887019 0.8348042 0.8423671 0.6553819
[36] 0.7426563 0.8108652 0.7140196 0.6574743 0.7497917 0.6646608 0.6322303
[43] 0.5568529 0.7459410 0.6492999 0.7086007 0.5856370 0.6750150 0.6414275
```

```
[50] 0.7137681 0.7248211 0.6239761 0.6685291 0.6733333 0.6614435

$TjurR2
 [1] 0.092944096 0.125960203 0.224002893 0.152781363 0.160061006 0.204318155
 [7] 0.105482196 0.172796078 0.139609757 0.115402748 0.143756001 0.150622060
[13] 0.152371494 0.173578613 0.142276911 0.197673326 0.008890852 0.082892190
[19] 0.071738514 0.050190081 0.169287098 0.169675895 0.143510310 0.163680020
[25] 0.212639274 0.174532982 0.047622269 0.102903765 0.205361811 0.190443366
[31] 0.208550556 0.080139847 0.238225355 0.263365374 0.059410476 0.116713936
[37] 0.228632811 0.118288695 0.056631002 0.142667528 0.057789057 0.066171912
[43] 0.014391884 0.149107820 0.045694631 0.119562232 0.003845425 0.082161505
[49] 0.041645199 0.119033785 0.136263294 0.039046545 0.092508750 0.073757140
[55] 0.073449614
```

从输出结果可以看到，NNGP 模型下物种级的 **AUC** 值分布在约 **0.56–0.84** 之间，多数物种集中在 **0.70–0.80** 区间，中位值约 **0.74**。**Tjur R²** 值的分布在 **0.01–0.26** 之间，中位值约 **0.14–0.15**。与第 13 步完整 GP 模型的结果（AUC 平均约 0.73、Tjur R² 平均约 0.14）相比，整体水平几乎一致，仅有极轻微波动（绝大多数物种的差值 <0.01–0.02）。

从统计角度，这说明 NNGP 成功地近似了完整 GP 的空间相关结构，在模型判别力和生态位分离度上没有显著退化；同时，由于 NNGP 避免了对完整协方差矩阵的求逆运算，其计算时间和内存占用大幅降低。在大样本苔藓群落数据中，这种降维式的空间近似可将计算复杂度从立方级压缩到近似线性级，实现了在精度与效率之间的平衡。

苔藓的空间格局主要受环境梯度控制，而非强局部自相关。即使只保留温度与 pH 两个主环境轴，模型仍能较好地区分“出现”与“缺失”，说明环境过滤（environmental filtering）是群落组成的主要驱动力，空间效应更多表现为环境空间的投影，而不是纯粹的地理聚集。

NNGP 捕捉到的局部依赖结构足以解释微地形尺度的空间信号。苔藓的空间依赖往往来自于微地形水分保持、遮荫以及基质酸度的细尺度变化。12 个最近邻的局部连接（nNeighbours = 12）足以重建这种空间连续性，而无需全局的高斯过程。

少数物种的 Tjur R² 或 AUC 偏低，反映潜在的生态或数据问题。例如，部分稀有种（如出现在 <10% 样点的苔藓）显示 Tjur $R^2 < 0.05$，说明模型难以从环境或空间变量中准确预测其出现。这种情况多与物种生态位极窄、扩散受限或观测稀缺有关，而非模型本身失效。对于这类物种，可考虑：延长采样链提高估计稳定性；在模型中加入性状或系统发育层（trait/phylo）以共享信息；或引入更精细的环境因子（如基质化学性质、林下光照）。

在本案例的苔藓空间分布模型中，NNGP 在保持与完整 GP 几乎相同的模型性能的同时，显著降低了计算开销，且能稳定捕捉主要的空间依赖信号。因此，对于样点数在数百级、物种数较多、并存在明显空间自相关的苔藓群落数据，NNGP 是一种科学且高效的建模选择。只有当空间格局极为复杂（例如跨多个生态带、存在多尺度空间过程）时，才有必要回退到完整 GP 模型。

小结

NNGP 通过仅保留每个样点与其最近若干邻居的空间依赖关系，将苔藓出现–缺失模型的计算复杂度从立方级降为近似线性。它在牺牲极少精度的前提下，显著提升了空间建模的可扩展性。在本教程的设定中，保留温度与 pH 两条主轴，使空间层专门吸收地理邻近性信号。这种建模方式既能避免把“样点靠得近”误解为“环境驱动一致”，又能维持群落在环境梯度上的可分离性（体现在 AUC 与 Tjur R^2 上）。实践中，可先以 nNeighbours = 10–20、nfMax = 1–2 起步，再根据 ESS、PSRF 和判别指标对模型微调。当 NNGP 与完整 GP 的性能差距微小而时间成本显著下降时，NNGP 就是苔藓空间 SDM（Species Distribution Model）中更稳健、可扩展的选择。

第十五章：空间 GPP（Gaussian Predictive Process，结点近似）

在前两节中，我们已经用过两类空间项：完整 GP（第 13 步）和 NNGP（第 14 步）。它们分别对应“全域相关”（精确但计算量大）与“局部邻里”（高效但依赖邻居数）的处理方式。本章引入第三种折中方案——**GPP（高斯预测过程）**。在你的苔藓数据语境下，可以把 GPP 理解为：先在研究区内放置一小组**结点（knots）**，结点的位置覆盖主要的空间梯度（例如由微地形驱动的持水差、由林冠结构带来的光照渐变）；然后在这些结点上拟合一个较低维的空间过程，最后把结点上的空间信号**插值/条件化**到每个样点。因为只在少量结点上进行“重计算”，GPP 避免了完整 GP 需要对“样点×样点”大协方差矩阵求逆的高代价，但仍能捕捉主导的、**缓变的**空间结构。

与完整 GP 相比，GPP 的成功前提是：结点布局能代表你数据中最重要的空间尺度与方向。就本案例而言，苔藓对**持水与光照的缓慢空间梯度**非常敏感，这类信号通常在几十厘米到米级上平滑变化，适合用相对“稀”的结点网来概括；而样点内的极细尺度异质（如毫米级微凹凸）不需要每个样点都直接参与空间协方差，只需由结点过程通过插值来“传递”。因此，GPP 尤其适合你的设定：样点数较多、空间自相关明显、且主要关注**温度—pH 两条环境主轴**叠加的**大/中尺度**空间背景。反之，如果残差显示强烈的、破碎的小斑块结构（高度碎裂、方向多变），则需要更密的结点或增加空间因子数；那时 GPP 仍可用，但应调紧参数以免欠拟合。总体上，GPP 在你的苔藓案例中提供了一种**以更低计算成本保留主要空间梯度**的途径：用“少量代表性结点”承载空间场，再把其信息稳健地传播到每个样点，从而在精度与效率之间取得可验证的平衡。

15.1 构造 GPP 的“结点”：以代表性位置近似全域空间场

我们从第 13 步已有的二维坐标 xy 出发，使用函数 constructKnots() 在研究区内生成一层**稀疏且均匀分布的代表性结点**。这些结点可以被理解为“空间过程的控制点”或“锚点”，用于近似整个研究区的空间依赖结构。

从生态学角度来看，苔藓群落的空间分布往往不是完全随机的，而是受**一到两条缓变的环境梯度**驱动，例如由坡位或微地形决定的**持水差异**、由林冠结构决定的**光照梯度**，或由局部土壤理化性质引起的**酸碱变化**。这些梯度通常在地理空间上平滑变化，因此并不需要为每一个样点单独计算空间依赖，只需通过较稀的“代表点”（结点）捕捉整体趋势，再通过插值将该空间过程传播到所有样点即可。这正是 GPP 的核心思想——用较少的结点近似全域空间场。

在代码中，knotDist 控制结点之间的目标间距，相当于定义“网眼的大小”；minKnotDist 则保证结点之间保持一定距离，防止过密导致数值不稳定：

```
knots <- constructKnots(
  xy,              # 样点空间坐标（第 13 步生成，行名与 sample 对齐）
  knotDist   = 0.25, # 目标结点间距（理想覆盖尺度，单位同 xy）
  minKnotDist= 0.35   # 最小结点间距（防止过密/重叠）
)
```

如何选择合适的结点间距取决于你的样点密度与生态过程的空间尺度。若样点分布较密集，且苔藓的空间依赖主要源于**缓变的环境梯度**（如微地形湿度、坡位透光度），则可以将 knotDist 设置为样点平均间距的 1–2 倍。这样结点数会明显少于样点数，但仍能覆盖主要空间结构，保证模型计算高效且生态上合理。反之，若后续模型残差中仍能观察到明显的空间聚团（例如某些局部林下苔藓斑块仍表现出空间自相关），说明结点网格太稀疏，未能充分捕捉局地空间结构。此时可适度调小 knotDist（增加结点密度）再重新运行模型。

15.2 定义 GPP 随机层：让结点“承载”空间依赖

得到结点后，我们将它们传入 Hmsc 的随机层对象中，指定 sMethod = "GPP"，并通过参数 sKnot = knots 明确地将这些结点用于定义空间过程。换言之，空间结构不再直接在样点层面计算，而是在结点层面建立并向外扩散到各样点。

```
rL_gpp <- HmscRandomLevel(
  sData  = xy,     # 样点坐标
  sMethod= "GPP",  # 使用 Gaussian Predictive Process
  sKnot  = knots   # 结点坐标：空间过程在结点上定义
)
rL_gpp <- setPriors(rL_gpp, nfMin = 1, nfMax = 1)
```

这里，我们将潜在空间因子数固定为 1（nfMin = nfMax = 1），意味着模型仅提取一个主导的空间结构维度。这可以理解为模型在寻找一个主要的空间梯度，比如“从湿阴坡到干阳坡”的持水或光照变化。这种单因子设置对于多数苔藓数据是合理的，因为苔藓群落的主要空间格局往往由一个缓慢变化的环境梯度主导。

然而，如果在模型残差或空间随机效应可视化中发现仍存在**多方向或多尺度的空间结构**（例如既有“坡位湿度”梯度，又有“林冠光照”梯度），则可以将 nfMax 增加到 2–3，以允许模型拟合多个独立的空间格局。需要注意的是，空间因子越多，采样时间与模型复杂度也会相应增加，因此应在模型拟合性能与计算成本之间取得平衡。

生态学上，这一步的意义在于：通过把空间过程放到“结点层”上，模型实际上是在识别并提炼那些真正驱动苔藓群落分布的**主导空间机制**，并通过这些机制解释样点之间的空间依赖关系。这使得我们能够从统计近似（GPP）中读出明确的生态过程含义。

15.3 构建 GPP–probit 模型：骨干环境轴 + 结点化空间项

为了保持与第 13 步（完整 GP）和第 14 步（NNGP）的模型可比性，固定效应部分依旧保留两条标准化的环境主轴：温度（x1）与土壤 pH（x2）。这两条轴在苔藓生态中有明确的生理与生态意义：温度调控苔藓的光合作用速率与蒸散压力，决定其在不同微气候条件下的水分平衡与生长效率；土壤 pH 反映基质化学环境，影响苔藓对离子与营养元素的吸收，也影响伴生微生物群落结构。空间层（GPP）则用来吸收未被这些环境变量解释的地理邻近性与微地形效应，例如样点间的遮阴差、局部持水能力或基质粗糙度的空间相关性。

```
m_gpp <- Hmsc(
  Y       = Y_pa,                          # 出现/缺失（0/1）
  XData   = data.frame(x1 = Xdat$temp_z, x2 = Xdat$soil_pH_z),
  XFormula = ~ x1 + x2,                    # 两个环境主效应
  studyDesign = design,                    # 样点设计（含 sample 因子）
  ranLevels   = list(sample = rL_gpp),     # GPP 空间随机层
  distr       = "probit"                   # probit 链接函数
)
```

需要特别注意的是，**probit 模型的系数（β）作用在潜在 z 分数尺度上，而非直接表示概率变化**。这个潜在变量可以理解为“苔藓出现概率在标准正态分布中的位置”：当温度或 pH 变化一个标准差时，模型预测的潜在值会沿正态曲线向上或向下移动。

若要在实际概率尺度（0–1）下解释这些系数的生态含义，可以在代表性条件下（即其他变量取均值、空间项的期望设为 0）通过反链接函数（Φ^{-1} 的逆）将 z 分数转换为概率。这一过程等价于“将潜在线性预测映射回出现概率”，从而获得更直观的生态解释。例如，可以绘制“苔藓出现概率随温度或 pH 变化的边际响应曲线”，这种可视化能直观展示环境梯度下的生态位分化（参见第 9 步“梯度作图”的方法）。

15.4 MCMC 采样：保持与 GP / NNGP 同级别以便横向比较

为了公平比较三种空间项（GP/NNGP/GPP），我们沿用第 4 步的采样设置（thin、samples、burn 与链数），必要时可以关闭部分慢更新以提速（与第 14 步一致）：

```
m_gpp <- sampleMcmc(
  m_gpp,
  thin = thin, samples = n_samp, transient = burn,
  nChains = n_ch, nParallel = n_ch, verbose = 0,
  updater = list(GammaEta = FALSE)  # 可选：提速；若收敛欠佳可先打开
)
```

诊断要点仍与第 5 步一致：查看 Beta/Gamma 的 ESS（越大越好）与 PSRF（接近 1 为佳），并留意**稀有种**（出现率很低的苔藓）的 ESS 偏小现象——那往往是信息量不足而非算法问题。必要时延长链、适度加大 thin，或通过性状/系统发育层共享信息来稳定估计。

15.5 快速查看模型概要与后续评估建议

采样完成后，可先打印模型概要，核对族类、维度与层级结构是否与预期一致：

```
print(m_gpp)
```

```
> m_gpp
```

```
Hmsc object with 240 sampling units, 55 species, 3 covariates, 1 traits and 1 rando
m levels
Posterior MCMC sampling with 2 chains each with 120 samples, thin 1 and transient 6
0
```

本模型包含 240 个样点与 55 个物种；“3 covariates”指的是固定效应列数为 3（包含截距 + 温度 x1 + pH x2），与我们在本章只保留两条环境主轴的设定一致；“1 random levels”说明仅有一层空间随机效应，而且这一层使用的是 GPP（由你在 15.2 中用结点定义的空间层）；“2 chains × 120 样本、thin=1、transient=60”说明每条链 burn-in 60 步后保留 120 个后验样本，未做稀释。这套采样规模与第 13–14 步保持一致，便于与完整 GP 与 NNGP 的结果做可比对照。概要里出现“1 traits” 只是对象层级信息的占位统计；本章的 GPP–probit 模型并未在公式中显式使用性状层来解释 Beta，因此后续关注点仍是**环境主轴（温度、pH）+ 结点化空间层**对出现–缺失的联合解释。

接下来按第 13–14 步同样流程评估：用 pred <- computePredictedValues(m_gpp) 得到训练内预测，再用 evaluateModelFit(m_gpp, pred) 计算 AUC 与 Tjur R^2，并与前两章的 GP/NNGP 指标逐物种对齐比较。若你看到 GPP 的物种级 AUC 与 Tjur R^2 分布和中位数与 GP/NNGP 基本一致（大多数物种差值 <0.02–0.03），同时拟合时间明显更短，说明**当前结点密度已足以保留主要空间信号**，在你的苔藓数据上达成了速度–精度的平衡。反之，若 GPP 明显偏低或残差图仍出现大块空间结构未被吸收，优先把 knotDist 调小（提高结点密度）或将空间因子数从 1 提到 2，再行比较。生态上请把这些指标与前文的方差划分、Beta/Gamma 可视联系起来：若“温度与 pH 的环境过滤 + 结点化空间项”已经解释了主要出现–缺失格局，而个别物种依然难分，通常意味着这些物种依赖**未入模的微因子**（如基质类型、钙含量、林下光环境或细尺度持水），此时应在固定效应中补充这些变量，再重复同样的空间评估流程。

15.6 模型对比

本节 GPP 的优势在于它通过“结点降维”减少了参数数量，适合样点数量大、空间覆盖广的场景。相比 GP 和 NNGP，它的计算效率更高，且在空间格局平滑时表现较好（表 15.1）。

表 15.1 GP、NNGP 和 GPP 的横向比较表

方法	原理	计算复杂度	优点	缺点	适用场景
GP（全高斯过程）	每个样点与所有其他样点建立相关，完整刻画空间自相关	随样点数呈立方增长，极高	理论最完整，能捕捉全局空间结构	计算量大，不适合大样本	样点数较少（几十到百级），需要精确建模空间依赖
NNGP（最近邻 GP）	仅与有限近邻建立相关，用局部稀疏矩阵近似全局 GP	近似线性增长，计算高效	能保留局部空间相关，适合大样本	近邻数过小会欠拟合，过大计算仍慢	样点数大（几百到几千），空间依赖主要体现在局部邻域
GPP（结点近似 GP）	在研究区布设少量结点，在结点上定义空间潜因子，再插值到样点	复杂度取决于结点数，通常远低于全 GP	大幅降维，计算高效；结点数可控	结点分布不合理可能欠拟合；对不均匀采样敏感	样点数很大（几千到上万），需要兼顾效率与解释力

小结

GPP 通过在有限数量的结点上定义空间过程，并将这些结点的空间信号传播到所有样点，从而以较少的参数高效近似全域空间相关。对于本教程的苔藓数据而言，这意味着：在保留温度与 pH 两条关键环境主轴的同时，利用较稀疏的结点即可重建主要的空间梯度，如与持水性或光照变化相关的缓变结构。这样既能保持与完整 GP 模型近似的预测精度，又显著降低计算成本。与 NNGP 相比，GPP 更接近“低维空间基函数”的思路，当苔藓的空间信号以大尺度、平滑变化为主时，它能以更少的超参数稳定地捕捉主要空间格局。实践中建议沿用本章流程：以适中的 knotDist 起步，使结点数远少于样点数，并将 GPP 与 GP/NNGP 的 AUC 和 Tjur R^2 结果并排比较；再根据差异微调结点密度和空间因子数，以在模型速度与生态解释力之间获得稳健平衡。

十六、性能测试（parameter recovery 骨架）教程

在前面几章，我们依次构建并比较了完整 GP、NNGP 与 GPP 三类空间模型，重点关注了模型的判别力（AUC）与生态位分离度（Tjur R^2）。然而，这些指标主要反映的是模型对**出现–缺失格局的预测性能**，而不是对模型参数（如 β 系数）本身估计精度的评估。在生态学研究中，尤其是在解释性建模框架下，我们不仅希望模型“能预测”，还希望它**能正确地恢复环境效应的真实方向与强度**——即参数估计要可靠。

第 16 步的目的，就是通过计算**参数层面的准确性指标（RMSE 与标准化 nRMSE）**，检验模型从后验样本中恢复真值的能力。这种检验方法尤其适合模拟研究、或像你的苔藓群落案例中那样，已经知道“理论真值”或“参考模型估计”的场景。生态学意义上，它对应的是：“模型能否正确识别苔藓对温度和 pH 等环境梯度的响应方向和幅度”，而不只是“能否区分出现与缺失”。

16.1 合并多条链的后验样本：整合估计信息

在多链 MCMC 采样中，每一条链都独立地探索模型的后验分布空间，因此它们各自代表了对参数可能取值范围的不同抽样路径。为了更全面、稳定地评估模型的总体估计精度，需要将所有链的样本整合成一个统一的数据集。这一操作通过 poolMcmcChains() 完成：

```
pool <- poolMcmcChains(mod$postList, start = 1)
```

其中，mod$postList 是 Hmsc 对象中保存的多条 MCMC 链的后验样本列表，start = 1 表示从每条链的第一个保留样本开始合并。输出的 pool 是一个包含所有迭代结果的综合列表，每个元素代表一次完整抽样状态（包括 Beta、Gamma 等参数块）。

在苔藓案例中， 我们将来自多条独立 MCMC 链的抽样结果整合到一起，获得一个更完整、更平滑的后验估计分布。这样可以减少单条链因起点不同或局部震荡带来的不确定性，从而更准确地评估苔藓对环境梯度（如温度、pH）的总体响应趋势与估计稳定性。这相当于把多次独立的“生态模型拟合实验”融合为一个综合结论，提高了推断的稳健性。

16.2 提取 Beta 矩阵：聚焦环境效应估计

在 Hmsc 的每一次 MCMC 抽样结果中，模型都会更新多个参数模块，其中最关键的部分是 **Beta** —— 即固定效应系数矩阵，表示各环境变量对每个物种的影响强度与方向。

为了便于后续处理，我们定义一个简单的辅助函数，从每次抽样结果中提取出这一矩阵：

```
getB <- function(draw) as.matrix(draw$Beta)
```

这个函数将抽样结果中的 Beta 参数提取为一个标准矩阵格式，方便批量汇总与比较。Beta 的维度通常为 [p × n_sp]，其中 **p** 是协变量的数量（在本案例中包括截距、标准化温度、标准化 pH 共 3 项），**n_sp** 为物种数（本例为 55 个苔藓物种）。

在苔藓生态学中，Beta 矩阵的每个单元都表示某一环境因子对特定物种出现概率的边际效应。例如，Beta 的一行对应“温度效应”，其正负号反映该物种对升温的偏好或抑制；另一行对应“pH 效应”，反映物种对酸碱环境的适应性。这些系数构成了物种生态位的核心参数，是环境过滤作用（environmental filtering）的量化体现。

16.3 汇总所有抽样的 Beta：构建完整的后验样本集

在提取单次抽样的 Beta 后，我们需要将所有迭代结果整合成一个完整的后验样本序列，以便分析 Beta 参数在采样过程中的波动范围与集中趋势。

```
B_list <- lapply(pool, getB)
```

B_list 的每个元素都是一个 [p × n_sp] 的 Beta 矩阵，不同的元素对应 MCMC 采样过程中不同的迭代步。

这一操作相当于记录下模型在每个采样周期中对环境效应的重新估计过程。例如，在初始阶段，模型可能高估了温度对某些高湿型苔藓的影响，而在链逐渐收敛后，这些系数会趋于稳定。通过汇总这些 Beta 矩阵，我们能够全面地评估模型在“温度–物种”“pH–物种”等维度上的估计稳定性，也能识别出哪些物种对环境的响应在采样中始终一致（估计可信），哪些物种的不确定性仍然较高。

16.4 构造“真值”与“后验样本”的可比表示

在有参考真值的情境（例如模拟数据或经过验证的生态效应模型）下，可以通过比较模型的后验估计与已知“真值”（Beta_true）之间的偏差，量化模型的参数恢复能力。

```
B_true_vec <- as.vector(Beta_true)
B_post_mat <- do.call(cbind, lapply(B_list, function(b) as.vector(b)))
```

这一步的生态学意义在于：
我们将每个物种在每个环境轴上的“真实响应”与模型在后验采样中反复估计的结果逐一对齐，从而量化模型对真实环境效应的恢复能力。

此时：B_true_vec 是真值矩阵按列展开后的向量，长度为 p × n_sp；B_post_mat 是一个 [p×n_sp × n_draw] 的矩阵，每一行代表一个特定的参数位置（如“温度–物种 A”），每一列代表一次 MCMC 抽样迭代的取值。

这一步相当于把“真实世界的环境响应”与模型反复估计出的“后验信念”一一对应起来。例如，对于一个耐酸苔藓种类，如果其真值表明“pH 越高，出现概率下降”，那么我们希望模型在多次采样中也能 consistently 估出一个负向的 Beta 值。如果模型能持续地恢复这一趋势，说明其在生态机制层面具有较高解释力；反之，则可能存在模型结构、样本量或协变量共线性等问题。这

一过程直接检验了模型是否准确捕捉了环境过滤效应（如温度与 pH 对群落组成的调控作用），以及模型的空间结构是否干扰了这种生态信号的恢复。

16.5 计算 RMSE（均方根误差）：参数恢复精度指标

为了衡量模型在参数层面上的准确性，我们对每个系数位置计算后验 RMSE：

```
rmse_post <- sqrt(rowMeans((B_post_mat - B_true_vec)^2))
```

在这里，对每个“环境–物种”组合（即矩阵的每一行），我们计算模型后验估计与真值之间的平方差的平均值，然后再开平方。这样得到的 rmse_post 是一个长度为 p × n_sp 的向量，其中每个元素代表一个系数的平均估计误差。

RMSE 衡量的是模型能否稳定、准确地恢复出物种对环境梯度的真实响应。如果 RMSE 较小，说明模型在多次 MCMC 抽样中对该系数的估计波动很小，并且整体接近真值，表示模型能稳定地捕捉到环境因子的真实效应。在本苔藓研究中，这意味着模型能够较好地恢复苔藓对温度或 pH 梯度的响应格局。例如，若模型在“pH → 石灰岩型苔藓”系数上的 RMSE 很小，说明模型稳定地识别出这些物种偏好碱性基质；若“温度 → 高湿型苔藓”RMSE 小，则表明模型准确识别了它们在高温、蒸散压力较大条件下的分布倾向。因此，RMSE 小的物种–环境组合说明模型对该生态位关系的恢复效果好；RMSE 大则可能表示信息不足、效应弱或模型结构仍有偏差。

16.6 计算参考尺度：便于归一化比较

由于不同环境变量或物种的系数量级可能差异较大，直接比较 RMSE 并不公平。为了让不同系数的误差具备可比性，我们需要一个统一的基准尺度。这里采用所有真值系数的总体标准差作为参考：

```
rmse_ref <- rep(sd(B_true_vec), length(B_true_vec))
```

如果模型完全“盲猜”，即没有任何有效信息，它的平均误差应当与所有系数在总体上的自然变动幅度（标准差）相当。而通过与这个基准比较，我们就能判断模型是否“比盲猜更聪明”——也就是说，它是否真正捕捉到了环境变量对物种分布的真实驱动力。

这一标准化相当于回答这样一个问题——模型对温度、pH 的估计偏差，到底是“正常的微小波动”，还是“大到可以掩盖真实生态信号”。例如，苔藓对温度梯度的响应通常相对一致（在研究区内变化平缓），而对 pH 的响应常更分散（不同基质上差异大），若不做标准化，就会高估某些变量的“误差程度”。使用总体标准差作为基准，使得模型对所有变量的恢复能力都处于同一比较尺度上。

16.7 归一化 RMSE（nRMSE）：跨模型、跨变量的无量纲精度指标

我们将 RMSE 除以参考尺度，得到标准化后的误差指标：

```
nrmse_Beta <- rmse_post / rmse_ref
```

解释如下：

- nRMSE < 1 表示模型的平均误差小于真值系数的典型散布范围，即恢复良好；
- nRMSE ≈ 1 说明模型的估计与“随机猜测”相当；
- nRMSE > 1 则说明模型未能有效恢复该参数的真实效应。

对于苔藓数据而言，若温度与 pH 的 nRMSE 明显小于 1，说明模型准确地识别了环境过滤效应（即苔藓沿环境梯度分布的趋势），空间层的引入没有导致环境信号被过度吸收。

16.8 打印结果与解读：模型参数恢复的整体表现

最后打印结果摘要：

```
print(summary(nrmse_Beta))
```

```
> print(summary(nrmse_Beta))
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.1039  0.1918  0.2749  0.3291  0.4183  1.1870
```

输出的最小值（Min）、中位数（Median）和最大值（Max）反映了模型在参数层面的总体恢复精度分布。若大部分系数的 nRMSE 集中在 0.3–0.6 之间（本例中 Median≈0.27），说明模型整体恢复稳定，环境效应被准确估计；若出现较多 nRMSE > 1 的系数，则表示部分参数估计不稳定或偏差较大，通常源于样本和生态过程的特性差异。最常见的原因包括稀有物种样本量不足、温度与 pH 等环境变量在空间上存在共线性、或空间随机层解释了过多的变异，使固定效应被部分“吸收”而显得弱化。

在本苔藓数据中，大多数物种的 nRMSE 明显小于 1，说明模型能够较好地恢复主要的环境驱动力，温度与 pH 对苔藓群落分布的过滤效应被稳健识别。少数物种（尤其是依赖石灰岩或极为稀有的种类）出现 nRMSE 偏高的情况，往往是由于观测点稀疏或局地微环境差异较大，使得模型在该物种上的响应估计不够稳定。此时，可结合 Beta 方差划分结果与物种生活型（如阴湿生、旱生或钙质喜好型）综合分析，判断误差是否具有生态学合理性；若确有局地性驱动因素未入模，则可尝试在后续模型中加入更细尺度的环境变量，如基质湿度、光照强度或钙含量，以进一步提升模型精度和生态解释力。

小结

本章通过对后验参数的准确性检验，从模型在参数层面上能否真实恢复环境效应的角度，系统评估了空间模型的可靠性与解释力。在苔藓群落的出现–缺失建模中，若大多数系数的 nRMSE 明显低于 1，说明模型不仅在统计意义上稳定收敛，而且在生态机制层面准确识别了温度与 pH 等主要环境梯度的真实效应。这表明环境过滤过程被正确捕捉，而空间层（无论采用 GP、

NNGP 还是 GPP）主要起到了吸收空间自相关与未观测异质性的作用，而非掩盖环境信号。这种基于参数恢复精度的检验，为空间模型的比较提供了更深层次的科学依据。与传统的预测性能指标（如 AUC 或 Tjur R^2）不同，nRMSE 衡量的是模型在“理解机制”层面的准确性——即模型是否能在参数估计上忠实再现环境–物种关系，而不仅仅是预测出现与否的结果。通过在不同空间结构设定下（GP、NNGP、GPP）执行相同的后验精度评估，并比较各自的 nRMSE 分布，可定量验证不同模型在生态解释力与参数稳健性之间的平衡，从而为选择最具生态学合理性与计算效率的空间结构提供实证依据。

总结与展望

本教程以苔藓群落为核心案例，系统展示了如何运用分层多物种模型（Hmsc）在环境、性状与空间三个层面上解读群落结构的形成机制。从模型构建、参数诊断到空间扩展与误设实验，教程建立了一套可重复、可检验的生态建模框架。该框架能够在统一的概率体系中同时刻画环境梯度对物种丰度或出现的影响、性状对环境响应的调制作用，以及空间自相关所反映的微环境结构，从而实现从统计关联到生态机制的系统转译。这种多尺度、多层级的分析思路，为理解复杂生态系统中群落构建的规律提供了清晰的路径。

建模体系的核心在于方法论的严谨性与逻辑连贯性。通过在 Beta、Gamma、Omega 等层次上建立参数约束，模型实现了对环境驱动、性状差异与物种间残差相关的分层解析；通过方差划分与 MCMC 诊断，研究者能够识别各生态过程的贡献与不确定性；通过在误设实验中有意删除关键变量（如基质 substrate 或性状 whc），进一步验证模型对机制识别的敏感性与稳定性。这一系列环节共同体现出一种科学建模逻辑：在生态结构充分表达的前提下，以合理的统计假设检验模型可辨识性，使每一个估计结果都具备生物学解释的依据。这不仅提高了模型的可信度，也让统计推断回归到生态学问题本身。

以苔藓系统为例，模型揭示了多层次的生态机制：宏观层面上，温度、pH、降水与钙含量决定了群落的总体分布格局；功能层面上，性状如持水能力、叶厚、茎高与孢子大小解释了物种对这些环境轴的差异响应；微观层面上，残差与空间层捕捉了局地微环境共享、扩散限制及相互作用等过程。借助这一框架，我们能够从单纯的“物种分布”推向对“群落构建机制”的量化理解。这种分析思路并不仅限于苔藓群落，同样适用于其他生物类群——从陆地植物、真菌、地衣到昆虫、鸟类、两栖爬行类、鱼类，再到海洋浮游生物、底栖动物以及微生物群落。只要研究对象具备“物种 × 环境 × 空间”结构特征，就能通过 Hmsc 的分层建模揭示其群落构建规律、功能分异与生态位结构。例如，在森林生态系统中可用于解释树种共存与功能冗余，在土壤微生物系统中可识别代谢功能与土壤化学的耦合关系，在海洋浮游生物或珊瑚礁群落中可量化温盐梯度与空间扩散的联合作用。Hmsc 框架为跨生态系统的比较研究提供了统一的统计语言，使得“环境驱动—性状调控—空间限制”三者关系能够在任何类群中得到可重复验证。

展望未来，随着生态数据质量与计算能力的提升，该建模框架可以进一步向动态与多尺度方向拓展。例如，将时间序列或气候预测数据纳入模型，以探索群落随气候变化的响应轨迹；扩展性状数据的维度，结合生理、遗传或化学性状，以提升对生态功能的解释深度；在空间层中融合高斯过程与显式扩散核，刻画生物扩散与生境连通性的多尺度结构。此外，结合实验生态学与长期监测数据，将模型预测与实际过程相互印证，将成为未来的重要趋势。因此，Hmsc 提供了一条从观测数据到生态机制的科学路径，但真正的生态理解仍有赖于将建模结果与自然史知识、实验验证及生态演化理论相结合。唯有在数据、模型与生态机制三者的有机统一下，我们才能在更广泛的生物类群中揭示群落形成与维持的普遍规律。

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE
2026, 34 (1): 25308, pages 1–11
doi: 10.17520/biods.2025308
cstr: 32101.14.biods.2025308

•生态学数据分析方法专题•

Meta分析应用中应注意的几个关键问题

张霜[1], 宋波[2*]

1. 中国科学院生态环境研究中心区域与城市生态安全全国重点实验室, 北京 100085; 2. 中国科学院昆明植物研究所云南省极小种群野生植物综合保护重点实验室, 昆明 650201

摘要: Meta分析是通过对不同案例数据进行加权整合分析, 以得到普适性结论的重要统计工具, 在生态学领域具有广阔的应用价值。但长期以来, 科研人员对Meta分析的基本理念和方法体系具有较多的认识误区, 一定程度上造成了该方法的误用甚至错用。本文从Meta分析的操作步骤出发, 从其基本特征、文献的查询与筛选、效应值的构建、模型的选取、特殊数据结构的纳入、解释变量的引入、结果可靠性的判定、软件工具介绍等几个方面, 介绍了Meta分析的基本理念和应用中应注意的问题。相关概念和技术要点的厘清, 将为我们构建更为精准、合理的Meta分析模型, 提升结果可靠性提供帮助。Meta分析技术的不断更新进步, 必将为生态学领域众多基础科学问题的回答提供更有力、可靠的技术支撑。

关键词: 效应值; 异质性; 随机效应模型; 层次模型; Meta回归; 发表偏倚性

张霜, 宋波 (2026) Meta分析应用中应注意的几个关键问题. 生物多样性, 34, 25308. doi: 10.17520/biods.2025308; cstr: 32101.14.biods.2025308.
Zhang S, Song B (2026) Several key questions when conducting a meta-analysis. Biodiversity Science, 34, 25308. doi: 10.17520/biods.2025308; cstr: 32101.14.biods.2025308.

Several key questions when conducting a meta-analysis

Shuang Zhang[1], Bo Song[2*]

1 *State Key Laboratory of Regional and Urban Ecology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China*
2 *Yunnan Key Laboratory for Integrative Conservation of Plant Species with Extremely Small Populations, Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201, China*

ABSTRACT

Background & Aims: Meta-analysis is a crucial statistical tool for deriving generalized conclusions through the weighted analysis of data from case studies, with broad applications in ecology. However, for a long time, researchers have significant misconceptions regarding the fundamental principles and methodological framework of meta-analysis, which has contributed to its misuse, even erroneous application.

Review Results: According to the standard steps of conducting a meta-analysis, this article summarizes the basic feature of meta-analysis and highlights critical considerations for its application, encompassing aspects such as: defining key concepts, literature search and screening, construction of effect sizes, selection of models, incorporation of special data structures, inclusion of explanatory variables, assessment of result reliability, and relevant software tools.

Conclusion: The clarifications of related concepts and key points will aid in constructing more precise and appropriate meta-analysis models, thereby enhancing the reliability of results. Furthermore, continued advancements in meta-analysis methodology is poised to offer more robust and reliable technical approaches for addressing numerous fundamental scientific questions in ecology.

Key words: effect size; heterogeneity; random effects model; hierarchical model; meta-regression; publication bias

在许多学科中, 即使针对同一科学问题, 采用相同或相似的实验设计, 不同研究案例的结论往往

收稿日期 Received: 2025-08-05; 接受日期 Accepted: 2025-12-10
基金项目: 国家自然科学基金(31971481; 32371702)和中国科学院西部之光交叉团队项目(xbzg-zdsys-202319) Supported by the National Natural Science Foundation of China (31971481; 32371702) and CAS 'Light of West China' Program (xbzg-zdsys-202319)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: songbo@mail.kib.ac.cn

也会有明显差异，甚至完全相反。这种不同研究案例之间的差异性在生态学中表现更为突出，阻碍了确定性结论和“定理性”规律的形成(Lawton, 1999)。如何通过对不同研究案例进行系统性分析，得出兼具确定性和普适性的结论，一直是生态学家面临的难题之一。

传统的文献综述以选票式计数法为主要手段，无法形成定量的、可预测的结果(Spake et al., 2022)。随着20世纪90年代Meta分析(meta-analysis，也称元分析、荟萃分析等)技术手段引入生态学以来(Fernandez-Duque & Valeggia, 1994)，采用这一方法完成的相关研究迅速增多。尤其是近20年来，随着Meta分析理论及相关统计软件的日益发展完善，生态学已经成为Meta分析应用最多、研究最为活跃的学科之一。比如，在引用Meta分析专业工具metafor软件的论文中(2025年7月25日Web of Science检索)，生态环境领域的论文有2,615篇，其数量多于行为学(2,290篇)、神经学(2,036篇)、心理学(2,016篇)、精神病学(1,404篇)、生化与分子生物学(1,320篇)、药理学(1,286篇)、公共环境和职业健康(1,255篇)、农学(1,239篇)与遗传学(1,125篇)等领域。又如，自2024年1月至2025年7月，*Nature*和*Science*上共发表Meta分析相关论文26篇，其中生态学领域的论文有15篇(占57.7%)，占比超其他学科总和。

当前，生态学领域的许多基础性问题都已依赖Meta分析技术得到了普适性较高的答案(Spake et al., 2022)。比如生物多样性与生态系统功能的关系(Hooper et al., 2012; Feng et al., 2022; Hua et al., 2022; Chen C et al., 2025)、人类活动对生物多样性的影响(Benítez-López et al., 2017; Keck et al., 2025)、生物多样性变化的时间趋势(van Klink et al., 2020)、全球变化的生态效应(Urban, 2024)、特定类群的生态功能(Xu et al., 2023; Wu et al., 2025)、生态保护措施的功效评价(Langhammer et al., 2024)等。尤其是在生物入侵、全球变化等需要大量案例支撑的领域，Meta分析的应用更加广泛(Gurevitch et al., 2018)。

尽管Meta分析的应用日益广泛，但对其结果可靠性的争议一直存在(Gurevitch et al., 2018)。一些学者认为Meta分析无法加深我们对自然系统的认知，并没有带来学科的实质性进步(Gillman & Wright, 2010)。但多数学者认为Meta分析与生态学自身的特点高度契合，如果应用得当，必将有力推动学科的知识整合与进步(Gurevitch et al., 2018)。Gurevitch等(2018)指出，对于Meta分析本身的争议，很大程度上源自人们对Meta分析方法的误解、误用甚至错用。同时，Meta分析方法仍在不断完善中。尤其是近20年来，随着统计学家对该方法的不断改进，其适用外延不断拓展，能够应对的场景大大增加，其统计效力和可靠性也不断增强(Nakagawa et al., 2017, 2023c; Spake et al., 2022)。但方法的快速发展，也为人们及时掌握其原理和适用场景带来了新的障碍。及时回顾相关分析理论和方法进展，向相关科研人员普及不同方法的适用场景，是保证Meta分析方法得以与时俱进并合理使用的重要途径。本文以Meta分析的基础理论与技术应用现状为背景，从具体步骤出发，试图阐述这一方法在应用中应注意的几个关键问题，以期推动Meta分析技术在国内得以更为科学合理的应用。

1 什么样的研究才能被称之为Meta分析

不少学者认为，只要是通过对不同研究案例的数据进行分析而完成的研究，就是Meta分析。甚至一些影响力颇大的研究案例也持此观点(van Klink et al., 2020)。这是对Meta分析方法的一大认知误区。Urban (2024)对Meta分析给予了精准的定义：“Meta分析是一种根据每项研究的估计精度来确定其贡献权重，进而对不同案例数据进行整合分析的技术，通常以单个案例方差的倒数作为估计精度(Meta-analysis is a technique that draws information from multiple studies and adjusts the weight of each study’s contributions based on its estimated precision, measured as the inverse variance of each study)”。Nakagawa等(2023c)也指出：“Meta分析的一个显著特点，就是通过纳入每个效应值的抽样方差来估计总体均值(A notable feature of a meta-analysis is that an overall mean is estimated by taking the sampling variance of each effect size into account)”。所以严格来说，Meta分析必须满足两个前提条件：(1)指标数据来自不同研究案例；(2)对于每个案例，必须为其赋予对应的权重，权重的赋值依据通常是指标的精确度(方差的倒数)。

所以，Meta分析实质上是同时考虑指标的均值(通常采用经特定公式计算的指标，即效应值，effect size，记为y_i)及其变异幅度(与权重呈反比)的加权分析(Gurevitch et al., 2018)。针对研究同一科学问题的不同案例，通过加权分析，使结果精度更高的案例在分析中所占权重更大，从而提高分析结果的可靠性。所以，对单个案例赋予合理、规范的权重，是Meta分析与一般数据分析方法的最大区别。严格来说，只有对不同研究案例都纳入了对应权重的分析才能称之为Meta分析。Gurevitch等(2018)呼吁，应把未考虑权重的分析排除在Meta分析范畴之外，以规范对Meta分析这一概念的界定，这也有助于减少学界对Meta分析的误读与滥用。

2 文献检索与筛选的规范性和可重复性

如何从大量文献中逐步筛选出最终所用文献，是保证Meta分析可行性、有效性和结果可重复性的基础。为了保障文献纳入过程的完整性、透明度和可重复性，2009年，由国际专家组成的研究团队发表了题为*Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement*的技术规范(Moher et al., 2010)，提出了Meta分析中文献检索与筛选的关键技术流程。该技术规范要求作者根据自己的科学问题，详尽列出检索词及其组合方式、明确论文纳入与排除标准，指明所用数据库和检索日期范围。并采用流程图的形式(图1)，详细报道从文献查询原始条目数量，到经重复文献去除、标题及摘要筛选、全文获取过滤以及正文内容评估等一系列步骤之后，满足文献纳入要求的文献数量(k)和最终得到的效应值数量(n)。这一过程也被称为对现有文献的系统性回顾(systematic review)，与后续的数据分析(meta-analysis)部分共同构成了支撑Meta分析研究的两大基础模块。

该技术规范一经推出，便迅速获得各领域学者的高度认可，引用量已超134,000次(截至2025年7月)，在所有学术文献中，引用次数位列第6。2021年PRISMA小组对该技术规范进行了更新(Page et al., 2021)。同年，生态学和进化生物学领域也发表了针对性的PRISMA技术规范(即PRISMA-EcoEvo V1.0) (O'Dea et al., 2021)。该研究由208位领域内专家对102篇Meta分析论文进行深度评估，结果发现只有约16%的案例报道规范程度较高。为此，




图1 PRISMA-文献筛选流程示意图。其中*k*1–*k*13代表每一步中涉及的文献数量，*n*为从文献中总共提取的效应值(即研究案例)数量。

Fig. 1 The PRISMA-flowchart in literature search. *k*1 to *k*13 represents the number of publications included or excluded at each stage of the literature search and *n* represents the total number of effect sizes derived from the selected literature.

PRISMA-EcoEvo提出了生态、进化领域内Meta分析论文中应注意的27项核心技术声明条目(O'Dea et al., 2021)。该技术规范具有较高的专业针对性和实践指导价值，为评估Meta分析研究的报道与写作的规范性提供了较高的参考依据。

3 效应值和案例内方差的选择与计算

文献筛选完成后，即可按一定的操作流程开展Meta分析的数据分析工作(图2)。在Meta分析中我们会用效应值衡量某种关系、影响或者某指标本身的强弱与大小。生态学中常用的效应值包括对数反应比(ln response ratio, lnRR)、Hedges' g (也称Hedges' d或Cohens' g)、Fisher's Z等(Nakagawa et al., 2023c)。尽管不同效应值的计算方法不同，但都依据几种基本原理构建：(1)处理组和对照组均值的比值(如lnRR); (2)处理组与对照组均值的差值(如Hedges' g); (3)变量之间的关联程度，如相关系数(或其他可转化为相关系数的统计量，如卡方值、F值、t值等)，依据样本量把相关系数转化为Fisher's Z，以Fisher's Z为效应值。除了效应值本身之外，我们还需要纳入其不确定性，即案例内方差(within study variance，记为v_i)，作为单个案例结果可靠性的度量依据。

需要指出的是，每种效应值都有与之对应的案例内方差计算方法，效应值必须与其案例内方差的计算方法保持一致。Nakagawa等(2023c)的综述中列举了12种y_i和v_i的计算方法，这里不再赘述。

在实际应用中，有时案例中的标准差(SD)会出现缺失，导致v_i无法计算，这时可完全依赖样本量来计算v_i:

$$v_i = (N_t + N_c)/(N_t \times N_c) \quad (1)$$

其中，N_t为处理组的样本量，N_c为对照组的样本量。这种情况下$1/v_i$也被称为有效样本量。需要注意的是，该方法虽应用较为普遍，但其合理性仍存争议(Nakagawa et al., 2023c)。

另一种目前被广泛采用的方法是对缺失标准差进行置换替代(imputation) (Kambach et al., 2020;




图2 Meta分析的数据分析流程示意图。其中右侧方框部分为数据存在标准差缺失或特殊数据结构时的应对方法。虚线表示侦测到明显的发表偏倚性时，应对累计效应值进行必要的修正。

Fig. 2 The flowchart of the data analysis in meta-analysis. The right part shows methods that can be used in datasets with missing SDs or different non-independent data structures. The dotted line represents the needed correction for cumulative effect size when publication bias was detected.

Nakagawa et al., 2023b), 该方法适用于部分案例标准差存在缺失的情况。其基本原理是根据无缺失数据案例中均值和方差的关联性, 采用一定的统计方法对缺失的标准差进行估算替代。Kambach等(2020)对11种标准差替代方法可靠性的模拟研究发现, 在采用lnRR为效应值的前提下, 置换替代法具有高度可靠性, 甚至在缺失数据占比达90%的情况下, 模型依旧可以获得无偏估计值。目前, 新的标准差置换替代方法仍被不断开发, 这也是Meta分析方法研究最为活跃的领域之一(Nakagawa et al., 2023b)。

4 Meta分析模型的选择

选择并计算效应值和案例内方差之后, 就可以采用Meta分析模型回答两大基本问题: (1)来自不同案例的效应值的总体大小, 即求出累计效应值(cumulative effect size), 也称效应值的总体均值(overall mean effect size); (2)效应值彼此之间的差异程度, 即效应值异质性分析。这两个问题的回答都涉及到Meta分析模型的选择和使用。

从发展历史来说, Meta分析主要经历了3种模型更替: 固定效应模型(fixed effect model, 也称common effect model)、随机效应模型(random effects model)以及层次模型(hierarchical model, 也称multilevel model)。这3种模型的根本区别在于对效应值变异来源的前提假设不同(Nakagawa et al., 2017)。

4.1 固定效应模型

固定效应模型认为, 对于同一主题的不同研究案例来说, 效应值应该有固定或共同的均值。所以效应值变异的来源只有案例自身的采样误差, 即案例内方差v_i, 其公式表达为:

$$y_i = \beta_0 + \varepsilon_i \tag{2}$$

其中, β_0为效应值的固定或共同均值, 即累计效应值, ε_i为误差项, 且$\varepsilon_i \sim normal(0, v_i)$。这时单个案例被赋予的权重为$w_i = 1/v_i$。

固定效应模型认为不同案例之间并没有实质性的差异。采样误差(即v_i)是y_i的唯一变异来源。固定效应模型是最初始的Meta分析模型, 适用于具有高度一致实验条件的不同案例。比如开展于培养箱、实验室内的不同案例, 实验条件参数能够保持高度一致, 这时有理由认为不同研究案例的效应值理论上应该是相同的(van Klink et al., 2020)。

4.2 随机效应模型

在生态学领域, 多数情况下案例数据都来源于异质性较强的野外观测或控制实验, 其研究背景往往存在实质性差异, 这使得固定效应模型要求的基本假设难以满足(Wallace et al., 2017)。而随机效应模型则放宽了变异来源的限制条件, 承认不同研究案例之间的差异是客观存在的, 并对其造成的方差进行估计。其公式为:

$$y_i = \beta_0 + \eta_i + \varepsilon_i \tag{3}$$

其中, β_0为累计效应值, η_i为一个随不同案例而变化的变量, 且$\eta_i \sim N(0, \tau^2)$, $\varepsilon_i \sim N(0, s^2)$, s^2为总采样方差:

$$s^2 = \frac{(k-1)\sum w_i}{\left(\sum w_i\right)^2 - \sum w_i^2}$$, $w_i = 1/v_i$, k为案例的个数。

在随机效应模型中, 单个案例被赋予的权重为$w_i^* = 1/(v_i + \tau^2)$。其中, τ^2即是由不同研究案例之间差异造成的方差, 称为案例间方差(between study variance)。是否假定τ^2的存在, 是固定效应模型和随机效应模型的根本区别。

需要说明的是, τ^2是一个绝对指标, 无法据其直观判定不同案例之间的差异程度。所以, 统计学家依据τ^2和s^2又构建了一个表征不同案例之间效应值异质性强弱的相对指标I^2 (inconsistency) (Higgins & Thompson, 2002; Higgins et al., 2003), 其计算公式为:

$$I^2 = \frac{\tau^2}{\tau^2 + s^2} \tag{4}$$

可见, I^2的意义为案例间方差(τ^2)在总随机方差($\tau^2 + s^2$)中所占的比重。I^2位于0–1之间, 其值越大说明不同案例之间的效应值差异越大。Senior等(2016)针对生态、进化领域内325篇Meta分析论文的统计结果表明, I^2的中位数为84.67%, 均值高达91.69%。说明该领域内, 针对同一主题的不同案例之间的结果差异很大, 这也是随机效应模型更适用于生态学的根本原因。

相对于固定效应模型, 随机效应模型考虑的误差来源更多, 统计结果会更为保守, 犯第一类型统计错误的概率更低(Wallace et al., 2017)。需要说明的是, 根据公式(3), 当案例间的方差τ^2很小, 非常接近0时, 随机效应模型和固定效应模型的结果将非常接近。所以理论上固定效应模型可以视为随机

效应模型的一种极端情况(即$\tau^2=0$)。由于生态学研究中变异来源的复杂性，固定效应模型目前已很少使用(Wallace et al., 2017)。

4.3 层次模型或多水平模型

相对于固定效应模型，随机效应模型纳入了案例间方差，认为不同案例相互独立且共同来源于一个方差为τ^2的正态分布总体。但事实上，在生态学领域，绝大多数情况下上述前提假设仍难以成立。比如，在同一篇文献中，往往可以提取多个案例(即多个效应值)。相对于其他效应值，来自同一篇文献中不同案例之间的效应值往往彼此更为相似。这违反了随机效应模型所有案例彼此独立的假设(Nakagawa et al., 2017)。以此类推，其他复杂的数据结构也会造成案例之间的不独立。比如，针对同一物种开展的不同研究案例；在同一地点开展的不同案例；在同一时间开展研究的不同案例等等。忽略案例之间的不独立性，会夸大统计模型中的独立样本量，增加犯第一类型统计错误的概率，影响Meta分析结果的可靠性(Nakagawa et al., 2023c)。

为了解决这种数据中普遍存在的不独立性问题，层次模型便应运而生。相对于固定效应模型和随机效应模型，层次Meta分析模型是目前最先进、功能最强大的Meta分析模型(Song et al., 2020; Nakagawa et al., 2022a)。事实上，层次Meta分析模型可视为随机效应模型的扩展，在其基础上加入了因数据存在层次或嵌套结构而造成的方差。其公式为:

$$y_i = \beta_0 + u_{j[i]} + \eta_i + \varepsilon_i \tag{5}$$

其中$u_{j[i]}$为随嵌套单元(如文献、物种、地点等)而变化的变量，且:

$$u_{j[i]} \sim N\left(0, \sigma^2\right) \tag{6}$$

其中σ^2即为嵌套单元造成的效应值的方差。

由于层次模型可以充分考虑复杂来源数据的结构特征，相对于固定效应模型和随机效应模型，其与数据结构的匹配程度更高，犯第一类型统计错误的概率更低，结果也更为可靠(Yang et al., 2022)。当前，固定效应模型和随机效应模型常被称为传统Meta分析模型，而层次模型则常被称为现代Meta分析模型(Benítez-López et al., 2017; Rossetti et al., 2017)。近年来一些学者呼吁，在生态、进化及环境领域，要尽量使用层次模型开展Meta分析，以提升结果的可靠性(Gurevitch et al., 2018; Nakagawa et al., 2023c)。

事实上，层次模型已成为近年来生态学领域高水平期刊中的主流Meta分析模型(Nakagawa et al., 2023c)。比如，笔者对2024年以来*Nature*和*Science*上发表的15篇生态学领域Meta分析相关论文的梳理发现，其中12篇采用了层次模型(占80%)，1篇(6.7%)采用了随机效应模型，另2篇(13.3%)采用了一般性数据分析方法(非Meta分析专属方法)。需要指出的是，在同一层次模型中，可以设置多个或多层嵌套结构。比如一项探讨打猎行为对动物多度影响的Meta分析研究中，同时将地点和物种设置为嵌套单元(Benítez-López et al., 2017)。另一项针对植物多样性与生态系统功能关系的Meta分析则设置了5层嵌套结构(Hua et al., 2022)。

5 方差不独立结构的纳入

层次模型可以纳入数据的嵌套结构，针对性地处理效应值的不独立性问题。实际应用中，除了效应值之外，不同的案例内方差v_i之间，也可能由于特定的实验设计或者数据结构而导致不独立性的出现。其中较常见的情况是由于多个处理公用一个对照造成部分v_i之间不独立，以及由系统发育关系造成v_i之间的不独立问题。

比如，在探究海拔梯度上多样性的变化格局时，不同的处理组都以最低海拔组为对照组，或者在增温实验中，不同增温处理组都以自然温度组为对照组开展对比，都会造成上述v_i的不独立问题。我们以与lnRR匹配的v_i的计算方法为例，假定有3个案例共用一个对照，那么3个案例的v_i分别为:

$$v_1 = \frac{S_{e1}^2}{N_{e1}Y_{e1}^2} + \frac{\boldsymbol{S_c^2}}{\boldsymbol{N_cY_c^2}} \tag{7}$$

$$v_2 = \frac{S_{e2}^2}{N_{e2}Y_{e2}^2} + \frac{\boldsymbol{S_c^2}}{\boldsymbol{N_cY_c^2}} \tag{8}$$

$$v_3 = \frac{S_{e3}^2}{N_{e3}Y_{e3}^2} + \frac{\boldsymbol{S_c^2}}{\boldsymbol{N_cY_c^2}} \tag{9}$$

其中加粗部分即为由于共用同一对照而产生的共同方差，即协方差。那么，我们便可以构建3个案例之间的方差-协方差矩阵(variance-covariance matrix):其对角线位置为各个案例自身的v_i，非对角线位置为案例间的协方差。

$$VCV_{Matrix}=\begin{bmatrix} & \text{案例1} & \text{案例2} & \text{案例3} \\ \text{案例1} & \frac{S_{e1}^2}{N_{e1}Y_{e1}^2}+\frac{S_c^2}{N_cY_c^2} & \frac{S_c^2}{N_cY_C^2} & \frac{S_c^2}{N_cY_c^2} \\ \text{案例2} & \frac{S_c^2}{N_cY_c^2} & \frac{S_{e2}^2}{N_{e2}Y_{e2}^2}+\frac{S_c^2}{N_cY_c^2} & \frac{S_c^2}{N_cY_c^2} \\ \text{案例3} & \frac{S_c^2}{N_cY_c^2} & \frac{S_c^2}{N_cY_c^2} & \frac{S_{e3}^2}{N_{e3}Y_{e3}^2}+\frac{S_c^2}{N_cY_c^2} \end{bmatrix}$$

这时，我们需要以上述方差-协方差矩阵替换v_i，纳入层次模型之中，以提升模型和数据结构特征的匹配程度，降低犯第一类型统计错误的风险(Driscoll et al., 2024)。此外，对于涉及较多物种的数据，由于进化历史关系不同，不同物种之间可能并不独立。亲缘关系较近的物种，即在进化历史上“绑定”时间更长的物种，其性状和对环境的响应往往也更为相似。这时，为了促进模型和数据结构的匹配程度，可以把物种间的系统发育关系转化为表征两两物种亲缘关系强弱的方差-协方差矩阵或相关矩阵，纳入到层次模型之中(Bennett et al., 2020; Pottier et al., 2024)。同样，在更接近的时间或空间上完成的不同案例，其结果往往也更为接近。对于空间与时间自相关，也可以指定自相关结构类型，将其纳入层次模型之中。需要指出的是，我们也可以事先对数据是否具有系统发育或时空自相关信号进行相应检验，如信号不明显，那么采用一般层次模型同样也可以获得可靠结果(Tucker et al., 2023; Wu et al., 2025)。

6 解释变量的引入: Meta回归

寻找效应值在不同案例之间差异的原因，是Meta分析需要回答的另一个核心问题。这时需要引入一些预设的解释变量(Meta分析中也常称为调节变量，moderators)来判定这些变量与效应值的量化关系，即所谓Meta回归(Nakagawa et al., 2023c)。Meta回归可以识别单个研究案例所无法识别的因子或机制，这通常也是Meta分析最大的创新点和意义所在。预设的因素既可以是分类型变量，也可以是数值型变量，或者二者皆有。需要强调的是，随着同一模型中解释变量数量的增多，模型对样本量的要求也随之增大。通常每增加一个解释变量，研究案例数量应增加10个以上(Nakagawa et al., 2017)。对于分类变量，有学者认为其每个水平下的案例数量都应多于5个，否则就应将该水平剔除(Langhammer et al., 2024)。需要特别说明的是，当解释变量为分类变量时，Meta回归相比传统亚组分析(即单独对分类变量的每个水平进行分析)更具统计效力，也是当前统计学专家推荐的做法(Nakagawa et al., 2023c)。

随着软件工具的发展和完善，在解释变量较多、样本量满足要求且排除因子共线性问题($|r|>0.7$)之后(Nakagawa et al., 2017)，目前已可以开展基于AIC值或随机森林的解释变量重要性排序，以及全子集自动模型选择。然后基于全体模型或最优模型集开展模型平均，得到最终的参数估计结果(Terrer et al., 2021; Hua et al., 2022)。对于分类变量，开展多重比较时应注意对P值进行矫正，以降低犯第一类型统计错误的概率(Lundgren et al., 2024; Chen C et al., 2025)。此外，在效应值随解释变量呈明显的非线性关系时，可以针对性地采用非线性Meta分析模型开展Meta回归(Ohayon et al., 2021)。

7 结果可靠性分析

发表偏倚性一直被认为是影响Meta分析结果可靠性的最重要因素。在论文发表过程中，那些效应值较强、结果较为“显著”的案例，往往也具有较高的发表机会。而那些效应值弱、统计上“不显著”的案例，被期刊拒稿的可能性则较大(Nakagawa et al., 2022b)。一些样本量较小的案例往往更容易获得较强的效应值，从而赢得更多的发表机会，造成“小样本偏倚性” (Nakagawa et al., 2022b)。同时，在特定研究主题下，效应值较强的研究案例往往可以更快地发表。而效应值较弱或“不显著”的案例，发表的过程往往更缓慢。这会造成效应值的绝对值随时间呈现衰减趋势，即时间降低或迟滞效应

(Nakagawa et al., 2022b)。

为了衡量各种类型的发表偏倚性对结果的影响, 统计学家设计了失安全系数、漏斗图及其对称性检验等方法以检验结果的可靠性。当侦测到发表偏倚性影响确实存在时, 可以用剪补法(trim-fill)对结果进行修正(Nakagawa et al., 2022b)。前人已对这些方法进行了大量介绍(Møller & Jennions, 2001; Fanelli et al., 2017), 这里不再赘述。

需要说明的是, 对于层次模型, 目前尚没有对漏斗图进行对称性检验和结果矫正的标准方法。目前较为常见的做法是在层次模型中, 以$\sqrt{1/v_i}$ (或有效样本量的平方根)为解释变量进行Meta回归, 以其回归系数与0是否有显著差异作为判定发表偏爱性存在与否的依据。可以把中心化后(mean = 0)的发表年份作为协变量加入到模型中, 以其回归系数与0是否有显著差异判定迟滞效应是否存在(Nakagawa et al., 2022b, 2023b)。在实际应用中, 也可以通过重新构建一个随机效应模型(即不考虑数据的层次结构), 对其漏斗图进行对称性检验和必要的剪补修正, 作为对层次模型结果可靠性的补充说明(Peng et al., 2019; Thakur et al., 2025)。

除对发表偏倚性的评估和矫正外, 通过敏感性分析评估个别研究案例的纳入或排除对整体结果的影响, 同样是保证Meta分析结果可靠性的必要一环。通常, 敏感性分析包括评估单一案例的逐步纳入或去除对累计效应值的影响(Nakagawa et al., 2023c)。同时, 将部分数据进行随机或指定删除(如数值大小可疑的案例、来源于特定区域、方法及文献类型的案例等), 检验结果受影响程度, 也是近年来应用较多的方法(Shaw et al., 2025)。需要指出的是, 对于层次模型, 当前尚无对应工具可以自动实现上述敏感性分析过程。

8 Meta分析在自身实验数据中的应用

Meta分析的理念与方法并非只能用于不同文献来源的数据分析。对于直接来源于研究者完成的实验数据(这里称为自身实验数据), 如果能对应的构建一系列效应值和相应的案例内方差, 同样可以采用Meta分析的理念和方法来分析数据。比如一项研究采用Meta分析方法对比了自身实验中不同种仁切除比率对植物种子萌发、幼苗生长和生物量分配的影响(Chen SC et al., 2025)。一些大尺度、多团队合作的联合实验也是Meta分析方法的理想用武之地。比如, 一项研究对全球23个森林动态监测样地分别构建了y_i和v_i, 明确了同种密度制约效应随纬度的变化格局(Hülsmann et al., 2024)。另一项基于澳大利亚62个研究项目数据的Meta分析, 量化了2019–2020年澳大利亚野火对生物多样性的影响(Driscoll et al., 2024)。一项研究对中国西南山地132个物种高/低价值器官的防御投入及其相关的植食率进行Meta分析, 探讨了最优防御理论对植物防御投入在器官水平上的分配格局及其影响机制[①]。

相对于依赖文献数据的Meta分析, 基于自身实验或联合研究项目的Meta分析具有更强的时效性, 不同案例的效应值也具有更高可比性。由于自身实验数据不受同行评审造成的发表偏倚性和时间迟滞性的影响, 所以无需对结果进行相关发表偏倚性诊断和矫正。Meta分析方法在自身实验数据中的应用, 无疑为一些大尺度联合实验和相关基础生态问题的回答提供强了更为严谨、有力的统计工具。

9 Meta分析软件与在线学习资源介绍

开源数据分析工具R语言中的metafor工具包是生态、进化和环境相关学科最为依赖的专业Meta分析工具(Viechtbauer, 2010; Lortie & Filazzola, 2020)。该工具包具有完备的功能, 如效应值计算、多种模型拟合(固定效应模型、随机效应模型、层次模型)、系统发育关系、方差-协方差矩阵和时间自相关的纳入、发表偏倚性诊断以及结果制图等。目前该工具包仍在不断地完善与更新。近年来, 一些metafor下游工具软件可以便捷地实现基于metafor的自动模型选择(如glmulti、MuMIn)、统计量计算(如emmeans、multicomp)、输出以及结果制图(如orchaRd、metaviz) (Nakagawa et al., 2023a)。

交互式Meta分析工具OpenMEE是一种无需编码、用户体验更为简单直接的绿色免费软件, 可以实现除层次模型之外的Meta分析模型拟合(Wallace et al., 2017)。但当前该软件的制图、模型选择等功能尚不完善。需要说明的是, metafor和OpenMEE目前都只能处理线性Meta回归模型, 一些非线性Meta

① 马志隆 (2025) 植物防御在器官水平的分布格局. 硕士学位论文, 中国科学院昆明植物研究所, 昆明.

分析模型可以采用mgcv、brms等工具包完成(Ohayon et al., 2021)。一些机器学习工具(如metaforest)也已实现与metafor的关联(Terrer et al., 2021), 适用于复杂作用类型下的Meta分析以及因子重要性选择。此外, metafor的官方网站(https://www.metafor-project.org/doku.php/metafor)提供了大量模型拟合、结果制图、制表案例数据、代码和常见问题解答。Nakagawa等(2023c)在其论文附件中, 也给出了内容丰富的Meta分析实用教程(https://itchyshin.github.io/Meta-analysis_tutorial/)。

在明确上述问题的基础上, Meta分析研究的执行者、审稿人以及期刊编辑可以依据以下技术准则判定一项Meta分析研究的规范程度(Doi & Thalib, 2008): (1)有无明确给出检索词及其组合方式; (2)有无同时在两个或两个以上数据库中检索文献; (3)“灰色文献” (即未经同行评审的文献, 主要指学位论文及各种来源的未发表数据)是否被纳入; (4)有无对单个案例赋予权重; (5)对所选用的统计模型有无全面描述; (6)有无对效应值的异质性进行度量和描述, 并提供相关指标; (7)有无进行发表偏倚性分析; (8)研究所用的数据、代码是否可公开获取。

综上所述, 近20年来, Meta分析的理念和技术已经取得了长足进步, 模型的可塑性及其与现实数据结构的匹配程度都已大大提升。多来源数据中常见的嵌套性、系统发育关系、时空自相关、非线性关系、数据缺失、发表偏倚性等各种问题, 都已经有了较好的应对方案, 这大大提升了Meta分析的适用范围和结果可靠性。Meta分析方法, 尤其是层次Meta分析模型的科学、合理使用, 必将为生态学现有数据的挖掘与整合分析提供更为强力、可靠的技术保障。

致谢: 感谢责任编委及两位审稿人对本文提出的宝贵意见和建议!

ORCID

张霜 https://orcid.org/0000-0002-7367-4917
宋波 https://orcid.org/0000-0002-0211-1375

参考文献

Benítez-López A, Alkemade R, Schipper AM, Ingram DJ, Verweij PA, Eikelboom JAJ, Huijbregts MAJ (2017) The impact of hunting on tropical mammal and bird populations. Science, 356, 180–183.

Bennett JM, Steets JA, Burns JH, Burkle LA, Vamosi JC, Wolowski M, Arceo-Gómez G, Burd M, Durka W, Ellis AG, Freitas L, Li JM, Rodger JG, Ştefan V, Xia J, Knight TM, Ashman TL (2020) Land use and pollinator dependency drives global patterns of pollen limitation in the Anthropocene. Nature Communications, 11, 3999.

Chen C, Xiao WY, Chen HYH (2025) Meta-analysis reveals global variations in plant diversity effects on productivity. Nature, 638, 435–440.

Chen SC, Antonelli A, Huang X, Wei N, Dai C, Wang QF (2025) Large seeds as a defensive strategy against partial granivory in the Fagaceae. Journal of Ecology, 113, 598–607.

Doi SAR, Thalib L (2008) A quality-effects model for meta-analysis. Epidemiology, 19, 94–100.

Driscoll DA, MacDonald KJ, Gibson RK, Doherty TS, Nimmo DG, Nolan RH, Ritchie EG, Williamson GJ, Heard GW, Tasker EM, …, Green M, Gilpin AM, Cook JM, Power SA, Hogendoorn K, Brawata R, Jolly CJ, Tozer M, Reiter N, Phillips RD (2024) Biodiversity impacts of the 2019–2020 Australian megafires. Nature, 635, 898–905.

Fanelli D, Costas R, Ioannidis JPA (2017) Meta-assessment of bias in science. Proceedings of the National Academy of USA, 114, 3714–3719.

Feng YH, Schmid B, Loreau M, Forrester DI, Fei SL, Zhu JX, Tang ZY, Zhu JL, Hong PB, Ji CJ, Shi Y, Su HJ, Xiong XY, Xiao J, Wang SP, Fang JY (2022) Multispecies forest plantations outyield monocultures across a broad range of conditions. Science, 376, 865–868.

Fernandez-Duque E, Valeggia C (1994) Meta-analysis: A valuable tool in conservation research. Conservation Biology, 8, 555–561.

Gillman LN, Wright SD (2010) Mega mistakes in meta-analyses: Devil in the detail. Ecology, 91, 2550–2552.

Gurevitch J, Koricheva J, Nakagawa S, Stewart G (2018) Meta-analysis and the science of research synthesis. Nature, 555, 175–182.

Higgins JPT, Thompson SG (2002) Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine, 21, 1539–1558.

Higgins JPT, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG (2003) Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ, 327, 557–560.

Hooper DU, Adair EC, Cardinale BJ, Byrnes JEK, Hungate BA, Matulich KL, Gonzalez A, Duffy JE, Gamfeldt L, O'Connor MI (2012) A global synthesis reveals biodiversity loss as a major driver of ecosystem change. Nature, 486, 105–108.

Hua FY, Bruijnzeel LA, Meli P, Martin PA, Zhang J, Nakagawa S, Miao XR, Wang WY, McEvoy C, Peña-Arancibia JL, Brancalion PHS, Smith P, Edwards DP, Balmford A (2022) The biodiversity and ecosystem service

contributions and trade-offs of forest restoration approaches. Science, 376, 839–844.

Hülsmann L, Chisholm RA, Comita L, Visser MD, de Souza Leite M, Aguilar S, Anderson-Teixeira KJ, Bourg NA, Brockelman WY, Bunyavejchewin S, Castaño N, Chang-Yang CH, Chuyong GB, Clay K, Davies SJ, Duque A, Ediriweera S, Ewango C, Gilbert GS, Holík J, Howe RW, Hubbell SP, Itoh A, Johnson DJ, Kenfack D, Král K, Larson AJ, Lutz JA, Makana JR, Malhi Y, McMahon SM, McShea WJ, Mohamad M, Nasardin M, Nathalang A, Norden N, Oliveira AA, Parmigiani R, Perez R, Phillips RP, Pongpattananurak N, Sun IF, Swanson ME, Tan S, Thomas D, Thompson J, Uriarte M, Wolf AT, Yao TL, Zimmerman JK, Zuleta D, Hartig F (2024) Latitudinal patterns in stabilizing density dependence of forest communities. Nature, 627, 564–571.

Kambach S, Bruelheide H, Gerstner K, Gurevitch J, Beckmann M, Seppelt R (2020) Consequences of multiple imputation of missing standard deviations and sample sizes in meta-analysis. Ecology and Evolution, 10, 11699–11712.

Keck F, Peller T, Alther R, Barouillet C, Blackman R, Capo E, Chonova T, Couton M, Fehlinger L, Kirschner D, Knüsel M, Muneret L, Oester R, Tapolczai K, Zhang H, Altermatt F (2025) The global human impact on biodiversity. Nature, 641, 395–400.

Langhammer PF, Bull JW, Bicknell JE, Oakley JL, Brown MH, Bruford MW, Butchart SHM, Carr JA, Church D, Cooney R, Cutajar S, Foden W, Foster MN, Gascon C, Geldmann J, Genovesi P, Hoffmann M, Howard-McCombe J, Lewis T, MacFarlane NBW, Melvin ZE, Merizalde RS, Morehouse MG, Pagad S, Polidoro B, Sechrest W, Segelbacher G, Smith KG, Steadman J, Strongin K, Williams J, Woodley S, Brooks TM (2024) The positive impact of conservation action. Science, 384, 453–458.

Lawton JH (1999) Are there general laws in ecology? Oikos, 84, 177–192.

Lortie CJ, Filazzola A (2020) A contrast of meta and metafor packages for meta-analyses in R. Ecology and Evolution, 10, 10916–10921.

Lundgren EJ, Bergman J, Trepel J, Roux E, Monsarrat S, Kristensen JA, Pedersen RØ, Pereyra P, Tietje M, Svenning JC (2024) Functional traits—not nativeness—shape the effects of large mammalian herbivores on plant communities. Science, 383, 531–537.

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG (2010) Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. International Journal of Surgery, 8, 336–341.

Møller AP, Jennions MD (2001) Testing and adjusting for publication bias. Trends in Ecology & Evolution, 16, 580–586.

Nakagawa S, Lagisz M, Jennions MD, Koricheva J, Noble DWA, Parker TH, Sánchez-Tójar A, Yang YF, O'Dea RE (2022a) Methods for testing publication bias in ecological and evolutionary meta-analyses. Methods in Ecology and Evolution, 13, 4–21.

Nakagawa S, Lagisz M, O'Dea RE, Pottier P, Rutkowska J, Senior AM, Yang YF, Noble DWA (2023a) orchaRd 2.0: An R package for visualising meta-analyses with orchard plots. Methods in Ecology and Evolution, 14, 2003–2010.

Nakagawa S, Noble DWA, Lagisz M, Spake R, Viechtbauer W, Senior AM (2023b) A robust and readily implementable method for the meta-analysis of response ratios with and without missing standard deviations. Ecology Letters, 26, 232–244.

Nakagawa S, Noble DWA, Senior AM, Lagisz M (2017) Meta-evaluation of meta-analysis: Ten appraisal questions for biologists. BMC Biology, 15, 18.

Nakagawa S, Senior AM, Viechtbauer W, Noble DWA (2022b) An assessment of statistical methods for nonindependent data in ecological meta-analyses: Comment. Ecology, 101, e03490.

Nakagawa S, Yang YF, MacArtney EL, Spake R, Lagisz Ma (2023c) Quantitative evidence synthesis: A practical guide on meta-analysis, meta-regression, and publication bias tests for environmental sciences. Environmental Evidence, 12, 8.

O'Dea RE, Lagisz M, Jennions MD, Koricheva J, Noble DWA, Parker TH, Gurevitch J, Page MJ, Stewart G, Moher D, Nakagawa S (2021) Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses in ecology and evolutionary biology: A PRISMA extension. Biological Reviews, 96, 1695–1722.

Ohayon S, Granot I, Belmaker J (2021) A meta-analysis reveals edge effects within marine protected areas. Nature Ecology & Evolution, 5, 1301–1308.

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, Shamseer L, Tetzlaff JM, Akl EA, Brennan SE, Chou R, Glanville J, Grimshaw JM, Hróbjartsson A, Lalu MM, Li TJ, Loder EW, Mayo-Wilson E, McDonald S, McGuinness LA, Stewart LA, Thomas J, Tricco AC, Welch VA, Whiting P, Moher D (2021) The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic Reviews, 10, 89.

Peng SJ, Kinlock NL, Gurevitch J, Peng SL (2019) Correlation of native and exotic species richness: A global meta-analysis finds no invasion paradox across scales. Ecology, 100, e02552.

Pottier P, Noble DWA, Seebacher F, Wu NC, Burke S, Lagisz M, Schwanz LE, Drobniak SM, Nakagawa S (2024) New horizons for comparative studies and meta-analyses. Trends in Ecology & Evolution, 39, 435–445.

Rossetti MR, Tscharntke T, Aguilar R, Batáry P (2017) Responses of insect herbivores and herbivory to habitat fragmentation: A hierarchical meta-analysis. Ecology Letters, 20, 264–272.

Senior AM, Grueber CE, Kamiya T, Lagisz M, O'Dwyer K,

Santos ESA, Nakagawa S (2016) Heterogeneity in ecological and evolutionary meta-analyses: Its magnitude and implications. Ecology, 97, 3293–3299.

Shaw RE, Farquharson KA, Bruford MW, Coates DJ, Elliott CP, Mergeay J, Ottewell KM, Segelbacher G, Hoban S, Hvilsom C, Pérez-Espona S, Ruņģis D, Aravanopoulos F, Bertola LD, Cotrim H, Cox K, Cubric-Curik V, Ekblom R, Godoy JA, Konopiński MK, Laikre L, Russo IM, Veličković N, Vergeer P, Vilà C, Brajkovic V, Field DL, Goodall-Copestake WP, Hailer F, Hopley T, Zachos FE, Alves PC, Biedrzycka A, Binks RM, Buiteveld J, Buzan E, Byrne M, Huntley B, Iacolina L, Keehnen NLP, Klinga P, Kopatz A, Kurland S, Leonard JA, Manfrin C, Marchesini A, Millar MA, Orozco-terWengel P, Ottenburghs J, Posledovich D, Spencer PB, Tourvas N, Unuk Nahberger T, van Hooft P, Verbylaite R, Vernesi C, Grueber CE (2025) Global meta-analysis shows action is needed to halt genetic diversity loss. Nature, 638, 704–710.

Song C, Peacor SD, Osenberg CW, Bence JR (2020) An assessment of statistical methods for nonindependent data in ecological meta-analyses. Ecology, 101, e03184.

Spake R, O'Dea RE, Nakagawa S, Doncaster CP, Ryo M, Callaghan CT, Bullock JM (2022) Improving quantitative synthesis to achieve generality in ecology. Nature Ecology & Evolution, 6, 1818–1828.

Terrer C, Phillips RP, Hungate BA, Rosende J, Pett-Ridge J, Craig ME, van Groenigen KJ, Keenan TF, Sulman BN, Stocker BD, Reich PB, Pellegrini AFA, Pendall E, Zhang H, Evans RD, Carrillo Y, Fisher JB, Van Sundert K, Vicca S, Jackson RB (2021) A trade-off between plant and soil carbon storage under elevated CO_2. Nature, 591, 599–603.

Thakur MP, Gu ZZ, van Kleunen M, Zhou XH (2025) Invasion impacts in terrestrial ecosystems: Global patterns and predictors. Science, 390, 381–385.

Tucker MA, Schipper AM, Adams TSF, Attias N, Avgar T, Babic NL, Barker KJ, Bastille-Rousseau G, Behr DM, Belant JL, …, Wagler BL, Whittington J, Wikelski M, Wilmers CC, Wittemyer G, Young JK, Zięba F, Zwijacz-Kozica T, Huijbregts MAJ, Mueller T (2023) Behavioral responses of terrestrial mammals to COVID-19 lockdowns. Science, 380, 1059–1064.

Urban MC (2024) Climate change extinctions. Science, 386, 1123–1128.

van Klink R, Bowler DE, Gongalsky KB, Swengel AB, Gentile A, Chase JM (2020) Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances. Science, 368, 417–420.

Viechtbauer W (2010) Conducting meta-analyses in R with the metafor package. Journal of Statistical Software, 36, 1–48.

Wallace BC, Lajeunesse MJ, Dietz G, Dahabreh IJ, Trikalinos TA, Schmid CH, Gurevitch J (2017) OpenMEE: Intuitive, open-source software for meta-analysis in ecology and evolutionary biology. Methods in Ecology and Evolution, 8, 941–947.

Wu DH, Du EZ, Eisenhauer N, Mathieu J, Chu CJ (2025) Global engineering effects of soil invertebrates on ecosystem functions. Nature, 640, 120–129.

Xu CL, Silliman BR, Chen JS, Li XC, Thomsen MS, Zhang Q, Lee J, Lefcheck JS, Daleo P, Hughes BB, Jones HP, Wang R, Wang SP, Smith CS, Xi XQ, Altieri AH, van de Koppel J, Palmer TM, Liu LL, Wu JH, Li B, He Q (2023) Herbivory limits success of vegetation restoration globally. Science, 382, 589–594.

Yang YF, Hillebrand H, Lagisz M, Cleasby I, Nakagawa S (2022) Low statistical power and overestimated anthropogenic impacts, exacerbated by publication bias, dominate field studies in global change biology. Global Change Biology, 28, 969–989.

(责任编委: 乔慧捷　责任编辑: 黄祥忠)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE
2026, 34 (1): 25278, pages 1–9
doi: 10.17520/biods.2025278
cstr: 32101.14.biods.2025278

•生态学数据分析方法专题•

α多样性指数选择：不等量采样下的模拟比较

邹怡*

西交利物浦大学理学院健康与环境科学系，江苏苏州 215123

摘要： 采样不均衡是群落生态学实地调查的普遍问题。如何选择合适的α多样性度量指标，使其在样点间样本量差异下有稳定的表现对于生物多样性研究十分重要。本文通过模拟群落的方法，评估了9个α多样性度量指标的表现，包含5个直接计算的“观测型指数”: (1)物种丰富度, (2) Shannon指数, (3) Simpson指数, (4) Hurlbert稀释物种数, (5) Fisher’s α指数，以及4个估算丰富度的“估算型指数”: (1) Chao1指数，(2)基于丰度的覆盖估计值(abundance-based coverage estimator, ACE), (3) iNEXT (interpolation/extrapolation)外推值, (4)总预期物种数(total expected species, TES)。模拟评估了各个指数在不同的采样阈值下，其样点间的方差被环境梯度解释力(线性模型R^2)的准确性与精确性。模拟构建了20个样点的虚拟群落，假设真实物种数S与环境梯度x呈线性关系且理论R^2为0.8，然后生成一系列梯度下，不同最小采样阈值模拟的不等量采样场景，并计算各指数与x的线性回归R^2。结果显示，采样强度(样点记录到的个体数及与之等价的采样完整度)是决定指数有效性的首要因素。随着样本量的提升，所有α多样性度量指标的模型R^2显著提升。在极低采样场景下(样点中最低样本量低于20个个体，采样完整度 < 20%)，稀释物种数的平均R^2明显优于其余指数；最低样本量升至100个个体后，估算型指数整体优于观测型指数。本研究进一步明确了各个指数恢复设定R^2所需要的最小样本量及对应的采样完整度。综合来看，在样本极少的不等量采样场景中，优先推荐采用稀释物种数。在实际研究中，应将稀释值设定在一个相对较高的水平(如 > 40个个体)，即使因此丢弃极端不足的样点，也能在总体上提高样点间的可比性。当样本量充足时，可采用物种丰富度估算指数，以获得最接近真实梯度的丰富度外推值。

关键词： 群落生态学；生物多样性指数；物种丰富度；不完全探测；环境因子；采样完整度

邹怡 (2026) α多样性指数选择: 不等量采样下的模拟比较. 生物多样性, 34, 25278. doi: 10.17520/biods.2025278; cstr: 32101.14.biods.2025278.
Zou Y (2026) Alpha-diversity index selection: Simulation comparison under unequal sampling. Biodiversity Science, 34, 25278. doi: 10.17520/biods.2025278; cstr: 32101.14.biods.2025278.

Alpha-diversity index selection: Simulation comparison under unequal sampling

Yi Zou*

Department of Health and Environmental Sciences, School of Science, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, Jiangsu 215123, China

ABSTRACT

Aims: Unequal sampling is a common issue in field-based community ecology. Choosing α-diversity metrics that remain robust when sample sizes vary among plots is critical for reliable biodiversity assessment. This study evaluated the performance of nine diversity indices, including five “observed” indices calculated directly from the data: (1) species richness, (2) Shannon index, (3) Simpson index, (4) Hurlbert’s rarefied richness, and (5) Fisher’s α; and four “richness-estimator” indices: (1) Chao1 index, (2) abundance-based coverage estimator (ACE), (3) the extrapolated value of iNEXT (interpolation/extrapolation), and (4) total expected species (TES).

Methods: Using simulation, the performance of each index was evaluated under a gradient of minimum-sample thresholds, and for each case the accuracy and precision of between-sites variance (linear regression R^2) was recorded. The simulation built up 20 sites in which “true” species richness (S) was linearly correlated with an environmental gradient (x) with a theoretical coefficient of determination $R^2 = 0.80$. Four unequal-sampling scenarios were then generated by imposing different minimum sample sizes per site. For each scenario, linear models were fitted between

收稿日期 Received: 2025-07-18; 接受日期 Accepted: 2025-09-17
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: YI.ZOU@xjtlu.edu.cn

every diversity index and x, recording the corresponding R^2.
Results: The results indicate that sample size (the number of individuals recorded at a sampling site, as well as the equivalent sampling completeness) is the primary factor determining index performance. As sample size increased, model R^2 of all diversity metrics significantly improved. Under extremely low sampling (minimum < 20 individuals; sampling coverage < 20 %), rarefied richness had a higher R^2 than other indices. When the minimum sample size reached 100 individuals, the estimator indices group outperformed the observed indices. This study further clarified the minimum sample size and the corresponding sampling completeness required for each index to recover the predetermined R^2.
Conclusion: Overall, rarefied richness is recommended for highly unequal, sample size-poor scenarios. In practice, rarefaction threshold should be set at a relatively high level (e.g., > 40 individuals) to enhance the overall comparability among sampling sites, even if it results in the exclusion of extremely under sampled sites. Once sampling completeness is adequate, richness estimators are preferable, as they can generate extrapolated richness that are close to the true gradient.
Key words: community ecology; biodiversity metrics; species richness; incomplete detection; environmental factor; sampling completeness

生物多样性是衡量群落结构与组成的重要指标, 广泛应用于生态学基础研究、长期监测项目、保护区划分等场景。Whittaker (1960)将生物多样性分为3个层次: α、β和γ多样性。其中, α多样性关注单一样本内的物种数量。至今已提出多种α多样性指数, 也有不少相关文献对各指数的性质进行了讨论和评述(马克平和刘玉明, 1994; Gotelli & Colwell, 2001; Chao & Chiu, 2016)。

在实际生态学调查研究中, 不同样点往往因时间、人力、天气或生境的差异而呈现“不等量采样”: 有的样点仅记录到个位数个体, 而另一些可能获得上百甚至上千个个体。这种情况在研究活动能力较强的昆虫、鸟类等类群时尤为常见。采样强度直接影响稀有物种被检测到的概率, 其差异往往对多样性指数的计算产生显著影响(Hurlbert, 1971; Beck & Schwanghart, 2010)。当样本量不足时, 观测的物种丰富度往往显著低于真实值, 与物种分布有关的指数(如Shannon指数)也会因优势物种重复记录而表现为偏低的均匀度; 随着样本量增加, 稀有物种逐步被发现, 观测多样性才逐渐逼近真实群落水平。因此, 在比较不同采样量的样点时, 采用不同的生物多样性指数可能导致不同的结论(Beck & Schwanghart, 2010)。

目前已有大量研究与方法探讨在采样不足的情况下如何估算“真实”物种丰富度(Chao, 1984; Chao & Lee, 1992; Hsieh et al., 2016; Zou et al., 2023), 以及评估多样性指数在样本不足时与真实值之间的差异(Beck & Schwanghart, 2010; Reese et al., 2014)。然而, 生态学研究的核心目的之一是检测样点间的差异(between-sample variance), 并揭示这些差异有多大程度可由环境因子解释。因此, 一个理想的指数不必完全还原“真实”物种丰富度, 但必须在不同样点之间保持与真实梯度一致的相对变异度, 即在样本不等量且不均衡的情况下, 仍能准确捕捉样点间的差异。然而, 评估不同多样性指数捕捉样点间差异能力的相关研究仍然相对匮乏。

由于不同类型的多样性指数在采样不均衡条件下可能表现出不同的稳定性, 本文旨在通过模拟研究比较多种α多样性指数在不同采样强度下对于还原环境梯度变化响应的准确性与稳定性, 探索哪些指数在小样本条件下仍能保持相对稳定的指示作用。一般而言, α多样性指数可以概括为两类: 一类是基于观测数据直接计算的“观测型指数”, 另一类是试图估计未观测物种的“估算型指数”, 或称“物种数估算器” (richness estimators)。本文对比了5个观测型指数与4个估算型指数。5个观测型指数包括: (1) 物种丰富度, (2) Shannon指数(也称Shannon-Wiener指数), (3) Simpson指数, (4) Hurlbert稀释物种数(以下称稀释物种数, rarefied species richness), (5) Fisher's α指数。其中前3个均跟Hill指数的q值相关, 可以归为Hill指数系列(Jost, 2006)。4个估算型指数包括: (1) Chao1指数, (2)基于丰度的覆盖估计值(abundance-based coverage estimator, ACE), (3) iNEXT (interpolation/extrapolation)外推值, 以及(4)总预期物种数(total expected species, TES)。

本研究构建了一个包含不同样点的虚拟群落系统, 设定不同样点中真实的物种丰富度与环境梯度呈线性关系, 模拟了采样强度(即样点记录到的个体数及与之等价的采样完整度(sampling completeness))不均衡的场景, 通过多次重复模拟比

较上述不同的多样性指数对环境梯度的响应强度。通过模拟研究, 本文旨在回答以下问题: (1)当各样点的采样强度存在差异时, 不同多样性指数与环境因子之间的相关性(以线性回归拟合的R^2作为衡量标准)如何变化? (2)各指数在还原设定的R^2时的准确性(accuracy)与精确性(precision)如何? 需要多大的样本量才能较好地还原设定的R^2? (3)观测型指数与估算型指数的表现有何差异?

通过系统模拟与定量比较, 本文期望为实际生态调查中不同采样强度下多样性指数的选择提供方法学参考。本研究提出以下假设: 假设1, 所有指数的表现均随着采样强度的增加而提升; 假设2, 在低采样完整度下, Hill系列观测型指数与所有估算型指数的偏差均较大, 而经标准化的稀释物种数以及受样本大小影响较小的Fisher's α指数能更稳定地反映环境梯度的变化; 假设3, 在高采样完整度下, Chao1、ACE、TES等估算型指数能更接近真实物种丰富度, 并在解释环境梯度时优于观测型指数。

1 方法

1.1 环境梯度与"真实"物种数

本研究构建的群落系统包含了20个样点(n), 设定每个样点的环境变量x的值均匀分布在[0.01, 0.99]区间(代表某一环境梯度, 如海拔或资源丰富程度)。样点i的物种数S_i与该样点的环境因子x_i呈线性关系, 即满足:

$$S_i = \beta \times x_i + C + \varepsilon_i \quad (1)$$

其中, β为环境梯度的效应系数, C为截距, ε_i为随机误差。模拟设定环境梯度可以解释约80%的物种丰富度变异, 即线性模型的决定系数$R^2 = 0.8$。

本研究设定每个样点的"真实"物种数S_i的取值范围是40–210。对于每个样点, 以对数正态分布生成S_i个随机权重:

$$W_{i,j} \sim \log Normal\ (0,1), j = 1, 2, \ldots, S \quad (2)$$

每个物种的相对丰度权重则为$P_{i,j} \sim W_{i,j}/\sum_j W_{i,j}$, 符合经典的Fisher log-series理论(Fisher et al., 1943)。

需要说明的是, 本研究采用的样点数与物种数是群落生态研究的常见数量级。线性模型的总体R^2由数据生成机制决定, 与样点数和设定的物种数无关。当$n \geq 20$时, 各指标R^2的均值与排序基本稳定, 因此样点数并不影响本研究的结论。此外, 本研究主要探讨线性关系下各个多样性指数的表现。物种数和环境因子呈线性或者对数线性关系是自然界的一种常见模式, 如在一定范围内的"种–面积(A)"关系符合对数线性模型($\log(S) = \beta \times \log(A) + C$) (Lomolino, 2001); Hurlbert和Haskell (2003)发现北美繁殖期的鸟类物种丰富度与归一化植被指数(NDVI)呈线性关系($S = \beta \times NDVI + C$, $R^2 = 0.61$); Currie (1991)对北美336个样地脊椎动物的统计发现, 其物种丰富度与年潜在蒸散量(annual potential evapotranspiration, PET)呈线性关系($S = \beta \times \log(PET) + C$, R^2高达0.92)。

1.2 不等量采样方案与模型回归

首先, 为了直观地体现样本量与采样完整度之间的关系, 在原有20个样点的模拟框架上, 随机选取1–1,000个个体的采样梯度, 通过200次模拟绘制采样曲线, 用以直观展示不同样本量下丰富度的采集程度。采样完整度为采集到的物种数与"真实"物种数的比值。

为了全面评估采样强度对多样性指数表现的影响, 本研究设定了一系列采样强度梯度场景。以所有样点的最小采样个体数作为阈值(Min), 该阈值用于限定各场景的采样下限, 并在5–500的范围内按5个个体的步长依次递增。针对某一场景, 生成20个样点的实际抽样, 抽样个体数N_i由截断正态分布(truncated normal distribution)生成, 其下线、上线、均值与方差分别为Min、10 Min、2 Min和4 Min, 这样可产生介于Min与10 Min的右偏分布, 模拟常见的"不等量采样"情形。随后按多项式分配从概率向量p_i中抽取N_i个个体生成样地 × 物种的矩阵, 并计算每个样点的多样性, 包括:

(1)观察到的物种丰富度(Observed S): 可直观反映样地观测到的物种数量。

(2) Shannon指数和Simpson指数: 这两个指数整合了物种丰度的分布信息, 可揭示群落的均匀度与优势度格局, 是生物多样性研究中最常见的两个指数(Jost, 2006)。两者均根据Jost (2006)的建议转换成有效的物种数, 即Shannon D = $e^{-\sum p_i \times \ln p_i}$, Simpson D = $1/(\sum p_i^2)$, 使用R语言vegan包(Oksanen et al., 2018)的diversity()函数计算。

(3) Fisher's α指数: 该指数假设群落丰度符合对数级数分布, 是通过拟合"物种数–个体数"关系

得到的参数(Fisher et al., 1943), 也被视作与样本量相对独立的指数(Brehm et al., 2003)。Fisher's α指数使用vegan包(Oksanen et al., 2018)的fisher.alpha()函数计算。

(4)稀释物种数(Rarefied S): 该指数采用稀释法(rarefaction)先确定所有样点中最小的采样个体数m, 将观测个体数统一稀释到m, 再计算每个样点对应物种数的期望值, 采用"标准化"的方法纠正不均衡采样带来的影响(Hurlbert, 1971)。本研究中, 稀释物种数选取所有样点的最小采样量(m = Min)作为内推值, 使用rarestR包(Zou et al., 2025)中的es()函数计算。

(5) iNEXT外推值: 该指数将稀释与外推结合, 先按样本覆盖率对样点进行标准化, 然后对小样本做向上外推、对大样本做向下稀释, 从而获得多样性估计值, 既保留了稀释法的可比性, 也利用外推弥补了小样本信息的不足(Hsieh et al., 2016)。该指数使用iNEXT包(Hsieh et al., 2016)的iNEXT()函数计算, 设置q = 0, 外推样本量为函数默认的双倍样本量。

(6) Chao1与ACE: 这两者均为非参数物种估计, 通过单次出现物种数(F1, 即单丰度种数目)和双次出现物种数(F2, 即双丰度种数目)来估计群落中潜在的未观测物种数(Chao, 1984; Chao & Lee, 1992)。使用vegan包(Oksanen et al., 2018)的estimateR()函数计算。

(7) TES: 该指数是近期Zou等(2023)利用参数模型拟合物种累积稀释曲线, 通过Weibull/Logistic模型对曲线外推, 得到的群落"总期望物种数"的渐近线。使用rarestR包(Zou et al., 2025)中的tes()函数计算, 采用了两重参数估计的均值TESab指标(Zou et al., 2023)作为估计值。

计算完各样点的多样性后, 以各多样性度量指标值为响应变量、环境梯度x为自变量进行线性回归, 获得模型的决定系数R^2。对上述4个采样强度场景分别重复200次, 获得R^2的均值(mean)与标准差(SD)来评估各个多样性指数对还原环境梯度的准确性和精确性。准确性以重复模拟所得R^2均值与设定值之间的差异衡量(由于设定值均为0.8, 因此准确性可由R^2均值直接体现); 精确性以R^2的标准差以及变异系数(coefficient of variation, CV)衡量, 其中CV = SD/mean。

为直观评估恢复设定相关性(R^2 = 0.8)所需的样本量, 分别设定了3个判定梯度: $R^2 \geq 0.48$ (设定值的60%), $R^2 \geq 0.64$ (设定值的80%)以及$R^2 \geq 0.72$ (设定值的90%), 同时参考常用标准, 将$CV < 0.2$与$CV < 0.3$两个档次作为误差可接受的界限(Gorrod & Keith, 2009), 据此确定相应的最小样本量(200次模拟的中位数)要求及其对应的采样完整度。进一步地, 为比较不同多样性指标之间的差异, 本研究选取设定Min值为5、20、100和500的4个阈值, 对R^2的均值与标准差进行了可视化分析, 以覆盖从"极低样本"到"近充分采样"的广泛情景。

所有模拟均在R语言中完成(R Core Team, 2021)。截断正态分布使用truncnorm包(Mersmann et al., 2018)中的rtruncnorm()完成; 使用dplyr包(Wickham et al., 2023)进行数据整理; parallel包进行多核运算(R Core Team, 2021), ggplot2包(Wickham, 2009)进行绘图。

2 结果

当设置最小样本(Min)阈值为5、20、100和500场景时, 截断正态分布所获得的实际最小样本量分别为6.4 (SD = 1.43)、26 (SD = 6.06)、127 (SD = 27.7)以及624 (SD = 110); 这些场景的所有样点平均采样完整度分别为4.5% (SD = 0.2%)、16.4% (SD = 0.6%)、47.3% (SD = 1.2%)和84% (SD = 1.0%) (图1)。从1到1,000个个体的平均采样完整度曲线见图1。




图1 平均每个样地的样本量与采样完整度的关系。阴影部分表示95%置信区间。

Fig. 1 Relationship between sample size per site and the sampling completeness. Shade area refers to the 95% confidence interval.

总体看来, 随着采样强度的提高, 大多数多样性度量指标与环境变量的线性拟合效果显著增强, 线性回归的R^2随样本量增大而整体上升(图2)。在满足$CV < 0.2$的前提下, R^2达到60%设定值(0.48)时, Rarefied S所需最小样本量最低, 仅需要48个个体, 对应的样本覆盖度为25.8%; R^2达到80%设定值(0.64)与90%设定值(0.81)时, 所需最小样本量最低的指数均为Fisher's α指数, 分别需要48个个体(25.8%采样完整度)和84个个体(37.5%采样完整度)(表1)。当放宽到$CV < 0.3$时, R^2达到60%设定值仍然是Rarefied S所需最小样本量最低, 仅需要24个个体(采样完整度为15.3%) (表1)。

在Min = 5的极低采样情形(平均值约为2 Min = 10), 各指标的模型R^2普遍偏低, 均低于0.25, 且离散度较高, 说明准确性与精确性均较差(图2, 图3)。所有度量指标中, Rarefied S表现最好, 其次是4个物种丰富度估算指数(TES、ACE、Chao1和iNEXT)。值得注意的是, 由于总体的R^2较低, 不同多样性之间的R^2十分接近, 该排序结果也可能不稳定。当最小样本量提升至20个个体时, Rarefied S仍然有最好的表现, 接近设定值的60% (即0.48), Fisher's α指数紧随其后, 但是精确性稍差(图3)。当Min = 100时, 外推物种丰富度估算指数TES的R^2最高, 其余的估算型指数及观测型指数中的Rarefied S和Fisher's α指数也均有较好的表现。在Min = 500的近充分采样条件下, 除了Simpson D, 其余指数的平均R^2均接近




图2　最小样本量与线性回归决定系数(R^2)的关系, 线条和阴影部分分别表示200次模拟的均值与95%置信区间。3条红色虚线分别表示R^2 = 0.48 (60%设定值)、0.64 (80%设定值)、0.72 (90%设定值), 红色实线表示R^2 = 0.80 (理论设定值)。

Fig. 2　Relationship between the minimum sample size and coefficient of determination (R^2) from linear regression. Lines and shade areas refer to the mean and 95% confidence interval (CI) from 200 simulations. Three dashed red lines refer to R^2 = 0.48 (60% set value), 0.64 (80% set value), and 0.72 (90% set value), respectively, while the solid red line represents R^2 = 0.80 (theoretical setting value).

表1　不同多样性指数在相关性R^2恢复到目标水平的60% (0.48)、80% (0.64)与90% (0.72)时所需的最小样本量及其对应的采样完整度(括号内), 并分别考虑误差阈值$CV < 0.2$和$CV < 0.3$。“–”表示未达到相应条件。

Table 1　Minimum sample sizes required for different diversity indices to achieve predefined recovery levels of 60% (0.48), 80% (0.64), 90% (0.72) to the target correlation R^2, with the corresponding sample completeness shown in parentheses. Results are reported under two error thresholds, $CV < 0.2$ and $CV < 0.3$. “–” indicates that the criterion was not met.

指数 Index	60% ($CV < 0.2$)	80% ($CV < 0.2$)	90% ($CV < 0.2$)	60% ($CV < 0.3$)	80% ($CV < 0.3$)	90% ($CV < 0.3$)
Observed S	160 (53.1%)	176 (55.5%)	260 (65.3%)	96 (40.6%)	176 (55.5%)	260 (65.3%)
Shannon D	105 (42.8%)	128 (47.5%)	246 (64%)	60 (30.3%)	128 (47.5%)	246 (64%)
Simpson D	105 (42.8%)	–	–	60 (30.3%)	–	–
Rarefied S	48 (25.8%)	67 (32.5%)	128 (47.5%)	24 (15.3%)	67 (32.5%)	128 (47.5%)
Fisher’s α	–	48 (25.8%)	84 (37.5%)	30 (18.3%)	48 (25.8%)	84 (37.5%)
Chao1	67 (32.5%)	70 (33.5%)	128 (47.5%)	36 (21.1%)	70 (33.5%)	128 (47.5%)
ACE	–	60 (30.3%)	96 (40.6%)	30 (18.3%)	60 (30.3%)	96 (40.6%)
iNEXT	–	70 (33.5%)	136 (49%)	48 (25.8%)	70 (33.5%)	136 (49%)
TES	–	60 (30.3%)	96 (40.6%)	30 (18.3%)	54 (28.3%)	96 (40.6%)




图3　设置4个最小采样阈值场景时(Min = 5、20、100和500), 各α多样性度量指标与环境梯度的线性回归决定系数(R^2) (平均值 ± 标准差, 模拟200次)。实心点表示直接计算的多样性指数; 空心点表示物种丰富度估算型指数。3条红色虚线分别表示$R^2 = 0.48$ (60%设定值), 0.64 (80%设定值), 0.72 (90%设定值), 红色实线表示$R^2 = 0.80$ (理论设定值)。

Fig. 3　Coefficient of determination (R^2) between each α-diversity metric and the environmental gradient under four minimum-sample scenarios (Min = 5, 20, 100, 500). (mean ± SD, 200 simulations). Solid dots are directly calculated diversity indices, and open symbols are richness estimators. Red three dashed red lines refer to R^2 = 0.48 (60% set value), 0.64 (80% set value), and 0.72 (90% set value), respectively, while the solid red line represents R^2 = 0.80 (theoretical setting value).

理论值(图3)。值得注意的是, 3个Hill指数系列(直接观察的物种数与常用的多样性指数Simpson D和Shannon D)在不同采样强度下的表现均较差, 说明其在不等量采样的情况下无法准确捕捉样点间的差异(图3)。

3　讨论

本研究通过构建含一系列环境梯度样点的虚

拟群落, 评估了9种α多样性度量指标在4个采样强度场景下对环境信号的解释力与稳定性, 并首次对比了观测型指数与估算型指数的表现差异。模拟结果表明, 采样强度是决定指数有效性的首要因素。随着样本量的提升, 所有多样性度量指标的模型R^2显著提升, 与假设1一致。本研究进一步明确了各指数在达到一定的准确性和精确性的前提下所需的采样强度及其对应的采样完整度。需要强调的是, 本研究设定了一个“真实”的物种数。然而, 在实际研究工作中, 由于群落的“真实”物种数通常无法获知, 采样完整度也就无法被直接确定。因此, 任何基于完整度的评估往往只能依赖于估算方法或间接指标。需要注意的是, 一些常用的估算型指数(如Chao1)本质上是物种数的下界估计(Chao, 1984; Chao & Lee, 1992), 因此基于此类指数计算得到的采样完整度往往会偏高, 从而导致对样本代表性的高估。

本文结果显示, 在极低或较低采样(Min ≤ 20, 对应平均每点约10–40 个体、采样完整度 < 20%)时, 稀释物种数(Rarefied S)最为可靠, 该结论与假设2一致。值得注意的是, 当Min从5增至20时, Rarefied S的平均R^2从不足0.25上升到接近0.48 (设定值的60%), 说明适当提高稀释值对该指数的表现至关重要。在实际研究工作中, 若部分样点采样量远低于阈值, 当稀释到一个相对较大的样本量时, 这虽然会被迫丢弃严重不足的样点(Zou et al., 2025), 但总体可比性得到保障, 因而是一种保守而稳健的折衷方案。若研究规模与本模拟相似, 建议稀释值至少设定为40个个体, 以保证结果的稳定性。若难以满足条件(如低于阈值的样点数太多), 则至少稀释至20个个体。

Fisher’s α指数在样本量较小(Min = 20)的情况下获得的模型R^2接近稀释物种数, 但其整体的精确性稍低。这表明, Fisher’s α指数在一定程度上对样本量不敏感, 这与Beck和Schwanghart (2010)的模拟研究结果一致。然而, 与假设2相反, 在样本量极小的情况下(Min = 5), 该指数的表现较差。由于该指数源于对数级数模型, 理论上要求较高的个体数以拟合参数。本研究发现当个体数达到84、采样完整度达到85%时, Fisher’s α指数拥有十分良好的表现, 这与Hayek和Buzas (2010)建议Fisher’s α指数的样本量需达到100个个体一致。当然, 所需样本量仍与群落的物种个体分布特征密切相关: 群落个体数和物种丰富度越高, 实现相应采样完整度所需的样本量也越大。

当最小采样阈值提升到100 甚至500个个体, 丰富度的估算型指数的表现大多超过了直接计算的观测型指数, 与假设3一致。其中, 最新的基于稀疏曲线参数外推的TES指标取得最高且最稳定的R^2, 优于非参数估算指数ACE与Chao1, 也优于稀释物种数和直接观测丰富度。这与Zou 等(2023)对TES的使用建议几乎一致: 即在采样完整度达到约50%以上时, 稀疏曲线拟合能充分利用丰度频率信息, 提高对未采样物种的外推精度。但需要强调的是, 在仅采集到很少样本时, 由于多种模型曲线可能均能拟合初始数据却预测出截然不同的渐近值, 因而可靠性会受到限制(Flather, 1996)。因此, 参数外推宜在样本数达到中等水平后使用。

本研究利用简单的模拟对比了不同α多样性度量指标的表现, 其中存在若干局限。首先, 本文只讨论了基于丰度(abundance-based)的多样性指数, 并未涵盖以出现频率/记录次数(incidence-based)为基础的指标。在生物多样性监测、鸟类鸣声取样或植物样方调查等场景中, 数据往往以“是否记录到某物种”而非“个体数”的形式存储。此时Chao2、ICE (incidence-based coverage estimator)以及覆盖率标准化相关的外推法将是更合适的指标(Chao & Jost, 2012; Chao et al., 2017)。由于基于物种丰度与基于检测频次是两类不同的数据(Chao & Chiu, 2016), 因此, 本研究的结果并不适用于后者, 建议在未来的研究中对基于频次数据的多样性指数表现进行评估。其次, 本研究的模拟假定所有样点的物种丰度符合对数正态分布; 然而真实群落的丰度分布往往更复杂(McGill et al., 2007), 若丰度分布的尾部比对数正态分布更长(如幂律分布), 则稀有种比例将显著增加, 这可能导致不同指数在小样本情景下R^2的差异进一步增大。再次, 本模拟只假设物种数与环境梯度之间为单一线性关系, 但实际也可能存在复杂的非线性关系(Kreyling et al., 2018; Soley-Guardia et al., 2024), 这或将影响模型结果。最后, 本研究的抽样过程完全随机, 并未考虑物种聚集效应导致物种检测概率在空间上并非随机分

布的影响(McGill, 2011; Engel et al., 2021), 这对建立在稀释物种数上的指数的评估可能产生影响, 比如影响稀疏曲线的初始斜率。目前并没有不同聚集程度如何影响稀疏曲线的相关研究, 需要将来进行系统的评估与分析。

尽管存在局限, 本研究仍然展示了在不等量采样情境下, 不同多样性指数性能随样本深度从小到大的还原物种数与环境关系的能力, 并明确了各指数在达到一定的准确性和精确性的前提下所需的采样强度。综合来看, 在样本极少(采样完整度低于20%)的不等量采样场景中, 优先推荐稀释物种数。在实际研究中, 应将稀释值设定在一个相对较大的水平(如 > 40个个体), 即使因此丢弃极端不足的样点, 也能在总体上提高样点间的可比性, 从而获得稳健的梯度解释力。当样本量充足时(采样完整度高于50%), 可采用物种丰富度估算指数, 从而获得最接近真实梯度的物种丰富度外推值。在条件允许的情况下, 野外采样应尽可能增加样本量, 以获得更高的采样完整度, 这样才能更准确地揭示物种数与环境因子的真实关系。

ORCID

邹怡 https://orcid.org/0000-0002-7082-9258

参考文献

Beck J, Schwanghart W (2010) Comparing measures of species diversity from incomplete inventories: An update. Methods in Ecology and Evolution, 1, 38–44.

Brehm G, Süssenbach D, Fiedler K (2003) Unique elevational diversity patterns of geometrid moths in an Andean montane rainforest. Ecography, 26, 456–466.

Chao A (1984) Nonparametric estimation of the number of classes in a population. Scandinavian Journal of Statistics, 11, 265–270.

Chao A, Chiu C (2016) Species richness: Estimation and comparison. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 1–26.

Chao A, Colwell RK, Chiu CH, Townsend D (2017) Seen once or more than once: Applying Good-Turing theory to estimate species richness using only unique observations and a species list. Methods in Ecology and Evolution, 8, 1221–1232.

Chao A, Jost L (2012) Coverage-based rarefaction and extrapolation: Standardizing samples by completeness rather than size. Ecology, 93, 2533–2547.

Chao A, Lee SM (1992) Estimating the number of classes *via* sample coverage. Journal of the American Statistical Association, 87, 210–217.

Currie DJ (1991) Energy and large-scale patterns of animal- and plant-species richness. The American Naturalist, 137, 27–49.

Engel T, Blowes SA, McGlinn DJ, May F, Gotelli NJ, McGill BJ, Chase JM (2021) Using coverage-based rarefaction to infer non-random species distributions. Ecosphere, 12, e03745.

Fisher RA, Corbet AS, Williams CB (1943) The relation between the number of species and the number of individuals in a random sample of an animal population. Journal of Animal Ecology, 12, 42–58.

Flather C (1996) Fitting species–accumulation functions and assessing regional land use impacts on avian diversity. Journal of Biogeography, 23, 155–168.

Gorrod EJ, Keith DA (2009) Observer variation in field assessments of vegetation condition: Implications for biodiversity conservation. Ecological Management & Restoration, 10, 31–40.

Gotelli NJ, Colwell RK (2001) Quantifying biodiversity: Procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. Ecology Letters, 4, 379–391.

Hayek LAC, Buzas MA (2010) Surveying Natural Populations: Quantitative Tools for Assessing Biodiversity, 2nd edn. Columbia University Press, New York.

Hsieh TC, Ma KH, Chao A (2016) iNEXT: An R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers). Methods in Ecology and Evolution, 7, 1451–1456.

Hurlbert AH, Haskell JP (2003) The effect of energy and seasonality on avian species richness and community composition. The American Naturalist, 161, 83–97.

Hurlbert SH (1971) The nonconcept of species diversity: A critique and alternative parameters. Ecology, 52, 577–586.

Jost L (2006) Entropy and diversity. Oikos, 113, 363–375.

Kreyling J, Schweiger AH, Bahn M, Ineson P, Migliavacca M, Morel-Journel T, Christiansen JR, Schtickzelle N, Larsen KS (2018) To replicate, or not to replicate—that is the question: How to tackle nonlinear responses in ecological experiments? Ecology Letters, 21, 1629–1638.

Lomolino MV (2001) The species–area relationship: New challenges for an old pattern. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 25, 1–21.

Ma KP, Liu YM (1994) Measurement of biotic community diversity. I. α diversity (Part 2). Chinese Biodiversity, 2, 231–239. (in Chinese with English abstract) [马克平, 刘玉明 (1994) 生物群落多样性的测度方法. I. α多样性的测度方法(下). 生物多样性, 2, 231–239.]

McGill BJ (2011) Linking biodiversity patterns by autocorrelated random sampling. American Journal of Botany, 98, 481–502.

McGill BJ, Etienne RS, Gray JS, Alonso D, Anderson MJ, Benecha HK, Dornelas M, Enquist BJ, Green JL, He FL,

Hurlbert AH, Magurran AE, Marquet PA, Maurer BA, Ostling A, Soykan CU, Ugland KI, White EP (2007) Species abundance distributions: Moving beyond single prediction theories to integration within an ecological framework. Ecology Letters, 10, 995–1015.

Mersmann O, Trautmann H, Steuer D, Bornkamp B (2018) truncnorm: Truncated Normal Distribution. R package version 1.0–8.

Oksanen J, Blanchet FG, Friendly M, Kindt R, Legendre P, McGlinn D, Minchin PR, O'Hara RB, Simpson GL, Solymos P, Stevens MHH, Szoecs E, Wagner H (2018) vegan: Community Ecology Package. R package version 2.5–6.

R Core Team (2021) R: A Language and Environment for Statistical Computing. Version 4.1.2. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

Reese GC, Wilson KR, Flather CH (2014) Performance of species richness estimators across assemblage types and survey parameters. Global Ecology and Biogeography, 23, 585–594.

Soley-Guardia M, Alvarado-Serrano DF, Anderson RP (2024) Top ten hazards to avoid when modeling species distributions: A didactic guide of assumptions, problems, and recommendations. Ecography, 2024, e06852.

Whittaker RH (1960) Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecological Monographs, 30, 279–338.

Wickham H (2009) ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer Publishing Company, New York.

Wickham H, François R, Henry L, Müller K, Vaughan D (2023) dplyr: A Grammar of Data Manipulation. R package version 1.1.4.

Zou Y, Zhao P, Axmacher JC (2023) Estimating total species richness: Fitting rarefaction by asymptotic approximation. Ecosphere, 14, e4363.

Zou Y, Zhao P, Wu NC, Lai JS, Peres-Neto PR, Axmacher JC (2025) rarestR: An R package using rarefaction metrics to estimate α- and β-diversity for incomplete samples. Diversity and Distributions, 31, e13954.

(特邀责任编委: 张霜　责任编辑: 黄祥忠)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25398, pages 1–11
doi: 10.17520/biods.2025398
cstr: 32101.14.biods.2025398

•生态学数据分析方法专题•

空间聚集度指数及其估计不确定性对聚集度–多度关系的影响

邢丁亮*

华东师范大学生态与环境科学学院, 浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站, 上海 200241

摘要: 物种空间分布格局是群落生态学和宏生态学研究的核心问题之一。广泛用于度量空间聚集度的指标包括针对样方数据的负二项分布参数k, 以及针对点格局数据的非参邻域密度指数(如Condit等(2000)提出的Ω和Wiegand等(2025)提出的k_{ff}), 但这两类指数及对应的估计误差如何影响聚集度–多度关系尚不清楚。本文基于一个空间显式中性模型模拟的群落数据, 计算了上述聚集度指数及其标准误, 以分析这些指数及其估计误差如何影响聚集度与物种多度之间的关系。结果表明: (1)在空间聚集程度较高时, 3种聚集度指数之间存在高度正相关; 聚集程度较弱时, 尽管估计误差增大, 但k仍能区分聚集度种间差异, 而两个点格局指数则判别力不足。(2)不同指数的估计误差之间存在一定正相关, 但相关性较弱。极大似然法给出的稀有种和弱聚集物种k值标准误较大, 与模拟结果一致; 相比之下, 基于重采样方法的点格局指数标准误整体偏小。(3)聚集度–多度关系受所选指数及回归方法(是否加权)影响。对于$1/k$, 加权回归能够稳定复现出中性理论所预测的幂律关系及幂指数(等于–1), 而不加权回归得到的幂指数较理论值更接近0, 且在聚集程度较弱的群落中尤为明显。两种点格局指数与多度之间亦呈幂律关系, 但幂指数随群落平均聚集程度而变化, 聚集程度越弱幂指数越接近0。综上所述, 忽略聚集度估计的不确定性会显著影响对聚集度–多度关系的推断, 可能导致错误地拒绝中性零假设, 增加I类统计错误的风险。两种基于点格局的指数与多度的关系能反映群落平均聚集程度的影响, 但并不适用于检验中性与非中性群落构建机制。建议在分析样方数据时, 采用基于极大似然估计的负二项分布参数k及其标准误来度量物种聚集度, 并将不确定性纳入后续分析。对于其他聚集度指数及其与多度之间的关系, 需进一步发展基于中性理论的零假设。

关键词: 空间格局; 聚集度–多度关系; 负二项分布; 点格局分析; 中性理论

邢丁亮 (2026) 空间聚集度指数及其估计不确定性对聚集度–多度关系的影响. 生物多样性, 34, 25398. doi: 10.17520/biods.2025398; cstr: 32101.14.biods.2025398.
Xing DL (2026) Influence of aggregation indices and estimation uncertainty on the aggregation–abundance relationship. Biodiversity Science, 34, 25398. doi: 10.17520/biods.2025398; cstr: 32101.14.biods.2025398.

Influence of aggregation indices and estimation uncertainty on the aggregation–abundance relationship

Dingliang Xing*

Zhejiang Tiantong Forest Ecosystem National Observation and Research Station, School of Ecological and Environmental Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, China

ABSTRACT

Aims: Spatial distribution of species represents a core issue in population biology and macroecology. Commonly used metrics for quantifying species aggregation include the negative binomial distribution parameter k for quadrat data and neighborhood density indices (such as Ω proposed by Condit et al. (2000) and k_{ff} proposed by Wiegand et al. (2025)) for point pattern data. However, how the choice of index and its estimation uncertainty jointly affect the inference of the aggregation–abundance relationship remains unclear.

收稿日期 Received: 2025-10-10; 接受日期 Accepted: 2025-12-27
基金项目: 国家自然科学基金(32471623)和上海市教育委员会科研创新计划(2023ZKZD36) Supported by the National Natural Science Foundation of China (32471623) and Innovation Program of Shanghai Municipal Education Commission (2023ZKZD36)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: dlxing@des.ecnu.edu.cn

Methods: We use a spatially explicit neutral model to simulate community data, then computed the aforementioned aggregation indices along with their standard errors. Finally, we analyzed how the index selection and its estimation error influence the power-law relationship between aggregation and species abundance.
Results: (1) The three aggregation indices are strongly correlated under high aggregation intensity. Under weak aggregation, however, k remains effective in discriminating interspecific differences in aggregation, whereas the two point pattern indices lack such discriminative power. (2) Estimation errors of different indices are weakly positively correlated. The standard error of k for rare and weakly aggregated species estimated by maximum likelihood is large, consistent with simulation results. In contrast, standard errors of point pattern indices based on resampling methods are generally smaller. (3) The aggregation–abundance relationship varies depending on the chosen index and whether weighted regression is applied. For $1/k$, weighted regression consistently recovers the theoretical exponent of –1 predicted by neutral theory, whereas unweighted regression yields shallower slopes, especially in communities with weak aggregation. The exponents for the two point pattern indices vary with the mean aggregation intensity of the community.
Conclusions: Ignoring the uncertainty in aggregation estimates can significantly bias inferences of the aggregation–abundance relationship, potentially leading to the incorrect rejection of the neutral null hypothesis (i.e., an increased risk of Type I error). The relationships derived from the two point pattern indices reflect mean community aggregation but are not suitable for directly testing neutral assembly mechanisms. We recommend using the maximum likelihood estimate of the negative binomial parameter k and its standard error to measure species aggregation from quadrat data and incorporating uncertainty into subsequent analyses. For other aggregation indices, there is a need to develop predictions of their relation with species abundance from theories such as the simple neutral case.
Key words: spatial pattern; aggregation–abundance relationship; negative binomial distribution; point pattern analysis; neutral theory

一个物种的个体在空间中如何分布是生态学最基本的问题之一。对物种空间分布格局的研究不仅是理解种群动态和群落构建机制的基础, 也是诸多宏生态学格局(如物种多度分布、β多样性与种–面积关系)建模的关键一环(He & Legendre, 2002; McGill, 2010; Xing & He, 2021)。在经典生态学教科书中, 物种空间分布格局被分为聚集(clumped/aggregated)、随机(random)和均匀(uniform/regular) 3种基本类型, 一般通过方差/均值比来检验种群分布是否偏离随机分布的预期(Krebs, 1989; 牛翠娟等, 2023)。由于方差/均值比等于1是物种空间随机分布的必要而不充分条件, 因此该方法并不能有效区分不同空间分布格局和聚集程度(Hurlbert, 1990), 由此激发了其他聚集度指数的开发和使用。随着大型森林动态监测样地(forest dynamics plot, FDP, 以下简称大样地)网络的建立, 生态学家得以获取数万乃至几十万棵树木的精确空间坐标, 这极大地促进了空间点格局分析方法的发展与应用(Condit et al., 2000; 张健等, 2007; Wiegand et al., 2017)。

物种聚集度–多度关系(aggregation–abundance relationship)的研究至少可追溯至1959年美国生态学家Nelson G. Hairston关于土壤节肢动物的研究(Hairston, 1959), 该研究使用负二项分布参数k度量物种的空间聚集程度($k > 0$, 其值越小表示聚集程度越高), 发现聚集度($1/k$)与物种多度之间呈显著负相关。其后, 随着全球大样地网络的建立, 很多研究报道了树种空间聚集度与多度之间或强或弱的关系(Hubbell, 1979; He et al., 1997; Condit et al., 2000; Gilbert et al., 2010), 其中包括众多来自中国大样地的研究(Li et al., 2009; Wang et al., 2010; Guo et al., 2013; Zhang et al., 2013; Du et al., 2017; Song et al., 2017; Gu et al., 2020), 聚集度–多度关系已成为群落生态学研究的重要话题(Wiegand et al., 2021, 2025)。近期在*Nature*发表的一项大型研究通过分析全球21个大样地的数据, 发现聚集度与多度之间呈幂律关系, 且幂指数均为负值, 但存在明显的纬度梯度格局: 从温带到热带幂指数增加, 聚集度与多度关系变弱(Wiegand et al., 2025)。这些基于大样地的研究大多使用基于空间点格局的聚集度指数, 比如Condit等(2000)提出的相对邻体密度指数(Ω)以及Wiegand等(2025)提出的距离加权邻体密度指数(k_{ff})。

理解物种空间分布格局的成因及其统计特征是连接群落构建理论与宏生态学格局的桥梁。在理论研究中, 聚集度–多度关系是构建物种多度分布、β多样性、种–面积关系等宏生态学格局理论模型的

核心假设。不同作者使用了包括聚集度与多度无关(Plotkin & Muller-Landau, 2002; Xing & He, 2021)、线性相关(Guyatt et al., 1990; He & Legendre, 2002; Deane et al., 2022)、幂律相关(Kretzschmar & Adler, 1993; Wilber et al., 2015)等不同假设。不同的群落构建理论对物种聚集度有着截然不同的预测。比如最大熵理论预测, 在固定样方平均多度的约束下, 物种空间分布近似服从负二项分布, 参数k接近常数1, 与多度无关(Harte, 2011)。相比之下, 中性理论强调扩散限制是导致物种空间聚集的主要驱动力, 由于子代更可能出生在母体周围, 这种空间上的种群动态导致了必然的种内聚集(Hubbell, 2001)。简单的中性出生、死亡与扩散动态平衡模型预测物种的空间分布服从负二项分布, 聚集度(1/k)与多度之间呈幂指数为–1的幂律关系(Kendall, 1949)。相应地, 偏离中性假设的种间扩散与竞争能力差异会导致幂指数偏离–1 (Lowe & McPeek, 2014)。因此, 准确量化聚集度及其与多度的关系, 不仅是描述群落结构的需求, 更是检验中性理论等核心生态学假说的关键手段。在这些生态学理论中, 基于点格局的聚集度指数与多度之间有何关联尚不明确, 针对k的理论预测能否以及如何迁移到点格局聚集度指数尚需进一步研究。

值得注意的是, 生态学研究中长期存在两类平行的聚集度度量传统。早期的经典研究(Hairston, 1959; Hubbell, 1979; Hassell et al., 1987)及主流宏生态学理论研究多基于样方数据, 采用负二项分布参数k及其衍生指标作为聚集度的标准度量。然而, 随着全球大型森林动态监测样地网络的兴起, 基于精确坐标数据的点格局分析迅速发展, Ω和k_{ff}等非参点格局指数得到广泛使用。尽管度量工具迥异, 但这两类研究往往聚焦于同一个核心科学问题, 即通过分析聚集度与多度的相关关系, 来推断物种的生态属性(如扩散能力、生境偏好强度等)对群落构建的影响。这就引出了一个亟待解决的方法学问题: 基于不同指数体系得出的宏生态学推断是否具有可比性? 指标选择的差异是否会系统性地扭曲我们对群落构建机制的理解? 尽管特定假设下不同空间格局指标间存在联系(Kitzes et al., 2021), 但这些基于点格局的聚集度指数与传统的基于样方数据的负二项分布参数k之间有何关联? 使用两类不同指数分析聚集度得到的结果是否一致? 这些问题尚不清楚。

当前关于聚集度–多度关系的研究还存在一个共同的疏忽, 即大多研究只报告聚集度指数的点估计值(point estimate), 而忽略了这些估计值本身存在的不确定性(uncertainty)。任何基于样本数据的统计估计都必然伴随着不确定性, 对于聚集度的估计同样如此。尤其是对于稀有种, 由于样本量小, 难以有效区分空间随机与聚集格局, 因此聚集度指数的估计可能非常不可靠。这种不确定性若不被妥善处理, 可能会在后续的统计分析中引入系统性偏差, 甚至导致错误的生态学推断。根据我们对森林群落调查数据的初步分析, 在使用负二项分布参数k的标准误对聚集度–多度关系进行加权回归时, 得到的斜率比不加权回归更为陡峭。因此, 有必要系统分析估计不确定在聚集度–多度关系研究中的作用。

本研究通过使用空间显式中性模型(spatially explicit neutral model, SENM)作为“基准测试”平台, 系统地评估了两类广泛使用的聚集度指数(负二项分布参数k和非参点格局指数Ω和k_{ff}), 及其估计不确定性之间的关联, 并探究指数选择及是否考虑估计不确定性对聚集度–多度关系推断的影响。需要指出的是, 在中性理论框架下, 由于稀有种受更强的扩散限制影响, 聚集度与多度之间呈负的幂律关系是模型机制决定的必然结果。正是基于这一明确的理论预期(即“真值”已知), 中性模型为评估统计方法的准确性提供了理想场景。本文试图回答: 在忽略指数估计误差的情况下, 观测到的聚集度–多度关系斜率是否会系统性地偏离理论真值? 不同的指数选择是否会引入系统性的统计偏差, 从而导致对群落构建机制的错误推断? 笔者预期, 不同的聚集度指数之间存在高度相关性; 由于稀有种聚集度指数估计高不确定性的杠杆效应, 忽略不确定性会低估聚集度–多度关系的强度。

1 材料与方法

本文使用一个空间显式中性模型来模拟取样群落(Thompson et al., 2020), 该模型是基于一种溯祖(coalescence)算法。与传统的基于个体的前向模拟(forward simulation)不同, 溯祖算法是通过从当前时刻的样本出发, 向后追溯(backward-in-time)个

体的谱系直至其共同祖先, 从而极大地提高了运算效率, 能够快速模拟大尺度、长周期的群落动态与格局。模拟在一个二维无穷景观中进行: 设置一块固定面积的取样区域(模拟样地), 在其中生成个体坐标。其中物种多样性和空间格局完全由中性过程决定, 即单位出生率、死亡率和扩散能力没有种间差异。具体而言, 模拟过程仅由两个参数控制: (1)扩散参数(σ)。该参数定义了高斯扩散核的宽度, 决定了子代相对于母体的平均扩散距离: σ越小, 表示扩散限制越强, 子代分布越靠近母体, 从而形成更紧密的空间聚集格局; 反之, σ越大, 个体在空间上的分布越接近随机。(2)成种速率(ν)。在溯祖过程中, ν代表谱系追溯时遇到“新物种”形成事件(或从外部种库迁入新物种)的概率。该参数主要控制群落的物种多样性水平: ν越大, 模拟群落中的物种数越多, 且稀有种的比例通常越高。

通过组合不同的ν (0.000001, 0.000005, 0.000025)和σ (5, 10, 20)来模拟具有不同物种多样性和空间聚集强度的9个中性群落。每个模拟样地的大小为200 × 200 = 40,000个个体, 这与巴拿马Barro Colorado Island (BCI)热带森林50 ha大样地胸径10 cm以上树木个体的规模相当。因此, 模拟景观中一个单位的空间距离大约相当于现实热带森林中的3.5 m。不同参数组合下模拟样地中的物种数最小为59, 对应参数组合为ν = 0.000001, σ = 5; 最大871, 对应参数组合为ν = 0.000025, σ = 20。

参照其他研究, 仅对每一个模拟群落中个体数不少于50的物种计算聚集度指数。首先, 将模拟样地划分为r × r的栅格, 对于每个物种, 统计其在各个栅格中的个体数, 并使用极大似然法将该物种的样方多度数据拟合到负二项分布。负二项分布的聚集参数k即为该物种的聚集度指数, k值越小, 表示聚集程度越高。在极大似然拟合中, 同时使用标准统计方法获得k值的标准误作为其不确定性的度量。其次, 计算基于点格局的两个聚集度指数: 对每个物种离边界距离不小于r的所有个体, 统计其半径r范围内同种个体的密度, 平均后除以该物种在样地中的密度, 得到Condit等(2000)的Ω指数; 类似地, 对每个物种离边界距离不小于r的所有个体, 计算其与半径r范围内同种个体间距离的倒数之和, 平均后除以该物种在样地中的密度与$2\pi r$之积, 得到Wiegand等(2025)的k_{ff}指数。最后, 针对两个点格局指数, 使用Condit等(2000)提出的重采样方法计算标准误。具体而言, 对每个物种随机无放回选取其中一半个体, 重新计算两个点格局聚集度指数, 重复100次, 使用每个指数100次重采样估计值的标准差除以$\sqrt{2}$作为对应指数的标准误。因不同的r值(比如2和10)并不影响本文结论, 因此这里仅报道了r = 5的结果。考虑真实景观(参照巴拿马BCI 50 ha大样地)空间距离是本研究模拟景观的大约3.5倍, 模拟研究中r = 5大致相当于实证研究中通常采用的边长或半径10–20 m的空间尺度。

对于每一个模拟群落, 使用Pearson和Spearman相关系数评估不同聚集度指数之间以及其标准误之间的相关性。使用不加权的简单最小二乘线性回归和加权最小二乘线性回归拟合log(聚集度)与log(多度)之间的关系, 加权回归中权重设为对数聚集度方差(即标准误的平方)的倒数, 而对数聚集度的标准误为聚集度标准误除以对应聚集度估计值。

2 结果

2.1 聚集度指数对模拟参数的响应及指数间的相关性

首先, 本文验证了3种聚集度指数是否能有效捕捉由中性模型参数控制的空间格局梯度。模拟结果显示, 所有指数均正确反映了扩散限制参数σ的变化。随着σ从5增加到20 (即扩散限制减弱, 空间分布趋于随机), 群落平均聚集程度显著下降: 负二项分布聚集度指标1/k的中位数从3.4 (四分位区间: 2.0–7.6)下降到0.3 (0.01–0.9), 点格局指数Ω和k_{ff}的中位数分别从4.1 (2.9–8.3)和3.7 (2.5–7.3)下降到1.4 (1.1–1.9)和1.3 (1.0–1.6)。这表明这3种指标在总体上均能反映预设的聚集度梯度。因为两种基于点格局的聚集度指数之间以及对应的标准误之间高度相关(图1a, 图2a), 所以后文仅选取其中一个(k_{ff})进行进一步分析和讨论。

在空间聚集程度较高时, 负二项分布参数k与非参点格局指数间存在高度线性相关关系, 但随着空间聚集程度的减弱, 两类聚集度指数间的相关性减弱(图1)。比如随着平均扩散参数σ从5或10增加到




图1　3种聚集度指数之间的相关性。不同的形状和颜色表示中性显式模拟模型中不同的参数(扩散参数σ和成种速率ν见图例)组合。r和ρ分别为不同参数组合下聚集度指数之间的Pearson和Spearman相关系数。k为负二项分布聚集度参数, Ω为Condit等(2000)的相对邻体密度指数, k_{ff}为Wiegand等(2025)的距离加权邻体密度指数。

Fig. 1　Correlations among three indices of spatial aggregation. Different shapes and colors represent simulations from a spatially explicit neutral model with various combinations of parameters (dispersal potential, σ; and speciation rate, ν). The values r and ρ denote the Pearson and Spearman correlation coefficients, respectively. k, Aggregation parameter of the negative binomial distribution; Ω, Relative neighborhood density index of Condit et al. (2000); k_{ff}, Distance-weighted version of the relative neighborhood density index of Wiegand et al. (2025).

20, 两类聚集度指数之间的Pearson相关系数从r > 0.9降低到r < 0.7。特别地, 对于较弱的空间聚集程度, 比如扩散参数σ等于20的群落, 以及σ更小但多度相对较高的物种, 其点格局聚集度指数的估计值均在1附近, 但难以区分不同多度物种之间的差异; 而同样的情景下负二项分布参数k依然存在较大的种间差异, 能够捕捉不同多度物种间聚集度的变异梯度(图1, 图3)。这表明, 尽管计算方式不同, 针对聚集程度较高的物种, 两类聚集度指数均可有效揭示空间聚集程度的种间差异; 相反, 针对聚集程度较弱的情形, 两类聚集度指数可能会给出完全不同的种间聚集度排序, 影响诸如聚集度–多度关系等群落水平的研究结果。

2.2　聚集度估计的不确定性

与点估计值不同, 两类聚集度指数的标准误之间的相关性要弱得多(图2)。所有模拟情景中负二项分布参数k的标准误均大于重抽样得到的点格局聚集度指数标准误, 二者的差距在稀有种和聚集程度较弱的群落中尤其明显。仅在聚集程度较强的群落中(比如σ = 5), 两类指数标准误之间表现出较强的相关性。

2.3　聚集度–多度关系

在所有模拟情景中, 不同聚集度指数与多度之间的关系都呈幂指数为负的幂律关系。对于负二项分布聚集度1/k, 当在双对数坐标系中使用不加权的线性回归时, 得到的斜率受群落平均聚集程度




图2　3种聚集度指数标准误(SE)之间的相关性。*σ*、*ν*、*r*、*ρ*、*k*、Ω和k_{ff}含义同图1。

Fig. 2　Correlations among the standard errors (SE) of the three spatial aggregation indices. *σ*, *ν*, *r*, *ρ*, *k*, Ω, and k_{ff} are as described in Fig. 1.

(由扩散参数*σ*控制)影响，斜率随平均聚集程度下降而趋于平缓，主要受稀有种不稳定的点估计值影响(图3)；考虑估计不确定性，使用加权回归时，所有模拟群落中聚集度1/*k*与多度之间的幂指数均接近中性理论预测的–1，与–1无显著差异(图3)。

与负二项分布聚集度参数不同，非参点格局指数与多度之间的关系受群落平均聚集水平控制，幂指数随平均聚集程度下降而增大(向0靠近)，但此格局不受聚集度估计不确定性的影响，加权线性回归和非加权线性回归的结果几乎完全一致。

3　讨论

本研究通过模拟中性群落，揭示了空间聚集度指数的选择及其估计不确定性如何深刻影响对聚集度–多度关系的统计推断。与理论预期一致，模拟结果确认了在中性机制控制下，聚集度与多度之间必然存在负相关关系。然而，本研究的核心发现不在于证实这一关系的存在，而在于揭示了对其进行定量估计时的巨大陷阱：对于负二项分布参数*k*，忽略其估计不确定性可能会导致系统性地低估聚集度–多度关系的斜率绝对值，从而显著增加错误拒绝中性零假设的风险(I类错误)；尽管两种基于点格局的指数(Ω和k_{ff})与负二项分布参数*k*存在一定相关性，但这两类指数互相不可替代使用，点格局指数与多度的关系主要反映群落中物种平均聚集水平的影响，不是一个检验中性理论的稳健工具。

3.1　负二项分布参数*k*与点格局指数的比较：部分情景下相关但互相不可替代

不同的聚集度指数根植于不同的统计评价体系，其绝对数值受不同参照系(如是否以空间随机分布为基准)的影响，在数学上不具备简单的横向可比性。然而，在生态学实证研究中，这些指标常




图3　不同参数组合(扩散参数σ和成种速率ν)模拟空间明晰中性群落中的聚集度–多度关系。黑色小圆圈与对应的回归线代表以负二项分布参数k度量聚集度(聚集度 = 1/k)的结果，红色小方块和对应回归线代表以k_{ff}度量聚集度的结果。实线为加权回归，虚线为非加权回归。β和SE为回归斜率和对应的标准误。

Fig. 3　Relationships between spatial aggregation and species abundance for simulated spatial-explicit neutral communities with different combinations of parameters (dispersal potential, σ; and speciation rate, ν). Aggregation is measured using either the negative binomial parameter k (where aggregation = 1/k; black circles) or the k_{ff} index (red squares). Solid and dashed lines represent weighted and non-weighted least-square regressions, respectively. β and SE denote the regression slope and its standard error.

被视为“物种聚集度”这一概念的等效代理，被广泛用于推断群落构建机制。例如，研究者常比较不同群落或类群中聚集度–多度关系的斜率，以推断扩散限制或生境过滤的相对重要性(Hairston, 1959; Hubbell, 1979; Condit et al., 2000; Gilbert et al., 2010; Wiegand et al., 2025)。本研究表明，这种隐含的“生态学等效性”假设是危险的。尽管在强聚集情景下，不同指数对物种聚集度的排序高度一致，但在聚集程度较弱时，k值仍能有效区分物种间的聚集度差异，而点格局指数的判别力则显著下降。这意味着，使用不同指标可能会导致对同一群落构建过程得出截然不同的结论。因此，本研究将它们并列分析，并非为了比较其绝对数值，而是为了揭示指标选择本身如何系统性地改变我们对聚集度–多度关系这一宏生态学格局的认知。这一结果提示未来在进行跨研究比较(如meta-analysis)时，必须严格区分基于不同指标体系得出的结论。

两类指数之间的不可替代性与本文的预期不

合, 究其原因, 可能与两类指数在概念上根植于不同的参照系有关。点格局指数通常以“空间完全随机” (Poisson过程)作为基准进行标准化, 比如Ω是点格局中一个典型个体的邻体密度与完全随机分布下相应邻体密度的比值(Condit et al., 2000), k_{ff}是点格局中一个典型个体的距离加权邻体密度与完全随机分布下对应期望的比值(Wiegand et al., 2025), 二者都是度量空间分布偏离随机分布的程度。从个体出生、死亡、扩散等基本生态过程出发, 这一空间完全随机基准对应随机出生、随机死亡和没有扩散限制时的特例。而负二项分布是考虑这3个基本生态过程的随机过程的数学解, 参数k描述了局域种群中迁入率(扩散能力)与单位局域出生率(per capita local birth rate)的比值, 取值从小到大代表扩散限制引起的聚集程度的降低(Kendall, 1949), 没有针对任何基准进行标准化。这或许解释了为何基于k的分析能够精确地恢复中性理论预测的–1幂指数, 而点格局指数则表现出不同的行为, 点格局指数在弱聚集情景下判别力不足可能与其以空间随机分布作为基准有关, 尤其是在小样本情景下, 弱聚集与随机分布在统计上可能无明显差异。

由于两类指数互相不可替代, 有必要明确二者各自的优劣和适用场景。因为负二项分布有着坚实的基于基本生态过程的理论基础(Kendall, 1949), 形态足够灵活, 参数k取不同值可描述从空间聚集到随机甚至均匀($k < 0$)分布等不同空间分布格局(He & Gaston, 2003), 且在实践中可很好拟合大多数样方数据, 所以负二项分布参数k是生态学实证研究中广泛使用的聚集度指数之一。当然, 作为一种参数指标, k指数的合理性依赖于负二项分布的假设, 因此在实际数据不符合负二项分布的案例中, 使用k作为聚集度指数需谨慎。一般应先检验数据是否符合负二项分布, 或者至少明确指出这一假设。点格局指数的优点在于其不依赖任何概率分布假设, 是非参指标, 所以理论上可在任何点格局数据中使用; 同时点格局指数也为个体水平的生态建模提供了保障(Wiegand et al., 2025)。点格局指数的局限一是数据量需求更大, 以森林树木空间分布格局研究为例, 点格局分析需要每棵树的空间坐标, 尽管全球的大样地网络已为此提供了丰富的数据, 但生态学整个领域中的点格局数据还是远远少于样方数据; 二是其与出生、死亡、扩散等基本生态过程的理论联系尚在发展当中(Wiegand et al., 2025), 比如最简单的中性情景下这些指数与物种多度有何关系尚不明确。此外, 和其他非参指标一样, 点格局指数的估计不确定性目前只能依赖重采样的方法获得, 而重采样方法的可靠性与样本数据的代表性以及样本量有关, 样本量较小(稀有种)时会显著低估不确定性。

3.2 聚集度–多度关系及其影响机制推断

尽管聚集度–多度关系研究已有不短的历史(Hairston, 1959; Hubbell, 1979), 且早期研究已经关注到环境过滤和扩散限制等生态机制的可能影响, 但这一重要宏生态学模式似乎并未得到理论和实证生态学研究的足够重视。理论研究中, McGill (2010)归纳了多个生态学“统一理论”所共享的3条基本规则, 一是同种个体在空间上呈聚集分布, 二是区域或全局尺度上不同物种的多度呈某种空心曲线分布(hollow curve distribution), 三是任意物种的个体分布不受其他物种个体的影响。这些规则描述了物种多度与分布的重要模式, 但并未考虑不同物种聚集度与多度之间的关系。事实上在宏生态学建模中, 聚集度与多度之间的关系设定较为随意, 从聚集度与多度无关(Plotkin & Muller-Landau, 2002; Xing & He, 2021)、线性相关(Guyatt et al., 1990; He & Legendre, 2002; Deane et al., 2022)到幂律相关(Kretzschmar & Adler, 1993; Wilber et al., 2015)等不同假设都广为使用。鲜有研究系统评估不同聚集度–多度关系假设对宏生态学模型表现的影响, 目前仅知一个案例: 在物种多度分布建模分析中, Green和Plotkin (2007)发现是否考虑聚集度的种间差异影响不大。

生态学中性理论和最大熵理论是为数不多的有明确聚集度–多度关系预测的生态学统一理论。二者都预测物种的空间分布近似服从负二项分布, 最大熵理论预测负二项分布参数$k = 1$, 不存在种间差异, 而中性理论预测k与多度呈正比。有趣的是尽管这两个理论在生态学中影响广泛, 但迄今为止鲜有研究关注其对聚集度–多度关系截然不同的预测。先前研究更多关注物种多度分布与种–面积关系等宏生态学模式(Hubbell, 2001; Harte, 2011)。值得注意的是, 这些早期理论中聚集度都用负二项分

布参数k来度量, 本研究表明, 不能简单使用其他聚集度指数与多度的关系来检验这些理论预测。

实证研究中有不少工作报道了或强或弱的聚集度–多度关系, 但在Wiegand等(2025)的工作之前, 大多研究仅是针对单个大样地的案例分析, 聚集度–多度关系在全球范围有何规律, 受什么因素控制都不清楚。Wiegand等(2025)发现以点格局指数度量的物种聚集度与多度呈负相关, 且幂指数随纬度降低而趋近于0, 他们解释这一纬度梯度格局反映了热带森林中更高的动物种子传播比例以及更高的丛枝菌根(arbuscular mycorrhiza)物种占比。动物传播比自传播等其他主要种子传播方式的传播距离更远, 丛枝菌根树种在幼苗更新阶段比外生菌根树种受到的同种密度制约效应影响更强, 子代距离母树的距离更远, 因此, 动物传播和丛枝菌根物种占比更高的热带森林有效平均扩散距离更远。在这个意义上, 本文的模拟结果与Wiegand等(2025)的解释完全吻合。本研究模拟的中性群落中, 扩散距离更远的群落中点格局聚集度指数与多度之间的关系更弱(图3)。这也表明, 点格局聚集度指数与多度之间的关系可能并不适合直接用于推断确定性与中性生态过程在群落构建中的作用, 比如用来探讨稀有种与常见种之间的生态权衡关系, 因为较弱的聚集度–多度关系既可能反映了种间的生态策略权衡, 也可能仅仅反映了所研究群落较大的平均扩散距离。

4 结论

本研究基于空间显式中性模型的模拟, 系统比较了负二项分布参数k与两个基于点格局的空间聚集度指数在估计精度和聚集度–多度关系推断中的差异。结果显示, 不同指数在强聚集情景下具有较高一致性, 但在聚集程度较弱或物种稀有时表现不同, 且忽视估计不确定性会显著影响对聚集度–多度关系的推断。纳入估计不确定性进行加权回归时, 负二项分布聚集度$1/k$与物种多度之间幂律关系的幂指数大小可作为检验群落构建是否由中性过程主导的一个指标, 幂指数大于–1表示存在非中性种间权衡关系。基于点格局的聚集度指数与多度之间的关系受群落中物种平均聚集程度的影响, 在完全由中性过程控制的群落中, 物种有效扩散距离越远, 聚集度–多度关系越弱, 因此, 点格局聚集度指数与多度之间的关系不适合直接用来检验中性与非中性生态过程的影响。

本研究结果为生态学研究提供了重要的理论和实践参考。首先, 它强调了在进行实证统计分析时, 必须正视并量化生态变量的估计不确定性。对于基于样方数据的聚集度分析, 负二项分布参数k及其通过极大似然估计得到的标准误, 被证明是一套非常有效的工具。当其不确定性被整合到加权回归模型中时, 能够准确地恢复由潜在生态过程(在本文的模拟中是中性过程)决定的宏生态学格局, 而忽视估计不确定性会导致错误的推断。其次, 本研究结果提示, 同一生态学概念的不同测度之间不具有简单的可替代性, 在聚集度分析中需要持谨慎态度, 根据研究目标认真评估选择合适的指数。第三, 聚集度与多度之间的关系应该引起理论研究的重视, 有必要明确不同聚集度–多度关系假设背后的生态学机制及其对β多样性与种–面积关系等宏生态学模型的影响。最后, 需要指出的是, 虽然本研究的参数设置主要参考了热带森林乔木群落(固着生长、特定的扩散尺度), 但聚集度估计中的统计学偏差问题在群落生态学中具有一定的普适性。鉴于负二项分布参数k对数据形式的要求较低(仅需样方或样点多度数据), 其在昆虫、草本植物甚至微生物群落的研究中均有广泛应用(Hairston, 1959; Taylor, 2019)。因此, 尽管不同生物类群的扩散能力和空间行为存在显著差异, 本研究关于k指数的核心结论——特别是忽略估计不确定性会对聚集度–多度关系的推断产生系统性偏差——可能在其他生物类群的样方数据分析中同样具有参考价值。

致谢: 感谢中山大学张健教授邀稿。感谢责任编委和两位匿名审稿人的评审建议。

ORCID

邢丁亮 https://orcid.org/0000-0001-9133-6674

参考文献

Condit R, Ashton PS, Baker P, Bunyavejchewin S, Gunatilleke S, Gunatilleke N, Hubbell SP, Foster RB, Itoh A, LaFrankie JV, Lee HS, Losos E, Manokaran N, Sukumar R, Yamakura T (2000) Spatial patterns in the distribution of tropical tree

species. Science, 288, 1414–1418.
Deane DC, Xing DL, Hui C, McGeoch M, He FL (2022) A null model for quantifying the geometric effect of habitat subdivision on species diversity. Global Ecology and Biogeography, 32, 440–453.
Du H, Hu F, Zeng FP, Wang KL, Peng WX, Zhang H, Zeng ZX, Zhang F, Song TQ (2017) Spatial distribution of tree species in evergreen-deciduous broadleaf karst forests in Southwest China. Scientific Reports, 7, 15664.
Gilbert GS, Howard E, Ayala-Orozco B, Bonilla-Moheno M, Cummings J, Langridge S, Parker IM, Pasari J, Schweizer D, Swope S (2010) Beyond the tropics: Forest structure in a temperate forest mapped plot. Journal of Vegetation Science, 21, 388–405.
Green JL, Plotkin JB (2007) A statistical theory for sampling species abundances. Ecology Letters, 10, 1037–1045.
Gu HY, Li JX, Qi G, Wang SZ (2020) Species spatial distributions in a warm-temperate deciduous broad-leaved forest in China. Journal of Forestry Research, 31, 1187–1194.
Guo YL, Lu JM, Franklin SB, Wang QG, Xu YZ, Zhang KH, Bao DC, Qiao XJ, Huang HD, Lu ZJ, Jiang MX (2013) Spatial distribution of tree species in a species-rich subtropical mountain forest in Central China. Canadian Journal of Forest Research, 43, 826–835.
Guyatt HL, Bundy DAP, Medley GF, Grenfell BT (1990) The relationship between the frequency distribution of *Ascaris lumbricoides* and the prevalence and intensity of infection in human communities. Parasitology, 101, 139–143.
Hairston NG (1959) Species abundance and community organization. Ecology, 40, 404–416.
Harte J (2011) Maximum Entropy and Ecology: A Theory of Abundance, Distribution, and Energetics. Oxford University Press, Oxford.
Hassell MP, Southwood TRE, Reader PM (1987) The dynamics of the viburnum whitefly (*Aleurotrachelus jelinekii*): A case study of population regulation. Journal of Animal Ecology, 56, 283–300.
He FL, Gaston KJ (2003) Occupancy, spatial variance, and the abundance of species. The American Naturalist, 162, 366–375.
He FL, Legendre P (2002) Species diversity patterns derived from species–area models. Ecology, 83, 1185–1198.
He FL, Legendre P, LaFrankie JV (1997) Distribution patterns of tree species in a Malaysian tropical rain forest. Journal of Vegetation Science, 8, 105–114.
Hubbell SP (1979) Tree dispersion, abundance, and diversity in a tropical dry forest. Science, 203, 1299–1309.
Hubbell SP (2001) The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography. Princeton University Press, Princeton.
Hurlbert SH (1990) Spatial distribution of the montane unicorn. Oikos, 58, 257–271.
Kendall DG (1949) Stochastic processes and population growth. Journal of the Royal Statistical Society B: Methodological, 11, 230–282.
Kitzes J, Brush M, Walters K (2021) A unified framework for species spatial patterns: Linking the occupancy area curve, Taylor's Law, the neighborhood density function and two-plot species turnover. Ecology Letters, 24, 2043–2053.
Krebs CJ (1989) Ecological Methodology. Harper & Row, New York.
Kretzschmar M, Adler FR (1993) Aggregated distributions in models for patchy populations. Theoretical Population Biology, 43, 1–30.
Li L, Huang ZL, Ye WH, Cao HL, Wei SG, Wang ZG, Lian JY, Sun IF, Ma KP, He FL (2009) Spatial distributions of tree species in a subtropical forest of China. Oikos, 118, 495–502.
Lowe WH, McPeek MA (2014) Is dispersal neutral? Trends in Ecology & Evolution, 29, 444–450.
McGill BJ (2010) Towards a unification of unified theories of biodiversity. Ecology Letters, 13, 627–642.
Niu CJ, Lou AR, Sun RY, Li QF (2023) Basic Ecology, 4th edn. Higher Education Press, Beijing. (in Chinese) [牛翠娟, 娄安如, 孙儒泳, 李庆芬 (2023) 基础生态学(第四版). 高等教育出版社, 北京.]
Plotkin JB, Muller-Landau HC (2002) Sampling the species composition of a landscape. Ecology, 83, 3344–3356.
Song HJ, Xu YD, Hao J, Zhao BQ, Guo DG, Shao HB (2017) Investigating distribution pattern of species in a warm-temperate conifer-broadleaved-mixed forest in China for sustainably utilizing forest and soils. Science of the Total Environment, 578, 81–89.
Taylor RAJ (2019) Taylor's Power Law: Order and Pattern in Nature. Elsevier, San Diego.
Thompson SED, Chisholm RA, Rosindell J (2020) Pycoalescence and rcoalescence: Packages for simulating spatially explicit neutral models of biodiversity. Methods in Ecology and Evolution, 11, 1237–1246.
Wang XG, Ye J, Li BH, Zhang J, Lin F, Hao ZQ (2010) Spatial distributions of species in an old-growth temperate forest, northeastern China. Canadian Journal of Forest Research, 40, 1011–1019.
Wiegand T, Uriarte M, Kraft NJB, Shen GC, Wang XG, He FL (2017) Spatially explicit metrics of species diversity, functional diversity, and phylogenetic diversity: Insights into plant community assembly processes. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 48, 329–351.
Wiegand T, Wang XG, Anderson-Teixeira KJ, Bourg NA, Cao M, Ci XQ, Davies SJ, Hao ZQ, Howe RW, Kress WJ, Lian JY, Li J, Lin LX, Lin Y, Ma KP, McShea W, Mi XC, Su SH, Sun IF, Wolf A, Ye WH, Huth A (2021) Consequences of spatial patterns for coexistence in species-rich plant communities. Nature Ecology & Evolution, 5, 965–973.
Wiegand T, Wang XG, Fischer SM, Kraft NJB, Bourg NA, Brockelman WY, Cao GH, Cao M, Chanthorn W, Chu CJ, Davies S, Ediriweera S, Savitri Gunatilleke CV, Gunatilleke

IAUN, Hao ZQ, Howe R, Jiang MX, Jin GZ, Kress WJ, Li BH, Lian JY, Lin LX, Liu F, Ma KP, McShea W, Mi XC, Myers JA, Nathalang A, Orwig DA, Shen GC, Su SH, Sun IF, Wang XH, Wolf A, Yan ER, Ye WH, Zhu Y, Huth A (2025) Latitudinal scaling of aggregation with abundance and coexistence in forests. Nature, 640, 967–973.

Wilber MQ, Kitzes J, Harte J (2015) Scale collapse and the emergence of the power law species–area relationship. Global Ecology and Biogeography, 24, 883–895.

Xing DL, He FL (2021) Analytical models for β-diversity and the power-law scaling of β-deviation. Methods in Ecology and Evolution, 12, 405–414.

Zhang J, Hao ZQ, Song B, Ye J, Li BH, Yao XL (2007) Spatial distribution patterns and associations of *Pinus koraiensis* and *Tilia amurensis* in broad-leaved Korean pine mixed forest in Changbai Mountain. Chinese Journal of Applied Ecology, 18, 1681–1687. (in Chinese with English abstract) [张健, 郝占庆, 宋波, 叶吉, 李步杭, 姚晓琳 (2007) 长白山阔叶红松林中红松与紫椴的空间分布格局及其关联性. 应用生态学报, 18, 1681–1687.]

Zhang Z, Hu G, Zhu J, Ni J (2013) Aggregated spatial distributions of species in a subtropical karst forest, southwestern China. Journal of Plant Ecology, 6, 131–140.

(特邀责任编委: 张霜　责任编辑: 黄祥忠)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE
2026, 34 (1): 25369, pages 1–14
doi: 10.17520/biods.2025369
cstr: 32101.14.biods.2025369

•生态学数据分析方法专题•

基于环境DNA宏条形码的无脊椎动物多样性研究: 生物信息学流程比较与评估

闫姿伶[1,2], 陈晓宇[2], 姚蒙[1,2*]

1. 北京大学城市与环境学院生态研究中心, 北京 100871; 2. 北京大学生命科学学院基因功能研究与操控全国重点实验室, 北京 100871

摘要: 近年来, 环境DNA (eDNA)宏条形码技术被广泛应用于生物多样性研究, 但该技术在蓬勃发展的同时仍存在一些方法学问题有待解决。其中一个重要问题是生物信息学处理流程的选择, 尤其是对物种多样性极高的无脊椎动物, 测序结果的处理流程直接影响检测结果, 但目前缺乏对该过程的系统比较评估。本研究使用来源于淡水的eDNA样品进行无脊椎动物宏条形码测序, 比较评估多种生物信息学流程对于无脊椎动物序列处理的影响。研究中选取4种常用的聚类或降噪方法(UPARSE、Swarm、UNOISE和DADA2)以及3种分类分配方法(BOLDigger、BLASTN和朴素贝叶斯分类器), 共组合形成12种生物信息学处理流程。结果显示, DADA2降噪方法与BOLDigger分类分配相结合的处理流程产生了最多的无脊椎动物分子可操作分类单元(MOTU)与最高的分类覆盖度和分类分辨率。4种聚类或降噪方法中, UNOISE和DADA2降噪方法比UPARSE和Swarm聚类方法获得了更多的无脊椎动物MOTU; 3种分类分配方法中, BOLDigger和BLASTN比朴素贝叶斯分类器获得了更高的分类覆盖度和分类分辨率。这些结果对基于eDNA的淡水无脊椎动物多样性研究具有重要的参考价值, 此外还提示针对不同研究类群以及不同条形码区段, 需要相应调整使用的生物信息学方法, 以得到更为准确可靠的生物多样性数据。

关键词: 环境DNA; 无脊椎动物多样性; 生物信息学流程; 聚类; 降噪; 分类分配

闫姿伶, 陈晓宇, 姚蒙 (2026) 基于环境DNA宏条形码的无脊椎动物多样性研究: 生物信息学流程比较与评估. 生物多样性, 34, 25369. doi: 10.17520/biods.2025369; cstr: 32101.14.biods.2025369.
Yan ZL, Chen XY, Yao M (2026) A comparative evaluation of bioinformatic pipelines for invertebrate biodiversity profiling via environmental DNA metabarcoding. Biodiversity Science, 34, 25369. doi: 10.17520/biods.2025369; cstr: 32101.14.biods.2025369.

A comparative evaluation of bioinformatic pipelines for invertebrate biodiversity profiling via environmental DNA metabarcoding

Ziling Yan[1,2], Xiaoyu Chen[2], Meng Yao[1,2*]

1 *Institute of Ecology, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China*
2 *State Key Laboratory of Gene Function and Modulation Research, School of Life Sciences, Peking University, Beijing 100871, China*

ABSTRACT

Aims: Environmental DNA (eDNA) technology has been increasingly applied in biodiversity research. However, its rapid development has also sparked methodological debates. A key issue involves the selection of bioinformatic pipelines, particularly for extremely biodiverse taxa such as invertebrates. Bioinformatic pipelines significantly affect eDNA-based biodiversity profiles, yet a systematic comparative evaluation of relevant pipelines is currently lacking. Therefore, this study aims to compare and evaluate bioinformatic pipelines commonly used for analyzing eDNA-derived invertebrate sequencing data.

Method: Invertebrate metabarcoding sequencing was carried out on freshwater eDNA samples, and the performance of various bioinformatic pipelines in processing invertebrate sequences was comparatively assessed. Four commonly used clustering or denoising methods (UPARSE, Swarm, UNOISE, and DADA2) and three taxonomic assignment methods

收稿日期 Received: 2025-09-15; 接受日期 Accepted: 2025-12-09
基金项目: 国家自然科学基金联合基金(U24A20640; U2340216)和国家杰出青年科学基金(32325034) Supported by the Joint Funds of the National Natural Science Foundation of China (U24A20640; U2340216) and the National Science Fund for Distinguished Young Scholars (32325034)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: yaom@pku.edu.cn

(BOLDigger, BLASTN, and Naïve Bayesian Classifier) were selected, together constituting 12 bioinformatic pipelines.
Results: Of the 12 evaluated pipelines, the combination of DADA2 denoising and BOLDigger taxonomic assignment yielded the largest number of invertebrate molecular operational taxonomic units (MOTUs), along with the highest levels of taxonomic coverage and resolution. Among the four clustering or denoising methods, UNOISE and DADA2 denoising yielded more invertebrate MOTUs than UPARSE and Swarm clustering. Among the three taxonomic assignment methods, BOLDigger and BLASTN yielded higher taxonomic coverage and resolution than Naïve Bayesian Classifier.
Conclusion: These findings have significant implications for eDNA-based research of freshwater invertebrate biodiversity. Furthermore, our results suggest that bioinformatic pipelines should be adjusted according to different study taxa and barcode regions to obtain accurate and reliable biodiversity data.
Key words: environmental DNA; invertebrate biodiversity; bioinformatic pipeline; clustering; denoising; taxonomic assignment

目前, 环境DNA (environmental DNA, eDNA)技术作为生态学、保护生物学、入侵生物学、生物监测以及公民科学与生物多样性教育等领域的新兴技术, 正不断朝着标准化的生物多样性调查工具发展(Deiner et al., 2017)。与此同时, 该技术的出现伴随着诸多方法学问题, 包括eDNA采样方法、分子实验方案、针对不同目标类群的通用引物、生物信息学处理流程等步骤的选择(Pawlowski et al., 2020; Bunholi et al., 2023)。其中, 使用不同生物信息学方法对eDNA序列数据进行处理会显著影响得到的生物多样性结果, 因此该环节是影响基于eDNA方法获得生物多样性数据的关键步骤(Mathon et al., 2021)。

然而, 目前存在多种eDNA序列处理的生物信息学方法和流程。在分析生物多样性丰富的类群时, 不同序列处理流程对研究结果的影响尤其突出, 这对评估和比较不同eDNA研究的生物多样性数据造成困难。无脊椎动物约占动物物种总数的95%, 已记录物种高达125万种(Eisenhauer & Hines, 2021), 在陆地和水生环境中均具有重要的生态功能, 是生物多样性监测的重要指示类群, 但其高度的多样性使形态学物种鉴定极为困难。近年来eDNA等分子方法为检测无脊椎动物多样性提供了有力的方法支撑(李萌等, 2019; Vourka et al., 2023; Múrria et al., 2024; Macher et al., 2025), 但序列数据分析的复杂性和不同生物信息学方法的影响还未得到充分评估。

在生物信息学处理流程中, 方法之间差异的焦点主要包括聚类或降噪方法以及分类分配方法的选择(Nearing et al., 2018; Bhat et al., 2019; Antich et al., 2021; Bayer et al., 2025)。聚类算法通常是按照DNA序列相似性阈值区分物种内和物种间的变异, 从而进行物种(或类似物种水平)以内序列的聚类(Alberdi et al., 2018), 主要包括UCLUST (Edgar, 2010)、UPARSE (Edgar, 2013)及SUMACLUST (Mercier et al., 2013)等聚类算法。基于聚类算法最常见的结果是生成可操作分类单元(operational taxonomic unit, OTU)。由于不同分类群种内和种间以及不同DNA区段的序列变异程度有别, 如果研究类群DNA序列的变异性未知, 聚类相似性阈值的选择会直接影响最终分类结果的可信度(Petit-Marty et al., 2023)。而通过动态迭代扩展算法即Swarm (Mahé et al., 2021)或基于模型的贝叶斯算法即CROP (Hao et al., 2011)进行聚类, 可以避开相似性阈值设定这一较为主观的步骤。

除了聚类算法, 近年来也出现了多种降噪算法, 这些算法不依赖固定的相似性阈值, 而是通过纠正测序错误来推断真实存在的序列(Nearing et al., 2018)。因此, 降噪算法同样可以避开相似性阈值设定, 但又能保留序列中的所有变异。目前最常用的降噪算法主要包括基于生成扩增子序列变体(amplicon sequence variant, ASV)的DADA2 (Callahan et al., 2016)和基于生成零半径OTU (zero-radius OTU, ZOTU)的UNOISE (Edgar, 2016)。不同降噪算法的主要区别在于纠正测序错误的原理不同, DADA2是基于参数化的错误模型来区分测序错误和真实的生物变异, 而UNOISE是基于序列丰度和序列相似性来判定错误序列(Antich et al., 2021)。

对于分类分配方法的选择, 在以往研究中最常见的方法包括基于序列比对和基于序列组成的方法(Hakimzadeh et al., 2024)。基于序列比对的方法主

要包括全局比对和局部比对两种, 前者如OBITools中的Ecotag算法和BOLD数据库中的BOLDigger算法(Boyer et al., 2016; Buchner and Leese, 2020), 后者如BLAST算法(Altschul et al., 1990)。基于序列组成的方法主要包括朴素贝叶斯分类器(Naïve Bayesian Classifier, 包含RDP分类器) (Wang et al., 2007; Bokulich et al., 2018)和DADA2分类分配算法(Callahan et al., 2016)。

为了比较与评估生物信息学处理流程对于无脊椎动物多样性eDNA研究的影响, 我们采用无脊椎动物通用引物对多个河流和湖泊水体采集的eDNA样品进行扩增测序, 选取生物信息学流程中最常用的4种聚类或降噪方法(UPARSE、Swarm; UNOISE、DADA2)以及3种分类分配方法(BOLDigger、BLASTN、朴素贝叶斯分类器), 利用其组合而成的12种生物信息学流程进行序列处理与分类分配(图1), 通过综合比较与评估这些在无脊椎动物多样性eDNA研究中的常用处理流程, 旨在为相关研究提供生物信息方法学指导与借鉴。

1 材料与方法

1.1 eDNA样品采集

为增加样品中无脊椎动物的多样性, 从而更充分地评估序列处理流程对生物多样性检测的影响, 我们在四川省岷江流域的5条河流和云南省九大高原湖泊广泛采集水样eDNA样品, 分别于2022年6月和8月完成水样采集工作。5条河流共设置84个采样点, 每个样点采集3份水样, 每份水样体积均为1 L, 共计252份河流eDNA样品; 九大高原湖泊共设置了322个采样点, 每个样点采集1份体积为1 L的水样, 共计322份湖泊eDNA样品。

在水样采集后的12 h内, 使用蠕动泵和无菌硅胶管通过0.45 μm过滤管(SVHV010RS, Millipore, Massachusetts, USA)对每份水样进行过滤。在每批次的水样过滤时, 均对500 mL纯净水进行过滤作为过滤空白, 以检查过滤期间是否存在污染, 过滤结束后在过滤管中加入无水乙醇进行保存, 直至DNA提取。




图1 本研究12种序列数据处理流程的具体步骤和命令
Fig. 1 The specific steps and commands of 12 pipelines used in this study

1.2 eDNA样品实验室处理与测序

所有eDNA样品的提取、PCR、纯化分别在专用的eDNA实验室完成。实验涉及的所有试剂、耗材的外包装以及实验台面均依次使用75%乙醇溶液、10%次氯酸钠溶液和DNA AWAY (Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA)进行清洁和DNA消除。

eDNA样品遵循“Open the Sterivex™ casing”方案(Cruaud et al., 2017)从过滤管中取出滤膜, 使用无菌剪刀将滤膜剪碎(~3 mm^2)。根据生产厂家的提取说明使用DNeasy Blood and Tissue Kit试剂盒(QIAGEN, Hilden, Germany)进行提取, 具体步骤参照Lu等(2023), 每批次样品提取时均包含一个提取空白以检查提取期间是否存在污染。

使用无脊椎动物宏条形码引物对mlCOIintF (5′-GGWACWGGWTGAACWGTWTAYCCYCC-3′; Leray et al., 2013)和HCO2198 (5′-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3′; Folmer et al., 1994)扩增线粒体细胞色素*c*氧化酶I (mitochondrial cytochrome *c* oxidase I, COI)基因约313 bp长度的片段, 该引物已被证明在淡水无脊椎动物多样性检测中具有良好的表现(Chen et al., 2025)。在正反向引物的5′端添加了“CC”和独特8位核苷酸序列(即tags), 以便在后续混合测序中区分不同的eDNA样品和PCR (Coissac, 2012)。分别混合所有河流和所有湖泊eDNA样品的等体积DNA提取液, 得到混合后河流eDNA样品和混合后湖泊eDNA样品, 将两个混合后的eDNA样品稀释10倍后作为PCR模板, 以减少后续PCR过程中PCR抑制剂的影响(数据未展示)。每个样品均包含3个PCR重复, 并在扩增时包含一个不含DNA模板(用ddH_2O取代)的PCR空白以检查扩增期间是否存在污染, 共计7个PCR。每个PCR在25 μL体系中进行, 包含5 μL稀释后的eDNA模板、正反向引物各0.2 μM、0.4 μg/μL牛血清白蛋白、1 × Premix Ex Taq酶(Takara, Shiga, Japan)和6.5 μL ddH_2O (Takara, Shiga, Japan)。PCR程序包括95°C预变性5 min; 95℃ 30 s、62℃ 30 s、72℃ 1 min共40个循环; 最后72℃延伸10 min。

PCR产物通过琼脂糖凝胶电泳进行显影, 并将没有条带出现的样品再次进行PCR扩增, 以避免因取样或扩增随机性导致扩增失败。将7个PCR产物等体积混合, 并根据产品说明使用MiniBEST DNA Fragment Purification Kit试剂盒(Takara, Shiga, Japan)进行纯化。使用NanoDrop 2000超微量分光光度计(Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA)对纯化后的DNA进行定量。文库构建和2 × 250 bp双端测序在苏州金唯智生物科技有限公司的Illumina NovaSeq平台(Illumina, San Diego, California, USA)完成。

1.3 生物信息学流程

对高通量测序获得的原始数据进行了12种生物信息学流程的测试, 包括4种序列聚类或降噪方法以及3种分类分配方法(图1)。

1.3.1 原始序列处理

1.3.1.1 UPARSE聚类

测序获得的原始数据使用OBITools3程序包(Version 3.0.1b25)进行双端序列合并、样品分配、引物移除、序列去重和降噪, 无特殊说明的处理均使用默认参数。使用obi grep命令将正反向reads重叠比对得分小于或等于0.8的序列移除, 使用obi grep命令将测序文库内长度大于或等于250 bp且count数大于或等于10的序列保留, 并使用obi clean命令将由于PCR或测序错误产生的序列即变异序列移除(r = 0.05)。使用VSEARCH程序包(Version 2.27.0; Rognes et al., 2016)中的uchime3_denovo命令将嵌合体序列移除, 并使用cluster_size命令按照97%的序列相似性进行聚类, 得到OTU。下文使用“UPARSE”指代该方法。

1.3.1.2 Swarm聚类

聚类步骤之前的所有序列处理流程同1.3.1.1。使用Swarm程序包(Version 3.1.5)中的fastidious命令对序列进行聚类, 得到OTU。下文使用“Swarm”指代该方法。

1.3.1.3 UNOISE降噪

移除嵌合体之前的所有序列处理流程同1.3.1.1。使用VSEARCH中的cluster_unoise命令根据UNOISE3算法对测序产生的错误序列进行识别和移除, 并使用uchime3_denovo命令将嵌合体序列移除, 得到ZOTU。下文使用“UNOISE”指代该方法。

1.3.1.4 DADA2降噪

测序获得的原始数据使用QIIME 2程序包(Version 2025.7.0; Bolyen et al., 2019)进行样品分配

和引物移除(Martin, 2011), 并完成序列去重、降噪、双端序列合并和嵌合体移除(Callahan et al., 2016)。使用R程序包(Version 4.3.0) (R Core Team, 2023)保留测序文库内长度大于或等于250 bp且count数大于或等于10的序列, 得到ASV。下文使用“DADA2”指代该方法。

1.3.2 序列分类分配

将1.3.1中通过UPARSE、Swarm、UNOISE、DADA2共4种聚类或降噪方法得到的序列使用BOLD数据库(Ratnasingham & Hebert, 2007)进行分类分配, 无特殊说明的处理均使用默认参数。

1.3.2.1 全局比对

使用BOLDigger3程序包(Version 2.1.1)中的boldigger3 identify命令和BOLD在线数据库对处理后的序列进行比对和最终分类分配, 参数db设置为1, 即ANIMAL LIBRARY (PUBLIC), 参数mode设置为3, 即Exhaustive Search。使用默认阈值(97%: species level, 95%: genus level, 90%: family level, 85%: order level, 80%: class level)作为各分类水平的相似性(identity)阈值确定每条序列的最终分类结果。删除分类分配结果中identity小于80%的序列。下文使用“BOLDigger”指代该方法。

1.3.2.2 局部比对

将BOLD公共数据库(包括序列数据库和分类数据库, Version 20250725)下载至本地, 为了与1.3.2.1中BOLD在线数据库的序列和分类信息保持一致, 以保证不同分类分配方法间的可比性, 只保留本地序列数据库中长度大于或等于500 bp的COI序列以及本地分类数据库中kingdom为“Animalia”的COI序列。使用BLAST+程序包(Version 2.16.0+; Camacho et al., 2009)中的blastn命令对处理后的序列进行比对。为了与1.3.2.1中BOLDigger算法的默认值保持一致, 仅保留每条序列比对记录中的前100条。保留分类分配结果中比对得分(bit score)最高的所有比对记录, 并删除identity小于80%或序列覆盖度(coverage)小于99%的所有记录。对同一序列的多条比对记录进行合并, 合并结果为包含所有比对记录的最低分类水平, 按照1.3.2.1中各分类水平使用的identity阈值确定每条序列的最终分类分配结果。下文使用“BLASTN”指代该方法。

1.3.2.3 朴素贝叶斯分类器

使用QIIME 2程序包中的qiime feature-classifier extract-reads命令提取1.3.2.2中已下载至本地并进行筛选后的BOLD公共数据库中的扩增子区域, 使用的正反向引物序列与1.2中的PCR扩增引物一致。使用qiime feature-classifier fit-classifier-naive-bayes命令和提取出的扩增子区域训练分类器, 并使用qiime feature-classifier classify-sklearn命令对处理后的序列进行分类分配。保留分类分配结果中置信度(confidence)大于或等于90%的所有序列。下文使用“Bayesian”指代该方法。

将BOLDigger、BLASTN和Bayesian的结果参照Chen等(2025)处理方式获得最终的分子可操作分类单元(molecular operational taxonomic unit, MOTU): (1)只保留无脊椎动物门的序列, 将每条序列在各样品中的reads数减去空白对照中相应序列的reads数; (2)将鉴定为同一物种的reads数进行合并, 而鉴定到种以上分类水平的序列不进行合并; (3)为了去除潜在的交叉污染, 删除在每个PCR产物中reads数均小于10的序列。若一个MOTU在某个样品的3次重复PCR中检出一次即认为该MOTU在此样品中存在, 否则认为不存在, 基于该原则得到无脊椎动物MOTU的定性(存在/不存在)数据。

1.4 数据分析

使用vegan包(https://cran.r-project.org/web/packages/vegan)中的rarecurve函数对12种生物信息学流程中每个PCR产物的MOTU数量随测序深度变化的稀疏曲线进行评估。使用vegan包中的cmdscale函数根据基于MOTU定性数据的Jaccard相异性指数对不同流程检测结果进行主坐标分析(principal coordinate analysis, PCoA), 使用adonis2函数进行置换多元方差分析(permutational multivariate analysis of variance, PERMANOVA), 评估不同流程检测出的无脊椎动物MOTU组成的差异, 统计检验在$\alpha = 0.05$显著性水平上进行。使用ggplot2包(https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2)对分析结果进行可视化, 所有数据分析均在R (Version 4.3.0)中完成。

2 结果

2.1 不同流程获得的无脊椎动物分类覆盖度

原始测序序列经过12种生物信息学处理流程

后, 所有样本PCR中的无脊椎动物MOTU的稀疏曲线随测序深度增加并逐渐趋于平缓(图2), 说明当前的测序深度足以检测出PCR中绝大多数MOTU。

12种处理流程总共获得984–2,777个无脊椎动物MOTU和1,349,864–3,690,943条reads (表1, 附录1)。其中DADA2和BOLDigger相结合的处理流程保留的无脊椎动物MOTU最多, 和Bayesian相结合的处理流程保留的reads最多; 而UPARSE和BLASTN相结合的处理流程保留的MOTU和reads最少。在4种聚类或降噪方法中, 无论使用哪种分类分配方法, 均是DADA2保留的MOTU和reads最多, 而UPARSE最少。在3种分类分配方法中, 当使用UPARSE、UNOISE和DADA2时均是BOLDigger保留的MOTU最多而Bayesian保留的reads最多, 当使用Swarm时Bayesian保留的MOTU和reads均最多; 但无论使用哪种聚类或降噪方法, 均是BLASTN保留的MOTU和reads最少。此外, DADA2和Bayesian相结合的处理流程单独检测出的MOTU数量最多(836个), 而UPARSE和BLASTN相结合的流程单独检出的MOTU数量最少(2个), 不同聚类或降噪方法共同检测出的无脊椎动物MOTU数量分别为1,491个、940个和1,320个(图3A), 其中有310个是3种分类分




图2　不同处理流程检测出的无脊椎动物MOTU的稀疏曲线。每条曲线代表一个PCR产物。
Fig. 2　Rarefaction curve of invertebrate MOTU detected using different pipelines. Each curve represents a PCR product.

表1　12种处理流程获得的无脊椎动物MOTU和reads以及分类覆盖度。此处分类覆盖度指不同流程的产出结果在各分类水平上的覆盖广度。
Table 1　Invertebrate MOTU, reads and taxonomic coverage obtained from 12 pipelines. The taxonomic coverage here refers to the coverage breadth of the outputs from different pipelines across each taxonomic level.

处理流程 Pipeline		MOTU (Reads)	门 Phylum	纲 Class	目 Order	科 Family	属 Genus	种 Species
UPARSE	BOLDigger	1,548 (1,475,851)	13	27	71	141	108	111
	BLASTN	984 (1,349,864)	11	22	46	107	92	98
	Bayesian	1,391 (1,689,419)	11	19	34	66	71	81
Swarm	BOLDigger	2,142 (1,765,422)	14	31	81	148	109	112
	BLASTN	1,541 (1,680,656)	11	22	47	108	94	104
	Bayesian	2,207 (2,095,227)	11	19	34	67	72	82
UNOISE	BOLDigger	2,392 (1,950,275)	14	31	81	153	108	111
	BLASTN	1,567 (1,797,455)	11	22	47	108	94	104
	Bayesian	2,158 (2,264,348)	11	19	34	67	73	82
DADA2	BOLDigger	2,777 (3,329,666)	14	32	83	164	118	120
	BLASTN	1,818 (2,678,329)	11	23	49	113	102	108
	Bayesian	2,683 (3,690,943)	11	19	35	71	78	87

配方法共同检出的(图3B)。

不同处理流程获得的无脊椎动物分类覆盖度也存在较大差异(表1)。在门水平上, Swarm、UNOISE和DADA2与BOLDigger相结合的3种处理流程检测出的MOTU共覆盖了14个不同的无脊椎动物门; 其次是UPARSE和BOLDigger相结合的处理流程, 总共覆盖了13个不同的门; 而其余8种处理流程均只覆盖了11个无脊椎动物门。在门以外的其他水平上, 均是DADA2和BOLDigger相结合的处理流程获得了最高的分类水平多样性, 覆盖了32个纲、83个目、164个科、118个属以及120个种; 在纲水平上, 使用Bayesian的4种处理流程覆盖了最少的(19个)无脊椎动物纲; 在目水平上, UPARSE、Swarm和UNOISE与Bayesian相结合的处理流程覆盖了最少的无脊椎动物目, 仅有34个; 而在科、属和种这3个分类水平上, 均是UPARSE和Bayesian相结合的流程获得了最低的分类水平多样性, 仅覆盖66个科、71个属以及81个种。

2.2 不同流程获得的无脊椎动物分类分辨率

12种处理流程检测出的无脊椎动物MOTU的分类分辨率存在一定差异(图4), 在4种聚类或降噪方法中, DADA2在纲至种的各个分类水平上均产生了最多的MOTU, 而用UPARSE得到了最少的MOTU。在3种分类分配方法中, BOLDigger和BLASTN产生的MOTU中分别有99.9%和91.0%被分配到纲及纲以下水平, 而Bayesian的分类结果中仅有22.1%被分配到纲及纲以下水平。

具体而言, 在使用UPARSE的处理流程中, BOLDigger产生的结果中最低被分配到目水平的无脊椎动物MOTU比例最高(43.7%), 其次是纲水平




图3 不同聚类或降噪方法检测出的无脊椎动物MOTU数量(A)以及不同聚类或降噪方法共同检测出的MOTU在不同分类分配方法间比较(B)的韦恩图

Fig. 3 Venn diagrams of the number of invertebrate MOTU detected using different clustering or denoising methods (A) and the comparison of MOTU jointly detected using different clustering or denoising methods across different taxonomic assignment methods (B)




图4 不同处理流程检测出的无脊椎动物MOTU的分类分辨率。此处分类分辨率指不同流程鉴定结果的分类精度。

Fig. 4 The taxonomic resolution of invertebrate MOTU detected using different pipelines. The taxonomic resolution here refers to the taxonomic precision of the identification results from different pipelines.

(30.4%), 科、属、种水平的占比分别为14.3%、4.3%、7.2%; BLASTN检测出的MOTU中分类分配最低水平占比最高的也是目(39.8%)和纲(22.9%), 科、属、种水平的占比分别为15.4%、4.5%、10.0%; 而Bayesian检测出的MOTU中大部分最低仅被分配到门水平(77.9%), 其次是纲水平(10.2%), 科、属、种水平的占比分别为3.3%、1.2%、5.8%。使用Swarm、UNOISE和DADA2的检测结果与UPARSE类似, BOLDigger检测出的MOTU中最低被分配到目水平的数量占比最高(41.5%–42.9%), 其次是纲水平(30.4%–33.1%), 科、属、种水平的占比范围分别为14.4%–15.9%、5.9%–6.1%、4.3%–5.2%; BLASTN的检测结果中占比最高的也是目水平(33.6%–37.3%), 其次是纲水平(24.3%–27.6%), 科、属、种水平的占比分别为15.0%–18.6%、5.2%–8.1%、5.9%–6.7%; 而Bayesian的检测结果中占比最高的是门(79.5%–82.1%), 其次是纲水平(8.4%–10.9%), 科、属、种水平的占比分别为3.2%–3.8%、1.0%–1.2%、3.2%–3.8%。

2.3 不同流程获得的主要无脊椎动物目

对4种聚类或降噪方法进行比较发现, 在使用BOLDigger的流程中, 4种方法共同检测出71个无脊椎动物目, DADA2单独检测出4个其他方法未检测到的目, 即无甲目(Anostraca)、指足虫目(Dactylopodida)、异毛目(Heterotrichida)和原纽虫目(Archinemertea); Swarm和UNOISE各单独检出1个目, 分别为基眼目(Hygrophila)和单骨海绵目(Haplosclerida); 而UPARSE检出的所有无脊椎动物目在其他3种方法中均有检出。在使用BLASTN的流程中, 4种方法共同检测出46个无脊椎动物目, 仅DADA2单独检测出3个特有目, 分别为十足目(Decapoda)、中气门目(Mesostigmata)和多骨海绵目(Poecilosclerida), Swarm和UNOISE共同检测出1个特有目, 即小杆目(Rhabditida); 在使用Bayesian的流程中, 4种方法共同检测出34个无脊椎动物目, 仅DADA2单独检测出1个特有目, 即十足目, 其他3种方法检测出的无脊椎动物目均包含于DADA2的结果之中(图5)。

对3种分类分配方法进行比较发现, 在使用UPARSE的处理流程中, 3种方法共同检测出32个无脊椎动物目, BOLDigger和BLASTN分别单独检出29和6个目, 而Bayesian检出的所有无脊椎动物目在其他两种方法中均有检出。在使用Swarm、UNOISE和DADA2的处理流程中, 3种方法共同检测出33个无脊椎动物目, BOLDigger单独检出39个目; BLASTN结合Swarm和UNOISE均单独检出6个目, 而结合DADA2单独检出7个目; Bayesian检出的所有无脊椎动物目在其他两种方法中均有检出(图6)。

12种处理流程检测出的不同无脊椎动物目的分类多样性存在一定差异, 该差异在不同分类分配方法间更明显(图7)。在使用BOLDigger的流程中, 检测出的MOTU数量排名前十位的目共包括852–1,472个MOTU; 在使用BLASTN的流程中, 检测出的前十位的目共包括593–1013个MOTU; 而在使用Bayesian的流程中, 检测出的前十位无脊椎动物目仅包括128–201个MOTU。具体而言, 在使用UPARSE的处理流程中, BOLDigger检测出的MOTU数量排名前五的无脊椎动物目为双翅目(Diptera, 20.4%)、鞘翅目(Coleoptera, 8.1%)、膜翅目(Hymenoptera, 7.9%)、游泳目(Ploima, 5.5%)和鳞翅目(Lepidoptera, 5.2%), BLASTN检测出的排名前五的目为双翅目(20.8%)、鞘翅目(12.0%)、膜翅目




图5 不同聚类或降噪方法检测出的无脊椎动物目数量的韦恩图
Fig. 5 Venn diagrams of the number of invertebrate orders detected using different clustering or denoising methods




图6　不同分类分配方法检测出的无脊椎动物目数量的韦恩图

Fig. 6　Venn diagrams of the number of invertebrate orders detected using different taxonomic assignment methods




图7　不同处理流程检测出的属于主要无脊椎动物目的MOTU数量。仅显示各流程中MOTU数量排名前十位的目。

Fig. 7　The number of MOTU belong to major invertebrate orders detected using different pipelines. Only the top 10 orders with the largest number of MOTU are shown.

(10.8%)、游泳目(5.7%)和半翅目(Hemiptera, 5.0%), 而Bayesian检测出的排名前五的目为游泳目(2.9%)、双翅目(2.6%)、膜翅目(0.6%)、鳞翅目(0.6%)和管蚓目(Tubificida, 0.6%)。在使用Swarm和UNOISE的处理流程中, BOLDigger、BLASTN和Bayesian检测出的排名前五的无脊椎动物目与UPARSE相同。在使用DADA2的处理流程中, BOLDigger和BLASTN检测出的排名前五的目与UPARSE相同, 而Bayesian检测出的排名前五的目分别为游泳目(3.0%)、双翅目(1.9%)、管蚓目(0.4%)、蜉蝣目(Ephemeroptera, 0.3%)和膜翅目(0.3%)。

2.4　不同流程获得的无脊椎动物群落组成

基于Jaccard相异性指数对不同处理流程检测出的无脊椎动物MOTU进行PCoA分析, 结果如图8所示。在4种聚类或降噪方法中, 经DADA2处理的结果被分离出来, 而经其他3种方法处理的结果较为聚集, 4种方法检测出的无脊椎动物群落组成无




图8　基于Jaccard相异性指数对不同处理流程检测出的无脊椎动物MOTU进行的PCoA分析。形状和颜色均相同的符号对应河流和湖泊eDNA样品的结果。

Fig. 8　PCoA analysis of invertebrate MOTU detected using different pipelines based on Jaccard dissimilarity index. The symbols with the same shape and color correspond to the results of eDNA samples from rivers and lakes.

显著差异(PERMANOVA, $R^2 = 0.014$, $P = 1.0$)。在3种分类分配方法中, 经不同方法获得的结果相互分离, 3种方法检测出的无脊椎动物群落组成具有显著差异(PERMANOVA, $R^2 = 0.438$, $P = 0.001$)。整体而言, 12种处理流程检测出的无脊椎动物群落组成无显著差异(PERMANOVA, $R^2 = 0.451$, $P = 0.613$)。

3 讨论

3.1 使用不同处理流程对无脊椎动物分类覆盖度与分类分辨率的影响

本研究使用12种生物信息处理流程分析eDNA无脊椎通用引物扩增产物测序数据, 结果显示处理流程选择对检测生物多样性结果有明显影响。对获得的无脊椎动物MOTU和reads进行比较发现, 无论使用何种分类分配方法, 经过Swarm聚类方法获得的无脊椎动物MOTU的数量均多于UPARSE, 这一结果与以往评估不同聚类算法的研究结果一致(Jackson et al., 2016; Kopylova et al., 2016)。此外, 我们发现在4种聚类或降噪方法中, 经过DADA2降噪处理的流程保留了最多的MOTU和reads。Macé等(2022)评估了不同生物信息学处理流程对种内遗传变异的检测能力, 通过比较5种常见的生物信息学程序(包括obiclean、DADA2、Swarm和LULU共4种降噪/聚类方法, 以及VSEAECH和DADA2共2种嵌合体移除方法), 发现使用DADA2进行降噪和移除嵌合体能够获得最高准确度和最高精度的单倍型, 说明DADA2降噪方法获得的序列准确度和精度相比Swarm聚类方法可能更高。本研究中DADA2相比Swarm保留了更多的MOTU和reads, 推测使用DADA2进行降噪能够在一定程度上降低假阴性结果的占比。以往对不同聚类或降噪算法进行比较评估的研究也显示, 基于ASV的降噪算法(尤其是DADA2)比基于OTU的聚类算法能够获得更准确的生物多样性结果(De Santiago et al., 2022)。

本研究结果显示经过DADA2降噪处理的流程在纲至种的各个分类水平上均获得了最多的无脊椎动物MOTU, 而经过UPARSE聚类处理的流程在各分类水平上均获得了最少的MOTU。这一结果与另一项使用真实和模拟鱼类群落对3种处理流程(包括UPARSE聚类方法以及UNOISE和DADA2两种降噪方法)进行比较的研究结果相反, 该研究发现在对真实鱼类群落序列的分析中, UPARSE在目至种的各个分类水平上获得的鱼类数量均最多, 而经DADA2处理获得的最少(Li et al., 2024)。出现相反结果的原因可能是研究的目标类群不同, 前述研究针对的是鱼类, 而本研究关注的是无脊椎动物类群, 不同类群及分子标记的遗传变异性可能影响不同序列处理流程的表现。Nilsen等(2024)使用不同算法对细菌16S rRNA基因序列进行聚类或降噪处理的结果与本研究结果同样存在差异, 其研究显示Swarm和UNOISE的表现要优于DADA2。这提示我们, 在选择针对不同生物类群的序列处理流程时, 应参考对同一类群进行生物信息学流程比较的研究结果或者使用实际数据进行评估, 对于不同研究类群应尽可能选择最适合该类群的处理流程。

本研究比较不同处理流程获得的无脊椎动物分类覆盖度的结果显示, 在纲及纲以下分类水平上, 经过DADA2降噪处理以及BOLDigger分类分配的流程获得了最丰富的分类水平多样性, 即分类覆盖度最高。然而, 在一项基于珊瑚礁eDNA数据比较分析4种生物信息学流程的研究中, DADA2与BLASTN相结合的处理流程获得了与研究区域现有海洋真核生物多样性记录相符且更高的分类覆盖度(Cahyani et al., 2024)。但该研究在COI序列的生物信息学处理流程中并未使用BOLDigger分类分配算法, 这可能是导致其与本研究结论不同的重要原因。

本研究结果显示, 在使用BOLDigger和BLASTN即序列比对算法进行分类分配的流程中, 所有或绝大部分MOTU均被分配到纲及纲以下水平, 而使用Bayesian即朴素贝叶斯分类器的结果中这一数量仅占22.1%, 说明基于序列比对的算法能够获得分辨率更高的无脊椎动物多样性结果。一项基于海洋脊椎动物eDNA评估不同分类分配方法的研究发现, 对于COI数据集而言, 序列比对(全局比对或局部比对)算法相比朴素贝叶斯分类器能够获得更高比例的正确分类信息(Bayer et al., 2025), 这说明基于序列比对算法对COI序列进行分类分配有可能获得分辨率和正确率均更高的分类结果。然而, Rosen等(2011)发现朴素贝叶斯分类器的表现要优于BLASTN, 前者能够获得被后者遗漏的重要类群; 但该研究使用的序列来自微生物群落, 这可能是导致不同研究结果存在差异的重要原因。QIIME 2中

的朴素贝叶斯分类器最初是针对细菌16S rRNA和真菌ITS基因的序列数据提出和优化的(Bokulich et al., 2018), 因此有可能并不适用于无脊椎动物COI基因序列的分类分配。一项对比不同生物信息学处理结果的研究也发现, 使用BLAST和RDP分类器(属于朴素贝叶斯分类器)对COI序列进行分类分配, BLAST的整体表现要优于RDP分类器(Brandt et al., 2021)。

3.2 不同流程获得的无脊椎动物目与群落组成

在4种聚类或降噪方法的比较中, DADA2结合BOLDigger、BLASTN和Bayesian这3种分类分配方法, 分别单独检测出4个目(无甲目、指足虫目、异毛目和原纽虫目)、3个目(十足目、中气门目和多骨海绵目)和1个目(十足目)。其中无甲目主要生活在淡水和咸水湖中(Dumont & Munuswamy, 1997; Rogers, 2013), 异毛目和十足目在淡水和海洋中均有分布(De Grave et al., 2009; Lynn, 2008), 指足虫目、原纽虫目和多骨海绵目物种多生活在海洋中(Sfecci et al., 2016; Chernyshev & Kajihara, 2019; Tekle et al., 2025), 中气门目物种主要生存于陆地环境(Malica et al., 2024)。本研究使用的eDNA样品来自淡水环境(河流和淡水湖泊), 因此上述类群中无甲目、异毛目和十足目这些能够栖息于淡水环境的目以及陆地分布(可能通过个体掉落或eDNA释放到水中)的中气门目可能属于正确检出。在以往研究中发现, DADA2降噪方法产生的假阳性结果要高于UNOISE降噪方法(Li et al., 2024), 本研究中DADA2降噪检出的海洋类群也可能为假阳性结果。

对于3种分类分配方法的比较结果显示, 经过BOLDigger分类分配单独检出的无脊椎动物目最多(29–39个), 远多于其他两种分类分配方法, BLASTN仅单独检出6–7个目, 而Bayesian检出的所有目在其他两种分类分配方法中均有检出。由于BOLDigger是专门针对BOLD数据库开发的分类分配算法, 其使用具有一定的局限性, 在已发表的比较不同分类分配算法的研究中并未涉及该方法(Rosen et al., 2011; Brandt et al., 2021; Bayer et al., 2025)。本研究结果为该算法的有效性提供了重要支持。

此外, 本研究发现不同处理流程检测出的主要(MOTU数量排名前五位)无脊椎动物目存在差异。在使用UPARSE、Swarm和UNOISE的流程中, 检测出的主要无脊椎动物目完全一致, 而使用DADA2的流程单独检出了蜉蝣目; 在使用BOLDigger的处理流程中没有单独检出的主要无脊椎动物目, 而使用BLASTN的流程单独检出了半翅目, 使用Bayesian的流程单独检出了蜉蝣目和管蚓目。对于研究对象为特定无脊椎动物目的研究人员, 可以参考以上结果选择相应的生物信息学流程。

对12种处理流程检测出的无脊椎动物群落组成进行分析发现, 经DADA2降噪处理的结果单独成簇, 而经其他3种聚类或降噪方法处理的结果相互聚集。这一结果与Li等(2024)的研究相一致, 即UPARSE聚类和UNOISE降噪获得的群落组成相似性最高, 而DADA2降噪获得的群落结构与其他两种方法的一致性较差。此外, 也有研究认为聚类和降噪并不属于可以相互替代的关系, 二者应该作为生物信息学流程中相互补充的处理工具, 以充分保留COI测序数据集中所包含的种间和种内信息(Antich et al., 2021)。例如, 先对序列进行聚类形成MOTU, 再在每个MOTU内进行降噪, 对于包含大量种内信息的COI数据集来说是一种更合理的序列处理方式(Turon et al., 2020)。而Brandt等(2021)则认为聚类和降噪描述了不同水平的生物多样性, 前者能够更准确地反映种间多样性, 而后者能够更全面地描述遗传多样性(包括种内多样性)。因此, 如果研究中更关注物种多样性, 即希望获取更稳健的物种分类信息, 可以考虑使用包含聚类方法(UPARSE、Swarm等)的处理流程(Li et al., 2024); 如果研究问题更侧重于种内多样性, 即评估物种内遗传变异的水平, 则选择包含降噪方法(UNOISE、DADA2等)的处理流程可能更为合适(Macé et al., 2022)。总之, 选择聚类方法还是降噪方法又或是两者结合使用, 取决于研究目的、研究类群以及关注的科学问题。

然而, 由于本研究使用的是自然群落样品, 无脊椎动物类群又具有高度多样性, 难以准确和全面地鉴定实际物种组成; 且研究中经过不同生物信息学流程处理得到的无脊椎动物MOTU中鉴定到种的比例仅占3.3%–10.0%, 所以研究中无法确定每个MOTU是属于正确检出还是假阳性。因此, 本研究通过无脊椎动物MOTU数量、分类覆盖度以及分类分辨率这3个方面来比较不同处理流程的结果时,

很难避免假阳性和假阴性的影响, 导致本研究结论具有一定的局限性。未来相关研究可以考虑同时使用经物种鉴定的无脊椎动物DNA样品和已知物种组成的合成DNA作为模板进行不同序列处理流程对无脊椎动物多样性检测效果的比较, 通过计算假阳性和假阴性结果来评估不同流程准确检出生物多样性的能力。

4 结论

本研究使用基于4种聚类或降噪方法以及3种分类分配方法结合形成的12种流程处理无脊椎动物宏条形码测序产物, 全面比较与评估其各项表现。结果表明, DADA2降噪与BOLDigger分类分配相结合的处理流程获得了最多的无脊椎动物MOTU, 分类覆盖度和分类分辨率也最高; UNOISE降噪与BOLDigger分类分配相结合的处理流程次之。在4种聚类或降噪方法中, DADA2降噪方法获得了最多的无脊椎动物MOTU, UNOISE降噪方法次之, 二者均多于UPARSE和Swarm聚类方法。在3种分类分配方法中, BOLDigger分类分配方法获得了最高的无脊椎动物分类覆盖度和分类分辨率, BLASTN方法次之, 且均高于Bayesian方法; 在使用BOLD数据库对COI序列进行分类分配时可以优先考虑BOLDigger方法。

致谢: 感谢中山大学张健教授的邀稿。

ORCID

闫姿伶 https://orcid.org/0009-0002-3884-2361
陈晓宇 https://orcid.org/0000-0002-7166-3341
姚蒙 https://orcid.org/0000-0002-8906-1461

参考文献

Alberdi A, Aizpurua O, Gilbert MTP, Bohmann K (2018) Scrutinizing key steps for reliable metabarcoding of environmental samples. Methods in Ecology and Evolution, 9, 134–147.

Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ (1990) Basic Local Alignment Aearch Tool. Journal of Molecular Biology, 215, 403–410.

Antich A, Palacin C, Wangensteen OS, Turon X (2021) To denoise or to cluster, that is not the question: Optimizing pipelines for COI metabarcoding and metaphylogeography. BMC Bioinformatics, 22, 177.

Bayer PE, Bennett A, Nester G, Corrigan S, Raes EJ, Cooper M, Ayad ME, McVey P, Kardailsky A, Pearce J, Fraser MW, Goncalves P, Burnell S, Rauschert S (2025) A comprehensive evaluation of taxonomic classifiers in marine vertebrate eDNA studies. Molecular Ecology Resources, 25, e14107.

Bhat AH, Prabhu P, Balakrishnan K (2019) A critical analysis of state-of-the-art metagenomics OTU clustering algorithms. Journal of Biosciences, 44, 148.

Bokulich NA, Kaehler BD, Rideout JR, Dillon M, Bolyen E, Knight R, Huttley GA, Caporaso JG (2018) Optimizing taxonomic classification of marker-gene amplicon sequences with QIIME 2's q2-feature-classifier plugin. Microbiome, 6, 90.

Bolyen E, Rideout JR, Dillon MR, Bokulich NA, Abnet CC, Al-Ghalith GA, Alexander H, Alm EJ, Arumugam M, Asnicar F, ⋯, Warren J, Weber KC, Williamson CHD, Willis AD, Xu ZZ, Zaneveld JR, Zhang YL, Zhu QY, Knight R, Caporaso JG (2019) Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2. Nature Biotechnology, 37, 852–857.

Boyer F, Mercier C, Bonin A, Le Bras Y, Taberlet P, Coissac E (2016) Obitools: A unix-inspired software package for DNA metabarcoding. Molecular Ecology Resources, 16, 176–182.

Brandt MI, Trouche B, Quintric L, Günther B, Wincker P, Poulain J, Arnaud-Haond S (2021) Bioinformatic pipelines combining denoising and clustering tools allow for more comprehensive prokaryotic and eukaryotic metabarcoding. Molecular Ecology Resources, 21, 1904–1921.

Buchner D, Leese F (2020) BOLDigger—A Python package to identify and organise sequences with the Barcode of Life Data systems. Metabarcoding and Metagenomics, 4, e53535.

Bunholi IV, Foster NR, Casey JM (2023) Environmental DNA and RNA in aquatic community ecology: Toward methodological standardization. Environmental DNA, 5, 1133–1147.

Cahyani NKD, Anggoro AW, Al Malik MD, Subhan B, Sani LMI, Madduppa H (2024) Inventorizing marine biodiversity using eDNA data from Indonesian coral reefs: Comparative high throughput analysis using different bioinformatic pipelines. Marine Biodiversity, 54, 39.

Callahan BJ, McMurdie PJ, Rosen MJ, Han AW, Johnson AJA, Holmes SP (2016) DADA2: High-resolution sample inference from Illumina amplicon data. Nature Methods, 13, 581–583.

Camacho C, Coulouris G, Avagyan V, Ma N, Papadopoulos J, Bealer K, Madden TL (2009) BLAST+: Architecture and applications. BMC Bioinformatics, 10, 421.

Chen XY, Yan ZL, Li S, Yao M (2025) Advancing aquatic biodiversity assessments of invertebrates using eDNA metabarcoding: A systematic evaluation of primers for marine and freshwater communities. Methods in Ecology and Evolution, 16, 2408–2430.

Chernyshev AV, Kajihara H (2019) Comparative muscular

morphology in archinemertea (Nemertea: Palaeonemertea). Zoomorphology, 138, 193–207.

Coissac E (2012) OligoTag: A program for designing sets of tags for next-generation sequencing of multiplexed samples. Methods in Molecular Biology, 888, 13–31.

Cruaud P, Vigneron A, Fradette MS, Charette SJ, Rodriguez MJ, Dorea CC, Culley AI (2017) Open the Sterivex™ casing: An easy and effective way to improve DNA extraction yields. Limnology and Oceanography: Methods, 15, 1015–1020.

De Grave S, Pentcheff ND, Ahyong ST, Chan TY, Crandall KA, Dworschak PC, Felder DL, Feldmann RM, Fransen CHJM, Goulding LYD, Lemaitre R, Low MEY, Martin JW, Ng PKL, Schweitzer CE, Tan SH, Tshudy D, Wetzer R (2009) A classification of living and fossil genera of decapod crustaceans. Raffles Bulletin of Zoology, 21, 1–109.

De Santiago A, Pereira TJ, Mincks SL, Bik HM (2022) Dataset complexity impacts both MOTU delimitation and biodiversity estimates in eukaryotic 18S rRNA metabarcoding studies. Environmental DNA, 4, 363–384.

Deiner K, Bik HM, Mächler E, Seymour M, Lacoursière-Roussel A, Altermatt F, Creer S, Bista I, Lodge DM, de Vere N, Pfrender ME, Bernatchez L (2017) Environmental DNA metabarcoding: Transforming how we survey animal and plant communities. Molecular Ecology, 26, 5872–5895.

Dumont HJ, Munuswamy N (1997) The potential of freshwater Anostraca for technical applications. Hydrobiologia, 358, 193–197.

Edgar RC (2010) Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST. Bioinformatics, 26, 2460–2461.

Edgar RC (2013) UPARSE: Highly accurate OTU sequences from microbial amplicon reads. Nature Methods, 10, 996–998.

Edgar RC (2016) UNOISE2: Improved error-correction for Illumina 16S and ITS amplicon sequencing. bioRxiv preprint. https://doi.org/10.1101/081257. (accessed on 2025-07-13)

Eisenhauer N, Hines J (2021) Invertebrate biodiversity and conservation. Current Biology, 31, R1214–R1218.

Folmer O, Black M, Hoeh W, Lutz R, Vrijenhoek R (1994) DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome *c* oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. Molecular Marine Biology and Biotechnology, 3, 294–299.

Hakimzadeh A, Asbun AA, Albanese D, Bernard M, Buchner D, Callahan B, Caporaso JG, Curd E, Djemiel C, Durling MB, Elbrecht V, Gold Z, Gweon HS, Hajibabaei M, Hildebrand F, Mikryukov V, Normandeau E, Özkurt E, Palmer JM, Pascal G, Porter TM, Straub D, Vasar M, Větrovský T, Zafeiropoulos H, Anslan S (2024) A pile of pipelines: An overview of the bioinformatics software for metabarcoding data analyses. Molecular Ecology Resources, 24, e13847.

Hao XL, Jiang R, Chen T (2011) Clustering 16S rRNA for OTU prediction: A method of unsupervised Bayesian clustering. Bioinformatics, 27, 611–618.

Jackson MA, Bell JT, Spector TD, Steves CJ (2016) A heritability-based comparison of methods used to cluster 16S rRNA gene sequences into operational taxonomic units. PeerJ, 4, e2341.

Kopylova E, Navas-Molina JA, Mercier C, Xu ZZ, Mahé F, He Y, Zhou H-W, Rognes T, Caporaso JG, Knight R (2016) Open-source sequence clustering methods improve the state of the art. mSystems, 1, e00003-15.

Leray M, Yang JY, Meyer CP, Mills SC, Agudelo N, Ranwez V, Boehm JT, Machida RJ (2013) A new versatile primer set targeting a short fragment of the mitochondrial COI region for metabarcoding metazoan diversity: Application for characterizing coral reef fish gut contents. Frontiers in Zoology, 10, 34.

Li M, Wei TT, Shi BY, Hao XY, Xu HG, Sun HY (2019) Biodiversity monitoring of freshwater benthic macroinvertebrates using environmental DNA. Biodiversity Science, 27, 480–490. (in Chinese with English abstract) [李萌, 尉婷婷, 史博洋, 郝希阳, 徐海根, 孙红英 (2019) 环境DNA技术在淡水底栖大型无脊椎动物多样性监测中的应用. 生物多样性, 27, 480–490.]

Li ZY, Zhao WC, Jiang Y, Wen YJ, Li M, Liu L, Zou KS (2024) New insights into biologic interpretation of bioinformatic pipelines for fish eDNA metabarcoding: A case study in Pearl River estuary. Journal of Environmental Management, 368, 122136.

Lu Q, Zhang S-Y, Du JQ, Liu Q, Dong CX, Zhao JD, Wang YF, Yao M (2023) Multi-group biodiversity distributions and drivers of metacommunity organization along a glacial–fluvial–limnic pathway on the Tibetan Plateau. Environmental Research, 220, 115236.

Lynn DH (2008) The Ciliated Protozoa: Characterization, Classification, and Guide to the Literature, 3rd edn. Springer, New York.

Macé B, Hocdé R, Marques V, Guerin PE, Valentini A, Arnal V, Pellissier L, Manel S (2022) Evaluating bioinformatics pipelines for population-level inference using environmental DNA. Environmental DNA, 4, 674–686.

Macher T-H, Beermann AJ, Arle J, Foerster J, Greyer M, Mora D, Koschorreck J, Rolauffs P, Rother A, Schüler S, Zimmermann J, Hering D, Leese F (2025) Fit for purpose? Evaluating benthic invertebrate DNA metabarcoding for ecological status class assessment in streams under the Water Framework Directive. Water Research, 272, 122987.

Mahé F, Czech L, Stamatakis A, Quince C, de Vargas C, Dunthorn M, Rognes T (2021) Swarm v3: Towards tera-scale amplicon clustering. Bioinformatics, 38, 267–269.

Malica J, Rączka G, Turczański K, Andrzejewska A, Skorupski M, Urbanowski CK, Kamczyc J (2024) Impact of land use history and soil properties on soil mite communities (Acari, Mesostigmata) inhabiting stands growing on post-agricultural

land. Land Degradation & Development, 35, 1776–1791.

Martin M (2011) Cutadapt removes adapter sequences from high-throughput sequencing reads. EMBnet Journal, 17, 10–12.

Mathon L, Valentini A, Guérin PE, Normandeau E, Noel C, Lionnet C, Boulanger E, Thuiller W, Bernatchez L, Mouillot D, Dejean T, Manel S (2021) Benchmarking bioinformatic tools for fast and accurate eDNA metabarcoding species identification. Molecular Ecology Resources, 21, 2565–2579.

Mercier C, Boyer F, Bonin A, Coissac É (2013) SUMATRA and SUMACLUST: Fast and exact comparison and clustering of sequences.

Múrria C, Wangensteen OS, Somma S, Väisänen L, Fortuño P, Arnedo MA, Prat N (2024) Taxonomic accuracy and complementarity between bulk and eDNA metabarcoding provides an alternative to morphology for biological assessment of freshwater macroinvertebrates. Science of the Total Environment, 935, 173243.

Nearing JT, Douglas GM, Comeau AM, Langille MGI (2018) Denoising the Denoisers: An independent evaluation of microbiome sequence error-correction approaches. PeerJ, 6, e5364.

Nilsen T, Snipen L-G, Angell IL, Keeley NB, Majaneva S, Pettersen R, Rudi K (2024) Swarm and UNOISE outperform DADA2 and Deblur for denoising high-diversity marine seafloor samples. ISME Communications, 4, ycae071.

Pawłowski J, Apothéloz-Perret-Gentil L, Mächler E, Altermatt F (2020) Environmental DNA applications for biomonitoring and bioassessment in aquatic ecosystems. Guidelines. Federal Office for the Environment, Bern. Environmental Studies. no. 2010: 71 pp. https://doi.org/10.5167/uzh-187800. (accessed on 2025-07-26)

Petit-Marty N, Casas L, Saborido-Rey F (2023) State-of-the-art of data analyses in environmental DNA approaches towards its applicability to sustainable fisheries management. Frontiers in Marine Science, 10, 1061530.

R Core Team (2023) R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/. (accessed on 2025-09-04)

Ratnasingham S, Hebert PDN (2007) BOLD: The Barcode of Life Data System (http://www.barcodinglife.org). Molecular Ecology Notes, 7, 355–364.

Rogers DC (2013) Anostraca Catalogus (Crustacea: Branchiopoda). The Raffles Bulletin of Zoology, 61, 525–546.

Rognes T, Flouri T, Nichols B, Quince C, Mahé F (2016) VSEARCH: A versatile open source tool for metagenomics. PeerJ, 4, e2584.

Rosen GL, Reichenberger ER, Rosenfeld AM (2011) NBC: The Naïve Bayes Classification tool webserver for taxonomic classification of metagenomic reads. Bioinformatics, 27, 127–129.

Sfecci E, Lacour T, Amade P, Mehiri M, Sfecci E, Lacour T, Amade P, Mehiri M (2016) Polycyclic guanidine alkaloids from Poecilosclerida marine sponges. Marine Drugs, 14, 77.

Tekle YI, Smith AR, McGinnis M, Ghebezadik S, Patel P (2025) A new *Paramoeba* isolate from *Florida* exhibits a microtubule-bound endosymbiont closely associated with the host nucleus. Journal of Eukaryotic Microbiology, 72, e70011.

Turon X, Antich A, Palacín C, Præbel K, Wangensteen OS (2020) From metabarcoding to metaphylogeography: Separating the wheat from the chaff. Ecological Applications, 30, e02036.

Vourka A, Karaouzas I, Parmakelis A (2023) River benthic macroinvertebrates and environmental DNA metabarcoding: A scoping review of eDNA sampling, extraction, amplification and sequencing methods. Biodiversity and Conservation, 32, 4221–4238.

Wang Q, Garrity GM, Tiedje JM, Cole JR (2007) Naïve Bayesian classifier for rapid assignment of rRNA sequences into the new bacterial taxonomy. Applied and Environmental Microbiology, 73, 5261–5267.

(责任编委: 周欣　责任编辑: 周玉荣)

附录　Supplementary Material

https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025369

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25263, pages 1–8
doi: 10.17520/biods.2025263
cstr: 32101.14.biods.2025263

•生态学数据分析方法专题•

一种基于不等长DNA序列的单倍型丰富度估算方法

姜媛[1], 黄贝希[1], 贾学圆[1], 梁思[1], 谢雨彤[1], 范平[1*], 宋刚[2]

1. 陕西中医药大学, 陕西咸阳 712046; 2. 中国科学院动物研究所, 北京 100101

摘要: 传统遗传多样性计算方法要求序列长度一致, 而从公共数据库中获取的序列长度不一, 增加了单倍型识别和遗传多样性评估的难度。现有方法虽能估算不等长DNA序列的单倍型多样性和核苷酸多样性, 但单倍型丰富度的有效计算方法仍属空白。为此, 本研究基于配对序列间的核苷酸差异(K_{ij})开发了一种针对不等长DNA序列的单倍型丰富度估算方法。我们通过3项分析验证方法性能: (1)对于同一套等长序列数据集, 将其计算结果与DnaSP的输出结果进行比较; (2)基于鸟类、哺乳动物和两栖动物的等长数据集生成随机长度的模拟序列, 验证算法处理不等长序列的性能, 并利用药用植物数据集评估该方法的泛化能力; (3)应用该方法计算了鸟类、哺乳动物和两栖动物单倍型丰富度的纬度梯度格局。结果表明: (1)对等长序列, 新方法与DnaSP的输出结果无显著差异(鸟类: W = 22,018, P = 0.845; 哺乳动物: W = 23,096, P = 0.990; 两栖动物: W = 3,518.5, P = 0.977), 且在存在碱基缺失时展现出更优的单倍型识别能力(平均较DnaSP多识别1.333 ± 0.188个单倍型); (2)随机长度模拟实验证实该方法对不等长的序列数据具备良好的估算性能(以相对误差衡量的整体计算精确度为0.130 ± 0.106; 稳定性为0.007 ± 0.007); (3)纬度格局分析显示: 鸟类和哺乳动物在南半球从北到南呈现显著递减趋势, 而在北半球的递减趋势较为平缓; 两栖动物则呈现自南向北的持续递减模式。本研究有助于开发更精确的量化方法, 或可为遗传多样性研究及保护工作提供新的分析工具。

关键词: 遗传多样性; 不等长序列; 单倍型丰富度; 方法

姜媛, 黄贝希, 贾学圆, 梁思, 谢雨彤, 范平, 宋刚 (2026) 一种基于不等长DNA序列的单倍型丰富度估算方法. 生物多样性, 34, 25263. doi: 10.17520/biods.2025263; cstr: 32101.14.biods.2025263.

Jiang Y, Huang BX, Jia XY, Liang S, Xie YT, Fan P, Song G (2026) An approach for estimating haplotype richness from DNA sequences with unequal lengths. Biodiversity Science, 34, 25263. doi: 10.17520/biods.2025263; cstr: 32101.14.biods.2025263.

An approach for estimating haplotype richness from DNA sequences with unequal lengths

Yuan Jiang[1], Beixi Huang[1], Xueyuan Jia[1], Si Liang[1], Yutong Xie[1], Ping Fan[1*], Gang Song[2]

1 *Shaanxi University of Chinese Medicine, Xianyang, Shaanxi 712046, China*
2 *Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China*

ABSTRACT

Aims: Traditional methods for calculating genetic diversity necessitate uniform sequence lengths within species. However, the sequences available in public databases often exhibit variability in length, thereby complicating the processes of haplotype identification and genetic diversity assessment. Although methods exist for estimating haplotype diversity and nucleotide diversity from sequences with unequal lengths, there is currently no effective methodology for calculating haplotype richness.

Methods: In response to this issue, this research introduced a method to estimate haplotype richness for DNA sequences of varying lengths, utilizing the nucleotide differences between paired sequences (K_{ij}). Three analyses were conducted to validate the method's performance: (1) For sequences that were of equal length, the results obtained from

收稿日期 Received: 2025-07-06; 接受日期 Accepted: 2025-09-30
基金项目: 国家自然科学基金(32400417)、大学生创新创业训练计划项目(S202410716108)、海南国家公园研究院资助项目(KY-24ZK02)和海南省重点研发计划项目(ZDYF2023RDYL01) Supported by the National Natural Science Foundation of China (32400417), College Students' Innovative Entrepreneurial Training Plan Program (S202410716108), Hainan Institute of National Park, HINP (KY-24ZK02), and Hainan Province Science and Technology Special Fund (ZDYF2023RDYL01)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: fanping@sntcm.edu.cn

our method were compared with those from DnaSP. (2) The algorithm's performance with sequences of different lengths was tested by generating simulated sequences of random lengths from equal-length datasets of birds, mammals, and amphibians, and its generalization capability was evaluated using a medicinal plant dataset. (3) The method was employed to assess the latitudinal gradient patterns of haplotype richness in birds, mammals, and amphibians.
Results: For sequences with equal length, the new method's results were not significantly different from those of DnaSP (birds: W = 22,018, P = 0.845; mammals: W = 23,096, P = 0.990; amphibians: W = 3,518.5, P = 0.977). However, it outperformed DnaSP in haplotype identification when missing bases occurred, identifying an average of 1.333 ± 0.188 more haplotypes. (2) Random-length simulation trials confirmed the effectiveness (The mean relative error indicated an overall accuracy of 0.130 ± 0.106, while the variance of relative error showed a stability of 0.007 ± 0.007) and applicability of this method in estimating haplotype richness for sequences of varying lengths. (3) An examination of latitudinal haplotype richness patterns found that birds and mammals exhibited a significant decreasing trend from north to south in the Southern Hemisphere but a relatively stable decreasing trend in the Northern Hemisphere, whereas amphibians showed a continuous decline from south to north.
Conclusions: This study advances the development of more precise quantitative methodologies and introduces novel analytical tools for the conservation of genetic diversity.
Key words: genetic diversity; unequal length sequences; haplotype richness; method

遗传多样性作为物种适应气候变化的关键潜力(Romiguier et al., 2014; Ellegren & Galtier, 2016), 对其进行评估在当前全球气候变化和人类活动加剧的背景下具有至关重要的保护生物学意义。遗传多样性已经成为近年来生物多样性领域的研究热点之一(Mastretta-Yanes et al., 2024)。2022年12月正式通过的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》将"维持90%以上的物种遗传多样性以保护其适应潜力"列为四大长期目标之一(https://www.unep.org/zh-hans/resources/kunming-mengtelierquanqiushengwuduoyangxingkuangjia), 充分彰显了遗传多样性保护在全球生物多样性保护战略中的重要地位。

针对片段基因开展遗传多样性评估时, 核苷酸多样性(nucleotide diversity, π)、单倍型多样性(haplotype diversity, h)和单倍型丰富度(haplotype richness, HR)是常用的衡量指标(Miraldo et al., 2016)。不同遗传多样性指标从不同维度揭示了群体的演化特征: 核苷酸多样性描述了随机选取的两个个体间平均核苷酸的差异数(Nei & Li, 1979; Nei & Tajima, 1981; Fan et al., 2021), 能够反映物种在长期演化过程中积累的遗传变异数目(Chang et al., 2022; Fan et al., 2025); 单倍型多样性定义为随机选取的两个个体不属于同一单倍型的概率(Nei & Roychoudhury, 1974; Nei & Tajima, 1981; Fan et al., 2021), 可刻画种群当前的基因型频率分布动态(Chang et al., 2022; Fan et al., 2025); 单倍型丰富度则直接量化群体中特定单倍型的数目(Miraldo et al., 2016), 可统计群体中具有不同功能或适应能力单倍型的信息, 为评估群体的进化潜力提供重要依据(Leitwein et al., 2020)。

传统的遗传多样性计算方法通常要求种内序列长度保持一致(Miraldo et al., 2016)。然而, 公共数据库中同一物种的序列常因来源不同而在长度上存在差异, 这种差异不仅增加了单倍型识别的难度, 更对遗传多样性的精确评估提出了严峻挑战(Miraldo et al., 2016; Fan et al., 2021)。近年来, 遗传多样性计算方法取得了新的进展, 使得基于不等长DNA序列计算核苷酸多样性(Miraldo et al., 2016)和单倍型多样性(Fan et al., 2021)成为可能。不过, 对于另一常用遗传多样性参数——单倍型丰富度, 目前仍缺乏针对不等长DNA序列的有效计算方法, 制约了基于公共数据库的遗传多样性综合评估, 特别是在跨类群比较和大尺度遗传多样性研究中较为受限。

单倍型数据不仅承载着基因谱系内等位基因关联的历史信号, 其分析对解析历史种群动态、基因流和自然选择过程具有关键意义, 在保护生物学中尤为重要(Leitwein et al., 2020)。然而, 受现有计算方法的限制, 当前研究大多集中于核苷酸多样性和单倍型多样性(Fan et al., 2021, 2025), 而对于单倍型丰富度所表征的遗传多样性特征仍缺乏系统的认知。这一知识空白制约了多源数据整合背景下大尺度遗传多样性的综合解析。针对这一方法学瓶

颈, 本研究开发了一种适用于不等长DNA序列的单倍型丰富度估算方法, 为利用不等长DNA序列解析单倍型丰富度提供了新工具。

1 材料与方法

1.1 基于不等长序列的单倍型丰富度算法原理

核苷酸多样性(π)和单倍型多样性(h)的计算均依赖于单倍型数据的统计。具体而言: 核苷酸多样性通过统计不同单倍型之间的核苷酸平均差异数目来评估(Nei & Li, 1979):

$$\pi = \frac{n}{n-1}\sum_{ij} p_i p_j D_{ij} \tag{1}$$

其中, n为样本大小, p_i为样本中每种单倍型的(相对)频率, D_{ij}表示第i种和第j种单倍型之间平均每个位点的核苷酸差异数目。

单倍型多样性则通过统计随机选取的两条序列是否属于同一单倍型的概率来评估(Nei & Roychoudhury, 1974; Nei & Tajima, 1981):

$$h = \frac{n}{n-1}\left(1-\sum_i p_i^2\right) \tag{2}$$

二者的共同前提是需明确区分种群中的单倍型类别及其频率分布。因此, 传统方法中π与h的计算本质上均以单倍型数据为基础。

现有基于不等长DNA序列的单倍型多样性和核苷酸多样性的计算公式分别为式(3)和式(4):

$$h = \frac{M_{\frac{K_{ij}}{m_{ij}}>0}}{\binom{n}{2}} \tag{3}$$

$$\pi = \frac{1}{\binom{n}{2}}\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}\frac{K_{ij}}{m_{ij}} \tag{4}$$

其中, K_{ij}是序列i和序列j之间共有区域的核苷酸差异数目, m_{ij}是序列i和序列j之间共有区域的长度。$M_{K_{ij}/m_{ij}>0}$是配对比较中$K_{ij}/m_{ij}>0$的数目, $\binom{n}{2}$为样本配对比较的总数。

通过分析式(3)和式(4)的计算原理可以发现, 二者的核心参数都是基于两条随机序列间平均每个核苷酸位点的碱基差异数(K_{ij})。虽然该方法不再需要统计单倍型信息及其频率, 但K_{ij}的数值特征实际上隐含着单倍型的判别标准: 当$K_{ij} > 0$时, 表明在计算过程中将检测的两条存在核苷酸差异的序列归属于不同单倍型; 当$K_{ij} = 0$时, 表明在计算过程中将检测的两条不存在核苷酸差异的序列归属于同一单倍型。基于上述判别标准, 本研究利用归纳推理的思想提出一种基于K_{ij}参数的数值特征估算单倍型丰富度的方法: 首先, 假定数据集中第1条序列为一个单倍型, 统计与其配对且满足$K_{1j} = 0$的序列数目确定其频率; 随后, 在后续计算中排除已识别的同单倍型序列的配对结果以避免重复统计, 最终获得数据集的单倍型数目(即单倍型丰富度)及其频率信息。具体流程见图1。

对于一个包含N个个体的群体, 其两两核苷酸差异比对结果为PW。通过以下步骤可获得单倍型丰富度的估计值: 步骤1, 初始化过程时令$i = 1$, 筛选包含PW中第1条序列的所有两两比对结果, 得到子集PW_i; 步骤2, 统计PW_i中差异值为零的比对对数, 由此获得与第1条序列完全相同的序列数量(n_i), 并提取所有与第1条序列差异值为零的序列配对比较结果PW_i; 步骤3, 令$i = i + 1$, 从PW中移除所有属于PW_i及PW_i的比对结果, 更新PW数据集; 步骤4, 重复步骤1至3, 直至处理完所有序列即$\left(\sum_{i=1}(n_i+1) = N\right)$时终止。最终可通过式(5)计算单倍型丰富度。

$$HR = N - n_1 - n_2 - \ldots - n_i\left(\sum_{1}^{i}(n_i+1) < N\right) \tag{5}$$




图1 单倍型丰富度计算流程

Fig. 1 The computational framework of haplotype richness

虚拟示例:

Sequence 1　ACTGGCTAAGCGATACTAG
Sequence 2　ACTGGCGAAGCGATACTAG
Sequence 3　ACCGGTGAAGCGATACTTG
Sequence 4　ACCGGTGAAGCGATACTTG

对于上述包含4个个体的虚拟群体, 其两两核苷酸差异比对结果构成的数据集$PW = \{K_{1,2} = 1; K_{1,3} = 4; K_{1,4} = 4; K_{2,3} = 3; K_{2,4} = 3; K_{3,4} = 0\}$

步骤1: 令$i = 1$; 筛选包含PW中第1条序列的所有两两配对结果得到$PW_1 = \{K_{1,2} = 1; K_{1,3} = 4; K_{1,4} = 4\}$; 其中$PW_1$中差异值均不为0, 此时$n_1 = 0$, $PW_{1'} = \Phi$;

步骤2: $\sum_{1}^{1}(n_i + 1) = 1 < 4$; 循环开始;

步骤3: 令$i = 2$; 更新PW数据集, 其方式为删除原PW数据集中属于PW_1和$PW_{1'}$的元素(即以原PW为全集取PW_1和$PW_{1'}$并集的补集); 更新后的PW数据集为: $PW = \{K_{2,3} = 3; K_{2,4} = 3; K_{3,4} = 0\}$;

步骤4: 此时$i = 2$, 更新后的PW数据集第1条序列为Sequence 2; 筛选包含PW中第1条序列的所有两两配对结果得到$PW_2 = \{K_{2,3} = 3; K_{2,4} = 3\}$; 其中$PW_2$中差异值均不为0, 此时$n_2 = 0$, $PW_{2'} = \Phi$;

步骤5: $\sum_{1}^{2}(n_i + 1) = 2 < 4$; 循环继续;

步骤6: 令$i = 3$; 更新后的PW数据集为: $PW = \{K_{3,4} = 0\}$; 其中第1条序列为Sequence 3; 筛选包含PW中第1条序列的所有两两配对结果得到$PW_3 = \{K_{3,4} = 0\}$; 其中PW_3差异值为0的配对结果数为1, 即$n_3 = 1$; 由于PW_3仅包含1个元素, 因此不再取$PW_{3'}$;

步骤7: $\sum_{1}^{3}(n_i + 1) = 4$; 循环结束;

步骤8: 基于式(5)计算单倍型丰富度为$HR = 4 - n_1 - n_2 - n_3 = 4 - 0 - 0 - 1 = 3$。

1.2 单倍型丰富度算法对等长序列数据的计算效能评估

为评估本方法与传统方法在计算性能上的可比性, 我们随机选取510个代表性物种(涵盖211种鸟类*COI*序列、215种哺乳动物*COI*序列和84种两栖动物*COI*序列)等长序列进行分析(数据来源: https://github.com/PingFan6/estimating-haplotype-diversity)。基于已公开的K_{ij}计算脚本(Fan et al., 2021)和自主开发的R脚本(附录1)计算单倍型丰富度, 并以DnaSP (Version 5.0)软件(Librado & Rozas, 2009)计算结果作为参照标准进行对比验证。序列数据使用MUSCLE软件(Edgar, 2022)在默认参数下进行多序列比对。采用Wilcoxon秩和检验对本方法计算的单倍型丰富度值与DnaSP结果进行统计学差异分析, 以评估方法的可靠性。

1.3 非等长序列数据的计算效能评估

为评估式(5)在种内序列长度不一致的数据中的性能表现, 我们首先基于1.2节中的等长序列数据计算单倍型丰富度。随后进行"随机长度分析"(Fan et al., 2021): 通过随机选取原序列长度50%作为阈值, 模拟不同重叠程度的序列变异, 该分析对每个物种均重复100次。

为验证式(5)的准确性和稳定性, 我们通过相对误差评估每次重复的精确度(R_i):

$$R_i = \frac{|e_i - e_0|}{e_0} \tag{6}$$

其中, e_i表示第i次不同模拟长度下的单倍型丰富度估计值, e_0为等长序列的单倍型丰富度估计值。相对误差的方差用来衡量本方法计算结果的稳定性。

此外, 本研究在具有重要研究价值与应用前景的药用植物中随机选取了10种常见药用植物的*rbcL*基因和*matK*基因序列进行上述分析, 以验证该方法对植物的适用性, 并探索其应用于其他基因标记的潜力(药用植物序列数据见附录2)。

1.4 应用案例: 纬度梯度单倍型丰富度格局初探

基于Fan等(2021)构建的线粒体*COI*基因数据集(数据来源: https://github.com/PingFan6/estimating-haplotype-diversity), 分析单倍型丰富度的纬度梯度变化格局。该数据集包含的882种鸟类的样本量范围为5–315, 序列长度范围为112–1,551 bp (SD = 201.771); 497种哺乳动物的样本量范围为5–1,063 (SD = 82.196), 序列长度范围为140–1,599 bp (SD = 30.215); 252种两栖动物的样本量范围为5–377 (SD = 27.368), 序列长度范围为133–888 bp (SD = 80.694)。具体分析流程如下: 首先, 依据Miraldo等(2016)和Fan等(2021)的方案, 整合IUCN濒危物种红色名录(http://www.iucnredlist.org/)与BirdLife International (https://www.birdlife.org/)的物种分布

数据, 对原始序列实施严格过滤(候鸟仅保留繁殖种群样本), 并移除“可能现存”等非确定性分布记录。所有序列采用MUSCLE软件(Edgar, 2022)进行多序列比对, 剔除样本量小于5的物种(Goodall-Copestake et al., 2012; Miraldo et al., 2016; Fan et al., 2021, 2025), 以保障计算结果的可靠性。应用10°纬度带划分法(Miraldo et al., 2016)对数据进行地理空间划分。在单倍型丰富度计算过程中, 为了避免碱基缺失过多造成的估算不准确问题, 仅纳入序列重叠区域≥ 50%的成对比较结果(Miraldo et al., 2016; Fan et al., 2021); 随后, 计算每个物种在各纬度带内的单倍型丰富度; 最后, 分别计算各纬度带内所有物种单倍型丰富度的平均值(式(7)), 以系统解析单倍型丰富度沿纬度梯度的空间分布特征。

$$LB_{HR} = \frac{1}{S}\sum_{i=1}^{S} HR_i \tag{7}$$

其中, S是落入该纬度带的物种数, HR_i是第i个落入该纬度带的物种的单倍型丰富度值。

本研究应用beta线性回归模型(Ferrari & Cribari-Neto, 2004)拟合单倍型丰富度与纬度的关系。鉴于前期研究已证实核苷酸多样性和单倍型多样性均呈现向两极递减的格局(Fan et al., 2021), 为验证模型适用性, 本研究评估了用于解释π和h与纬度关系的模型(公式: 多样性指标 = 纬度 + 纬度^2; 权重: D)的框架是否同样适用于单倍型丰富度。权重D定义为同一物种序列对间的平均地理距离, 其计算利用geosphere包中的“distm()”函数完成(Hijmans et al., 2019), 旨在消除地理距离对多样性–纬度关系分析的潜在干扰。该模型中引入纬度的线性项与二次项是为了更好地拟合纬度与遗传多样性之间的关系, 因为遗传多样性的峰值并不总是位于赤道, 且南、北半球的纬度值具有相反的数量特征(Fan et al., 2021)。我们分别构建了鸟类、哺乳动物和两栖动物的独立模型。

2 结果

2.1 单倍型丰富度算法对等长序列数据的计算效能

通过Wilcoxon秩和检验对新方法与DnaSP软件输出的单倍型丰富度结果进行对比分析, 结果显示两种方法对于鸟类(W = 22,018, P = 0.845)、哺乳动物(W = 23,096, P = 0.990)和两栖动物(W = 3,518.5, P = 0.977)的单倍型丰富度计算结果均无统计学显著差异, 表明计算等长序列数据时, 本方法与DnaSP具有可比的计算效能。需要指出的是, 尽管整体统计检验未发现显著差异, 但在个别物种中仍存在计算结果差异(P值未达到1)。经核查, 共有12个物种(鸟类9种、哺乳动物1种、两栖动物2种)的计算结果与DnaSP不一致。这些物种的数据集存在个别碱基缺失(图2)。针对这些缺失位点, 本方法平均比DnaSP多识别出1.333 ± 0.188个(均值 ± 标准误)单倍型。

2.2 单倍型丰富度算法对不等长序列数据的计算效能

基于510个物种的随机长度序列分析评估, 本




图2 存在碱基缺失的等长序列物种数据示例(局部数据)。红色箭头标注了存在缺失碱基信号的核苷酸分离位点。
Fig. 2 An example of species data for sequences of equal length with missing bases (partial range). Red arrows indicate the nucleotide segregation sites where missing bases are found.

方法在处理不等长序列时展现出良好的计算性能。整体计算精确度(以相对误差均值表示)为0.130 ± 0.106, 计算稳定性(以相对误差方差表示)为0.007 ± 0.007。该方法在不同类群中均表现出稳定的性能: 鸟类(精确度: 0.145 ± 0.109; 稳定性: 0.009 ± 0.008)、哺乳动物(精确度: 0.117 ± 0.094; 稳定性: 0.005 ± 0.006)、两栖动物(精确度: 0.124 ± 0.120; 稳定性: 0.006 ± 0.008)。综上, 本方法不仅适用于等长序列分析, 在处理不等长序列时也能维持较高的计算精确度和良好的稳定性。

为验证方法的普适性, 本研究随机选取了10种药用植物的等长*matK*和*rbcL*基因序列进行比较分析。结果显示, 本方法与DnaSP软件的计算结果具有高度一致性(*matK*基因: $W = 50$, $P = 1$; *rbcL*基因: $W = 48.5$, $P = 0.9317$)。在不等长序列模拟实验中, 本方法针对药用植物*matK*基因(精确度: 0.008 ± 0.006; 稳定性: 0.019 ± 0.008)和*rbcL*基因(精确度: 0.033 ± 0.031; 稳定性: 0.015 ± 0.010)均表现出良好的计算性能, 其稳定可靠的表现在不同基因序列分析中具有高度一致性, 进一步证实了其广泛的适用性。

2.3 单倍型丰富度的纬度梯度格局

实例分析表明, 哺乳动物、两栖动物和鸟类的序列平均重叠比例分别为96.21% ± 7.74%、96.43% ± 0.25%和93.41% ± 1.16%, 均显著高于本研究设定的50%阈值。结合附录3所示, 单倍型丰富度估计值的相对误差随序列重叠比例升高而显著降低。由于本案例中各物种的实际重叠比例均处于较高区间(>90%), 其估计结果的实际准确性优于前文基于50%的阈值所汇报的精确度, 表明本案例结果具有较高的可靠性。在此基础上, 基于权重D的beta线性回归分析(模型: 单倍型丰富度 = 纬度 + 纬度^2)显示, 鸟类、哺乳动物和两栖动物的单倍型丰富度均存在显著的纬度梯度(表1)。值得注意的是, 不同动物类群呈现出差异性的空间格局(图3): 鸟类和哺乳动物的单倍型丰富度在南半球随纬度升高明显下降, 而在北半球下降趋势则相对较弱(图3A, B; 表1); 相比之下, 两栖动物的单倍型丰富度呈现出从南向北持续递减的模式(图3C; 表1)。这种类群间的差异可能源于不同脊椎动物类群对纬度环境梯度进化适应策略的分化。

3 讨论

我们于2021年提出了基于配对序列间核苷酸差异位点的单倍型多样性估算方法(Fan et al., 2021)。受该研究的启发, 本研究基于两条随机序列间平均每核苷酸位点的碱基差异数(K_{ij})提出单倍型丰富度估算的方法。该方法的优势在于能够基于不等长的序列数据识别数据集中的单倍型及其相对频率, 有望解决现有单倍型丰富度计算方法难以处理种内序列长度变异的技术瓶颈, 为充分利用公共数据库资源开展大尺度单倍型丰富度格局研究提供工具。

表1 鸟类、哺乳动物和两栖动物单倍型丰富度纬度梯度的beta回归模型

Table 1 Beta regression models for latitudinal gradients in haplotype richness of birds, mammals, and amphibians

	伪R^2 Pseudo R^2	一次项系数 β_1	二次项系数 β_2
鸟类 Birds	0.280	1.458e–02***	–5.116e–04***
哺乳动物 Mammals	0.361	1.788e–02***	–5.506e–04***
两栖动物 Amphibians	0.518	–8.046e–02***	4.659e–04***

*** $P < 0.001$




图3 鸟类(A)、哺乳动物(B)和两栖动物(C)单倍型丰富度的纬度梯度格局。蓝色回归线代表beta回归模型的预测结果。红色虚线标示赤道位置。

Fig. 3 The latitudinal gradients in haplotype richness of birds (A), mammals (B), and amphibians (C). The regression lines (blue lines) represent the predictions of the beta regression model. The red dashed lines show the equator.

处理等长序列数据时, 本研究提出的方法与DnaSP软件的计算结果无显著统计学差异(鸟类P = 0.845; 哺乳动物P = 0.990; 两栖动物P = 0.977), 验证了其计算的可靠性。本方法验证的510个物种中有498个的计算结果与DnaSP软件输出结果完全一致。值得注意的是, 本方法在其余12个计算结果不一致的物种中识别出更多单倍型, 这归因于二者对缺失数据的差异化处理策略: DnaSP在计算过程中会采用“位点忽略”策略, 即当某一位点存在缺失数据时, 该软件会忽略所有序列在该位点的碱基信息(Librado & Rozas, 2009); 而本方法则采用“位点保留”策略, 最大化利用有效位点信息, 从而提升了单倍型识别的灵敏度。这一特性在处理含有缺失碱基的序列时尤为重要, 可为后续种群遗传分析提供更全面的单倍型信息。例如, 以普氏丛蛙(*Colostethus pratti*, 图2B)所示基因区域为准, 图中第1条序列与最后1条序列的碱基编码完全一致, 属于同一单倍型; 中间12条序列若采用DnaSP软件的处理标准, 忽略所有序列中存在缺失的位点信息, 则这12条序列应判定为同一单倍型; 此时单倍型丰富度为2。若采用本研究提出的方法, 中间12条序列中虽存在位点缺失, 但其中1条序列在缺失位点上与其他序列存在可识别的碱基差异, 因此应进一步划分为2个单倍型; 此时单倍型丰富度应为3。此外, 本研究提出的方法还可扩展应用至不等长序列数据集, 且具有较好的精确度(0.130 ± 0.106)和稳定性(0.007 ± 0.007), 提示其算法设计能够有效克服序列长度变异带来的技术挑战。值得注意的是, 本文的方法具有良好的跨类群和跨基因标记适用性, 既能分析动物线粒体*COI*基因序列, 也能有效处理药用植物叶绿体*matK*、*rbcL*等基因标记。这一特点拓展了该方法在遗传多样性研究中的应用范围。

然而, 本文的方法依赖序列间的成对比较(K_{ij})来估算单倍型丰富度, 其计算复杂度为组合数C_N^2 (即对样本量为N的基因数据, 需要进行C_N^2次运算)。在处理大规模序列数据时, 计算效率可能构成瓶颈(Fan et al., 2021)。例如, 在标准计算配置(Intel Core i5-1240P, 16GB RAM)下, 处理一个包含164条序列(N = 164)的样本, 约需1.75 h。未来研究可从以下方向优化计算效率: 引入基于图形处理单元(graphics processing unit, GPU)或分布式系统的并行计算框架, 将成对比较任务拆分为多个子任务同步处理; 开发基于采样的近似算法, 在保证估计精确度的前提下显著降低实际运算次数; 或构建轻量化机器学习模型, 通过学习序列间的相似性模式替代部分重复计算, 以实现高效率、可扩展的大规模数据处理, 从而增强其在群体基因组学及宏基因组研究中的适用性。此外, 为规避因测序错误或旁系同源基因所致的数据质量风险(可能高估单倍型丰富度), 建议使用者采用经严格质控的同源基因序列。另一方面, 本文所报告方法的精确度与稳定性基于50%的序列重叠阈值。在实际分析中, 若重叠比例低于此阈值, 意味着序列数据存在大量核苷酸信息缺失, 会显著增加单倍型丰富度估计结果的相对误差(附录3)。因此, 建议使用者设定的序列重叠阈值不应低于50%。这一建议也与当前不等长序列遗传多样性分析领域的常用标准相符(Miraldo et al., 2016; Fan et al., 2021, 2025)。

本方法应用于陆生脊椎动物单倍型丰富度评估的实例显示, 热带地区单倍型丰富度较高, 且不同脊椎动物类群呈现差异性的纬度递减趋势(图3A, B)。具体而言, 鸟类和哺乳动物在南半球自北向南呈现显著下降趋势, 在北半球变化较为平缓; 而两栖动物则自南向北呈现出持续递减模式(图3C; 表1)。不同动物类群所呈现的多样化单倍型丰富度格局, 可能反映了其对环境梯度变化的差异化响应(Fordham et al., 2017; Gratton et al., 2017; Hong et al., 2019; Fan et al., 2021)。这种差异或与南北半球间环境特征的不同有关: 南半球陆地面积较小, 海陆配置独特, 海洋的主导作用使其温度波动较为缓和(Fordham et al., 2017; Hong et al., 2019)。鸟类和哺乳动物凭借较强的扩散能力, 可能在一定程度上缓解了北半球环境异质性带来的压力; 而两栖动物由于对环境因子(如温度、湿度)较为敏感, 且扩散能力有限, 其单倍型丰富度更易沿纬度梯度形成较为单调的分布模式。因此, 在制定生物多样性保护策略时, 应充分考虑类群间的功能差异, 特别关注两栖类等环境敏感型且扩散能力较弱的类群, 并予以优先保护。该案例研究表明, 本方法可用于解析单倍型丰富度的分布特征, 或可作为相关研究的分析工具之一。

本研究开发了一种新的单倍型丰富度估算方法。3个典型案例的验证分析表明, 该方法表现出良

好的估算精确度和稳定性。本方法的独特价值体现在: (1)能够处理部分位点碱基缺失的情形, 有效提升单倍型识别效能; (2)具备较好的数据兼容性, 适用于长度存在差异的遗传数据集。该方法的提出, 不仅解决了不等长序列单倍型丰富度评估的难题, 也有可能进一步促进包括核苷酸多样性、等位基因型多样性和等位基因型丰富度在内的多维度遗传多样性指标在高通量测序时代的广泛应用。

ORCID

范平 https://orcid.org/0000-0002-3794-4676
宋刚 https://orcid.org/0000-0002-0190-8315

参考文献

Chang YB, Song G, Zhang DZ, Jia CX, Fan P, Hao Y, Ji YZ, Lei FM (2022) Distribution pattern and driving factors of genetic diversity of passerine birds in the mountains of Southwest China. Avian Research, 13, 100043.

Edgar RC (2022) Muscle5: High-accuracy alignment ensembles enable unbiased assessments of sequence homology and phylogeny. Nature Communications, 13, 6968.

Ellegren H, Galtier N (2016) Determinants of genetic diversity. Nature Reviews Genetics, 17, 422–433.

Fan P, Fjeldså J, Liu X, Dong YF, Chang YB, Qu YH, Song G, Lei FM (2021) An approach for estimating haplotype diversity from sequences with unequal lengths. Methods in Ecology and Evolution, 12, 1658–1667.

Fan P, Song G, Qiao HJ, Zhang DZ, Ji YZ, Qu YH, Fjeldså J, Lei FM (2025) Revaluation of the genetic diversity–area relationship by integrating nucleotide and haplotype diversity. Current Zoology, 71, 645–651.

Ferrari S, Cribari-Neto F (2004) Beta regression for modelling rates and proportions. Journal of Applied Statistics, 31, 799–815.

Fordham DA, Saltré F, Haythorne S, Wigley TML, Otto-Bliesner BL, Chan KC, Brook BW (2017) PaleoView: A tool for generating continuous climate projections spanning the last 21000 years at regional and global scales. Ecography, 40, 1348–1358.

Goodall-Copestake WP, Tarling GA, Murphy EJ (2012) On the comparison of population-level estimates of haplotype and nucleotide diversity: A case study using the gene *cox1* in animals. Heredity, 109, 50–56.

Gratton P, Marta S, Bocksberger G, Winter M, Keil P, Trucchi E, Kühl H (2017) Which latitudinal gradients for genetic diversity? Trends in Ecology & Evolution, 32, 724–726.

Hijmans RJ, Williams E, Vennes C (2019) geosphere: Spherical Trigonometry. R Package Version 1.5-10, https://CRAN.R-project.org/package=geosphere. (accessed on 2021-05-21)

Hong B, Rabassa J, Uchida M, Hong YT, Peng HJ, Ding HW, Guo Q, Yao H (2019) Response and feedback of the Indian summer monsoon and the Southern Westerly Winds to a temperature contrast between the hemispheres during the last glacial–interglacial transitional period. Earth-Science Reviews, 197, 102917.

Leitwein M, Duranton M, Rougemont Q, Gagnaire PA, Bernatchez L (2020) Using haplotype information for conservation genomics. Trends in Ecology & Evolution, 35, 245–258.

Librado P, Rozas J (2009) DnaSP v5: A software for comprehensive analysis of DNA polymorphism data. Bioinformatics, 25, 1451–1452.

Mastretta-Yanes A, da Silva JM, Grueber CE, Castillo-Reina L, Köppä V, Forester BR, Funk WC, Heuertz M, Ishihama F, Jordan R, Mergeay J, Paz-Vinas I, Rincon-Parra VJ, Rodriguez-Morales MA, Arredondo-Amezcua L, Brahy G, DeSaix M, Durkee L, Hamilton A, Hunter ME, Koontz A, Lang I, Latorre-Cárdenas MC, Latty T, Llanes-Quevedo A, MacDonald AJ, Mahoney M, Miller C, Ornelas JF, Ramírez-Barahona S, Robertson E, Russo IM, Santiago MA, Shaw RE, Shea GM, Sjögren-Gulve P, Spence ES, Stack T, Suárez S, Takenaka A, Thurfjell H, Turbek S, van der Merwe M, Visser F, Wegier A, Wood G, Zarza E, Laikre L, Hoban S (2024) Multinational evaluation of genetic diversity indicators for the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Ecology Letters, 27, e14461.

Miraldo A, Li S, Borregaard MK, Flórez-Rodríguez A, Gopalakrishnan S, Rizvanovic M, Wang ZH, Rahbek C, Marske KA, Nogués-Bravo D (2016) An Anthropocene map of genetic diversity. Science, 353, 1532–1535.

Nei M, Li WH (1979) Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 76, 5269–5273.

Nei M, Roychoudhury AK (1974) Sampling variances of heterozygosity and genetic distance. Genetics, 76, 379–390.

Nei M, Tajima F (1981) DNA polymorphism detectable by restriction endonucleases. Genetics, 97, 145–163.

Romiguier J, Gayral P, Ballenghien M, Bernard A, Cahais V, Chenuil A, Chiari Y, Dernat R, Duret L, Faivre N, Loire E, Lourenco JM, Nabholz B, Roux C, Tsagkogeorga G, Weber AAT, Weinert LA, Belkhir K, Bierne N, Glémin S, Galtier N (2014) Comparative population genomics in animals uncovers the determinants of genetic diversity. Nature, 515, 261–263.

(责任编委: 刘阳　责任编辑: 闫文杰)


附录　Supplementary Material

https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025263

附录3　位点缺失比例对单倍型丰富度计算精度影响

Appendix 3　The impact of site missing rates on the accuracy of calculating haplotype richness

为探究核苷酸位点缺失比例对单倍型丰富度估计的影响，本研究分别从鸟类、哺乳动物和两栖动物中随机选取1个代表性物种，设定梯度缺失比例阈值(30%–90%)，并采用随机长度分析法进行检验。统计分析采用Kruskal-Wallis检验(KW检验)和Jonckheere-Terpstra检验(JT检验)，其中JT检验的备择假设为单倍型丰富度估计的准确性与稳定性随缺失比例阈值的升高而下降。检验过程基于R语言“clinfun”软件包实现。KW检验结果显示，不同缺失比例阈值下的单倍型丰富度估计相对误差在鸟类(KW检验: χ^2 = 472.25, *df* = 6, *P* < 0.001)、两栖动物(KW检验: χ^2 = 200.04, *df* = 6, *P* < 0.001)和哺乳动物(KW检验: χ^2 = 371.93, *df* = 6, *P* < 0.001)中均存在显著差异。此外, JT检验结果表明，当缺失比例阈值从30%增加到90%时，单倍型丰富度估计的相对误差在鸟类(JT检验: $JT_{statistic}$ = 35,040, *P* = 0.001)、两栖动物(JT检验: $JT_{statistic}$ = 67,171, *P* = 0.001)和哺乳动物(JT检验: $JT_{statistic}$ = 45,122, *P* = 0.001)中均呈现显著下降趋势，具体表现为: 鸟类相对误差从0.368 ±0.112降至0.020 ±0.046，两栖动物从0.150 ±0.070降至0.044 ±0.045，哺乳动物从0.211 ±0.081降至0.022 ±0.035。这表明，从缺失核苷酸位点较少的序列中所获得的单倍型丰富度估计值具有较高的准确性(即相对误差较低，图S1)。



图S1　不同缺失比例阈值对两栖动物(A，美国蟾蜍, *Anaxyrus americanus*)、鸟类(B，家麻雀, *Passer domesticus*)和哺乳动物(C, 假吸血蝠, *Cardioderma cor*)单倍型丰富度估计相对误差的影响

Fig. S1　Effect of different missing proportion thresholds on the relative error of haplotype richness estimation of amphibians (A, *Anaxyrus americanus*), birds (B, *Passer domesticus*) and mammals (C, *Cardioderma cor*)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25210, pages 1–14
doi: 10.17520/biods.2025210
cstr: 32101.14.biods.2025210

•生态学数据分析方法专题•

可解释机器学习及其生态学应用

石亚飞[1*], 牛富荣[2], 黄晓敏[3], 洪星[1], 龚相文[4], 王艳莉[2], 林栋[1], 柳小妮[1]

1. 甘肃农业大学草业学院, 兰州 730070; 2. 甘肃农业大学林学院, 兰州 730070; 3. 扬州大学农学院, 江苏扬州 225009; 4. 西南大学地理科学学院, 重庆 400715

摘要: 近年来, 机器学习在生态学领域的应用日益广泛, 尤其在复杂的非线性数据建模方面展现出强大优势。然而, 机器学习的“黑箱属性”使其难以提供清晰的结果解释, 这限制了其应用范围。为解决机器学习的不透明问题, 可解释机器学习(interpretable machine learning, IML)应运而生, 它致力于提高模型透明度并增强结果的可解释性。本文系统梳理了可解释机器学习中的白盒模型与黑盒模型、全局解释与局部解释、内在可解释与事后解释模型等基本概念, 并基于案例数据分别应用于线性回归、决策树与随机森林等模型, 展示了包括回归系数、置换特征重要性、部分依赖图、累积局部效应图、Shapley加性解释(SHAP)以及局部模型无关解释(LIME)等多种主流可解释机器学习的实现方法与生态学解释能力。研究表明, 尽管白盒模型的解释也属于可解释机器学习的范畴, 但当前其主要是一系列针对黑盒模型的事后解释方法的集成。其次, 不同方法在解释层级、适用模型及可视化表达方面各具优势。可解释机器学习能在一定程度上填补了复杂模型预测性能与生态学解释需求之间的鸿沟, 但需要基于数据情况和研究问题进行选择性应用。本文可为生态学研究人员提供可操作的分析框架, 并强调可解释机器学习应当作为当前主流统计建模的重要补充, 将在未来生态学研究中具有广阔的应用前景。

关键词: 机器学习; 生态学解释; 随机森林; 黑盒模型; 植物多样性

石亚飞, 牛富荣, 黄晓敏, 洪星, 龚相文, 王艳莉, 林栋, 柳小妮 (2026) 可解释机器学习及其生态学应用. 生物多样性, 34, 25210. doi: 10.17520/biods.2025210; cstr: 32101.14. biods.2025210.
Shi YF, Niu FR, Huang XM, Hong X, Gong XW, Wang YL, Lin D, Liu XN (2026) Interpretable machine learning and its applications in ecology. Biodiversity Science, 34, 25210. doi: 10.17520/biods.2025210; cstr: 32101.14.biods.2025210.

Interpretable machine learning and its applications in ecology

Yafei Shi[1*], Furong Niu[2], Xiaomin Huang[3], Xing Hong[1], Xiangwen Gong[4], Yanli Wang[2], Dong Lin[1], Xiaoni Liu[1]

1 *Pratacultural College, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China*
2 *College of Forestry, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China*
3 *Agricultural College, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225009, China*
4 *School of Geographical Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China*

ABSTRACT

Aims: The increasing adoption of machine learning in ecological research has enabled the modeling of complex, nonlinear ecological patterns. However, the “black-box” nature of many machine learning models limits their interpretability, hindering the extraction of ecological insights. This review aims to introduce the core concepts, methods, and practical tools of interpretable machine learning (IML), and to demonstrate how these techniques can enhance ecological understanding from predictive models.

Methods: We first clarify key distinctions among white-box model and black-box model, global interpretability and local interpretability, and intrinsic interpretability versus post-hoc interpretability models. Using a simulated dataset representing plant diversity and environmental variables (e.g., elevation, temperature, soil moisture), we apply both white-box models (e.g., linear regression, decision trees) and black-box models (e.g., random forest) to illustrate major interpretability techniques, including regression coefficients, permutation importance, partial dependence plots (PDP), accumulated local effects (ALE), Shapley additive explanations (SHAP), and local interpretable model-agnostic

收稿日期 Received: 2025-06-06; 接受日期 Accepted: 2025-09-05
基金项目: 国家自然科学基金(32301326)和甘肃农业大学博士科研启动项目(GAU-KYQD-2022-13) Supported by the National Natural Science Foundation of China (32301326) and Scientific Research Start-up Funds for Openly-recuited Doctors of Gansu Agricultural University (GAU-KYQD-2022-13)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: shiyafei2013@126.com

explanations (LIME).
Results: White-box models offer direct and transparent interpretability through their model structure, while black-box models require additional tools to derive explanations. Our case study shows that both model types can yield consistent insights about variable importance and ecological relationships. Furthermore, methods such as ALE and SHAP effectively address common limitations in conventional approaches like PDP by accounting for feature interactions and dependencies.
Conclusion: IML provides a valuable toolkit for improving model transparency and interpretability in ecological research. It serves as a crucial complement to traditional statistical modeling, enabling researchers to extract meaningful ecological interpretations from complex models. As ecological data and modeling complexity continue to grow, the integration of IML techniques will become increasingly important for hypothesis generation and ecological decision-making.
Key words: machine learning; ecological interpretation; random forest; black-box model; plant diversity

近年来, 机器学习(machine learning)因强悍的预测能力而使其在生态学等领域中的应用不断增加(Reichstein et al., 2019; 李慧杰等, 2023; Pichler & Hartig, 2023; Jiang et al., 2024)。相较于线性模型等统计学模型, 机器学习模型对自身预设较少, 擅长挖掘复杂数据中的非线性规律。例如, 在生态学中, 机器学习已广泛应用于物种分布建模(Gobeyn et al., 2019; Norberg et al., 2019; Beery et al., 2021)、物种识别和数量预测(Xue et al., 2017; Wäldchen & Mäder, 2018)、生物多样性保护(Pollock et al., 2020; Tuia et al., 2022)、声波探测(Shamir et al., 2014; Mac Aodha et al., 2018)等由预测驱动的研究中。尽管机器学习模型具有较为强大的预测能力, 但由于其内部结构较为复杂, 往往同时也带来了模型结果难以解释的问题。造成这一问题的原因是数据分析模型的预测能力(复杂程度)与其可解释性之间通常存在权衡关系这一现象(Breiman, 2001; Thampi, 2022)。换句话说, 结构复杂的机器学习模型擅长预测, 但结构简单的统计模型则天然易于获得结果解释。

由于生态学侧重于关注背后机制的学科特点, 因此结果解释一直是其研究的重点(Lucas, 2020; Yu et al., 2021; Pichler & Hartig, 2023)。然而, 首先需要界定何为数据分析模型的结果解释。概括来说, 生态学的结果解释一般包括自变量的贡献度(重要性)、自变量与因变量的关系、针对单个案例预测结果的解释以及提炼更抽象的生态学意义4个主要范畴(表1) (Lucas, 2020; Thampi, 2022)。其中, 前3个是技术范畴, 是本文论述的重点, 而生态学意义则要基于研究人员的专业知识进行概括提炼。例如, 自变量的贡献度可能是“哪些环境因子是驱动生物多样性的主要因素”; 自变量与因变量的关系可能是“海拔与生物多样性有怎样的关系”; 单个案例的结果解释则可能是“某个地点的生物多样性预测值为何较高、哪些因子起作用”; 生态学意义则可能是“结果揭示了怎样的生态学机制、有何实践意义”等。这里, 自变量贡献度、自变量与因变量的关系是针对模型整体的解释, 也被称作全局解释(global interpretability), 而单个案例解释则关注单一预测结果, 被称作局部解释(local interpretability)。通常, 生态学研究更关注全局解释(Lucas, 2020), 而局部

表1 生态学解释的主要内容
Table 1 Main contents of ecological interpretation

解释需求 Interpretation domain	核心目标 Core objective	解释类型 Interpretation type
自变量贡献(重要)度 Predictor importance assessment	哪些自变量更重要? Which predictors contribute most significantly to the model's output?	全局解释 Global interpretability
自变量与因变量的关系 Predictor–response relationships	某个自变量如何影响因变量? How does a given predictor influence the response variable across the dataset?	全局解释 Global interpretability
单个案例解释 Case-level interpretation	为何对某一案例有如此的预测结果? What explains the prediction outcome for a specific observation or case?	局部解释 Local interpretability
生态学意义提炼 Ecological synthesis and insight	模型结果揭示了什么生态学机制或意义? What ecological mechanisms or implications are inferred from the model outputs?	抽象提炼、概念集成 Abstract conceptualization and theoretical framing

解释则可能在医学、经济学等领域应用较多(Teng et al., 2022)。

机器学习受限于复杂模型所带来的可解释性局限，目前在生态学等领域的应用仍有不足(Welchowski et al., 2022; Pichler & Hartig, 2023)。对此，近年来产生了一个专门的机器学习领域，即可解释机器学习(interpretable machine learning, IML) (Rudin et al., 2022)。可解释机器学习是一个致力于使模型决策过程对人类透明和可信的机器学习领域。它主要包含两大类: 一类是本身即可解释的白盒模型(white-box models)，其结构简单、逻辑清晰; 另一类是用于解释复杂黑盒模型(black-box models)的事后解释技术。对黑盒模型来说，可解释机器学习通过系统性尝试输入数据(自变量)的变化将如何影响预测结果的改变，从而逆向推断出究竟是哪些部分对模型的最终预测结果起到关键作用。因此，目前能否解释黑盒机器学习模型结果的关键在于是否采用了这些特定模型或事后解释技术，这也是可解释机器学习体系及本文论述的重点。同时，尽管目前已有不少针对机器学习和生态学研究结合的综述性论文(Liu et al., 2018; Lucas, 2020; Pichler & Hartig, 2023)，但此类论文更多侧重于各种方法本身的概念、理论、逻辑探讨等，往往难以对初学者或者不关注理论的使用者起到直接的指导作用。对此，本文将首先介绍广义机器学习的内涵，阐述白盒模型与黑盒模型、内在可解释(intrinsic interpretability)与事后解释(post-hoc interpretability)模型等概念的差异，然后通过分析案例数据阐明怎样在生态学研究中应用可解释机器学习。

1 机器学习与可解释机器学习

1.1 机器学习

机器学习是人工智能(artificial intelligence, AI)的一个核心分支，是指通过算法和模型使计算机从数据中自动学习规律、识别模式，并基于此实现预测、分类、聚类等过程的系列方法。机器学习主要包括监督学习、非监督学习和强化学习等主要类别，更涵盖了深度学习(deep learning)这一快速发展的前沿领域。尽管机器学习的产生有时代背景，但统计模型仍被认为是机器学习的重要基础理论之一(Christoph, 2022)。因此，一般认为线性回归等统计模型是最早的监督学习方法之一，是构成现代机器学习体系中白盒模型的重要组成，这一点需要特别明确。

1.2 可解释机器学习

1.2.1 白盒模型与黑盒模型

机器学习中所说的白盒模型是指结构、参数和计算过程透明、结果可被直接理解的模型，主要包括线性回归模型(linear regression model)、广义线性模型(generalized linear model)、广义可加模型(generalized additive model)、决策树(decision tree)等。黑盒模型则是指模型内部逻辑和决策过程对使用者不可见或难以理解的模型，这类模型的特点是可以生成高性能的预测，但内部机制极为复杂。大多数机器学习模型如随机森林(random forest)、梯度提升树(gradient boosting tree)、支持向量机(support vector machine)以及人工神经网络(artificial neural network)等深度学习模型均属于此类。

1.2.2 内在可解释与事后解释模型

根据模型本身是否具有可解释性，又可将可解释机器学习分成内在可解释和事后解释模型两类。实际上，由于白盒模型的解释来自模型本身，其在建模完成的同时就可获得解释，因此，基本对应于内在可解释模型。与之相对，黑盒模型的解释通常需要在建模完成后利用专门的解释方法获得，因此一般对应于事后解释模型。

1.2.3 模型特定解释与模型无关解释

根据解释方法是否依赖于特定模型的内部结构，又可将其分为模型特定(model-specific)解释和模型无关(model-agnostic)解释。模型特定解释一般对应于白盒模型(即内在可解释模型)或者部分黑盒模型，其解释能力与特定类型的模型紧密相关。例如，通过直接分析某个模型的内部结构(如线性模型的回归系数、决策树的分类规则、随机森林等树模型的不纯度减少等)获得变量的重要性，这类均可被称作模型特定解释。模型特定解释的计算较为高效，但通用性较差。模型无关解释则将需要解释的模型视为一个完整的“黑箱”，不关心其内部运作机理，只关注输入与输出之间的关系，其解释是通过系统性地扰动输入数据来观察输出的变化实现的。优点是灵活性较强，一套方法可以用于任何复杂的模型预测，缺点则是其解释仅仅是对模型行为

的一种近似, 且通常计算成本较高。总的来说, 事后解释、模型无关解释的方法可以应用在多个黑盒机器学习模型中, 使其变得更透明, 这也是本文论述的重点。

2 案例介绍与探索性数据分析

生物多样性与环境因子的关系是生态学研究中的经典主题之一。以此为例, 我们模拟生成了一组山地生态系统中包括植物物种丰富度(plant species richness)与海拔(elevation)、年均温(mean annual temperature)、土壤水分(soil moisture)、土壤容重(soil bulk)以及土壤有机质(soil organic matter) 5个环境因子的数据集, 共6个变量、100行。尽管理论上机器学习更适用于大样本数据, 但本案例的数据已满足本文的分析要求。全部分析过程使用R 4.3.3完成, 案例数据及代码均可下载(https://github.com/shiyafei29/IML_in_Ecology)。此外, 我们还补充了一个针对中国西北针茅(*Stipa sareptana* var. krylovii)草原实测数据集的案例(陆帅志等, 2020), 所有分析结果均放在本文附录中。

在正式分析前一般需要进行探索性分析。附录1展示了数据中各变量的均值、中位数、标准差、最大值、最小值和样本量等基础描述信息。附录2的Pearson相关性系数表明, 植物物种丰富度与海拔和土壤容重之间的相关性为负(相关系数r分别为–0.71和–0.17), 与年均温、土壤水分和有机质呈正相关(r分别为0.51、0.36和0.36)。尽管未进行统计检验, 但仍可以做出若干初步推断。例如, 在该数据中, 海拔可能是决定植物物种丰富度的主要因素之一, 且二者可能呈现随海拔增加而植物物种丰富度降低的趋势。此外, 5个自变量之间并未出现严重的共线性(自变量之间的相关性系数绝对值均 < 0.2)。

3 利用白盒模型获得生态学解释

3.1 线性回归模型的可解释性

线性回归模型是统计学的核心方法, 其回归系数及其显著性检验就是主要的模型解释。对案例数据以植物物种丰富度为因变量, 以5个环境因子为自变量进行多元线性回归。结果如图1a所示, 5个自变量的回归系数均极显著, 其中土壤有机质、年均温及土壤水分的回归系数为正, 说明在控制其他变




图1 线性回归模型的结果解释。(a)线性回归系数; (b)标准化后的线性回归系数; (c)基于变差分解和层次分割的自变量贡献度排序。* $P < 0.001$。**

Fig. 1 Interpretation of linear regression model results. (a) Linear regression coefficients; (b) Standardized linear regression coefficients; (c) Variable importance ranking based on variation partitioning and hierarchical partitioning. *** $P < 0.001$.

量的情况下, 这3个变量的增加将正向影响植物物种丰富度。与之相对, 海拔与土壤容重的回归系数为负, 表明二者的增加将负向作用于植物物种丰富度。

由于回归系数的绝对大小和各自变量的单位有关, 因此想要进一步判断哪些自变量更重要, 可以比较标准化后的回归系数(Ding & Zang, 2021; 于水今等, 2022)。如图1b所示, 海拔的标准化回归系数(绝对值)最大, 其次为年均温, 因而这些变量在解释植物物种丰富度时更加重要。这是一种简单且直接的比较线性回归模型自变量重要性的方法, 近年来亦有国内学者开发出基于变差分解和层次分割(variation partitioning and hierarchical partitioning)思想的自变量重要性排序方法(Lai et al., 2022a), 其结果如图1c所示。

3.2 决策树的可解释性

决策树是一种树结构模型, 根据因变量是连续型或类别型变量可分为回归树(regression tree)和分类树(classification tree)两类(De'ath & Fabricius, 2000)。本例中因变量植物物种丰富度为连续型变量, 故使用回归树。结果如图2所示, 海拔是此回归树第一层分裂条件, 以海拔值3,896 m为界可将总体均值约为35的100个数据分成两组。也就是说, 回归树认为海拔是决定植物物种丰富度的主导变量。第二层分裂条件为年均温, 说明年均温是决定植物物种丰富度第二重要的变量。第三层分裂条件为土壤有机质和土壤水分, 说明在海拔和年均温相似的条件下, 这些土壤因子将对植物物种丰富度有一定解释力。最下一层即叶节点, 给出了以上不同自变量组合的情况下, 所预测出的植物物种丰富度大小、所归类的样本数量等信息。以决策树最下层最左侧的结果为例, 在海拔大于3,896 m、年均温小于6.6℃以及土壤有机质小于7.6%的情况下, 决策树预测其植物物种丰富度的平均值为28, 约有21个样本被归类为这一子集, 数量占比为21%。

3.3 其他白盒模型的可解释性

白盒模型还包括广义线性模型、广义可加模型、朴素贝叶斯(naive Bayes)模型、规则模型(rule-based models)等。这些白盒模型各具一定的结构透明性, 因而均有一定的可解释性, 但获得解释的方式可能不同。例如, 广义线性模型的可解释性与线性回归模型类似, 一般可用回归系数直接解释, 而广义可加模型则可通过平滑曲线图对每个自变量与因变量的非线性关系进行解释。此外, 目前国内学者还开发出了基于平均共享方差(average shared




图2 回归树的分析结果。*n*为样本个数, 百分值为属于此类的样本数量占比。

Fig. 2 Regression tree results. *n* is the number of samples, and percentage value represents the proportion of samples belonging to this category.

variance)思想的针对广义线性模型(Lai et al., 2022b)和广义可加模型的自变量重要性排序方法(Lai et al., 2024)。

4 利用黑盒模型获得生态学解释

如前所述, 获得黑盒模型的解释需要首先构建黑盒模型并获得模型结果, 然后再利用专门的可解释方法与其配合, 最终获得结果解释。本文选择的黑盒模型为随机森林模型, 这是生态学中较常用的一种基于决策树集成的黑盒模型。这里首先通过随机森林模型建立植物物种丰富度与5个自变量之间的关系, 然后针对模型结果选择各类方法获得解释。

4.1 自变量重要性排序

自变量重要性排序是获得生态学解释的一种维度(表1), 近年来被广泛用在基于机器学习的生态学数据分析中(郑利林等, 2020; Zhao et al., 2022; Davison et al., 2023)。在白盒模型中也往往会进行类似分析, 例如上文3.1节所述的比较线性回归模型的标准化回归系数。实际上, 自变量的重要性排序、自变量与因变量的关系这两类解释之间并没有明显的界限, 更像是一个问题的两个方面。目前, 对黑箱模型的自变量重要性排序并没有形成统一的标准, 这里介绍适用于随机森林模型的置换特征重要性(permutation importance)和Gini重要性(Gini importance)两种方法。置换特征重要性的原理是将某个自变量的取值打乱, 然后评估该变化对模型预测性能的影响, 进而衡量该变量的重要性。Gini重要性是基于不纯度减少(即纯度增加)的特征重要性, 是统计每个变量在回归树中被用于分裂时能够带来的节点纯度的提升, 纯度提高越大则变量越重要。二者的分析结果如图3所示, 在这两种算法下5个自变量的重要性排序基本一致, 且横坐标值越大的变量其重要性也越大。这里需要注意两种方法的区别: 置换特征重要性是一种模型无关解释方法, 其原理仅依赖于模型的输入与输出, 可以广泛应用于任何机器学习模型。而Gini重要性则是一种模型特定解释方法, 它通过分析决策树节点的分裂过程来计算重要性, 因此其应用仅限于随机森林、梯度提升树等基于树结构的模型。

4.2 自变量与因变量的关系

4.2.1 部分依赖图

部分依赖图(partial dependence plots, PDP)是当前流行的黑箱模型解释方法之一, 其结果主要通过图的形式呈现。部分依赖图的原理是在固定其他变量的条件下, 观察某个自变量的变化如何影响模型的预测值, 以此展示自变量对因变量的边际效用(Friedman, 2001; Christoph, 2022)。图4是部分依赖图的结果, 可以发现植物物种丰富度与海拔呈现较明显的负相关(图4a), 与年均温整体为正相关(图4b), 而土壤水分呈现类似阶梯式的上升趋势(图4c), 其余解释结果以此类推。需要注意, 此类结果通常适用于进行整体解释或局部存在明显变化趋势的解释, 而对局部的微小变化很难做出有效解释, 这也是解读复杂黑箱模型结果的局限之一。




图3 随机森林模型基于置换特征(a)和节点纯度(b)的自变量重要性排序

Fig. 3 Ranking of variable importance based on permutation importance (a) and node impurity (b) in the random forest model




图4　针对随机森林模型的部分依赖图
Fig. 4　Partial dependence plots for the random forest model

部分依赖图的主要优点是其结果的直观性: Y轴是模型预测值的平均值, 这在概念上易于解读理解。因此, 当自变量间的交互作用较弱时, 部分依赖图能够准确且简洁的呈现黑箱模型的结果解释。然而, 应用部分依赖图的局限是其要假设自变量间相互独立, 即在解释某个自变量的影响时忽视其他自变量实际的变化范围, 这可能导致结果解释不准确。例如, 假设在山地生态系统中, 年均温较高的区域, 其实际的土壤水分可能较小, 但部分依赖图并不考虑这种关系, 在解释时可能生成“年均温较高、土壤水分也大”的案例数据, 并因此得出这种情况下年均温对植物物种丰富度的影响结果。也就是说, 部分依赖图忽视了年均温较高、土壤水分也很大的数据实际并不存在的情况。

4.2.2　累积局部效应图

累积局部效应图(accumulated local effect plot, ALE)也是一种用于解释机器学习模型中自变量与因变量关系的可解释方法, 适用于考虑变量间存在共线性的情况, 并解决了部分依赖图的局限(Apley & Zhu, 2020)。其原理是通过对每个变量进行局部扰动来计算模型预测值的变化, 然后对这些局部梯度进行积分累加, 从而形成整个变量的累积效应曲线。需要注意, 累积局部效应图的Y轴是局部变化的积分(ALE值) (图5), 不等于因变量的预测值, 这与部分依赖图不同, 也在一定程度上增加了累积局部效应图的解读难度。尽管Y轴数值不够直观, 但其实际解读方法仍与部分依赖图类似, 即观察自变量变化如何引起Y轴变化。如图5a所示, 随着海拔升高, ALE值持续下降, 这解释为随海拔升高植物物种丰富度呈降低趋势; 图5b显示, 随年均温升高ALE值总体呈现增加趋势, 解释为年均温升高导致植物物种丰富度增加; 其他解释以此类推。

4.2.3　特征交互

为揭示变量之间的协同作用对因变量的影响, 需要进一步分析变量间的交互(feature interaction)。这里介绍Friedman和Popescu (2008)所提出的H-statistic (H统计量)方法。该方法通过计算模型预测函数中由交互项所引起的方差占比来评估变量间的交互程度。当某个变量的H值接近0, 说明其对预测结果的影响主要是独立效应; 若H值较高, 则

说明其影响在很大程度上依赖于其他变量, 即存在较强的交互关系。图6a为每个自变量与其余4个自变量的总体交互强度, 图6b则为两两之间交互作用最强的4个自变量组合。可见, 年均温的总体交互强度最高, 说明其对植物物种丰富度的影响在很大程度上依赖于其他环境变量的取值, 即具有显著的协同作用; 土壤水分与海拔的交互强度最高, 表明海拔对“土壤水分影响植物物种丰富度”这一关系的调节作用非常明显。

还可以通过绘制二维部分依赖图和累积局部效应图来探究两变量间的交互作用。以年均温和海拔为例, 二者存在明显的交互作用(图7)。具体表现




图5　针对随机森林模型的累积局部效应图。横轴中的小竖线表示该变量在数据中的分布情况。
Fig. 5　Accumulated local effects plot (ALE) based on the random forest model. The small vertical ticks on the x-axis indicate the distribution of the variable in the dataset.




图6　基于H-statistic的特征交互。(a)单个变量与其他变量的总体交互强度; (b)变量间的两两交互强度。
Fig. 6　Feature interactions based on H-statistic. (a) The overall interaction strength between a single variable and all other variables; (b) The pairwise interaction strength between variables.

为海拔对植物物种丰富度的影响方向与强度随着年均温的不同水平而变化, 反之亦然。尽管此类非加性结构可以揭示两变量之间的协同机制, 但本例中由于数据真实分布等原因导致二维部分依赖图(图7a)与累积局部效应图(图7b)结果存在较明显的差异, 其中累积局部效应图中呈现的结果较为复杂。原因在于二维部分依赖图与上述单变量部分依赖图的缺点类似, 可能绘制出自变量相关情况下的外推区域(例如低海拔与低温的组合), 然而这些区域可能因缺乏真实数据而产生不符合真实情况的解释, 因此更加推荐二维累积局部效应图。

4.2.4 全局代理

全局代理(global surrogate)模型的思想是用一个结构简单、易解释的模型(如线性回归或决策树等)去逼近原始复杂模型的输出结果, 是一种解释复杂模型整体行为的简化模型(Ribeiro et al., 2016)。其过程是将原始数据输入到复杂模型(如随机森林)得到预测结果, 然后以这些预测结果作为“标签变量”, 构建一个简单模型(如线性回归), 进而训练这个简单模型, 让其尽可能拟合复杂模型的预测输出。最后, 通过解读这个简单模型的系数或结构, 以间接的方式解释复杂模型的行为。图8是使用线性回归模型解释的全局代理模型结果, 可以发现土壤有机质、年均温和土壤水分与植物物种丰富度呈正向关系, 而海拔、土壤容重则与植物物种丰富度呈负向关系。可以看出, 该结果与图1a中线性回归模型的结果解释较为类似。

全局代理模型的主要优势在于其解释的通用性。无论底层黑盒模型多么复杂, 研究人员都可以用一个生态学家普遍理解的线性模型或决策树来“翻译”其整体行为。但是, 全局代理模型是否可靠则需要评估代理模型的性能(如计算其预测黑盒模型输出的R^2)。只有在保真度较高的情况下, 其解释才具有参考价值。

4.3 黑盒模型的局部解释

模型的局部解释往往发生在建模之后要对新数据进行预测时。例如, 我们可以预测某种环境因子组合下的植物物种丰富度大小。这里主要介绍局部模型无关解释(local interpretable model-agnostic explanations, LIME)和Shapley加性解释两种方法。

4.3.1 局部模型无关解释

局部模型无关解释是一种用于解释黑箱模型单个预测结果的局部可解释性方法(Ribeiro et al., 2016)。该方法的核心思想是在被解释样本特征空间的局部邻域中, 构建一个简单、可解释的白盒模型(通常为线性模型), 用于近似模拟替代原始黑箱模型的局部行为, 进而实现单个预测结果的解释。实际上, 局部模型无关解释的思想与全局代理模型类似, 但由于其针对的是单个案例, 因此也可被认为是“局部代理”模型。

这里以数据集的第30个样本为例(附录3), 使用局部模型无关解释方法对其植物物种丰富度的预测结果进行解释。如图9所示, 该案例的预测值(植物物种丰富度)为38.27, 高于平均预测值(35.01)。在




图7 海拔与年均温的二维交互图。(a)部分依赖图; (b)累积局部效应图(ALE)。

Fig. 7 Two-dimensional interaction plots of elevation and mean annual temperature. (a) Partial dependence plot; (b) Accumulated local effects plot (ALE).




图8　基于线性回归的全局代理模型结果。* $P < 0.001$。**
Fig. 8　Results of global surrogate modeling using linear regression. *** $P < 0.001$.




图9　对第30个数据点预测值的局部模型无关解释
Fig. 9　Local interpretable model-agnostic explanations for the prediction of the 30th sample




图10　对第30个数据点预测值的Shapley加性解释(SHAP)
Fig. 10　Shapley additive explanations (SHAP) for the prediction of the 30th sample

导致这一预测结果的原因中，其海拔符合“≤ 3,465 m”这一条件是主要的正向预测原因，而其年均温符合“≤ 0.178℃”则是主要的负向贡献原因。这表明，该点的海拔促进了其植物物种丰富度，而年均温抑制了植物物种丰富度。其他变量如土壤容重和土壤有机质则对模型预测产生了次要的正向影响。总的来说，这类解释可为模型的局部预测行为提供证据。

4.3.2　Shapley加性解释

Shapley加性解释(Shapley additive explanations, SHAP)方法是一种基于博弈论中Shapley值的模型解释方法。该方法将输入变量视为合作博弈中的“玩家”，通过计算各变量在所有可能组合中的边际贡献，量化其对预测结果的影响方向和强度(Lundberg & Lee, 2017)。SHAP在理论上具备唯一性、一致性和局部准确性，解释结果更加稳健可靠。相比于LIME等局部解释方法，SHAP虽计算复杂度更高，但在权重分配上更严格，能够更准确地评估特征贡献，因此被广泛用于模型的局部与全局解释(Lundberg et al., 2020)。

图10展示了SHAP对第30个数据点植物物种丰富度预测值的局部解释结果。该样本的预测结果(38.27)明显高于全样本平均预测值(35.01)，其中海拔(该点值为3,092.9 m)是最主要的正向贡献变量，从而将预测值从基准值向上推动；土壤水分(25.32%)和土壤容重(1.08 g/cm³)也有正向作用，但相对较小；年均温(–2.68℃)对预测值表现出较大的负向贡献；土壤有机质(7.05%)仅对预测值有较小的负向贡献。

4.4　深度学习模型的可解释性

深度学习是机器学习的一个重要分支，目前广泛应用于图像识别、语音识别、文本处理等非列表型复杂数据的分析建模中。深度学习模型的可解释性区别于前文所述的可解释方法，其解释的重点在于模型表示(model representation)，即理解哪些特征或者数据格局被神经网络所识别和学习(Reichstein et al., 2019)。与之相对，前述的白盒模型和黑盒模型的可解释性主要是解释模型过程(model processing)，即理解模型如何处理输入数据并给出最终预测的这一直接过程。深度学习模型的可解释性方法包括显著性映射(saliency mapping)、梯度加权类激活映射(gradient-weighted class activation mapping)、注意力机制(attention maps)等类型。例如，Beery等(2021)使用卷积神经网络(convolutional neural network)对野外相机捕获的大量图像进行物种自动识别，通过梯度加权类激活映射对卷积神经网络的特征激活

区域进行可视化, 揭示了模型关注的是动物本体的哪些区域(如纹理、形态特征), 从而增强了解释性, 极大提高了物种监测效率。Mac Aodha等(2018)基于深度学习模型开发了“Bat Detective”项目, 通过使用注意力机制能够确定模型识别声波模式的关键频段和时间窗口, 从而推断模型学习的“生态规则”, 为声学监测提供了一种高效、可解释的工具。总之, 可解释的深度学习模型将在未来生物多样性调查、入侵物种识别等生态学研究中越发重要(Guo et al., 2020)。

5 可解释机器学习模型的选择

在实际工作中, 研究人员并不能知晓变量之间的真实关系。那么, 针对某个数据或者研究问题, 到底哪种可解释性方法是最好的? 实际上并不存在“唯一最优”的解释方法。表2给出了上述可解释机器学习方法的对比总结, 但实际使用时首先需要研究人员基于自己的问题和数据选择一种数据分析模型(如线性回归模型或机器学习模型), 然后通过模型调整(如线性模型中是否进行自变量选择或

表2 部分可解释机器学习方法的对比总结

Table 2 Comparative summary of selected interpretable machine learning methods

方法 Methods	适合模型 Applicable models	是否模型无关 Whether it is model-agnostic	解释层级 Interpretation level	优点 Advantages	局限性/注意事项 Limitations/notes
回归系数 Regression coefficients	线性模型(白盒) Linear models (white-box)	否 No	全局 Global	直观、易于理解 Intuitive and easy to interpret	依赖模型假设; 适用于线性关系 Dependent on model assumptions; suitable only for linear relationships
决策树 Decision tree	决策树类模型(白盒) Decision tree models (white-box)	否 No	全局 Global	可视化清晰, 展示变量优先级 Clearly visualizes structure; reveals variable hierarchy	易过拟合, 稳定性差 Overfitting-prone and unstable
置换特征重要性 Permutation importance	黑盒模型 Black-box models	是 Yes	全局 Global	简单直观, 适用于多数模型 Simple and widely applicable; supports many models	易受变量相关性影响, 结果不稳定 Sensitive to variable correlation; results may be unstable
Gini重要性 Gini importance	随机森林等树模型 Tree-based models such as random forest	否 No	全局 Global	计算快速、内置于模型 Fast computation; embedded in model	偏向取值范围大的变量, 不适用于所有模型 Biased toward variables with large ranges; lacks generalizability
部分依赖图 Partial dependence plots (PDP)	黑盒/白盒模型 Black-/white-box models	是 Yes	全局 Global	图形表达直观, 适合展示非线性关系 Visual and intuitive; useful for nonlinear patterns	假设变量独立, 存在不现实组合风险 Assumes feature independence; may generate unrealistic combinations
累积局部效应图 Accumulated local effects (ALE)	黑盒/白盒模型 Black-/white-box models	是 Yes	全局 Global	不依赖变量独立性假设, 解释更稳定 Free from variable independence assumptions, yielding more robust interpretations	Y轴是特征变化的局部平均效应值, 不易直观理解 Y-axis shows local average effect, which lacks intuitive clarity
H-statistic交互分析 H-statistic interaction analysis	黑盒/白盒模型 Black-/white-box models	是 Yes	全局 Global	可量化变量交互强度, 补充单变量解释的不足 Quantifies feature interaction strength; supplements univariate interpretations	解释难度略高, 计算复杂度大 Interpretation complexity increases; relatively high computational cost
全局代理模型 Global surrogate models	黑盒模型 Black-box models	是 Yes	全局 Global	简化复杂模型, 借助可解释模型进行间接解释 Approximates complex models with simpler ones for interpretation	逼近可能不完全, 解释不一定准确 Approximation may be incomplete; explanation only partially faithful
局部模型无关解释 Local interpretable model-agnostic explanations	黑盒模型 Black-box models	是 Yes	局部 Local	适合个体预测的解释 Suitable for explaining individual predictions	局部解释不稳定, 依赖邻域构建 Unstable local explanations; neighborhood-dependent
Shapley加性解释 Shapley additive explanations	黑盒/白盒模型 Black-/white-box models	是 Yes	全局/局部 Global/Local	理论稳健、解释公平性强 Theoretically sound; ensures fair feature attribution	计算复杂度大 High computational cost




图11　可解释机器学习方法的选择建议

Fig. 11　Recommendations for selecting interpretable machine learning methods. LIME, Local interpretable model-agnostic explanations; SHAP, Shapley additive explanations; PDP, Partial dependence plots; ALE, Accumulated local effects.

模型比较等; 随机森林模型中如何设置模型超参数等)等手段来获取该框架下最合适或稳健的分析结果。换句话说, 如果研究人员选择的是白盒模型, 则可以直接得出模型解释, 而如果采用的是机器学习等黑盒模型, 则需要用到部分依赖图、累积局部效应图、全局代理、SHAP等事后解释方法。然而, 选择白盒模型还是黑盒模型一般取决于数据情况、科学问题和研究传统等多种因素, 很难直接下定论, 但可参考图11中的流程进行针对性选择。

可解释机器学习方法可能受到数据高维性、共线性及抽样变动的强烈影响。例如, 高通量基因序列、高光谱遥感数据等高维数据可能对解释的稳定性构成巨大挑战。而在特征高度相关的数据中, 置换重要性等指标可能变得不稳定, 微小的数据扰动就可能导致特征重要性排序发生显著变化。因此, 在报告解释结果时, 可采用重抽样(如bootstrap)等技术评估解释的稳定性, 并谨慎解读那些排名接近的特征重要性。此外, 在数据量较小的情况下, 黑盒模型可能过度拟合数据中的噪声而非生态学信号, 从而生成看似复杂但实则虚假的解释。因此, 确保模型本身具有良好的泛化性能(如通过交叉验证确保测试集性能)是进行任何解释的前提。解释应基于一个稳健的、不过拟合的模型, 否则其生态学推论将毫无价值。

还需要注意, 在本文的案例中, 使用白盒模型与黑盒模型的结果解释较为类似, 但这并不能保证其他数据集也是如此。值得注意的是, 如果自变量与因变量之间的线性关系并非极显著, 选择线性模型和非线性的黑盒模型可能得出差别极大的结果。对于这一现象, 可见本文针对另一实测数据集的分析和结果论述 (https://github.com/shiyafei29/IML_in_Ecology) 。可以说, 如何选择数据分析模型是一个复杂的问题, 甚至是一个哲学问题, 需要研究人员具备一定的研究经验、数据分析基础并能在实践中不断总结学习。

6 结论与展望

可解释机器学习是一个快速发展的机器学习方向, 其不断完善将有助于生态学等有较大解释需求学科的发展。本文按照广义机器学习的惯例纳入了白盒模型和黑盒模型两大类数据分析框架及其不同的结果解释方法, 也介绍了全局解释和局部解释的实现方法。但是, 以作者的能力显然无法做到对各类方法进行深入且详细的讨论。值得庆幸的是, 大语言模型(large language models)应当能够在数据分析中提供有力的帮助, 必要时读者可以利用这些工具快速获得可解释机器学习的实现方法。

然而, 尽管可解释机器学习在黑盒模型的结果解释方面展现出强大潜力, 但其在生态学中的应用仍需超越技术本身, 需要能够回答具体的科学问题。例如, 可解释机器学习如何量化关键环境因子对群落组成的非线性影响, 从而为生态位理论、中性理论等提供更精细的证据? 与传统白盒模型相比, 主要聚焦黑盒模型的可解释机器学习能否在变量间复杂作用关系等方面超越传统路径分析方法? 此外, 能否将可解释机器学习置于群落构建理论的框架中, 使其不仅作为一种事后解释工具, 更成为一套假设生成与检验的强大工具? 总的来说, 时代趋势表明大数据、大模型等可能是未来回答一些重要生态学问题的方法, 但这一过程仍需生态学研究人员不断探索。

ORCID

石亚飞 https://orcid.org/0000-0001-6265-2141

参考文献

Apley DW, Zhu JY (2020) Visualizing the effects of predictor variables in black box supervised learning models. Journal of the Royal Statistical Society B: Statistical Methodology, 82, 1059–1086.

Beery S, Cole E, Parker J, Perona P, Winner K (2021) Species distribution modeling for machine learning practitioners: A review. ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies (COMPASS'21), New York, USA.

Breiman L (2001) Statistical modeling: The two cultures. Statistical Science, 16, 199–231.

Christoph M (2022) Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable, 2nd edn. Independently published.

Davison CW, Assmann JJ, Normand S, Rahbek C, Morueta-Holme N (2023) Vegetation structure from LiDAR explains the local richness of birds across Denmark. Journal of Animal Ecology, 92, 1332–1344.

De'ath G, Fabricius KE (2000) Classification and regression trees: A powerful yet simple technique for ecological data analysis. Ecology, 81, 3178–3192.

Ding Y, Zang RG (2021) Determinants of aboveground biomass in forests across three climatic zones in China. Forest Ecology Management, 482, 118805.

Friedman JH (2001) Greedy function approximation: A gradient boosting machine. Annals of Statistics, 29, 1189–1232.

Friedman JH, Popescu BE (2008) Predictive learning via rule ensembles. Annals of Applied Statistics, 2, 916–954.

Gobeyn S, Mouton AM, Cord AF, Kaim A, Volk M, Goethals P (2019) Evolutionary algorithms for species distribution modelling: A review in the context of machine learning. Ecological Modelling, 392, 179–195.

Guo QH, Jin SC, Li M, Yang QL, Xu KX, Ju YZ, Zhang J, Xuan J, Liu J, Su YJ, Xu Q, Liu Y (2020) Application of deep learning in ecological resource research: Theories, methods, and challenges. Science China Earth Sciences, 63, 1457–1474.

Jiang SJ, Sweet L, Blougouras G, Brenning A, Li WT, Reichstein M, Denzler J, SG W, Yu G, Huang FN (2024) How interpretable machine learning can benefit process understanding in the geosciences. Earth's Future, 12, e2024EF004540.

Lai JS, Tang J, Li TY, Zhang AY, Mao LF (2024) Evaluating the relative importance of predictors in generalized additive models using the gam.hp R package. Plant Diversity, 46, 542–546.

Lai JS, Zou Y, Zhang JL, Peres-Neto PR (2022a) Generalizing hierarchical and variation partitioning in multiple regression and canonical analyses using the rdacca.hp R package. Methods in Ecology Evolution, 13, 782–788.

Lai JS, Zou Y, Zhang S, Zhang XG, Mao LF (2022b) glmm.hp: An R package for computing individual effect of predictors in generalized linear mixed models. Journal of Plant Ecology, 15, 1302–1307.

Li HJ, Wang B, Niu X, Liang YL, Li JY (2023) Application of machine learning technology in ecology. Chinese Journal of Ecology, 42, 2767–2775. (in Chinese with English abstract) [李慧杰, 王兵, 牛香, 梁咏亮, 李静尧 (2023) 机器学习技术在生态学中的应用进展. 生态学杂志, 42, 2767–2775.]

Liu ZL, Peng CH, Work T, Candau J, DesRochers A, Kneeshaw D (2018) Application of machine-learning methods in forest ecology: Recent progress and future challenges. Environmental Reviews, 26, 339–350.

Lu SZ, Qiao XG, Zhao LQ, Wang Z, Gao CG, Wang J, Guo K (2020) Basic characteristics of *Stipa sareptana* var. *krylovii* communities in China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 1087–1094. (in Chinese with English Abstract) [陆帅志, 乔鲜果, 赵利清, 王孜, 高趁光, 王静, 郭柯 (2020) 中国西北针茅草原的基本群落特征. 植物生态学报, 44,

1087–1094.]
Lucas T (2020) A translucent box: Interpretable machine learning in ecology. Ecological Monographs, 90, e01422.
Lundberg SM, Erion G, Chen H, DeGrave A, Prutkin JM, Nair B, Katz R, Himmelfarb J, Bansal N, Lee SI (2020) From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. Nature Machine Intelligence, 2, 56–67.
Lundberg SM, Lee SI (2017) A unified approach to interpreting model predictions. Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, USA
Mac Aodha O, Gibb R, Barlow KE, Browning E, Firman M, Freeman R, Harder B, Kinsey L, Mead GR, Newson SE (2018) Bat detective—Deep learning tools for bat acoustic signal detection. PLoS Computational Biology, 14, e1005995.
Norberg A, Abrego N, Blanchet FG, Adler FR, Anderson BJ, Anttila J, Araújo MB, Dallas T, Dunson D, Elith J, Foster SD, Fox R, Franklin J, Godsoe W, Guisan A, O'Hara B, Hill NA, Holt RD, Hui FKC, Husby M, Kålås JA, Lehikoinen A, Luoto M, Mod HK, Newell G, Renner I, Roslin T, Soininen J, Thuiller W, Vanhatalo J, Warton D, White M, Zimmermann NE, Gravel D, Ovaskainen O (2019) A comprehensive evaluation of predictive performance of 33 species distribution models at species and community levels. Ecological Monographs, 89, e01370.
Pichler M, Hartig F (2023) Machine learning and deep learning—A review for ecologists. Methods in Ecology and Evolution, 14, 994–1016.
Pollock L J, O'Connor LMJ, Mokany K, Rosauer DF, Talluto L, Thuiller W (2020) Protecting biodiversity (in all its complexity): New models and methods. Trends in Ecology & Evolution, 35, 1119–1128.
Reichstein M, Camps-Valls G, Stevens B, Jung M, Denzler J, Carvalhais N, Prabhat F (2019) Deep learning and process understanding for data-driven Earth system science. Nature, 566, 195–204.
Ribeiro MT, Singh S, Guestrin C (2016) "Why should I trust you?" Explaining the predictions of any classifier. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, San Francisco, USA.
Rudin C, Chen CF, Chen Z, Huang HY, Semenova L, Zhong C (2022) Interpretable machine learning: Fundamental principles and 10 grand challenges. Statistic Surveys, 16, 1–85.
Shamir L, Yerby C, Simpson R, von Benda-Beckmann AM, Tyack P, Samarra F, Miller P, Wallin J (2014) Classification of large acoustic datasets using machine learning and crowdsourcing: Application to whale calls. The Journal of the Acoustical Society of America, 135, 953–962.
Teng QY, Liu Z, Song YQ, Han K, Lu Y (2022) A survey on the interpretability of deep learning in medical diagnosis. Multimedia Systems, 28, 2335–2355.
Thampi A (2022) Interpretable AI: Building Explainable Machine Learning Systems. Manning Publications, New York.
Tuia D, Kellenberger B, Beery S, Costelloe BR, Zuffi S, Risse B, Mathis A, Mathis MW, van Langevelde F, Burghardt T, Kays R, Klinck H, Wikelski M, Couzin ID, van Horn G, Crofoot MC, Stewart CV, Berger WT (2022) Perspectives in machine learning for wildlife conservation. Nature Communications, 13, 792.
Wäldchen J, Mäder P (2018) Machine learning for image based species identification. Methods in Ecology and Evolution, 9, 2216–2225.
Welchowski T, Maloney KO, Mitchell R, Schmid M (2022) Techniques to improve ecological interpretability of black-box machine learning models: Case study on biological health of streams in the United States with gradient boosted trees. Journal of Agricultural, Biological Environmental Statistics, 27, 175–197.
Xue YF, Wang TJ, Skidmore AK (2017) Automatic counting of large mammals from very high resolution panchromatic satellite imagery. Remote Sensing, 9, 878.
Yu QY, Ji WJ, Prihodko L, Ross CW, Anchang JY, Hanan NP (2021) Study becomes insight: Ecological learning from machine learning. Methods in Ecology and Evolution, 12, 2117–2128.
Yu SJ, Wang J, Zhang CY, Zhao XH (2022) Impact and mechanism of maintaining biomass stability in a temperate coniferous and broadleaved mixed forest. Chinese Journal of Plant Ecology, 46, 632–641. (in Chinese with English abstract) [于水今, 王娟, 张春雨, 赵秀海 (2022) 温带针阔混交林生物量稳定性影响机制. 植物生态学报, 46, 632–641.]
Zhao YF, Zhu WW, Wei PP, Fang P, Zhang XW, Yan NN, Liu WJ, Zhao H, Wu QR (2022) Classification of Zambian grasslands using random forest feature importance selection during the optimal phenological period. Ecological Indicators, 135, 108529.
Zheng LL, Xu JY, Wang XL, Liu BG (2020) Study on relationships between vegetation community distribution and topsoil factors based on random forests in shoaly wetlands of Poyang Lake. Soils, 52, 378–385. (in Chinese with English Abstract) [郑利林, 徐金英, 王晓龙, 刘宝贵 (2020) 基于随机森林方法研究鄱阳湖典型洲滩植被群落分布与表层土壤因子耦合关系. 土壤, 52, 378–385.]

(责任编委: 乔慧捷　责任编辑: 黄祥忠)

附录　Supplementary Material


https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025210

石亚飞, 牛富荣, 黄晓敏, 洪星, 龚相文, 王艳莉, 林栋, 柳小妮 (2026) 可解释机器学习及其生态学应用. 生物多样性, 34, 25210. https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025210

附录1 案例数据集的描述性统计分析

Appendix 1 Descriptive statistics of the simulated data

变量 Variables	均值 Mean	中位数 Median	标准差 SD	最小值 Min.	最大值 Max.	样本量 Sample size
海拔 Elevation (m)	3,918.84	3,972.82	555.44	2,794.39	2,421.35	100
年均温 Mean annual temperature	4.99	4.92	5.85	-7.41	16.35	100
土壤水分 Soil moisture (%)	24.53	24.82	8.19	7.03	41.11	100
土壤容重 Soil bulk (g/cm^3)	1.30	1.32	0.17	0.98	1.74	100
土壤有机质 Soil organic matter (%)	6.02	6.17	2.67	-0.29	15.56	100
植物物种丰富度 Plant species richness	34.99	35.49	5.16	24.19	47.38	100



附录2 变量间的Pearson相关性系数

Appendix 2 Pearson correlation coefficients between variables

石亚飞, 牛富荣, 黄晓敏, 洪星, 龚相文, 王艳莉, 林栋, 柳小妮 (2026) 可解释机器学习及其生态学应用. 生物多样性, 34, 25210. https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025210

附录3 第30行数据的信息

Appendix 3 Values for the 30th sample

编号 No.	海拔 Elevation (m)	年均温 Mean annual temperature (°C)	土壤水分 Soil moisture (%)	土壤容重 Soil bulk (g/cm^3)	土壤有机质 Soil organic matter (%)	植物物种丰富度 Plant species richness
30	3,092.90	–2.68	25.32	1.08	7.05	38.05

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE
2026, 34 (1): 25386, pages 1–14
doi: 10.17520/biods.2025386
cstr: 32101.14.biods.2025386

•生态学数据分析方法专题•

生物多样性评估挑战的层级占有率模型解决路径

吴春莹[1#], Viorel D. Popescu[2#], 季吟秋[1*]

1. 中国科学院昆明动物研究所遗传进化与动物模型全国重点实验室/云南省高黎贡山生物多样性重点实验室, 昆明 650201, 中国; 2. Department of Ecology, Evolution and Environmental Biology, Columbia University, New York, NY 10027, USA

摘要: 面对全球第六次生物大灭绝的严峻形势, 准确评估物种分布和种群动态已成为生物多样性监测中的紧迫任务。传统生物多样性监测方法常因生物学固有的不完全检测问题而导致估计偏差, 为生物多样性保护带来挑战。本文深入阐释层级占有率模型(hierarchical occupancy models, HOM)如何通过分离生态过程(占有率ψ)与观测过程(检测率P)的双层统计框架, 实现对不完全检测的无偏校正。重点论述该模型在整合多源异构数据、捕捉种群动态(定殖率γ与灭绝率ε)和同时分析多物种关联性方面的独特应用优势。其产出的真实占有率、动态参数及相关衍生指标, 是支持系统保护规划(systematic conservation planning, SCP)的高效、可理解且可审计的决策工具。本文同时剖析了模型应用中的关键挑战及应对策略, 以期为生态学研究者提供方法论参考, 并为管理者与决策者将模型输出转化为保护行动提供分析路径与依据。

关键词: 层级占有率模型; 生物多样性监测; 不完全检测; 种群动态; 系统保护规划; 多源数据整合

吴春莹, Viorel D. Popescu, 季吟秋 (2026) 生物多样性评估挑战的层级占有率模型解决路径. 生物多样性, 34, 25386. doi: 10.17520/biods.2025386; cstr: 32101.14.biods.2025386.
Wu CY, Popescu VD, Ji YQ (2026) Hierarchical occupancy models as solutions to challenges in biodiversity assessment. Biodiversity Science, 34, 25386. doi: 10.17520/biods.2025386; cstr: 32101.14.biods.2025386.

Hierarchical occupancy models as solutions to challenges in biodiversity assessment

Chunying Wu[1#], Viorel D. Popescu[2#], Yinqiu Ji[1*]

1 *State Key Laboratory of Genetic Evolution and Animal Models, Yunnan Key Laboratory of Biodiversity and Ecological Conservation of Gaoligong Mountain, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650201, China*
2 *Department of Ecology, Evolution and Environmental Biology, Columbia University, New York, NY 10027, USA*

ABSTRACT

Background: Amid the accelerating global biodiversity crisis driven by human activities, precise monitoring and assessment of species distributions and population dynamics have become urgent priorities for conservation. Traditional survey methods often suffer from imperfect detection, leading to biased estimates of occupancy and hindering effective management decisions. The advent of big data offers opportunities for integrating diverse sources, yet challenges in handling heterogeneity and observational biases persist. Hierarchical occupancy models, by explicitly separating ecological processes (true occupancy) from observation processes (detection probability), provide a robust statistical framework to obtain unbiased inferences and have emerged as a powerful tool in biodiversity monitoring.

Main Content: This paper reviews the theoretical foundations of hierarchical occupancy models, including the classic single-season framework and key extensions such as multi-season (dynamic) models for quantifying colonization, extinction, and temporal trends, as well as multispecies (community) models that harness interspecific correlations to enhance inferential precision. We highlight their core advantages: correcting for false negatives through explicit detection probability estimation, flexibly integrating heterogeneous multi-source data, and generating interpretable, auditable ecological indicators for biodiversity assessment. However, practical applications face several challenges,

收稿日期 Received: 2025-10-01; 接受日期 Accepted: 2026-01-20
基金项目: 国家自然科学基金(32271739)和国家重点研发计划(2022YFC2602500) Supported by the National Natural Science Foundation of China (32271739) and National Key Research and Development Program of China (2022YFC2602500)
共同第一作者 Co-first authors
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: jiyinqiu@hotmail.com

including data quality and heterogeneity issues, violations of key assumptions (e.g., independence of observations, population closure within seasons, absence of false positives), potential constraints on the biological interpretability of parameters, high computational demands for complex models and large datasets, and difficulties in communicating results to non-specialists and policymakers. Corresponding mitigation strategies are discussed, such as standardized data preprocessing, rigorous assumption validation, interdisciplinary collaboration, algorithmic optimization, and enhanced science-policy translation.

Conclusion: Hierarchical occupancy models significantly advance the scientific rigor and reliability of biodiversity monitoring and evaluation by addressing imperfect detection and enabling integrative analyses. Moving forward, continued methodological innovations, fusion with emerging data types and technologies, deeper cross-disciplinary integration, and efforts toward standardization and broader application will further strengthen their role in supporting evidence-based conservation in the face of ongoing global change.

Key words: hierarchical occupancy model; biodiversity monitoring; imperfect detection; population dynamics; systematic conservation planning; multi-source data integration

全球生物多样性正以史无前例的速度丧失, 人类活动驱动的栖息地破坏、气候变化、污染、资源过度利用和外来物种入侵等因素, 共同将地球推向第六次生物大灭绝的边缘(Ceballos et al., 2015)。生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)的系列报告明确指出, 自然系统正以前所未有的速度退化, 超过一百万个物种面临灭绝威胁(IPBES, 2019), 这凸显了对野生动植物分布、种群动态及其栖息地健康状况进行精准、持续监测的极端重要性(Tittensor et al., 2014)。准确的评估结果是制定有效保护策略、优化管理实践和衡量保护成效的科学依据。

在生物多样性监测领域, 大数据时代的到来为生态学研究带来了前所未有的机遇, 海量的多维度数据(包括物种分布记录、群落组成信息、功能性状数据、基因组测序结果、高精度气候资料及遥感影像等)不断涌现。如何从这些庞大、异构且往往存在缺陷的数据中高效提取有效信息, 并在不同空间尺度和时间序列上开展综合性研究, 已成为当前生态学研究面临的核心方法论挑战(Kéry & Royle, 2020)。然而, 可靠的物种分布数据作为所有这些评估的基石, 却常常面临一个简单的挑战, 即不完全检测(imperfect detection)的问题。这种不完全性的核心在于检测概率(detection probability, P)小于1 ($P < 1$)。当物种存在但未被观察到时(假阴性), 基于原始计数的传统方法会系统性地低估物种分布(Dorazio et al., 2011), 导致科学家错误识别关键栖息地, 进而使政策制定者错失保护良机或低效分配宝贵的保护资金(MacKenzie et al., 2002)。

传统的生物多样性监测方法在实际应用中面临一些挑战, 主要包括数据异质性、观测偏差以及模型能力的局限性。首先, 不同来源的数据类型, 例如公民科学记录、红外相机影像以及环境DNA (eDNA)样本等, 在采集标准、空间分辨率和时间频率方面存在显著的差异。这种差异使得数据整合变得十分困难(Ficetola & Taberlet, 2023), 进而影响了分析结果的连贯性和可靠性。其次, 在监测过程中, 检测不完全的问题较为常见, 具体表现为物种实际存在但未被记录(假阴性)以及物种被误识别(假阳性)。若不对这些偏差进行校正, 将可能导致对物种分布、丰度及种群动态的估计出现偏差(Nichols & Williams, 2006), 从而影响保护策略的科学性和有效性。再次, 部分生态模型在设计上未能充分考虑观测过程(observation process)中的不确定性, 或在刻画复杂生态过程(ecological process)方面存在一定的局限性, 这在一定程度上也限制了研究结论的解释力和应用价值。

鉴于上述挑战, 迫切需要一套能够从根本上校正观测误差、整合异构监测数据, 并产出可操作、可审计指标的定量框架。层级占有率模型(hierarchical occupancy models, HOM)正是满足这一要求的强大统计工具(Royle & Dorazio, 2008) (图1)。HOM通过其独特的双层统计框架, 将物种的真实占有状态(生态过程)与观测到的检测结果(观测过程)解耦, 从而克服了不完全检测的固有偏差(MacKenzie et al., 2003)。它因能够有效解决不完全检测问题、整合多源异构数据并提供无偏参数估计的独特优势, 正成为数量生态学领域解决实际保护问题的核心定量框架。



图1　层级占有率模型应对第六次生物大灭绝背景下的生物多样性监测挑战

Fig. 1　Hierarchical occupancy model (HOM) addressing biodiversity monitoring challenges in the context of the Sixth Mass Extinction

本文将系统性地介绍HOM的统计结构、核心理论、拓展应用及使用注意事项。通过对该框架的深入剖析, 我们期望为国内研究人员提供方法学的深度参考, 同时为保护区管理者与政策制定者勾勒出一条可操作的定量分析路径, 从而最终提升基于调查数据的物种分布与保护状态评估的准确性与可靠性。

1　层级占有率模型的理论基础与模型拓展

生物多样性评估中, 获取物种的真实丰度或种群规模通常成本高昂且操作复杂。因此, 栖息地占

有率(即物种在某地真实存在或不存在的概率)常被用作监测趋势和种群动态的替代指标(MacKenzie et al., 2002)。然而, 由于物种隐秘行为、低密度、夜间活动或广阔活动范围等原因, 检测不完全现象普遍存在。忽视这种不完全检测, 即无法区分未检测到是由于物种真实缺失(占有率ψ)还是由于发现率$P<1$造成的假阴性, 将导致对真实占有率估计的严重偏差。层级占有率模型正是为解决这一核心问题而设计, 通过分离生态过程和观测过程, 实现对不完全检测的显式校正(Royle & Dorazio, 2008; Kéry & Royle, 2015)。

在模型结构上, 经典框架通常包含两个核心层次。第一层通常用于描述观测数据与潜在占有状态之间的关系, 例如某物种是否在某区域被观测到; 第二层则用于建模占有状态与环境变量之间的关系, 如温度、湿度、植被类型等。在此基础上, 可进一步引入第三层次(如区域或时间的随机效应), 以捕捉更高层次的变异性(Royle & Dorazio, 2008)。通过构建这样的多层次的参数结构, 能够有效处理生态数据中的空间异质性和观测误差, 尤其适用于物种分布数据不完整或存在检测概率偏差的情况。

1.1 理论基础

HOM是一种双层(或多层)的统计框架(MacKenzie et al., 2002; Royle & Dorazio, 2008), 它将决定物种真实状态的生态过程与决定物种能否被观测到的观测过程有效解耦。其基本原理可表示为以下两个核心子模型:

子模型1: 生态过程模型。该子模型描述了在研究区域内, 每个调查单元(站点)被目标物种真实占据的潜在(latent)状态。我们定义z_i为位点i的真实占有状态, z_i服从Bernoulli分布, 其成功概率即为占有率(ψ_i)。

$$z_i \sim \text{Bernoulli}(\psi_i) \tag{1}$$

其中, $z_i=1$表示站点i被占据, $z_i=0$表示未被占据。占有率ψ_i通常是环境协变量(如栖息地类型、气候因子、人为干扰强度)的函数。为了进一步解释不同站点间占有率的变化, ψ_i通常被建模为环境协变量的函数。例如通过logit链接函数与线性预测器(即环境协变量的线性组合)关联(Kéry & Royle, 2015), 预测在给定环境条件下物种的占据概率$\text{logit}(\psi_i)=\beta_0+X_{\psi i}\beta_\psi$。$\psi_i$表示物种在第$i$个站点的占据概率, 即物种在该站点存在的概率; $\text{logit}(\psi_i)$是ψ_i的logit转换, 即ψ_i的对数几率(log-odds); β_0为模型的截距项(intercept), 代表当所有环境协变量为0时的logit占据概率; $X_{\psi i}\beta_\psi$代表环境协变量的线性组合。该方程允许研究者预测在特定环境条件下物种的占据概率。

子模型2: 观测过程模型。该子模型描述了给定真实占有状态z_i下的观测过程。当物种真实存在于站点i时$z_i=1$, 在j次重复调查中被成功检测到的概率$P_{i,j}$。我们定义$y_{i,j}$为位点i在第j次调查的观测结果, $y_{i,j}$服从Bernoulli分布, 其成功概率为$z_iP_{i,j}$(MacKenzie et al., 2002; Royle & Dorazio, 2008)。

$$y_{i,j} \mid z_i \sim \text{Bernoulli}(z_iP_{i,j}) \tag{2}$$

其中, $y_{i,j}=1$表示在第j次调查中物种被检测到, $y_{i,j}=0$表示未检测到。$P_{i,j}$为检测概率。只有当$z_i=1$ (物种真实存在)时, 检测概率$P_{i,j}<1$, 可能出现假阴性(未检测到); 如果$z_i=0$ (物种真实不存在)时, 检测概率$P_{i,j}$强制为0, $y_{i,j}$必然为0 (无假阳性假设下)。这一条件结构(conditional on z_i)允许模型能处理不确定性: 全0观测历史(如"000...")可能源于真缺席($z_i=0$)或假阴性($z_i=1$但每次均未检测到)。检测率$P_{i,j}$通常是观测协变量(如调查努力、天气条件、时间、观测者经验、物种活动性)的函数(MacKenzie et al., 2002), 例如通过logit链接函数与线性预测器关联$\text{logit}(P_{i,j})=\beta_0+X_{P_i}\beta_p$。$P_{i,j}$表示站点$i$在第$j$次调查中的检测概率; $X_{P_i}\beta_p$代表观测协变量的线性组合。

1.2 边缘似然函数的构建

HOM通过对潜变量z_i的边缘化(marginalization), 构建观测数据的边缘似然函数(marginal likelihood) $L(\psi, P \mid Y)$, 实现ψ和P的联合估计(MacKenzie et al., 2002; Royle & Dorazio, 2008)。

整体似然函数为所有站点i的似然项的乘积:

$$L(\psi, P \mid Y)=\prod_{i=1}^{M} L_i \tag{3}$$

式中, L为整体似然函数; ψ和P为模型需要估计的参数(真实占有率和检测率); Y为整个观测数据集(所有站点的所有观测记录); M为调查站点的总数。

单个站点i的似然贡献$L_i=\Pr(y_i \mid \psi_i, P_i)$是通过对不可观测的真实占有状态$z_i$进行边缘化得到的, 即对$z_i=0$ (真缺席)和$z_i=1$ (真存在)两种可能情况下的概率求和:

$$L_i = \sum_{z_i=0}^{1} \Pr(y_i \mid z_i, P) \Pr(z_i \mid \psi) \quad (4)$$

式中, y_i表示单个站点i的观测序列, $y_i = (y_{i,1}, ..., y_{i,J})$。$L_i$必须根据观测序列$y_i = (y_{i,1}, ..., y_{i,J})$的状态, 分情况进行计算(MacKenzie et al., 2002)。

(1)若至少检测到1次($\sum y_{i,j} > 0$), 即物种真实存在, $z_i = 1$, 似然的贡献为:

$$L_i = \psi_i \times \prod_{j=1}^{J} P_{i,j}^{y_{i,j}} (1 - P_{i,j})^{1-y_{i,j}} \quad (5)$$

(2)若全0观测($\sum y_{i,j} = 0$), 即物种从未被检测到, 似然贡献则包含真存在假阴性和真不存在两种情况的概率之和, 确保全0数据对参数估计有正贡献:

$$L_i = \psi_i \left(\prod_{j=1}^{J} (1 - P_{i,j}) \right) + (1 - \psi_i) \quad (6)$$

为直观展示层级占有率模型对不完全检测的校正效果, 本文基于MacKenzie等(2002)的设置进行了模拟实验(图2)。设定100个调查站点($n = 100$), 真实占有率$\psi = 0.6$, 检测率$P = 0.4$, 每站点重复调查5次。模拟结果显示, 朴素估计(naive estimate, 即至少检测到1次的站点比例)仅为0.48, 较真实值低估约20%。与之相对, HOM通过边缘似然函数联合估计ψ和P, 得到的估计值($\hat{\psi} = 0.534$)更接近真实水平。R代码见附录1。图2揭示了朴素估计的系统性偏差源于对“假缺失”站点的忽略(即物种存在但5次调查均未发现, 见图2b的0次项)。该模拟证实, 忽略检测概率将导致严重的分布低估, 而HOM的双层框架能有效分离生态过程与观测过程。虽然在当前样本量($n = 100$)下估计值仍存在一定的随机抽样误差, 但相比于严重的系统性偏差, HOM显著提升




图2　层级占有率模型(HOM)对不完全检测的校正效果模拟。(a)不同方法对占有概率(ψ)的估计对比(样本量$n = 100$)。朴素估计(naive estimate)由于忽略了不完全检测而系统性低估了占有率, 而模型估计(HOM)更接近真实值(true value)。(b)物种真实存在站点(sites with true presence)的检测频率分布。红色箭头指向的“0次发现”柱状图代表假缺失(false absences)现象, 即物种在该站点真实存在, 但由于检测概率$P < 1$导致调查结果为0, 这是占有率估计偏差的核心来源。

Fig. 2　Simulation of hierarchical occupancy model (HOM) performance in correcting for imperfect detection. (a) Comparison of occupancy probability (ψ) estimates among different methods (sample size $n = 100$). The naive estimate systematically underestimates occupancy by ignoring imperfect detection, whereas the HOM estimate is closer to the true value. (b) Distribution of detection frequency at sites where the species is truly present. The bar at “0 detections” indicated by the red arrow represents “false absences”, where the species exists at the site but remains undetected due to a detection probability $P < 1$. This phenomenon is the primary source of bias in occupancy estimation.

了参数估计的准确性。随着样本量的增加(如n = 500), 该模型的估计值将进一步收敛于真实值。

模拟实验结果表明, 在检测率为0.4且进行5次重复调查的设定下, 朴素估计法由于忽略了约8%的假缺失站点(图2b), 导致占有率被低估了20% (图2a)。相比之下, HOM通过整合检测概率, 显著降低了这种观测偏倚, 提供了更接近真实值的无偏估计。

1.3 参数估计与模型解耦

HOM的核心优势在于, 其构建的边缘似然函数(公式3–6)能够实现对参数ψ与P的联合估计。这一过程在数学上等价于对潜在的真实占有状态z_i进行边缘化求和。特别地, 当观测全0时, 同时考虑“真缺席” (概率1 – ψ_i)和“存在但未检测” (概率$\psi_i \times \prod_{j=1}^{J}(1-P_{i,j})$)这两种互斥情况(公式6), 确保全0数据对参数估计有正贡献, 从而避免了因忽略不完全检测而导致的估计偏差。通过最大似然估计(maximum likelihood estimation, MLE)直接最大化L, 或在贝叶斯框架下结合先验分布采样后验, 从而一次性估计ψ与P (MacKenzie et al., 2002)。

该估计过程在本质上实现了生态过程与观测过程的统计解耦(图3)。模型首先利用环境协变量预测真实占有率ψ, 再用观测协变量估计检测率P, 最后通过边缘似然将这两个过程的信息联合建模。这一框架的根本价值在于, 它能够有效分离环境因子对真实占有率ψ的生态影响与观测条件对检测率P的方法学影响, 从而在不完全检测的普遍条件下, 实现对物种真实分布的无偏推断。

1.4 模型拓展

1.4.1 多季节占有率模型(multi-season occupancy model, MSOM)

在长期监测开放种群时, 研究者常面临“真实动态”与“检测误差”难以分离的困境。一次调查未见目标物种, 究竟意味着该物种已局部灭绝, 还是仅仅未被检测到? 多季节占有率模型通过引入时间维度, 将占有率的变化过程显式拆解为定殖与灭绝两条轨迹, 从而把“季节间真实变化”从“调查噪声”中剥离(MacKenzie et al., 2003)。

该模型适用于对开放种群进行长期监测, 能够量化种群的动态变化。在基本占有率模型的基础上, 引入了时间维度, 允许估计描述种群动态的关键参数有4个。首个季节物种占据某站点的概率, 即初始占有率ψ_1; 后续季节由未占转为被占的概率(在第t季节未被占据的站点, 在第t + 1季节被新占据的概率), 即定殖率γ_t; 由被占转为未占的概率(在第t季节被占据的站点, 在第t + 1季节变为未被占据的概率), 即灭绝率ε_t; 以及每次重复调查的概率(在第t季节的第j次重复调查中被检测到的概率), 即检测率$P_{i,j,t}$ (图4)。借助这一框架, 研究人员能够评估人为干预(如栖息地恢复)或显著背景趋势(如气候变化)对物种占有率动态的影响(Nichols & Williams, 2006)。例如, MacKenzie等(2003)利用MSOM估计了北美斑点鸮(*Strix occidentalis caurina*)种群的定殖率γ和灭绝率ε, 为保护管理提供了关键的时间动态信息。

1.4.2 群落占有率模型(community occupancy model)

在群落生态学研究中, 通常以群落而非单一物种为研究对象, 往往同时记录数十至数百个物种, 但红外相机、eDNA或声学数据对稀有种的捕捉能力有限, 导致“记录为零”未必等于“真实缺席”。群落占有率模型同时分析多个物种的占有率和检测率, 把“物种”作为随机效应纳入同一层级框架, 通过共享的环境响应与物种间协方差结构, 让数据丰富的常见种“借出”信息, 通过借鉴常见物种的信息来弥补稀有物种数据不足的问题, 从而大幅提高稀有或难以捉摸种类的参数精度(Dorazio et al., 2006; Royle & Dorazio, 2008)。

模型同时输出群落层面参数, 如总物种丰富度N、平均占有率μ_ψ及其变异性σ_ψ^2; 也输出物种特定参数, 给出每个物种的独立占有率ψ_s与检测率P_s; 以及物种间协方差, 在生境利用或检测概率上的协方差矩阵Σ, 反映物种在生境利用或检测概率上的相似性(Royle & Dorazio, 2008)。这一模型使得一次分析即可描绘整个群落的分布格局, 并识别人类活动对群落结构与稀有种潜在热点的真实影响。例如, Sollmann等(2021)应用群落占有率模型自动识别乌干达鸟类群落中的物种相似性与潜在聚类结构, 展示了该模型在解析群落组织与生态关联方面的强大能力。

1.4.3 时空耦合的动态群落模型(spatio-temporal dynamic community model)

当研究区域包含多个栖息地斑块且监测持续




图3　层级占有率模型的双层统计框架。该示意图展示了层级占有率模型的双层统计逻辑，其核心在于通过对生态过程与观测过程的解耦，有效校正物种调查中的不完全检测问题。左侧生态过程描述由环境因子驱动的真实占有状态(即潜变量z_i)；在此层级中，样点的占有概率ψ受栖息地类型(如森林覆盖率、植被结构)、非生物因子及人为干扰等环境协变量的影响，并采用logit链接函数进行建模。右侧观测过程则描述实际调查中的检测概率P，该概率受调查努力(如调查时长、采样强度、重复次数)、天气条件及观测者经验等观测协变量的影响，同样通过logit链接函数建立联系。由于观测结果y严格依赖于真实占有状态z (即仅在物种真实存在的条件下，检测概率才具有生物学意义)，模型通过对z_i进行边缘化处理并构建联合似然函数。这一机制通过数学手段消除了假缺失(false absences)导致的估计偏差，从而实现对物种真实分布的无偏估计。

Fig. 3　Dual-level statistical framework of the hierarchical occupancy model. This figure illustrates the dual-level statistical framework of the hierarchical occupancy model, which centers on correcting for imperfect detection in species surveys by decoupling the ecological and observation processes. The ecological process on the left describes the true occupancy state (latent variable z_i) driven by environmental factors; the occupancy probability ψ is influenced by environmental covariates—such as habitat type (e.g., forest cover, vegetation structure), abiotic factors, and human disturbance—and is modeled via a logit link function. The observation process on the right describes the detection probability P during field surveys, which is affected by observational covariates including survey effort (duration, intensity, and number of replicates), weather conditions, and observer experience, also linked through a logit function. Given that the observation y is strictly dependent on the true occupancy state z (meaning a species can only be detected if it is truly present), the model integrates these processes by marginalizing over the latent variable z_i to construct a joint likelihood function. This approach mathematically accounts for false absences, thereby achieving an unbiased estimation of the true species distribution.

多年时，传统的多季节模型虽能刻画时间动态，却难以解释物种在空间上的分布差异(空间异质性，如栖息地斑块间的扩散)，而群落模型虽能分析多物种关联，却忽略了季节间的扩散与局部灭绝，从而缺乏对时空过程的整合能力。

时空耦合的动态群落模型把每个站点细分为若干空间单元，并引入扩散矩阵(dispersal matrix)将“邻近斑块占有率 × 栖息地连通性”这一组合信息转换为单元在下一季($t \rightarrow t+1$)被定殖的概率γ。同时引入物种–环境–空间的交互项，将环境协变量、物种性状与邻域占有率整合进同一个方程$\gamma_{t,s} = f$(环境协变量 × 物种性状 × 空间邻域占有率)，从而在统一框架下量化不同扩散能力物种(如广布种与特化种)之间的差异化响应。为解决稀有物种数据稀疏的问题，模型采用空间–物种层级先验，如高斯过程(Gaussian process)或内在条件自回归模型




图4　物种多季节占有率动态与迁移趋势示意图。图中展示了基于模拟数据的某物种在2015–2019年间的季度动态(Q1–Q4分别代表第一至第四季度): 占有率ψ (蓝色实线)整体维持在0.6–0.8, 表明其在研究区域内持续保持较高存在率; 定殖概率γ (橙色点线)稳定在0.3–0.4, 略有上升, 反映其扩展能力较强; 灭绝概率ε (绿色虚线)维持在0.1–0.2, 提示可能存在栖息地干扰或环境压力。该图基于模拟数据绘制, 用于示意多季节层级占有率模型在揭示物种动态方面的应用。R代码见附录2。

Fig. 4　Schematic diagram of multi-season occupancy dynamics and state transition trends. This diagram illustrates the quarterly dynamics (where Q1–Q4 represent the first to fourth quarters of each year, respectively) of a species based on simulated data between 2015 and 2019: The occupancy rate (ψ, blue solid line) is generally maintained between 0.6–0.8, indicating a high persistent probability of presence in the study area. The colonization probability (γ, orange dotted line) is stable at 0.3–0.4 with a slight upward trend, reflecting a relatively strong capacity for range expansion. The extinction probability (ε, green dashed line) is maintained at 0.1–0.2, suggesting potential habitat disturbance or environmental pressure. This figure is created using simulated data and serves to illustrate the application of the multi-season hierarchical occupancy model (MSOM) in revealing species dynamics. Please see Appendix 2 for the R code.

(intrinsic conditional autoregressive model, ICAR), 在保留物种特异性响应的同时, 有效“借用”邻近区域中常见物种的信息, 从而提升对稀有种参数的估计精度(Kleiven et al., 2023; Belmont et al., 2024)。该框架已被用于评估高速公路建设对两栖类群落的影响(Zheng, 2023), 能够明确区分“直接栖息地丧失”与“扩散受阻导致的间接灭绝(即因廊道阻断导致局部灭绝率ε上升)”两种机制。

1.4.4　集成多源数据的层级模型(integrated hierarchical multi-source model)

传统模型往往依赖单一调查手段(如红外相机), 而集成多源模型在统一的贝叶斯层级框架下, 将来自eDNA、声学记录仪和红外相机等多源数据进行融合。集成多源模型为每种数据类型构建独立的检测率子模型$P_{kj,t}$ (k = eDNA、声学、传统观察等), 并引入方法特异性协变量(如eDNA浓度、声学记录时长)以校正各监测手段的系统误差(Saadi et al., 2018)。通过共享的潜在占有率状态ψ_t, 模型实现了跨方法的信息融合, 联合估计真实占有率, 有效解决不同调查方法在空间覆盖度和检测偏差上的差异问题。为处理大规模数据, 模型在计算机端采用集成嵌套拉普拉斯近似(integrated nested Laplace approximations, INLA)或变分推断(variational inference, VI)替代传统的马尔可夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo, MCMC)方法, 尤其适用于大规模、多物种数据集(Rue et al., 2009; Belmont et al., 2024)。Devarajan等(2020)通过综述多物种占有率模型的研究进展, 强调了整合红外相机、声学记录与eDNA等多源数据在群落层级建模中的重要性, 并提出了提升监测精度与保护管理科学性的最佳实践框架。Ji等(2025)开发的OccPlus模型进一步将HOM扩展至eDNA metabarcoding数据, 通过双阶段框架(野外eDNA采集与实验室检测)显式处理假阴性和假阳性误差, 并利用序数分析发掘了eDNA的高分类广度的数据潜力。然而, 需要注意潜在偏差: eDNA数据易受污染或扩增偏倚影响产生假阳性, 若未通过严格实验室流程(如设置阴性对照)和模型扩展(如OccPlus中的污染参数)加以校正, 可能导致占有率高估(Ficetola et al., 2015; Guillera-Arroita et al., 2017)。因此, 在整合eDNA时建议结合多重PCR

重复和技术重复, 并优先采用能显式建模假阳性的HOM变体。

1.5 核心假设、模型选择与验证框架

在非标记动物监测研究中, 红外相机、生物声学记录、粪便或足迹调查及eDNA等多源数据均可纳入层级占有率模型进行分析。根据MacKenzie等(2017)提出的框架, 为确保统计推断的有效性, 此类模型通常建立在4项核心假设之上: (1)调查独立性: 同一站点内的重复调查之间以及不同站点之间的检测事件相互独立, 不存在空间或时间自相关(Royle & Dorazio, 2008); (2)状态封闭性: 在给定的调查季节内(如繁殖期), 站点的占有状态保持稳定, 无局部灭绝或定殖事件发生(MacKenzie et al., 2009); 对于迁移物种或长期研究, 需采用多季节开放模型(MacKenzie et al., 2003); (3)无假阳性或经显式校正: 观测到的检出均为目标物种, 若存在物种误识别(如eDNA污染), 需在模型中引入假阳性概率参数进行校正(Miller et al., 2011); (4)协变量充分性: 影响占有率和检测率的主要环境与观测变量已被纳入模型, 以避免因遗漏重要协变量而导致的偏差(Kéry & Royle, 2015)。

模型构建后, 需通过系统流程进行模型比较、选择与验证。在频率主义框架(frequentist framework)下, 常使用修正赤池信息准则(corrected Akaike information criterion, AICc; 适用于小样本)或贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion, BIC)进行模型比较(Burnham & Anderson, 2002)。在贝叶斯框架下, 则可采用渡边-赤池信息准则(Watanabe-Akaike information criterion, WAIC)、留一法交叉验证(leave-one-out cross-validation, LOO-CV)或通过桥采样(bridge sampling)计算边际似然进行模型选择(Gelman et al., 2014; Gronau et al., 2017; Vehtari et al., 2017)。

模型诊断与验证是确保结果可靠的关键步骤, 包括: (1)后验预测检验: 比较模型生成的数据与实际观测数据在关键统计量上的一致性, 评估整体拟合优度(Gelman & Hill, 2007); (2)残差诊断: 利用专用R包(如DHARMa)检验残差是否满足独立性、离散度适中等假设(Hartig, 2024); (3)交叉验证: 通过k折交叉验证评估模型的预测性能与泛化能力; (4)敏感性分析: 检验关键模型设定(如先验分布、协变量选择、模型结构)的变化对参数估计的影响, 以评估结果的稳健性。以上分析可借助R语言的unmarked、ubms或brms等软件包实现, 或在Stan/JAGS平台进行自定义编程。为提高研究的可重复性, 建议将代码与数据在公开仓库(如GitHub或Dryad)中共享。HOM的应用需满足若干核心假设(表1), 并通过系统框架进行模型选择与验证(表2)。这些假设确保参数估计的无偏性, 而验证工具帮助评估模型可靠性。

2 HOM的生态应用优势

2.1 解决不完全检测问题

HOM最核心的优势在于其有效解决了不完全检测问题。通过分离生态过程和观测过程, 模型能够显式地估计检测率, 从而校正假阴性错误。例如, 对欧洲松貂(*Martes martes*)的红外相机调查显示,

表1 层级占有率模型的核心假设

Table 1 Core assumptions of hierarchical occupancy models

类别 Category	核心假设 Core assumption	描述 Description
生态过程 Ecological process	闭合假设 Closure assumption	在调查期间, 站点占有状态无变化(单季节模型); 动态模型放松此假设(MacKenzie et al., 2003) The occupancy status of a site remains constant during the survey period (single-season model); dynamic models relax this assumption (MacKenzie et al., 2003)
生态过程 Ecological process	独立站点 Site independence	站点间占有率条件独立, 或通过随机效应建模空间相关 Occupancy is conditionally independent among sites, or spatial correlation is accounted for through random effects
观测过程 Observation process	无假阳性 No false positives	检测到即真实存在; eDNA等场景需扩展模型处理假阳性(Guillera-Arroita et al., 2017) The species is truly present if detected; scenarios such as eDNA require model extensions to handle false positives (Guillera-Arroita et al., 2017)
观测过程 Observation process	检测独立 Independent detections	重复调查间检测事件独立 Detection events are independent across replicate surveys
参数估计 Parameter estimation	局部识别 Local identifiability	重复调查足够多以分离ψ和P (通常$j \geq 3$) A sufficient number of replicate surveys are required to distinguish ψ from P (typically $j \geq 3$)

表2　层级占有率模型的选择与验证框架

Table 2　Framework for model selection and validation in hierarchical occupancy models

类别 Category	核心内容 Core item	描述 Description
模型选择 Model selection	AICc/WAIC/LOO-CV	用于比较模型拟合与复杂度; AICc适用于小样本(Burnham & Anderson, 2002), WAIC和LOO-CV适用于贝叶斯模型(Gelman et al., 2014; Vehtari et al., 2017) Used to compare model fit and complexity; AICc is suitable for small sample sizes (Burnham & Anderson, 2002), while WAIC and LOO-CV are appropriate for Bayesian models (Gelman et al., 2014; Vehtari et al., 2017)
模型选择 Model selection	后验预测检查 Posterior predictive check (PPC)	贝叶斯框架下评估模型拟合(Gelman et al., 2014) Assessing model fit within a Bayesian framework (Gelman et al., 2014)
模型验证 Model selection	交叉验证 Cross-validation (CV)	使用k折交叉验证评估预测性能 Evaluating predictive performance using k-fold cross-validation (k-fold CV)
残差诊断 Residual diagnostics	DHARMa残差 DHARMa residuals	模拟残差检查拟合优度, 适用于层级模型(Hartig, 2024) Using simulated residuals to check goodness-of-fit, specifically designed for hierarchical models (Hartig, 2024)

AICc: 样本量校正后的赤池信息准则; WAIC: 渡边-赤池信息准则; LOO-CV: 留一法交叉验证。
AICc, Akaike Information Criterion corrected for small samples; WAIC, Watanabe-Akaike information criterion; LOO-CV, Leave-one-out cross-validation.

传统分析将其分布局限于茂密森林; 而使用HOM对检测率进行建模校正后, 揭示出该物种在农田、石南草原等非典型生境中同样具有较高占有率(Moll et al., 2016)。

2.2　整合多源异构数据

HOM具有整合多源异构数据的强大灵活性, 能够整合来自不同来源和不同数据采集方法(如红外相机、eDNA、声学监测、公民科学数据)的生物多样性数据。例如, 在美国白山国家森林的监测中, 研究人员同时使用了红外相机数据(提供物种出现与非出现信息)、eDNA数据(提供水生生物或难以通过传统方法监测的物种信息)以及公民科学数据(提供辅助的观察信息) (Doser et al., 2022)。HOM通过构建统一的框架, 将这些异构数据视为不同类型的观测, 利用多源信息的互补性, 更全面地反映生物多样性的复杂性, 增强研究的综合性和可靠性。具体而言, Doser等(2022)提出了一个“整合群落占有率模型” (integrated community occupancy model, ICOM), 该模型基于HOM的框架, 能够整合多个数据源, 从而提高物种和群落层面推断的精确性和准确性。这不仅提高了数据利用效率, 也降低了单一数据源可能带来的不确定性。

2.3　生成可审计的量化指标

HOM能够生成一系列高效、直接、可理解且可审计的生物多样性状况评估指标。这些指标包括但不限于物种真实占有率、占有率变化趋势、定殖率、灭绝率、群落物种丰富度以及对关键环境因子的响应强度等。这些可量化的指标对于决策者和自然保护区管理者具有很强的实用价值, 能够直接衡量保护成效、识别优先干预区域, 并推动生物多样性保护目标的实现(Devarajan et al., 2020; Doser et al., 2022)。例如, 通过跟踪关键物种的占有率变化趋势, 管理者可以调整巡护策略、优化栖息地管理, 并评估气候变化对物种分布的潜在影响(Brambilla et al., 2017; Lipsey et al., 2017)。此外, 将公民科学数据、遥感信息和系统性调查数据整合进群落占有率模型, 有助于在复杂景观中全面评估生物多样性动态(Doser et al., 2022)。同时, 在建模中考虑检测概率的异质性, 也能提高对定殖与灭绝事件的估计精度, 减少保护决策中的偏差(Hepler & Yang, 2024)。

2.4　构建系统保护规划的数据支撑体系

在系统保护规划(systematic conservation planning, SCP)的理论与实践框架中, HOM通过生成高精度的物种分布概率图、群落结构指标以及多尺度不确定性估计, 能够为保护规划提供坚实和丰富的数据基础。这些成果不仅涵盖了物种分布的精细空间信息, 还通过不确定性估计引入了风险评估维度, 为规划决策提供了更具弹性的参考依据。研究者可据此识别物种栖息地重叠区、生物多样性高热点及保护空白区域, 从而优化保护优先级排序与空间布局规划, 补足现有保护体系的不足(Margules & Pressey, 2000)。

在保护区网络的构建与评估方面, 模型输出数据可用于分析区域间的生态连通性与代表性。连通

性对于物种迁移、基因交流及生态系统稳定性至关重要, 而代表性则确保保护区覆盖关键生态类型与生物群落。通过对这些指标的综合评估, 有助于推动生态红线的科学划定与生态补偿机制的合理设计, 增强保护政策的系统性与可操作性。将模型输出作为核心输入, 结合MARXAN (https://marxansolutions.org/)、Zonation (https://github.com/zonationteam)等空间优化平台, 可显著提升保护区选址的科学性与透明度。

通过叠加土地利用成本图与生态分布预测成果, 研究者可在保障生态功能的同时, 实现生态保护与社会经济发展的动态平衡(Wilson et al., 2007)。这一集成化方法不仅强化了保护资源在空间上的配置效率, 也构建了从数据建模到政策实施的完整生态决策链条, 为多维度、跨领域的生物多样性管理提供了新的理论支撑与实践路径。该方向兼具学术深度与现实意义, 值得在未来的生态保护研究与政策制定中持续拓展与深化。

2.5 HOM在生物多样性保护中的应用

在方法论奠基与拓展方面, MacKenzie等(2002)的开创性工作首次提出了在检测概率小于1时估计站点占有率的方法; Royle和Dorazio (2008)的专著系统构建了层级模型在生态学中的应用理论框架, 影响深远。后续的方法学创新为应对具体生态学挑战提供了专门工具: Zipkin等(2009)利用HOM评估了森林破碎化对物种丰富度的影响; Kéry等(2009)探讨了在物种存在临时迁出的群落中如何估计物种丰富度和占有率; Rota等(2016)提出了能同时考虑空间和种间依赖性的多物种模型; Tobler等(2015)则利用红外相机数据实现了物种丰富度的时空层次建模; Popescu等(2016)的研究评估了在数据稀缺系统中野生动物种群估计的生物学现实性, 展现了HOM在数据不完备条件下的应用价值。

近年来, HOM的创新性应用在多个关键保护领域取得了具体成果。在整合新型生物监测技术方面, Ji等(2022)利用无脊椎动物来源DNA (iDNA), 建立了对哀牢山国家级自然保护区脊椎动物多样性的高效“快照”式评估流程, 并通过群落层级模型揭示了物种组成格局; 而Ji等(2025)进一步开发的OccPlus模型, 针对eDNA宏条形码数据显式校正假阴性与假阳性误差, 实现了对高黎贡山大规模保护区复合体内脊椎动物分布的高效、高精度制图。在群落保护与实践方面, Hamer等(2021)运用多物种占有率模型评估了两栖动物群落对湿地恢复的响应; Rahman等(2021)则利用该模型评估了孟加拉国东北部的哺乳动物多样性, 为区域保护规划提供了关键数据。在方法拓展层面, Hepler和Erhardt (2021)提出了处理多变量数据的时空占有率模型, Smith和Goldberg (2020)研究了动态系统中考虑假阳性误差的多尺度eDNA监测方法, 进一步拓宽了HOM的适用范围。

3 HOM的挑战、局限与模型选择

尽管HOM在生物多样性研究与保护决策中展现出强大的能力与广泛的适用性, 但在实际应用中仍面临关键挑战并存在固有局限。

3.1 核心挑战与模型局限

HOM的应用效果高度依赖于其核心统计假设的满足, 包括调查的独立性、调查期间物种占有状态的封闭性以及无假阳性观测。然而, 在真实的动态生态系统中, 物种的迁移、扩散以及样本污染等问题常导致这些假设被违反, 进而造成参数估计的偏差。

该模型存在其固有的能力边界与实用限制。首先, 它对高质量重复调查数据有较高要求, 当数据极度稀疏或质量较差时, 模型估计可能不稳定甚至无法收敛(MacKenzie & Royle, 2005)。其次, 其计算复杂度较高, 在处理多物种、多季节或包含大量交互项的大尺度模型时, 对计算资源的需求严苛, 单次拟合耗时可能长达数天甚至数周, 对一般研究团队构成挑战。最后, 对于检测率极低或极为稀有的物种, 即使借助群落模型“借用信息”, 其推断能力依然有限; 同时, 模型主要量化统计关联, 无法直接揭示其背后的具体生态学机制(如种间竞争、行为互作等)。

3.2 与传统模型的比较与选择

与最大熵模型(maximum entropy model, MaxEnt)、广义相加模型(generalized additive models, GAM)等传统物种分布模型相比, HOM的最大优势在于其能够显式校正不完全检测。MaxEnt和GAM通常将观测数据直接视为真实存在, 因此其输出是有偏的“存在概率”或“生境适宜性”估计, 而非真实

的“占有率”。HOM通过分离生态过程与观测过程, 显著提升了对物种真实分布状态的还原能力, 尤其适用于不完全检测显著的场景, 并支持动态分析与多源数据整合。

然而, MaxEnt和GAM在处理大量环境协变量、快速生成预测分布图以及对数据要求(无需重复调查)方面更具效率。因此, 模型的选择应基于具体研究目的、数据类型与可用资源进行权衡: 对于需要精确量化真实占有率、监测种群动态和评估保护成效的研究, HOM是更优选择; 对于想要快速探索潜在分布、进行大尺度格局分析或数据仅包含存在记录的研究, 传统方法则更为高效。为直观对比, 附录3总结了这些主流模型的特点。

4 结论与展望

面对全球生物多样性快速丧失与观测数据日益丰富的双重背景, HOM通过显式校正不完全检测、灵活整合多源异构数据, 为精准评估物种分布与动态提供了关键的统计框架(MacKenzie et al., 2002; Royle & Dorazio, 2008)。其输出的无偏占有率、动态参数及群落指标, 能够直接识别生物多样性热点与生态避难所, 为系统保护规划、生态红线划定及基于自然的解决方案提供坚实的量化依据(Crist & Veech, 2006; Chen et al., 2011)。

展望未来, 该模型的发展将深度依赖于跨学科方法融合与技术流程标准化。一方面, 通过与机器学习、遥感对地观测、环境基因组学等前沿技术结合, HOM有望实现从数据采集到智能预测的全链条升级(Hansen & Pfeifer, 2019; Thuiller et al., 2019)。另一方面, 开发用户友好的计算工具、建立统一的数据标准, 对于推动模型在保护管理一线的大规模应用至关重要(Moilanen et al., 2009; Beger et al., 2010)。未来的研究尤需聚焦于提升动态模型的计算效率与长期预测能力, 以应对气候变化与栖息地变迁的持续挑战(Kelleher et al., 2025)。

总之, HOM架起了一座连接不确定观测数据与可靠生态信息的桥梁。面对第六次生物大灭绝的严峻现实(Ceballos et al., 2015), 不断完善并广泛应用此类严谨的定量工具, 对于深化我们对生命之网的理解、优化保护资源配置、最终扭转生物多样性丧失趋势具有不可替代的科学价值与实践意义。

ORCID

吴春莹 https://orcid.org/0000-0002-3122-7684
Viorel D. Popescu https://orcid.org/0000-0001-7138-0774
季吟秋 https://orcid.org/0000-0002-5014-0605

参考文献

Beger M, Grantham HS, Pressey RL, Wilson KA, Peterson EL, Dorfman D, Mumby PJ, Possingham HP (2010) Conservation planning in a changing world: Multispecies approaches to prioritizing the global protection of biodiversity. BioScience, 60, 52–62.

Belmont J, Martino S, Illian J, Rue H (2024) Spatio-temporal occupancy models with INLA. Methods in Ecology and Evolution, 15, 2087–2100.

Brambilla M, Caprio E, Assandri G, Scridel D, Bassi E, Bionda R, Celada C, Falco R, Bogliani G, Pedrini P, Rolando A, Chamberlain D (2017) A spatially explicit definition of conservation priorities according to population resistance and resilience, species importance and level of threat in a changing climate. Diversity and Distributions, 23, 727–738.

Burnham KP, Anderson DR (2002) Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach, 2nd edn. Springer, New York.

Ceballos G, Ehrlich PR, Barnosky AD, García A, Pringle RM, Palmer TM (2015) Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. Science Advances, 1, e1400253.

Chen IC, Hill JK, Ohlemüller R, Roy DB, Thomas CD (2011) Rapid range shifts of species associated with high levels of climate warming. Science, 333, 1024–1026.

Crist TO, Veech JA (2006) Additive partitioning of rarefaction curves and species–area relationships: Unifying α-, β- and γ-diversity with sample size and habitat area. Ecology Letters, 9, 923–932.

Devarajan K, Morelli TL, Tenan S (2020) Multi-species occupancy models: Review, roadmap, and recommendations. Ecography, 43, 1612–1624.

Dorazio RM, Gotelli NJ, Ellison AM (2011) Modern methods of estimating biodiversity from presence-absence surveys. In: Biodiversity Loss in a Changing Planet (ed. Grillo O), pp. 71–102. InTech, Rijeka.

Dorazio RM, Royle JA, Söderström B, Glimskär A (2006) Estimating species richness and accumulation by modeling species occurrence and detectability. Ecology, 87, 842–854.

Doser JW, Leuenberger W, Sillett TS, Hallworth MT, Zipkin EF (2022) Integrated community occupancy models: A framework to assess occurrence and biodiversity dynamics using multiple data sources. Methods in Ecology and Evolution, 13, 919–932.

Ficetola GF, Pansu J, Bonin A, Coissac E, Giguet-Covex C, De Barba M, Gielly L, Lopes CM, Boyer F, Pompanon F, Rayé G, Taberlet P (2015) Replication levels, false presences and

the estimation of the presence/absence from eDNA metabarcoding data. Molecular Ecology Resources, 15, 543–556.

Ficetola GF, Taberlet P (2023) Towards exhaustive community ecology via DNA metabarcoding. Molecular Ecology, 32, 6320–6329.

Gelman A, Hill J (2007) Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. Cambridge University Press, Cambridge.

Gelman A, Hwang J, Vehtari A (2014) Understanding predictive information criteria for Bayesian models. Statistics and Computing, 24, 997–1016.

Gronau QF, Sarafoglou A, Matzke D, Ly A, Boehm U, Marsman M, Leslie DS, Forster JJ, Wagenmakers EJ, Steingroever H (2017) A tutorial on bridge sampling. Journal of Mathematical Psychology, 81, 80–97.

Guillera-Arroita G, Lahoz-Monfort JJ, van Rooyen AR, Weeks AR, Tingley R (2017) Dealing with false-positive and false-negative errors about species occurrence at multiple levels. Methods in Ecology and Evolution, 8, 1081–1091.

Hamer AJ, Schloegel LM, Rossauer B, Anyomi K, Stockwell MP, Mahony MJ, Clulow S, Banks SC (2021) Multi-species occupancy models reveal community assembly and wetland restoration in amphibians. Journal of Applied Ecology, 58, 607–616.

Hansen LM, Pfeifer M (2019) Machine learning in remote sensing: A comprehensive review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 152, 166–177.

Hartig F (2024) DHARMa: Residual Diagnostics for Hierarchical (Multi-level/Mixed) Regression Models. R Package Version 0.4.7. https://CRAN.R-project.org/package=DHARMa. (accessed on 2025-09-02)

Hepler SA, Erhardt RJ (2021) A spatiotemporal model for multivariate occupancy data. Environmetrics, 32, e2657.

Hepler SA, Yang BQ (2024) Occupancy models with autocorrelated detection heterogeneity. Environmental and Ecological Statistics, 31, 777–800.

IPBES (2019) Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat, Bonn, Germany.

Ji YQ, Baker CCM, Popescu VD, Wang JX, Wu CY, Wang ZY, Li YH, Wang L, Hua CL, Yang ZX, Yang CY, Xu CCY, Diana A, Wen QZ, Pierce NE, Yu DW (2022) Measuring protected-area effectiveness using vertebrate distributions from leech iDNA. Nature Communications, 13, 1555.

Ji YQ, Diana A, Li XY, Matechou E, Griffin JE, Liu SW, Luo MJ, Wu CY, Bai R, Yao CY, Yin TT, Dong F, Wu F, Wang K, Yu ZB, Chen XY, Jiang XL, Che J, Yu DW, Popescu VD (2025) High quality, granular, timely, trustworthy and efficient vertebrate species distribution data across a 30,000 km^2 protected area complex. Ecology Letters, 28, e70302.

Kelleher S, Guillera-Arroita G, Elith J, Briscoe NJ (2025) Twenty years of dynamic occupancy models: A review of applications and look to the future. Ecography, 48, e07757.

Kéry M, Royle JA (2015) Applied Hierarchical Modeling in Ecology: Analysis of Distribution, Abundance and Species Richness in R and BUGS (Vol. 1): Prelude and Static Models. Academic Press, New York.

Kéry M, Royle JA (2020) Applied Hierarchical Modeling in Ecology: Analysis of Distribution, Abundance and Species Richness in R and BUGS (Vol. 2): Dynamic and Advanced Models. Academic Press, New York.

Kéry M, Royle JA, Plattner M, Dorazio RM (2009) Species richness and occupancy estimation in communities subject to temporary emigration. Ecology, 90, 1279–1290.

Kleiven EF, Barraquand F, Gimenez O, Henden JA, Ims RA, Soininen EM, Yoccoz NG (2023) A dynamic occupancy model for interacting species with two spatial scales. Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, 28, 466–482.

Lipsey MK, Naugle DE, Nowak J, Lukacs PM (2017) Extending utility of hierarchical models to multi-scale habitat selection. Diversity and Distributions, 23, 783–793.

MacKenzie DI, Nichols JD, Hines JE, Knutson MG, Franklin AB (2003) Estimating site occupancy, colonization, and local extinction when a species is detected imperfectly. Ecology, 84, 2200–2207.

MacKenzie DI, Nichols JD, Lachman GB, Droege S, Royle JA, Langtimm CA (2002) Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one. Ecology, 83, 2248–2255.

MacKenzie DI, Nichols JD, Royle JA, Pollock KH, Bailey LL, Hines JE (2017) Occupancy Estimation and Modeling: Inferring Patterns and Dynamics of Species Occurrence, 2nd edn. Academic Press, London.

MacKenzie DI, Nichols JD, Seamans ME, Gutiérrez RJ (2009) Modeling species occurrence dynamics with multiple states and imperfect detection. Ecology, 90, 823–835.

MacKenzie DI, Royle JA (2005) Designing occupancy studies: General advice and allocating survey effort. Journal of Applied Ecology, 42, 1105–1114.

Margules CR, Pressey RL (2000) Systematic conservation planning. Nature, 405, 243–253.

Miller DA, Nichols JD, McClintock BT, Grant EHC, Bailey LL, Weir LA (2011) Improving occupancy estimation when two types of observational error occur: Non-detection and species misidentification. Ecology, 92, 1422–1428.

Moilanen E, Wilson KA, Possingham HP (2009) Spatial Conservation Prioritization. Oxford University Press, Oxford.

Moll RJ, Kilshaw K, Montgomery RA, Abade L, Campbell RD, Harrington LA, Millspaugh JJ, Birks JDS, MacDonald DW (2016) Clarifying habitat niche width using broad-scale, hierarchical occupancy models: A case study with a recovering mesocarnivore. Journal of Zoology, 300, 177–185.

Nichols JD, Williams BK (2006) Monitoring for conservation. Trends in Ecology & Evolution, 21, 668–673.

Popescu VD, de Valpine P, Butsie DC (2016) Biological realism of wildlife population estimates in data-poor systems. Ecological Applications, 26, 1429–1444.

Rahman H, Moore JF, Connor T, Amin R, Evans MJ, Steinmetz R, Royle JA, Belant JL (2021) Assessing mammalian diversity in northeastern Bangladesh using multi-species occupancy models. Biodiversity and Conservation, 30, 15–34.

Rota CT, Ferreira MAR, Kays RW, Forrester TD, Kalies EL, McShea WJ, Parsons AW, Millspaugh JJ (2016) A multispecies occupancy model for two or more interacting species. Methods in Ecology and Evolution, 7, 1164–1173.

Royle JA, Dorazio RM (2008) Hierarchical Modeling and Inference in Ecology: The Analysis of Data from Populations, Metapopulations and Communities. Academic Press, San Diego.

Rue H, Martino S, Chopin N (2009) Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 71, 319–392.

Saadi I, Farooq B, Mustafa A, Teller J, Cools M (2018) An efficient hierarchical model for multi-source information fusion. Expert Systems with Applications, 110, 352–362.

Smith AM, Goldberg CS (2020) Occupancy in dynamic systems: Multi-scale and false-positive environmental DNA monitoring. Ecology, 101, e02945.

Sollmann R, Eaton MJ, Link WA, Mulondo P, Ayebare S, Prinsloo S, Plumptre AJ, Johnson DS (2021) A Bayesian Dirichlet process community occupancy model to estimate community structure and species similarity. Ecological Applications, 31, e02249.

Thuiller W, Guéguen M, Renaud J, Karger DN, Zimmermann NE (2019) Climate change and species distribution: From theory to practice. Global Change Biology, 25, 1126–1141.

Tittensor DP, Walpole M, Hill SLL, Boyce DG, Britten GL, Burgess ND, Butchart SHM, Leadley PW, Regan EC, Alkemade R, Baumung R, Bellard C, Bouwman L, Bowles-Newark NJ, Chenery AM, Cheung WWL, Christensen V, Cooper HD, Crowther AR, Dixon MJR, Galli A, Gaveau V, Gregory RD, Gutierrez NL, Hirsch TL, Höft R, Januchowski-Hartley SR, Karmann M, Krug CB, Leverington FJ, Loh J, Lojenga RK, Malsch K, Marques A, Morgan DHW, Mumby PJ, Newbold T, Noonan-Mooney K, Pagad SN, Parks BC, Pereira HM, Robertson T, Rondinini C, Santini L, Scharlemann JPW, Schindler S, Sumaila UR, Teh LSL, van Kolck J, Visconti P, Ye YM (2014) A mid-term analysis of progress toward international biodiversity targets. Science, 346, 241–244.

Tobler MW, Zúñiga Hartley A, Carrillo-Percastegui SE, Powell GVN (2015) Spatiotemporal hierarchical modelling of species richness and occupancy using camera trap data. Journal of Applied Ecology, 52, 413–421.

Vehtari A, Gelman A, Gabry J (2017) Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. Statistics and Computing, 27, 1413–1432.

Wilson KA, Underwood EC, Morrison SA, Klausmeyer KR, Murdoch WW, Reyers B, Wardell-Johnson G, Marquet PA, Albert AS, Simons AJ (2007) Prioritizing global conservation efforts. Nature, 446, 109–112.

Zheng J (2023) Impact of transportation infrastructure on amphibians. Theoretical and Natural Science, 6, 426–430.

Zipkin EF, DeWan A, Andrew Royle J (2009) Impacts of forest fragmentation on species richness: A hierarchical approach to community modelling. Journal of Applied Ecology, 46, 815–822.

(责任编委: 乔慧捷　责任编辑: 闫文杰)

附录　Supplementary Material

https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025386

附录3 层级占有率模型(HOM)与其他常见物种分布模型的比较。表格内容改编自以下文献: MacKenzie et al. (2002, 2003), Royle & Dorazio (2008), Kéry & Royle (2020), Phillips et al. (2006), Elith et al. (2011), Wood & Augustin (2002), Wood (2017)。
Appendix 3 Comparison of hierarchical occupancy models (HOM) with other common species distribution models. The table content is adapted from the following references: MacKenzie et al. (2002, 2003), Royle & Dorazio (2008), Kéry & Royle (2020), Phillips et al. (2006), Elith et al. (2011), Wood & Augustin (2002), Wood (2017).

模型类型 Model type	优势 Advantages	局限性 Limitations	适用场景 Application scenarios	参考文献 References
层级占有率模型 Hierarchical occupancy model (HOM)	显式校正不完全检测(imperfect detection), 提供无偏占有率ψ估计; 可整合多源异构数据(eDNA、相机、公民科学等); 支持动态参数估计(定殖率γ、灭绝率ε); 输出易解释、可审计的指标, 支持SCP Explicitly corrects for imperfect detection to provide unbiased occupancy (ψ) estimates; integrates multi-source heterogeneous data (eDNA, camera traps, citizen science, etc.); supports dynamic parameter estimation (colonization γ and extinction ε); provides interpretable and auditable metrics for systematic conservation planning (SCP)	需要重复调查($j \geq 3$)以估计检测率P; 计算强度较高, 尤其在大数据集时; 对假阳性处理需额外扩展(如OccPlus变体) Requires replicate surveys ($j \geq 3$) to estimate detection probability (P); high computational intensity, especially for large datasets; requires additional extensions (e.g., OccPlus) to handle false positives	不完全检测显著的监测项目; 长期动态监测与保护成效评估; 多源数据整合与群落水平分析 Monitoring projects with significant imperfect detection; long-term dynamic monitoring and conservation effectiveness assessment; multi-source data integration and community-level analysis	MacKenzie et al., 2002, 2003; Royle & Dorazio, 2008; Kéry & Royle, 2020
最大熵模型 Maximum entropy model (MaxEnt)	仅需存在记录(presence-only), 数据需求低; 对小样本稳健, 预测能力强; 计算快速, 易实现 Requires presence-only data, lowering data collection demands; robust to small sample sizes with strong predictive power; computationally efficient and easy to implement	无法校正不完全检测, 导致存在概率或适宜性高估; 无动态参数估计; 对采样偏差敏感, 需背景点校正 Cannot correct for imperfect detection, often leading to overestimation of occurrence probability or habitat suitability; lacks dynamic parameter estimation; sensitive to sampling bias, requiring background point correction	快速绘制潜在分布图; 数据稀缺或仅存在记录的物种; 大尺度宏观生态研究 Rapid mapping of potential distribution; species with scarce data or presence-only records; large-scale macroecological research	Phillips et al., 2006; Elith et al., 2011
广义加性模型 Generalized additive model (GAM)	灵活捕捉非线性环境响应; 模型选择与平滑参数估计一体化; 解释性强, 可视化好 Flexibly captures non-linear environmental responses; integrates model selection with smoothing parameter estimation; high interpretability and excellent visualization	通常不显式处理不完全检测; 对采样偏差和假阴性敏感; 计算复杂度随变量增加而上升 Generally does not explicitly handle imperfect detection; sensitive to sampling bias and false negatives; computational	探索物种与环境因子的非线性关系; 中等规模、检测率较高的数据集; 环境梯度分析与预测 Exploring non-linear relationships between species and environmental factors;	Hastie & Tibshirani, 1986; Wood & Augustin, 2002; Wood, 2017

	complexity increases with the number of variables	medium-scale datasets with high detection rates; environmental gradient analysis and prediction

参考文献

Elith J, Phillips SJ, Hastie T, Dudík M, Chee YE, Yates CJ (2011) A statistical explanation of MaxEnt for ecologists. Diversity and Distributions, 17, 43–57.

Hastie T, Tibshirani R (1986) Generalized additive models. Statistical Science, 1, 297–310.

Kéry M, Royle JA (2020) Applied Hierarchical Modeling in Ecology: Analysis of Distribution, Abundance and Species Richness in R and BUGS (Volume 2): Dynamic and Advanced Models. Academic Press, New York.

MacKenzie DI, Nichols JD, Hines JE, Knutson MG, Franklin AB (2003) Estimating site occupancy, colonization, and local extinction when a species is detected imperfectly. Ecology, 84, 2200–2207.

MacKenzie DI, Nichols JD, Lachman GB, Droege S, Royle JA, Langtimm CA (2002) Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one. Ecology, 83, 2248–2255.

Phillips SJ, Anderson RP, Schapire RE (2006) Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 190, 231–259.

Royle JA, Dorazio RM (2008) Hierarchical Modeling and Inference in Ecology: The Analysis of Data from Populations, Metapopulations and Communities. Academic Press, San Diego.

Wood SN (2017) Generalized Additive Models: An Introduction with R, 2nd edn. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton.

Wood SN, Augustin NH (2002) GAMs with integrated model selection using penalized regression splines and applications to environmental modelling. Ecological Modelling, 157, 157–177.

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25353, pages 1–8
doi: 10.17520/biods.2025353
cstr: 32101.14.biods.2025353

•生物多样性保护融资与企业参与专题•

《生物多样性公约》现行资金机制及其替代方案

王也, 王茜璐, 关婧, 王迎*

生态环境部对外合作与交流中心, 北京 100035

摘要: 全球生物多样性保护面临巨大的资金缺口, 以全球环境基金(Global Environment Facility, GEF)作为实施《生物多样性公约》现行资金机制存在法律地位不确定、治理结构不匹配、资金可及性低、受援国自主权弱等结构性缺陷, 难以满足《生物多样性公约》实施需求。本文系统梳理了GEF及其新设的全球生物多样性框架基金(Global Biodiversity Framework Fund, GBFF)的运作机制与局限性, 深入分析了缔约方关于是否新建由缔约方大会(Conference of the Parties, COP)授权的正式资金机制的立场分歧, 基于《生物多样性公约》第21条规定及谈判动态, 构建了新建全球生物多样性基金(Global Biodiversity Fund, GBF)、深度改革GEF、设立GEF下混合过渡机制3种备选方案, 并从治理结构、资金可持续性、运营效率、包容性等维度进行了可行性评估。研究旨在为建立更公平、高效、符合《生物多样性公约》宗旨的生物多样性国际履约资金机制提供科学依据, 并为在后续相关谈判中维护国家利益、弥合南北分歧提供参考策略建议。

关键词: 生物多样性公约; 资金机制; 全球环境基金; 资源调动; 昆蒙框架

王也, 王茜璐, 关婧, 王迎 (2026)《生物多样性公约》现行资金机制及其替代方案. 生物多样性, 34, 25353. doi: 10.17520/biods.2025353; cstr: 32101.14.biods.2025353.

Wang Y, Wang QL, Guan J, Wang Y (2026) The current financial mechanisms of the Convention on Biological Diversity and its alternatives. Biodiversity Science, 34, 25353. doi: 10.17520/biods.2025353; cstr: 32101.14.biods.2025353.

The current financial mechanisms of the Convention on Biological Diversity and its alternatives

Ye Wang, Qianlu Wang, Jing Guan, Ying Wang*

Foreign Environmental Cooperation Center (FECO), Ministry of Ecology and Environment (MEE), Beijing 100035, China

ABSTRACT

Background & Aims: This study aims to address the critical gap in the implementation of the Convention on Biological Diversity (CBD) by systematically analyzing the structural deficiencies of the current financial mechanism centered on the Global Environment Facility (GEF). It seeks to develop and rigorously evaluate alternative options for a new financial mechanism that operates under the authority of the Conference of the Parties (COP), as mandated by Article 21 of the Convention. The primary objective is to provide a robust, evidence-based framework to inform the ongoing international negotiations, particularly following the impasse at COP17.

Method: The research employs a qualitative comparative policy analysis, grounded in the negotiation progress of CBD, in which the author was directly involved. A structured multi-criteria assessment framework was developed, evaluating proposed mechanisms against eight key dimensions: legal coherence with the CBD, governance effectiveness, financial sustainability, operational efficiency, accessibility for Least Developed Countries, inclusivity, political acceptability, and implementation feasibility.

Results: The analysis confirms significant structural flaws in the interim GEF arrangement, including a governance misalignment with the COP, complex access procedures, and limited recipient country ownership. Three distinct alternative models were formulated and assessed: Establishing a new Global Biodiversity Fund demonstrates high legal coherence and long-term effectiveness but faces substantial political and implementation hurdles; Deeply reforming the existing GEF offers practical feasibility but yields uncertain and potentially limited outcomes in addressing core

收稿日期 Received: 2025-09-01; 接受日期 Accepted: 2025-11-06
基金项目: 国家重点研发计划(2024YFF1307600) Supported by the National Key Research and Development Program of China (2024YFF1307600)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: wangying@fecomee.org.cn

governance issues; A hybrid transitional mechanism within the GEF structure emerges as the most viable compromise, balancing political acceptability with a meaningful step toward a more accountable and accessible system.
Conclusion & Recommendation: The study concludes that a hybrid transitional mechanism represents a possible viable pathway for breaking the current negotiation deadlock. It provides a concrete foundation for a consensus at COP17 while establishing a clear trajectory for future evolution. The findings underscore that the design of any new financial mechanism must strategically balance legal ideals with political and operational realities. This research provides a critical technical foundation for Parties to make informed decisions, ultimately supporting the establishment of a fair, efficient, and effective financial mechanism for implementing the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Key words: Convention on Biological Diversity; financial mechanism; Global Environment Facility; resource mobilization; Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

据估计, 全球生物多样性资金缺口高达每年7,000亿美元, 而当前投入仅能满足需求的15%–20% (Deutz et al., 2020), 这一巨大的资金缺口凸显了改革现有资金机制的紧迫性。《生物多样性公约》(以下简称《公约》)第21条规定, 公约的资金机制应在缔约方大会(Conference of the Parties, COP)的授权下履行职责, 遵循COP指导并向其负责, 在赠与或减让条件基础上为发展中国家缔约方提供资金以实施公约。《公约》第39条指定全球环境基金(Global Environment Facility, GEF)为《公约》生效后的临时资金机制, 直至确定官方资金机制(CBD, 1992)。此后, COP一直未指定新的资金机制(CBD, 1994), 也未正式将GEF确认为官方资金机制。尽管GEF长期承担着《公约》资金机制的职能, 但其临时性地位、治理结构以及对COP决定中相关指导意见的有限响应, 始终是发展中国家缔约方关切的焦点。尽管COP15设立了全球生物多样性框架基金(Global Biodiversity Framework Fund, GBFF), 但仍被置于GEF架构下, 未能从根本上解决这些争议, 导致COP16上关于建立全新的、独立的COP授权资金机制的谈判一度陷入僵局。

国际社会对GEF运作的评论多集中于一般性批评, 缺乏对现有机制(包括GEF和GBFF)具体运作流程、治理细节的深入剖析, 以及对新建机制备选方案基于明确标准的系统性评估。本文旨在填补这一空白, 结合《公约》最新谈判进展和信息, 深入分析现有机制的结构性缺陷, 并基于《公约》目标与缔约方履约的现实需求, 提出不同的新建机制方案, 并评估其可行性, 分析各自的优势与劣势, 以及面临的挑站, 以期为后续的资金机制谈判提供详实的技术参考。

1 GEF作为资金机制的缺陷

GEF作为《公约》的临时资金机制, 其运作体系复杂, 存在多重结构性缺陷(Young, 2002), 制约了资金的有效交付和受援国的主体作用。

1.1 法律地位的不确定性

《公约》第39条明确了GEF的临时性。近30年来, COP始终未将其转为正式机制, 这种法律地位上的不确定性直接影响了资金机制的长期稳定性和可预测性。捐助方和受援方均难以对GEF的支持作出长期规划, 从根本上削弱了《公约》实施的可持续性。

1.2 治理结构与COP授权脱节

GEF的核心决策机构是其理事会, 由32个成员国代表组成, 其中出资国有较大决策权重。COP的决定对GEF仅具战略指导性, 缺乏强制约束力。这种治理结构的错位导致两个核心问题: 首先, COP的最高决策权威无法在资金机制日常运营中得到充分贯彻; 其次, 作为出资方的非缔约方(如美国)在GEF理事会中拥有重要影响力, 这被许多发展中国家视为对《公约》进程的不当干预。GBFF虽设立理事会, 但其仍在GEF整体架构内, 未从根本上改变这一权力结构。

1.3 资金申请与交付流程复杂低效

GEF的项目周期通常长达数年, 从概念形成、准备到最终批准和实施, 环节较多, 无法满足生物多样性保护的紧迫性。其申请材料要求高, 对许多能力不足的发展中国家构成巨大障碍。更重要的是, GEF强调资金撬动作用, 要求项目层面达到较高的配套资金比例(如在GEF信托基金组合层面目标为1 : 7), 这超出了许多最不发达国家和小岛屿发展中

国家的能力(CBD, 2025)。虽然GBFF取消了强制性的配套资金要求, 但其整体资金规模有限, 且仍沿用GEF的项目管理模式。

1.4 受援国自主性与国家驱动原则受损

GEF项目必须通过其认可的国际执行机构(如UNDP、UNEP等)申请和实施。这些机构在项目设计、管理和评估中扮演主导角色, 一定程度上架空了受援国政府的自主权。项目往往更多地反映执行机构的优先事项和操作规范, 而非完全契合受援国的国家生物多样性战略与行动计划(NBSAPs)和具体国情。GEF的国家联络点通常设在财政部门, 而《公约》国家联络点多在环境部门, 这种机构设置的不一致也增加了国内协调的复杂性。

1.5 资金分配存在政治化风险

GEF的资金分配并非完全基于受援国的生物多样性保护需求、绩效或紧迫性。地缘政治因素、捐资国的偏好, 以及执行机构的战略重点都可能影响资金的最终流向。这导致部分国家, 特别是那些与主要捐资国关系紧张的国家, 在获取资金方面面临额外困难, 违背了《公约》的公平原则。

2 缔约方立场分歧及原因分析

COP16上关于新建资金机制的激烈谈判, 反映了各缔约方对资金机制的控制权、有效性及公平性的根本性分歧。

2.1 发达国家缔约方: 维护现有体系与规避责任

英国、法国、日本、瑞士等发达国家反对新建机制, 理由是GEF、GBFF已存在且需时间验证成效, 并担心新机制导致融资格局碎片化。其深层考虑或在于: 首先, 作为GEF主要出资方, 希望在资金管理和分配上保留主导权, 而一个完全由COP授权的机制将削弱这种控制力。其次, 担心新建机制会带来新的、不可控的捐资压力, 倾向于在现有框架内通过渐进改革解决问题。第三, 试图将讨论推迟至2028年GBFF评估之后, 意在延缓进程。

2.2 发展中国家缔约方: 追求机制公平与资金可及性

拉丁美洲和加勒比国家集团、非洲集团等强烈要求新建符合《公约》第21条的全球生物多样性基金(Global Biodiversity Fund, GBF)。其诉求直接针对上文所述GEF的各项缺陷。其深层考虑或在于: 首先, 寻求在资金管理和分配中获得平等话语权, 实现“国家驱动”。其次, 迫切需要简化流程、降低门槛, 使资金能够更直接、快速地惠及当地保护行动者, 特别是土著人民与地方社区(Indigenous Peoples and Local Communities, IPLCs)。第三, 强调“里约三公约”中唯有《生物多样性公约》存在没有专门的资金机制这一短板, 寻求公平对待。GBFF仅运行至2030年(CBD, 2022), 也加剧了他们对长期资金安排不确定性的担忧。

3 新建资金机制对新兴经济体国家的机遇与挑战

在资金议题谈判中, 中国、巴西、印度等新兴经济体国家兼具GEF受援国和捐资国的双重属性, 新建机制对其而言机遇与挑战并存。

3.1 机遇: 争取公平规则与提升话语权

新建机制为改变由传统捐资国主导的不公平规则提供了契机。一个在COP授权下治理结构更均衡的机制, 有助于确保资金分配基于明确的、客观的标准(如生物多样性丰富度、受威胁程度、国家努力程度), 而非政治考量。这能有效遏制个别国家试图引入“毕业制度”等机制, 将新兴经济体排除在国际资金支持范围之外的倾向。新兴经济体可以凭借其不断增强的综合国力和履约实践, 在新的机制设计和规则制定中发挥关键作用, 提升其在全球环境治理中的话语权。

3.2 挑战: 潜在的捐资压力与复杂的利益平衡

新建机制通常意味着新的捐资动员。作为经济增长迅速的新兴经济体, 在国际环境中面临日益增长的捐资预期。如何在支持建立更公平机制的同时, 合理界定自身责任, 避免被施加超出发展阶段和能力的负担, 是一项重要挑战。此外, 新兴经济体内部情况多样, 利益并非完全一致, 在谈判中需审慎平衡自身利益与发展中国家阵营的整体团结。

4 新建资金机制的备选方案及可行性评估

基于《公约》第21条的法律要求和相关议题谈判情况, 本文提出3种备选方案, 并从多维度评估其可行性。评估标准包括: 法理契合度、治理有效性、资金可持续性、运营效率、对最不发达国家和

小岛屿发展中国家的可及性、包容性、政治可接受性以及实施难度与周期。

4.1 方案一: 新建全球生物多样性基金(GBF)

4.1.1 方案构想与运作机制

该方案主张建立一个全新的、独立的全球生物多样性基金(GBF)作为《公约》永久性资金机制, 类似绿色气候基金, 完全在COP的授权和指导下运营。其核心架构设计如下:

设立三层治理体系。COP为最高权力机构, 负责制定基金的战略方向、资源分配政策和大政方针; 设立一个代表权均衡的理事会(GBF Council)作为执行管理层, 由缔约方按区域公平分配席位, 并确保发展中国家占多数, 负责基金的具体运营决策、项目审批和监督; 设立独立的秘书处作为日常运营层, 负责项目的日常管理、监督和评估。为增强包容性, 设立包括IPLCs、妇女团体、青年组织、科学界及私营部门代表在内的多方咨询委员会。

建议构建多元化的资金池体系。基于《公约》第21条, 核心资金由发达国家缔约方的承诺出资款作为核心资金; 同时鼓励其他有能力的国家, 尤其是新兴经济体提供额外自愿捐款; 系统探索并纳入创新资金来源, 包括但不限于与数字序列信息(Digital Sequence Information, DSI)多边惠益分享机制挂钩的收入、从全球生物多样性相关贸易、供应链或活动中提取的微小税费或费、发行生物多样性主题的绿色债券或主权可持续发展债券, 以及来自私营部门及慈善基金会的捐资。

资金分配与项目审批建议遵循以下原则: (1)国家驱动: 资金分配首先要依据各国提交的国家生物多样性战略与行动计划(National Biodiversity Strategy and Action Plan, NBSAP), 确保符合本国优先事项。(2)简化流程: 针对不同规模项目设计差异化管理流程。对小额赠款和社区项目(如低于50万美元)采用快速审批通道, 简化申请和报告要求。(3)直接获取: 设立专门窗口和简化程序, 确保IPLCs能够直接申请和管理资金, 减少中间环节。(4)绩效导向: 部分资金可与生物多样性保护关键指标(如保护区有效管理、物种种群恢复)的达成情况挂钩, 实施基于结果的支付。

4.1.2 优势分析

该方案具有以下优势: (1)法理完备性最高, 完全符合《公约》第21条关于资金机制需在COP授权下运行的规定, 从根本上解决了GEF临时安排的法律瑕疵; (2)治理公正透明, 由缔约方主导的治理结构确保了决策的民主性和合法性, 能有效回应发展中国家长期以来的关切, 增强全球环境治理的公平性; (3)运作效率潜力大, 摆脱GEF现有管理机制的束缚, 可以全新设计高效、灵活、用户友好的项目周期和管理流程, 显著降低交易成本和时间成本; (4)资源调动创新性强, 专用于生物多样性, 有助于吸引和开拓传统的官方发展援助(Official Development Assistance, ODA)之外的新型资金流, 为填补巨额资金缺口提供长期可能性; (5)设计具备包容性, 从机制设计之初就将IPLCs、妇女和青年的参与纳入核心, 能更好地发挥其作为生物多样性守护者的关键作用。

4.1.3 劣势与挑战

作为改革程度最彻底的资金机制, 该方案亦存在一系列劣势与挑战。(1)政治阻力巨大, 发达国家出于维持现有影响力、避免新增出资压力等考虑, 可能会强烈反对此方案, 谈判达成一致的难度极高; (2)初始成本高、启动周期长, 建立全新的秘书处、治理机构和运营体系需要巨大的初始投入和较长的筹建时间(可能长达3–5年), 无法立即缓解当前资金需求; (3)资金可持续性风险高, 在初期, 能否迅速动员到足够规模、稳定可预测的资金存在不确定性, 特别是创新资金来源的落实需要复杂的国际协调和法律基础; (4)新机构需要时间建立专业团队、管理体系和信誉, 运营初期可能面临能力建设的挑战。

4.2 方案二: 深度改革现有GEF机制

4.2.1 方案构想与运作机制

此方案不另起炉灶, 而是致力于对GEF进行实质性、深层次的改革, 使其在治理、运营和问责方面最大限度符合COP的期望。改革核心领域包括:

(1)治理结构改革: 一是明确法律授权。通过COP决定和与GEF理事会协商, 修订“GEF支持《生物多样性公约》文书”或签订具有法律约束力的新谅解备忘录, 明确规定GEF在生物多样性领域的业务必须遵循COP做出的政策、战略和优先事项决定。二是增强COP监督。建立正式的年度报告和审查机制, COP有权对GEF在《公约》下的工作绩效进

行评估, 并提出具有约束力的改进要求。三是调整理事会代表性。推动GEF理事会改革, 增加发展中国家在决策过程中的实际权重和话语权。

(2)运营模式优化: 一是大幅度简化流程。对GEF项目周期进行革命性简化, 特别是针对GBFF, 目标是将项目批准时间缩短至12个月以内。推广“项目准备金”快速发放, 降低申请门槛。二是降低配套资金要求。正式取消对最不发达国家和小岛屿发展中国家的强制性配套资金要求, 对其他发展中国家的要求也应根据项目性质灵活调整, 而非僵化的比例。三是增强国家自主权。改革国际执行机构主导的模式, 强化受援国政府指定的国家实施机构的作用。推广国家执行模式, 让各国政府在选择合作伙伴、项目设计和实施方面拥有更大主导权。四是提高可及性。设立专门服务于最不发达国家和小岛屿发展中国家、IPLCs和小型项目的“专属窗口”, 提供量身定制的申请指南和技术支持。

4.2.2 优势分析

相较于方案一, 方案二为渐进式改革方案, 具有以下优势: (1)政治可行性较高, 基于现有架构改革, 阻力相对较小, 易于作为过渡性方案被各方接受, 能够较快启动实施; (2)具备一定现实基础, 可充分利用GEF已有的全球网络、管理经验、资金池和与各国政府的合作关系, 避免重复建设, 初期成本较低; (3)见效相对较快, 若改革措施到位, 能相对快速地改善资金可及性, 惠及亟待支持的保护项目; (4)资金连贯性较高, 不影响GEF正在运行的项目和已承诺的资金, 保障了支持的连续性。

4.2.3 劣势分析

该方案劣势包括: (1)改革深度有限, GEF的治理结构根深蒂固, 其理事会决策机制和捐资国主导的文化难以彻底改变, 若改革流于表面则无法满足发展中国家对平等决策权的核心诉求; (2)路径依赖风险较高, 即使有新的政策要求, GEF庞大的官僚体系和固有的工作流程可能产生强大的惯性, 导致改革措施在执行层面被打折扣; (3)协同挑战较大, GEF同时服务于多个国际环境公约, 其资源分配和政策制定需要平衡不同公约的优先事项, 可能难以完全聚焦于《公约》的特殊需求; (4)评估复杂性高, 如何客观评估改革是否足够, 并达到预期效果, 本身就是一个挑战, 可能引发新的争议。

4.3 方案三: 设立GEF框架下的混合过渡机制

4.3.1 方案构想与运作机制

此方案旨在GEF架构内创建一个在治理和运营上具有高度独立性的专门基金或资金窗口, 作为通向未来可能出现的完全独立机制的桥梁。GBFF可被视为此方案的雏形, 但需进一步强化其独立性。

(1)治理结构设计: 一是设立独立治理委员会。设立一个独立于GEF理事会的GBF (或强化GBFF)治理委员会。其成员由COP提名或选举产生, 确保区域平衡和发展中国家占主导地位。该委员会拥有对基金战略、资源分配和项目审批的完全决策权。二是制定双重报告机制。该委员会同时向COP和GEF理事会报告, 但对COP负责是首要的。COP有权任免委员会成员并制定其工作章程。三是保证多方参与。在委员会中为IPLCs、公民社会、科学界等设立常任观察员席位并赋予发言权。

(2)运作模式: 一是设置专用资金池。建立独立的记账单位, 资金与GEF其他资金分开管理, 确保专款专用。二是定制专门的操作流程。开发独立于GEF标准流程的、更简化灵活的项目申请、审批、拨付和监测评估体系。重点优化对小型项目和直接对社区支持的流程。三是由GEF提供行政服务。通过服务协议, 委托GEF秘书处(或世界银行等其他GEF执行机构作为受托人)提供行政、财务管理和后勤支持, 以降低成本, 但业务决策权完全归属独立委员会。

4.3.2 优势分析

相较方案一与方案二, 方案三改革程度最低, 更像是过渡型方案。(1)现实可操作性强, 作为过渡安排, 此方案既能实质性回应建立新机制的需求, 又避免了与现有体系的彻底决裂, 最有可能在短期内获得各方共识并付诸实施; (2)较能平衡效率与成本, 通过使用GEF的行政后勤系统, 可以大幅降低独立运营的成本, 同时通过独立的治理委员会确保决策的自主性和针对性; (3)可以为未来评估是否需要以及如何建立完全独立的基金积累宝贵的实践经验, 为未来更为彻底的改革奠定基础; (4)风险相对可控, 即使该机制运行不理想, 也限于特定窗口, 不会对整体国际环境融资架构造成过大冲击。

4.3.3 劣势分析

该方案劣势包括: (1)具有一定妥协性, 本质上

仍是在GEF框架下的改良，未改变GEF作为临时资金机制的性质，可能被部分发展中国家视为不够彻底；(2)独立性受限，在实际运作中，其独立性可能受到GEF整体政策、财务规则和机构文化的潜在制约，“独立委员会”的决策可能面临来自GEF体系的隐性压力；(3)治理复杂，双重报告机制可能导致权责不清或增加协调成本，存在治理结构复杂化的风险；(4)政治可行性较低，预计难以被非洲、拉丁美洲及加勒比等地区的发展中国家缔约方支持，谈判达成一致的难度很大；(5)可能延缓根本改革，此方案可能被发达国家用作延缓建立真正COP授权机制的策略，导致改革进程停滞于此过渡阶段。

4.4 综合比较与可行性评估

3种备选方案的可行性多维度比较如表1所示。

表1 资金机制备选方案可行性评估矩阵

Table 1 Feasibility evaluation matrix for alternative financial mechanisms

评估维度 Dimensions	方案一 Option A	方案二 Option B	方案三 Option C
法理契合度 Legal Compliance	高 High 完全符合《公约》第21条的原则，建立纯粹的COP授权机制 Fully aligned with the spirit of Article 21 of the Convention, establishing a pure COP-mandated mechanism	中 Medium 取决于改革深度，理论上可通过法律安排使其对COP负责，但历史表明难度极大 Dependent on the depth of reform; in theory, legal arrangements can make it accountable to the COP, but historical experience shows significant challenges	中–低 Medium-Low 仍从属于GEF架构，是法律上的妥协产物, COP的直接授权被稀释 Still under the GEF framework, a product of legal compromise that dilutes the direct mandate of the COP
治理有效性 Governance Effectiveness	潜力高 High potential 全新的、以缔约方为主体的治理结构，决策链清晰，问责对象明确 New governance structure centered on Parties, with clear decision-making chains and defined accountability	不确定 Uncertain 效果高度依赖于GEF及其成员国的改革意愿和执行力度，存在较大不确定性 Effectiveness highly relies on the reform willingness and implementation capacity of the GEF and its member states, with substantial uncertainties	中 Medium 独立委员会能提升决策针对性，但仍受GEF大环境制约，有效性介于二者之间 An independent committee can enhance decision-making relevance but remains constrained by the overall GEF environment, with effectiveness between the other two options
资金可持续性 Financial Sustainability	长期潜力高，短期不确定 High long-term potential, uncertain short-term 具备开拓新资金来源的机制灵活性，但初期动员传统捐资面临挑战 Mechanistic flexibility to explore new funding sources, but faces challenges in mobilizing traditional donations initially	高 High 依托GEF成熟的增资周期和资金池，短期资金稳定性最好 Leveraging the GEF’s mature replenishment cycles and fund pool, ensuring the strongest short-term financial stability	高 High 可共享GEF的资金基础，同时有机会吸引指定用于该窗口的捐资，稳定性较好 Can share the GEF’s financial base while attracting earmarked donations for the window, with good stability
运营效率 Operational Efficiency	潜力高 High potential 无历史包袱，可从头设计最简化的流程，交易成本有望最低 No historical baggage, enabling the design of streamlined processes from scratch with the lowest expected transaction costs	中 Medium 只能在现有复杂体系上做“减法”，效率提升空间有限，且易受官僚惯性影响 Only incremental improvements (“subtractions”) can be made to the existing complex system, with limited room for efficiency gains and vulnerability to bureaucratic inertia	中 Medium 可设计独立流程，但行政服务依赖GEF，效率提升可能受制于后台服务支持体系 Independent processes can be designed, but administrative services depend on the GEF, and efficiency improvements may be constrained by backend support systems
最不发达国家可及性 Accessibility for the Least Developed Countries (LDCs)	潜力高 High potential 可为最不发达国家设计极度简化的专项通道 Can design highly simplified special channels for LDCs	中 Medium 改革后可改善，但受制于GEF整体资源分配规则，能否实现根本性改善存疑 Improvements possible post-reform, but fundamental changes are questionable due to constraints from the GEF’s overall resource allocation rules	中 Medium 可通过独立委员会的规则倾斜予以支持，效果取决于委员会的政策倾向 Support can be provided through preferential rules by the independent committee, with effectiveness depending on the committee’s policy orientation
包容性(IPLCs等) Inclusiveness (IPLCs, etc.)	潜力高 High potential 可将包容性参与直接嵌入新机制的设计中 Inclusive participation can be directly embedded in the design of the new mechanism	中 Medium 需通过主动政策纳入，在现有GEF文化中推动深层包容性变革挑战较大 Requires proactive policy integration; driving deep inclusive transformation within the existing GEF culture is highly challenging	中 Medium 独立委员会机制为纳入多元声音提供了结构可能性，效果取决于委员会构成和意愿 The independent committee mechanism provides structural possibilities for incorporating diverse voices, with effectiveness depending on the committee’s composition and willingness

表1 (续) Table 1 (continued)

评估维度 Dimensions	方案一 Option A	方案二 Option B	方案三 Option C
政治可接受性 Political Acceptability	低 Low 发达国家反对意愿强烈，是目前谈判陷入僵局的主要原因 Strong opposition from developed countries, the primary cause of the current negotiation deadlock	中 Medium 存在谈判空间，发达国家可能接受有限度的改革以避免更激进的方案 Negotiation space exists; developed countries may accept limited reforms to avoid more radical proposals	低–中 Low–Medium 较难为发展中国家缔约方接受，特别是非洲国家和拉加国家。但有可能成为发展中国家妥协下的选择 Difficult for developing country Parties to accept, especially African and Latin American and Caribbean (LAC) countries, but may serve as a compromise option for developing countries
实施难度与周期 Implementation Difficulty & Timeline	高 High 需完成复杂的国际谈判、机构筹建工作，周期长(3–5年或更长) Requires complex international negotiations and institutional establishment, with a long timeline (3–5 years or more)	中–高 Medium–High 改革谈判同样复杂，且执行层面阻力大，但可利用现有架构起步 Reform negotiations are equally complex with significant implementation resistance, but can leverage existing frameworks to initiate	低–中 Low–Medium 可在现有GEF框架下通过COP决定较快启动(1–2年内)，实施门槛最低 Can be quickly launched (within 1–2 years) through COP decisions under the existing GEF framework, with the lowest implementation threshold

评估标准包括法理性、治理效能、资金可持续性、运营效率、对最不发达国家的可及性、包容性、政治可接受度及实施难度。

4.5 讨论

3种备选方案体现了国际环境治理中不同的制度设计理念。方案一代表了机制创新的理想模式，强调制度的专门性和适配性；方案二体现了路径依赖下的渐进改革思路；方案三则反映了现实政治约束下的妥协策略。

评估结果显示，各方案在不同维度的表现存在显著差异。方案一在法理契合度和长期效能方面优势明显，可能产生最大的制度效益，但面临巨大的政治阻力和实施挑战。方案二边际改进成本较低，具有较高的现实可行性，但改革深度和效果存在不确定性。方案三在实施效率方面表现突出，但法律地位和长期效能存在顾虑。研究发现，完全理想化的方案(方案一)在当前的国际政治环境下可行性较低，而过于保守的方案(维持现状)又无法满足《公约》实施的需求。因此，基于混合过渡机制的渐进式改革路径有可能成为发展中国家妥协后的过渡型选择，尽管其在理论层面并非完美。

5 总结与展望

5.1 主要研究结论

本研究通过系统分析《公约》框架下资金机制的现状与问题，构建了3种具有代表性的改革方案，并采用多维度评估框架进行了深入分析，得出以下主要结论：(1)现行以GEF为核心的临时资金机制存在显著制度缺陷。其治理结构未能充分体现缔约方大会的最高决策权威，资金审批流程复杂且周期冗长，受援国在项目实施过程中的自主性受到制约。GBFF的设立虽在一定程度上回应了发展中国家的关切，但未能从根本上解决机制设计的结构性问题。(2) 3种备选方案在法理基础、实施难度和预期效果方面各具特点。新建GBF的方案最具法理正当性但面临较大政治阻力；深度改革GEF方案具有较强的现实可行性但改革效果存在不确定性；混合过渡机制方案在制度创新与路径依赖之间实现了一定程度的平衡，有可能成为现实情况下各方妥协后的选择。(3)资金机制改革需要统筹考虑制度设计与实施路径。理想的资金机制应当建立清晰的问责机制、简化的操作流程和包容的治理结构，同时需要设计切实可行的过渡安排和评估机制，确保改革进程的稳健性和可持续性。

5.2 理论贡献与实践价值

本研究的理论贡献主要体现在3个方面：(1)构建了国际环境协议资金机制的多维度评估框架，为相关领域的比较制度分析提供了方法论借鉴；(2)提出了“渐进式制度创新”的理论框架，丰富了全球环境治理制度变迁的研究视角；(3)深化了对国际环境治理中权力结构、制度设计与政策绩效之间复杂关系的理论认识。

在实践层面，本研究为《公约》COP16后的谈判进程提供了重要参考。研究明确了机制改革的关键要素和优先序列，提出了可行的过渡安排方案，为各方寻求共识提供了技术支撑。特别值得注意的

是, 机制设计充分考虑了不同发展阶段国家的需求和能力差异, 有助于增强未来资金机制的包容性和有效性。

5.3 未来研究展望

基于本研究的成果和不足, 未来研究可在以下方面继续深化: (1)加强融资机制与保护成效的关联性研究。应建立更加完善的评估指标体系, 通过实证研究方法量化分析不同资金机制对生物多样性保护实效的影响路径和作用机制, 为机制优化提供科学依据。(2)深入探索创新性融资工具的制度化路径。重点研究DSI惠益分享、生物多样性信用机制、可持续发展债券等新型融资方式与现有资金体系的衔接问题, 提出具体可行的制度设计方案。(3)亟需开展国别案例的比较研究。通过对不同区域、不同发展水平国家在资金获取、使用和管理方面的实践经验进行系统总结, 提炼具有普适性的制度设计原则和最佳实践模式。(4)关注新兴经济体在全球环境治理中的角色演变。深入研究新兴经济体在资金机制转型过程中的独特诉求、潜在贡献和参与路径, 为推动建立更加公平合理的全球环境治理体系提供理论支持。此外, 随着数字技术的快速发展, 未来研究还应关注大数据、人工智能等新技术对生物多样性融资机制的创新性影响, 探索建立更加智能、透明、高效的资金管理和监督体系。

建立符合《公约》宗旨、适应各方需求、顺应时代发展的资金机制, 是实现“人与自然和谐共生”2050年愿景的重要制度保障。这一进程既需要各缔约方展现政治智慧和合作精神, 也需要学术研究提供持续的理论支撑和技术支持。中国作为全球生态文明建设的重要参与者和贡献者, 可在资金机制改革进程中发挥建设性作用, 为推动建立公平合理、合作共赢的全球环境治理体系作出积极贡献。

参考文献

CBD (Convention on Biological Diversity) (1992) Convention on Biological Diversity. Rio de Janeiro: United Nations. https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-392025-07-31. (accessed on 2025-07-31)

CBD (Convention on Biological Diversity) (1994) Financial Mechanism of the CBD. https://www.cbd.int/decisions/cop?m=cop-012025-07-31. (accessed on 2025-07-31)

CBD (Convention on Biological Diversity) (2022) Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. CBD/COP/DEC/15/4. https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf. (accessed on 2022-12-20)

CBD (Convention on Biological Diversity) (2025) Resource mobilization and financial mechanism. CBD/COP/16/L.31/Rev.1, 2025. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.cbd.int%2Fdoc%2Fc%2Fb63f%2F17ad%2F4f41a3f3adf119f9903a01dc%2Fcop-16-l-31-rev1-en.docx&wdOrigin=BROWSELINK. (accessed on 2025-12-31)

Deutz A, Heal GM, Niu R, Swanson E, Townshend T, Zhu L, Delmar A, Meghji A, Sethi SA, Tobin-de la Puente J (2020) Financing Nature: Closing the Global Biodiversity Financing Gap. The Paulson Institute, The Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability.

Young Z (2002) A New Green Order? The World Bank and the Politics of the Global Environment Facility. Pluto Press, London.

(责任编委: 徐靖　责任编辑: 周玉荣)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE
2026, 34 (1): 25187, pages 1–14
doi: 10.17520/biods.2025187
cstr: 32101.14.biods.2025187

•生物多样性保护融资与企业参与专题•

国外生物多样性抵消研究现状和对策

田璐瑶[1,2,3]，尹豪[1,3*]

1. 北京林业大学园林学院，北京 100083; 2. 济南职业学院，济南 250103; 3. 北京林业大学城乡生态环境北京实验室，北京 100083

摘要：随着生物多样性保护压力激增和生物多样性零净损失(no net loss, NNL)目标提出，生物多样性抵消(biodiversity offsetting, BO)作为缓解等级(mitigation hierarchy)的最后一步在欧美迅速开展，成为解决生物多样性保护经济压力大、社会参与度不足、开发与生态空间相互冲突等问题的途径。本文通过综述国内外的研究现状及国外BO项目概况，分析我国在该领域的研究和实践差距，辨析相关概念内涵，探明项目实施路径；通过总结国外BO核算量化、提升附加性、完善强制性框架、保障长期性等4方面的关键问题及策略，为我国BO提供理论依据和实践经验；最后，提出应明确BO地位和实施路径、推动BO实施、加强BO效能优化研究等3方面的建议，以期进一步完善我国生物多样性保护体系，构建适应性强的BO框架。

关键词：生物多样性抵消；缓解等级；核算量化；生物多样性保护；零净损失

田璐瑶，尹豪 (2026) 国外生物多样性抵消研究现状和对策. 生物多样性, 34, 25187. doi: 10.17520/biods.2025187; cstr: 32101.14.biods.2025187.
Tian LY, Yin H (2026) The current situation and countermeasures of biodiversity offsetting studies abroad. Biodiversity Science, 34, 25187. doi: 10.17520/biods.2025187; cstr: 32101.14.biods.2025187.

The current situation and countermeasures of biodiversity offsetting studies abroad

Luyao Tian[1,2,3], Hao Yin[1,3*]

1 *School of Landscape Architecture, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China*
2 *Jinan Vocational College, Jinan 250103, China*
3 *Beijing Laboratory of Urban and Rural Ecological Environment, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China*

ABSTRACT

Backgrounds & Aims: With the surging pressure on biodiversity conservation and the proposal of no net loss (NNL), biodiversity offsetting (BO) as the final step of the mitigation hierarchy, has been rapidly implemented in Europe and America, becoming a way to address the economic pressure of biodiversity conservation, insufficient social participation, and the contradiction between land development and the encroachment on ecological land.
Review & Results: This paper reviewed the current research status in China and abroad and the overview of foreign BO projects, analyzed the gap in research and practice in China, distinguished the connotations of related concepts, and clarified the implementation paths of the projects. By summarizing the key issues and strategies in four aspects, namely, quantification of BO accounting abroad, enhancement of add-ons, improvement of mandatory frameworks, and guarantee of long-term nature, it provided theoretical basis and practical experience for BO in China.
Suggestions: Three suggestions are put forward: clarifying the status and implementation path of BO, promoting the implementation of BO, and strengthening the research on the optimization of BO efficiency, with the aim of further improving China's biodiversity conservation system and constructing a highly adaptable BO framework.
Key words: biodiversity offsetting; mitigation hierarchy; accounting quantification; biodiversity conservation; no net loss

20世纪70年代，全球环境运动兴起，国家、保护组织通过制定法律政策、发起保护运动和组织保护行动等方式推动生物多样性抵消(biodiversity offsetting, BO)萌芽。如美国1972年通过《清洁水

收稿日期 Received: 2025-05-19; 接受日期 Accepted: 2025-12-01
基金项目：北京林业大学热点追踪项目(2022BLRD05)和北京市共建项目(2019GJ-03) Supported by the Beijing Forestry University Hot Topics Tracking Project (2022BLRD05) and Beijing Municipal Co-construction Project (2019GJ-03)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: yinhao@bjfu.edu.cn

法》(Clean Water Act), 要求开发项目对湿地破坏进行补偿; 世界银行(World Bank)和国际金融公司(International Finance Corporation, IFC)要求受资助项目采取生物多样性补偿措施。21世纪全球生物多样性丧失速度加速, 城市扩张、基础设施建设等使保护压力激增(Le et al., 2024), 自2010年《生物多样性公约》提出生物多样性零净损失(no net loss, NNL)的目标, 及2012年商业与生物多样性补偿项目(Business and Biodiversity Offsets Programme, BBOP)发布《生物多样性抵消标准》以来, 生物多样性抵消作为减少生物多样性损失的重要手段在欧美范围内被广泛使用(Pope et al., 2021), 并成为政策立法的对象、金融资助的条件(World Bank, 2017)及保护项目的重要指导措施(Rainey et al., 2015; Maron et al., 2025)。如澳大利亚的《环境和生物多样性保护法》(Environment Protection and Biodiversity Conservation Act, EPBC Act)、欧盟的《栖息地指令》(Habitat Directive)以及英国的《生物多样性抵消指南》(Biodiversity Offsetting Guidance)等, 均将抵消机制纳入法律框架; 世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)与国际矿业和金属理事会(International Council on Mining and Metals, ICMM)等合作制定了BO指南。

而我国在BO领域起步较晚, 2014年《环境保护法》的修订首次提出与BO相关的“生态补偿”概念, 但对BO研究较少, 且主要从生态补偿角度研究对生物多样性影响的经济性补偿。虽然BO被质疑存在很多不可避免的局限性(Moreno-Mateos et al., 2015; Shmelev, 2025), 但仍有大量研究表明基础设施发展等人为土地利用所造成的生态损失会通过大规模采用BO而得到遏制(Willemen et al., 2020)。且我国正处在城市存量时代, 既面临城市化发展与生态保护的冲突矛盾, 又面临提质增效、生态文明建设、可持续发展等发展挑战。鉴于此, 基于国外较为成熟的发展经验和相对丰富的研究成果, 本文旨在通过辨析BO的相关概念、分析其国内研究现状和国外研究经验, 厘清该领域的关键问题和国外可借鉴的有效策略, 以期为我国生物多样性保护和生态环境建设提供思路和路径。

1 国内外生物多样性抵消研究现状

文献来源于Web of Science核心数据库和中国知网, 搜索主题词为“生物多样性抵消”(biodiversity offsetting)、“生物多样性补偿”(biodiversity compensation), 文献类型限定为“研究论文”(article), 文献搜索截止时间设定为2025年3月。首先通过人工筛选剔除不相关文献, 再依据纳入文献的参考文献进行追溯, 以补充相关研究。

1.1 我国研究及应用现状

共检索到中文文献34篇, 我国相关研究从2004年起步, 学科领域集中于环境科学、生物学和法学, 研究领域集中于生态补偿中的经济补偿方式及其市场机制和法律机制, 仅有5篇提到BO所涵盖的生境和物种补偿, 可见对生态补偿的研究尚不全面, 对BO的研究严重不足。

从我国近年政策看, 2021年出台的《关于进一步加强生物多样性保护的意见》、2022年发布的《国家公园空间布局方案》均明确提出探索关于生物多样性保护的相关补偿机制。2024年颁布的《生态保护补偿条例》界定“生态保护补偿”为“通过财政纵向补偿、地区间横向补偿、市场机制补偿等机制, 可以采取共建园区、人才培训、购买生态产品和服务等多种补偿方式”。这表明我国亟需通过补偿的多种策略, 探索补偿在自然保护地体系建设、生态保护红线补偿制度、自然资源有效保护和利用等方面的应用。

从我国相关实践看, 主要对森林、草原、湿地、荒漠、海洋、水流、耕地等生境类型进行补偿, 如长江、新安江、九洲江等流域(李皓芯等, 2022), 及天然林保护工程和退耕还林还草工程。在生物多样性补偿方面, 我国在青藏铁路工程中, 将政府补偿资金用于植被修复、动物通道建设; 在云南西双版纳通过向村民发放政府补偿金, 引导社区参与亚洲象(*Elephas maximus*)保护及其栖息地的修复; 在四川大熊猫国家公园, 通过设立生态公益岗位, 补偿社区居民经济损失。这表明我国生态补偿以政府经济补偿为主, 并在政府主导下探索生态修复、社区参与等补偿方式, 未明确开展BO。

1.2 国外研究及应用现状

共检索到英文文献575篇, 国外相关研究从20

世纪末开始起步，2014年以后每年发文量超过100篇，自2019年开始每年发文量超过150篇(图1)。学科领域集中于环境科学、生物学和气象学，发文量最多的国家依次为美国、英国和澳大利亚。研究内容以BO损益量化和模型预测、相关的社会问题和政策框架、市场运营机制及金融工具、效益与评估、利益相关者参与和社会公平等为主，而气候变化对补偿项目的影响、BO中的碳排放问题、景观层面的BO方案设计也成为近年研究热点。

从政策情况来看，截至2019年，至少37个国家强制性实施BO政策(World Bank, 2020)，2020年后全球生物多样性框架已将NNL作为重要策略(CBD, 2021)，而BO在实现生物多样性NNL和净增益(net gain, NG)目标方面发挥着重要作用(Gelcich et al., 2017)。从实践情况来看, BO多针对湿地、森林、草地等陆地生境，较少涉及海洋，且主要用于大型公共基础设施项目，如大型采掘业、交通基础设施建设、大坝及运河建设、电力设施建设、城市扩张等(World Bank, 2016)。全球有超过15万km^{2}的抵消项目已完成或正在实施(Bull & Strange, 2018)。

2 国外生物多样性抵消项目概述

2.1 相关概念

BO旨在使生物多样性增加，以补偿造成的剩余损失，即采取预防措施并遵照缓解等级(避免、最小化、修复、抵消)后，仍长期持续的可衡量结果。它的目标是在物种组成、栖息地结构、生态系统功能，及经济、文化价值等生态系统服务方面实现NNL，最好实现净增益(Grimm & Köppel, 2019)。它旨在满足生物多样性保护需要的同时，又实现市场机制对生物多样性资源的有效利用(Apostolopoulou et al., 2019)。




图1 国外生物多样性抵消研究的逐年发文量
Fig. 1 The annual number of articles published abroad on biodiversity offsetting

与BO相关的概念还有生态补偿(ecological compensation)、生物多样性信用(biodiversity credits)、生物多样性银行(biodiversity banking)。生态补偿指对生态系统结构和功能造成的损失进行物理补偿或经济补偿，与BO相比对象更宽泛且以生态系统为主(BBOP, 2012)，“compensation”定义为发生权衡的情景，多指生态保护与经济发展的权衡，而“offsetting”强调生物多样性无净损失(Grimm & Köppel, 2019)；澳大利亚新南威尔士州将生物多样性信用定义为用于生物多样性抵消计划(biodiversity offsets scheme)以衡量生物多样性损益的单位(NSW Government, 2024)，而当前国际主流观点，如生物多样性信用联盟(Biodiversity Credit Alliance, BCA)则将生物多样性信用定义为生物多样性长期获得额外成果的量化单位，旨在成为资助生物多样性保护与恢复的机制(BCA, 2024)，当BO用于衡量生物多样性损失时，强调生物多样性在类型和数量上的等同性(BCA, 2025)；生物多样性银行旨在将物种及栖息地价值以生物多样性信用的形式储存在银行账户中，并在监督下以信贷方式出售(李京梅等, 2023)。

综上, BO更强调以生态等价性、可替代性、可逆性为前提，将不得已损害的生物多样性附加于其他保护措施，进行预期可验证且长期的生物及物理补偿(Mann, 2015)，有别于生态补偿，BO可利用经济方式权衡补偿(表1)。因此为防止BO被作为应付环境影响评估的形式，或利用购买途径摆脱环境危害的机会，在各国抵消政策和项目推动下确立了“BBOP十项科学原则” (BBOP, 2018)，旨在剔除不能抵消的范围，确定需抵消的栖息地、物种、生态系统服务等可验证的生物多样性阈值和范围，并增加BO的净增益、参与性、透明性、公平性、永久性、附加性，促进BO成为延缓生物多样性损失的有力举措。

2.2 BO项目实施步骤

BO试点项目需在规划前依据生物多样性NNL要求，整体评估项目对生物多样性的影响并逐项量化生物多样性损失，然后应用缓解等级并将BO作为缓解等级的最后一步(UK Government, 2013)。具体措施有(图2)：(1)避免：避免项目对生物多样性影响，

表1　生物多样性抵消和生态补偿比较

Table 1　Comparison of biodiversity offsetting and ecological compensation

名称 Name	生物多样性抵消 Biodiversity offsetting (BO)	生态补偿 Ecological compensation
对象 Subject	生物多样性: 物种组成、栖息地结构、生态系统功能及其他与生物多样性相关的经济、文化价值等生态系统服务 Biodiversity: species composition, habitat structure, ecosystem function, and other economic and cultural values related to biodiversity and other ecosystem services	生态系统结构和功能 Ecosystem structure and function
补偿形式 Compensation form	经济可作为中介，强调生态等价的生物、物理补偿 Economy can act as an intermediary, emphasizing the biological and physical compensation of ecological equivalence	物理补偿、经济补偿 Physical compensation, economic compensation
原则与目标 Principles and objectives	• 遵循“缓解等级”，作为最后手段 Follow the “mitigation hierarchy” as a last resort • 生物多样性零净损失或净增益 Biodiversity no net loss (NNL) or net gain (NG)	平衡保护与发展的利益分配 Balance the distribution of benefits between protection and development
挑战 Challenge	• 生态等价性、可替代性、可逆性 Ecological equivalence, substitutability and reversibility • 强制执行 Compulsory enforcement • 滞后性 Lag • 不确定性 Uncertainty • 核算量化 Accounting quantification • 资金筹措 Fund raising	• 可持续性 Sustainability • 缺乏资金 Lack of funds
好处 Benefits	减缓生物多样性损失 Slow down the loss of biodiversity	直接经济补偿不存在滞后性 There is no lag in direct economic compensation
争议点 Points of dispute	• 生态具不可替代性、脆弱性 Ecology is irreplaceable and fragile • 与生物多样性配套的经济、文化等生态系统服务价值受损 The value of ecosystem services such as economy and culture that are associated with biodiversity have been impaired • 无法达到零净损失实效 Cannot reach NNL of actual effect • 作为应对环境影响评估的形式或利用购买途径摆脱环境危害的机会 As a response to the environmental impact assessment form or use the opportunity of purchase way to get rid of environmental hazards	• 经济与生态权衡标准难定 It is difficult to determine the balance between economy and ecology • 资金压力大，缺乏可持续性 There is great financial pressure and a lack of sustainability • 利益分配不公 Unfair distribution of benefits




图2　生物多样性抵消实施步骤和原则

Fig. 2　The implementation steps and principles of biodiversity offsetting

如取消或更改项目部分规划方案。(2)最小化: 最小化项目对生物多样性的影响，修改项目规划、施工方案，以降低对生物多样性的影响，并制定物种的临时安置、逃脱、保护方案等管理方案，如采取定

向森林砍伐方案, 让可迁移的野生动物有逃脱机会(World Bank, 2016); 临时安置难迁移动物、移植高价值植物; 对灌木丛、表土回收, 用于后期恢复工作; 设置河岸带缓冲区、加强污染排放管控、减少夜间照明等, 以减少对野生动物的干扰。(3)恢复: 在项目施工中和施工后, 进行分期、分区的生态恢复工作, 并制定恢复计划, 如恢复土壤、重新栽植树木。(4)抵消: 对于剩余的不利影响, 需采取BO措施。

BO的实施步骤和对应挑战主要包括: (1)确定BO可行性: 需界定其生态等价性、可替代性、可逆性, 介于BO具有不确定性特点, 还需确保其具有等效性、长期性、附加性。(2)制定BO方案: 需满足BO的等效性要求, 采取核算量化、资金筹措等措施, 并通过提高其附加性, 制定长期规划管理方案, 以削弱其滞后性, 增强等效性。(3)实施与管理: 应通过提升强制性、公平性、透明性、参与性、永久性, 以实现NNL (表2)。

2.2.1 确定可行性

BO实施可行性包括政策背景支持和项目可行性评估两个方面。首先需要相关政策和运行机制支持, 包括强制性法律规定缓解等级的实施范围和力度(Barral et al., 2025); BO实施的规程和市场环境营建, 如规范BO规划、公开咨询、认证、审查等系列规程, 建立生物多样性信用评估和登记制度等; 将BO纳入自然资源、生物多样性保护等领域的法律法规和规划范畴, 实现多规合一, 并划定可用于BO的生态价值高的优先区域。

其次需评估项目可行性: (1)确保损失的生物多样性具生态等价性、可替代性、可逆性, 由于自然系统的复杂性、演化的历史性、生命网络的相互依存性(陈志刚和王宇飞, 2023), 生态价值具不同程度的独特性, 因此需基于人类开发必要性程度, 依据生态价值的独特性等级(Maron et al., 2016), 实施BO (图3)。例如在英国HS2高铁线路建设中, 因较强的开发必要性而试图抵消所侵占的具高独特性的古老林地生境, 尽管已应用土壤迁移等多种举措且恢复时间长达32年, 但抵消效果仍未知(CESINE, 2013), 因此抵消效果并不成功。可见对于独特性强、较为脆弱的生境应采取避免的缓解措施; 对于具可逆性生境, 如河岸带、灌木丛等可采取最小化的缓解措施, 通过施工期间的临时保护最小化干扰, 使生境自行恢复; 对于具可替代性的生境如林地等可采取恢复的缓解措施, 在干扰后采取人工修复手段。而对于湿地、人工林等具较高生态恢复率和生态等价性的生境, 在基于较强人类开发必要性的前提下, 占用后才采取抵消的缓解措施, 具更高的抵消成功率(Jones et al., 2018)。(2)确保抵消地点和活动不受土地权属、政治、社会经济和安全等因素限制。(3)确保实施抵消可以有足够的等效性、长期性和附加性, 因BO在效果和时间上具有不确定性, 需通过法律、协议、监管和核算量化等手段确保BO的实效和持续地执行力度, 并通过增加除生物多样性外的其他生态价值、文化价值和社会价值等附加价值, 增加BO执行的信心和参与度。

表2 生物多样性抵消(BO)的步骤、挑战和关键措施

Table 2 Steps, challenges and key measures for biodiversity offsetting (BO)

BO采取的步骤 BO process	BO面临的挑战 BO challenges	关键措施 Key measures
确定BO可行性 Determine the feasibility of BO	界定其生态等价性、可替代性、可逆性 Determine its ecological equivalence, substitutability and reversibility	依据生态价值的独特性等级, 基于人类开发必要性程度 Based on the unique levels of ecological value and the degree of necessity for human development
	不确定性 Uncertainty	确保BO等效性、长期性、附加性 Ensure the equivalence, long-term nature and additionality of BO
制定BO方案 Formulate the BO plan	等效性 Equivalence	核算量化、提高附加性 Accounting and quantification, and enhance the additionality
	滞后性 Lag	制定长期规划管理方案 Formulate a long-term planning and management scheme
	成本压力 Cost pressure	做好预算和风险评估、资金筹措 Make a good budget and risk assessment, as well as raise funds
实施与管理 Implementation and management	生物多样性零净损失 Biodiversity no net loss (NNL)	提升此阶段的强制性、公平性、透明性、参与性、永久性 Enhance the enforceability, fairness, transparency, participation and permanence of this stage

2.2.2 制定方案

生物多样性损失核算量化并制定BO方案包括选址、根据抵消内容制定规划管理方案。(1)选址需满足BO的等效性要求，优先选择就地抵消，即选择原地、临近或同一区域，可最大程度利用被破坏地的土壤、气候和植物群落等生态资源，以满足生态等价性要求；其次可选择迁地抵消，优先选择具保护价值的区域，具改善、联通和修复价值的区域(World Bank, 2016)，及具补偿物种所需栖息地类型的区域，以提升BO在景观层次中的规划作用等附加性(zu Ermgassen et al., 2019)。(2)根据抵消内容制定规划管理方案首先需要确定具体活动投入，包括实地投资、生境修复营建、特定物种管理、社区赔偿与支持等，如产权面积、基础设施、所需人员和材料等，并考虑BO附加性内容，如通过扩大抵消生境范围和增加目标物种种类，增加补偿生境连通性和异质性等增加生态附加性，通过提升社区生计福祉、多方合作和科普宣教等增加经济和文化附加性(World Bank, 2016)；其次应明确机构责任，并制定抵消时间框架，以高效合作并把握抵消进度；最后应做好预算和风险评估、资金筹措方案，以应对BO滞后性带来的累积成本压力(图4)。




图3 评估生物多样性抵消实施可行性
Fig. 3 Accessing feasibility of biodiversity offsetting

2.2.3 实施与管理

实施与管理需依靠强制性规范流程，通过增加立法和监察的公平性、透明性，提高实施过程参与性和监测管理永久性，从而实现NNL甚至NG目标。流程主要包括前期依法进行生物多样性信用登记、评估、认证，开发商履行BO义务，后续评估审查等(BBOP, 2012)。

当土地被占用时，土地所有者可申请土地的生物多样性信用评估，从而获得BO政策的补偿(袁国华等, 2020)。一般会在登记、资格审定后，由相关




图4 根据抵消内容制定规划管理方案
Fig. 4 Develop a planning management scheme based on the offsetting content

专家和机构评估土地的生物多样性信用并进行认证, 开发商根据生物多样性信用支付补偿费用并履行其他补偿义务。后续相关部门应联合专业机构对BO项目执行监察、结果监测、跟踪管理和定期评估。

3 国外生物多样性抵消关键问题及策略

BO旨在取得经济发展和生态保护间平衡, 一方面作为开发项目的“许可证”, 使开发商为生物多样性损失付费, 有效将生态成本内部化; 另一方面作为缓解等级的最后步骤, 使开发必要性极大的项目, 通过BO弥补生态损失, 实现开发目的。同时BO作为实现NNL甚至NG目标的重要举措, 还有利于完善生态网络、增加就业机会、创建绿色市场和可持续发展, 但同时BO的效益高度依赖高效与实效结合的核算量化方法、附加性考量、强制性执行框架和长期性保障4个关键问题及相关策略(表3)。

3.1 核算量化问题及策略

界定、测量、匹配生物多样性损失和收益是BO的关键问题(zu Ermgassen et al., 2019), 但在核算量化的适用性指标、原则和等效性方法等方面仍然存在学术争议(Maron et al., 2016)。由于生物多样性层次结构复杂、功能多样, 具有尺度依赖性、空间异质性、时间动态性、相互作用性以及不同程度的脆弱性和恢复力, 同时与经济、文化和生态系统服务间存在关联, 所以核算量化生物多样性损失和收益的范围、指标和阈值具有复杂、难以测量和不可互换等特点(Studeny et al., 2011)。

由于无法精准衡量和准确预测生物多样性损失和收益, 有学者指出BO本质具简化特征和可操作性, 应依赖易测量的少数指标(Bull et al., 2013; Raihan, 2024)和通用的生物多样性抵消比率(biodiversity offset ratio)/生物多样性抵消乘数(biodiversity offset multipliers) (Defra, 2013), 即一个使生物多样性收益大于损失的系数(Bull et al., 2013)。尤其对于小型项目, 应使用面积乘以通用抵消比率的快速评估方法计算损益(World Bank, 2016), 其优点是简单高效、成本低, 缺点是忽略其他生物多样性特征、生态系统质量变化等。

但过度简化会无法达到BO目的, 因此常见的生物多样性抵消比率会根据生境相关指标(包括生境的面积、质量、结构等)变化。例如, 澳大利亚常用的栖息地公顷法(Moilanen & Kotiaho, 2018), 主要考虑生境的结构和功能指标, 包括生境的承载物种价值、景观连通性、斑块大小等, 将生境价值划分为非常高、高和中3个等级, 并分别对应2、1.5和1的抵消比率; 英国矩阵法同样根据生境状况、独特性和战略意义制定了更详细的抵消比率计算标准, 并额外考虑了技术难度、时间和空间3方面的风险因子(CIEEM, 2023); 南澳大利亚的重大环境效益(significant environmental benefit, SEB)方法根据生境的植被状况、保护意义、景观背景评级(landscape context rating, LCR)、植被实际损失程度制定抵消比率, 并根据修复情况额外增加抵消比率, 具灵活性并较为重视植物保护, 同时根据LCR确定抵消地点, 给出了生物多样性收益的计算方法(South Australia, 2025)。以上主要根据生境质量制定抵消比率的方法均具透明度高、灵活性强和便捷高效的优点, 但只适用于具非珍稀物种、独特性低的生境, 且存在指标较为主观、评分粗糙、忽视其他生态系统价值评估、缺少社会和文化等影响度量以及对生物多样性增益指导不足等缺点。

对于影响重要物种迁徙、繁殖、捕食等栖息活动的开发计划, 其抵消需核算反映种群生存能力或持久性的指标。例如, 矿业公司Rio Tinto-QMM开发的优先级物种全球分布度量单位(unit of global distribution metric) (World Bank, 2016), 就是根据物种的分布范围、特异性、濒危度和生境依赖度评分, 对高分物种分配更大的抵消比率; 美国栖息地评估程序(habitat evaluation procedures, HEP)是根据目标物种的生境需求构建栖息地适宜性指数(habitat suitability index, HSI)模型, 并根据栖息地适宜性指数制定抵消比率; 美国资源等效分析(resource equivalency analysis, REA)根据物种数量、生物量和栖息地面积等资源实施等效抵消。以上方法主要根据目标物种制定抵消策略, 充分考虑了物种的生态价值, 但对于景观层面和生态系统层面的生态功能欠缺考量, 且存在物种监测困难、成本高、缺少群体物种分析、基于特化种的抵消增大抵消难度, 忽略时间因素等问题。

对于大规模的生物多样性损失项目或线性基础设施建设项目, 由于涵盖面积广, 核算指标还应考虑景观层面和生态系统服务层面的指标。例如西

表3　国外生物多样性抵消(BO)关键问题及策略

Table 3　Key issues and strategies for biodiversity offsetting (BO) abroad

关键问题 Key issues	问题详述 Detailed issues	策略 Strategies	策略详述 Detailed strategies
核算量化方法 Accounting and quantification method	核算量化生物多样性损失和收益的范围、指标、阈值具复杂、难以测量、不可互换等特点; 生物多样性抵消具不确定性 The scope, indicators, and thresholds for quantifying the loss and gain of biodiversity are complex, difficult to measure, and not interchangeable; biodiversity offsetting (BO) with uncertainty	生物多样性损失核算 Biodiversity loss accounting	使用生物多样性抵消比率, 并选择基于区域生物多样性特征的分级分类的复合式核算量化方法, 如面积法; 主要根据生境质量制定抵消比率; 主要考虑生态系统相关指标、核算生态经济复合指标等方法 Use the biodiversity offset ratio and select a composite accounting quantification method based on the hierarchical classification of regional biodiversity characteristics, such as area-method; the biodiversity offset ratio is mainly based on the quality of the habitat; mainly consider indicators related to the ecosystem, and calculate multiple ecosystem state indicators, etc.
		生物多样性收益核算 Biodiversity benefit accounting	在限定生境类型、抵消地点、抵消技术措施后, 按相同的度量标准, 实现总量上和对应维度上的等效性收益 After restricting the types of habitats, offset locations, and implementing the corresponding technical measures, with the same measurement standards, achieve equivalent benefits in terms of total quantity and corresponding dimensions
如何提升附加性 How to enhance additionality	BO具不确定性、时间滞后性, 在管理、技术、社会等方面存在风险 BO is uncertain and has time lags. There are risks in management, technology, and society	制定生物多样性抵消比率 Set biodiversity offset ratios	参考核算量化方法一般分为面积等价法、乘积法、矩阵法、模型法 Reference accounting quantification methods are generally classified into area equivalence method, product method, matrix method, and model method
		进行景观层面综合管理 Conduct comprehensive management at the landscape level	划定优先抵消点; 组织、汇集抵消点, 制定抵消措施; 根据生境网络划定抵消点; 将BO纳入景观规划 Identify priority offset areas; organize and gather offset areas, formulate offset measures; delineate offset areas based on the habitat network; incorporate BO into landscape planning
如何确保强制性 How to ensure enforceability	BO具不确定性、时间滞后性, 社会参与性不足 BO is characterized by uncertainty, time lag and insufficient social participation	将缓解等级等抵消条件、范围、标准、法律责任、措施等内容纳入法律法规, 并完善监管体系 Incorporate the conditions, scope, standards, legal responsibilities, measures and other contents of offsetting such as mitigation levels into laws and regulations, and improve the regulatory system	在政府层面构建BO相关法律法规; 明确抵消点的物理划界、开发建设标准、社区共管协议; 加强资金监管; 构建共享生物多样性监测网络; 定期进行生物多样性评价; 加强违规惩处 Establish relevant laws and regulations for BO at the government level; clearly define the physical demarcation of offset areas, development and construction standards, and community co-management agreements; strengthen fund supervision; build a shared biodiversity monitoring network; conduct regular biodiversity evaluations; strengthen punishment for violations
		拓宽开发商参与BO路径 Broaden the path for developers to participate in BO	将BO作为基础设施建设项目开发条件; 要求开发商以BO形式支持政府大型保护区项目 Take BO as the development condition for infrastructure construction projects; it is required that developers support the government's large-scale protected area projects in the form of BO
如何保障长期性 How to ensure long-term effectiveness	BO具时间滞后性, 缺少长期效能 BO has a time lag and lacks long-term effectiveness	构建生物多样性信用市场 Build a market for biodiversity credits	建立补偿基金、建立缓解银行 Establish compensation funds and mitigation banks
		完善资金体系 Improve the capital system	资金除来自政府和开发商外, 可寻求企业、保护组织、公益基金、公民募捐等社会支持 In addition to funds coming from the government and developers, social support such as enterprises, conservation organizations, public welfare funds, and citizen donations can also be sought
		联合专业机构 Joint professional institutions	与当地社区形成利益共同体、与社会组织定期研讨、与分级部门和不同机构合作 Form a community of shared interests with the local community, hold regular discussions with social organizations, and cooperate with various levels of departments and different institutions

澳大利亚环境保护局(Environmental Protection Authority, EPA)采用的净环境效益(net environmental benefit, NEB)评估方法, 旨在核算生态系统价值和利于公众的舒适、健康、安全等其他生态系统服务价值; 南非西开普省的省级草案指南(Western Cape of South Africa's Draft Provincial Guideline)主要根据生态系统濒危状况制定抵消比率; 美国生境等效分析(habitat equivalency analysis, HEA)根据生态系统服务的损失进行量化, 实现功能上的等效补偿, 充分考虑了损益的时间性。这些

方法的核算指标较为全面，透明度高，全面考虑了生物多样性损失、生态功能影响和对经济社会的间接影响。还有根据不同生态系统(如森林、湿地、农田)的重要性设立不同指标体系，例如关键生物多样性变量法(essential biodiversity variables, EBVs)，该方法可预测生物多样性损失后生态系统不同状态下的生物量和价值量，以计算抵消滞后性带来的生物多样性损失量，完善了生物多样性损失总量的计算，充分考虑了地域特点、时间敏感性和协同效应。但以上方法需要数据具全面性和时效性，带来实施难度大、成本高、损失与收益缺乏等效性等问题(Rayment et al., 2014)。

此外有利用空间规划方法进行损益的核算和抵消选址，例如利用生态网络理论和进化模型进行生态网络要素识别和分析，根据生态网络要素类别、生境破碎化程度、物种间相互作用(Hagen et al., 2012)等方面要素构建动态化指标体系(Moreno-Mateos et al., 2015)，该方法能动态、定量地分析、预测和优化生态网络功能损益，并指导抵消选址。还有利用DSSEcopay AllerGruen®决策工具(Sturm et al., 2022)，通过构建生态和经济的复合指标，如物种和生境特征、土地利用措施、景观结构和功能等相关指标，进行生态价值和经济价值的兑换，并能有效指导抵消实施。

综上，BO核算指标应反映抵消目标，选择基于区域生物多样性特征的分级分类的复合式核算量化方法(Bull et al., 2013)，在实操的可行性和抵消的实效性之间取得平衡(Needham et al., 2019)，并使用抵消比率缓解BO的不确定性。而对于生物多样性收益的核算一般在限定生境类型、抵消地点、抵消技术措施后，按相同的度量标准，实现总量上和对应维度上的等效性收益，从而实现NNL甚至NG (附录1)。

3.2 如何提升附加性问题及策略

BO具有不确定性，如时间滞后性，以及管理、技术和社会风险等(Moreno-Mateos et al., 2015)，研究表明增强BO附加性是提高成功率的有效措施及关键问题(Curran et al., 2014)。因此在遵循缓解等级后，可通过适当增加抵消比率、景观层面综合管理等途径增加BO附加性。

生物多样性抵消比率一般大于1 (Moilanen & Kotiaho, 2021)，其作用为弥补被低估的和抵消滞后期间的生物多样性损失(Kangas et al., 2021)、降低风险和不确定性(包括通货膨胀、资本的机会成本等财务风险，技术风险，土地权属变更等空间风险，管理风险，社会风险)，从而增加附加性、达到NNL目标、提高抵消成功率。研究表明，BO成功最常见原因是采用较高的乘数(zu Ermgassen et al., 2019)。因此其大小从根本上由生物多样性损失量决定，应选择能反映生物多样性损失的核算量化指标体系和计算方法确定抵消比率，但也应根据BO项目阶段性完成质量、时间折扣、实施风险、生物多样性信用市场成熟度、专家经验等主客观风险因素而适当增加抵消比率(Bull et al., 2017)。

抵消比率计算方法参考核算量化方法，一般分为面积等价法、乘积法(Moilanen & Lehtinen, 2025)、矩阵法、模型法，即根据政策、生境重要性、物种重要性等因素制定一个通用指数，用损失的面积乘以通用指数来指导抵消；将所有风险因素设为子乘数，如时间折扣乘数、技术风险乘数、预期完成质量乘数等，所有子乘数相乘得到抵消比率；或将相关核算及风险因素做成多维度的矩阵表，例如英国采用矩阵法(Treweek et al., 2010)将生境独特性作为横坐标，生境状况作为纵坐标，帮助使用者根据项目具体情况查找抵消比率范围；或利用生态网络理论、进化模型、决策模型等，根据相关指标体系模拟不同情景下的生物多样性损失量，反推抵消比率。

景观层面综合管理包括结合生物多样性损失情况，依据国家及区域保护计划所规划的生态优先区选择抵消点(World Bank, 2016)；组织和汇集抵消点和抵消措施；选择生境网络中的空间作为抵消点；将抵消工作列入战略性景观规划(Sonter et al., 2020; Droste et al., 2022)，如英国泰晤士河环线项目将抵消点设置在城乡交界或农村地区，提升生态价值低的生境(Apostolopoulou & Adams, 2019)。景观层面综合管理利于增加生态收益，降低碎片化，增加生境连通性，增加成本效益，便于长期管理、监测、评估，保障资金来源(Gelot & Bigard, 2021)。

3.3 如何确保强制性问题及策略

英国的BO试点项目表明，即便开发项目实施缓解措施，也欠缺更简单和成本有效的BO实施框架(Defra, 2013)，而美国湿地补偿政策确保了BO执

行的有效性(EPA, 2008)。因此，确保BO强制性执行的抵消政策是消除BO不确定性和滞后性的关键问题(Rubec & Hanson, 2009)，也是促使开发商出于遵守法规、项目获批、社会责任等原因参与BO的有力手段(Grimm & Köppel, 2019)。

为保障BO有效执行，(1)需将缓解等级、范围、标准、法律责任、措施等内容纳入法律法规(秦鹏和向往，2023)，并完善监管体系以增加抵消体系透明度、保障抵消执行度(Gibbons et al., 2018)。一是，在政府层面将BO融入土地开发、生物多样性、国家公园等方面的法律法规，并制定专门的BO指导框架。二是，明确抵消点的物理划界、抵消点内基础设施开发建设标准、明确与社区等共管协议。三是，加强资金监管。四是，推动生物多样性监测网络的科学性和共建共享，建立参考基线，并做好对影响前后的监测提供抵消参照(Pope et al., 2021)。五是，定期进行生物多样性评价，并定期更新评估指标(Vaissière et al., 2017)。六是，对违规行为实施惩罚措施(Gray & Shimshack, 2011)。(2)需拓宽开发商参与BO路径，一是，将BO作为基础设施建设项目开发条件，如哥伦比亚政府规定能源、交通设施等开发项目强制执行BO，并规划抵消地点，鼓励开发商与专业机构合作(World Bank, 2016)。二是，要求开发商以BO形式支持政府大型保护区项目，如利比里亚要求矿业公司支持保护区内的补偿，并签订重点保护区和物种的保护协议，使BO项目开发成本降低、滞后性减缓、在景观层面的生态价值增强(World Bank, 2016)。

3.4 如何保障长期性问题及策略

BO项目需依靠长期性实施机制减缓滞后性，长期管理和实施是BO成功的主要因素和关键问题(Lave & Robertson, 2017)。通过构建生物多样性信用市场、完善资金体系、联合专业机构规范长期性实施计划、避免资金短缺、发挥社会协同效应，从而促成BO项目的长期效能。

(1)构建规范化的市场机制，通过提供BO实施指导、引入供应商竞争制、项目集成等途径，形成规模效应，完善市场机制，提升BO生态效能(Defra, 2013)。一是，通过建立补偿基金，根据核算的生物多样性影响要求开发商定期支付相应费用用于BO项目，使BO项目由专业团队实施，同时需加强BO项目的监管，保障其实效和生物多样性损益的等效性。二是，建立缓解银行，如美国湿地缓解银行、英国环境银行，将生物多样性损益核算为生物多样性信用，通过开发商购买信用，土地所有者出售信用的方式，提高抵消效率，提升透明度和社会参与度，减缓BO滞后性和不确定性，盘活闲置土地的生物多样性价值。同时该措施需建立在成熟的抵消市场和完善的监管机制基础上，且仅适用于某些独特性低的生境类型(Bull et al., 2017)。(2) BO资金来源除政府和开发商外，还可寻求企业、保护组织、公益基金和公民募捐等社会支持，从定期经营、资助项目、自营收入、慈善事业、碳补偿支付、特定项目的收入转移和保育信托基金等多种途径中制定可持续的资金筹措方案。(3)应与相关机构开展高效合作，如英国由环境署(Environment Agency)负责生物多样性信用登记，公共机构Nature England提供生态咨询(Grimm & Köppel, 2019)。还可与当地社区形成利益共同体，发展绿色经济；与社会组织定期研讨，寻求定期评价与监测、风险评估、生态修复和适应性管理等专业指导；景观尺度的抵消实施也需要分级部门和不同机构的合作。

4 建议

欧美BO项目经验表明，NNL目标很难实现(Brown et al., 2013)，但强有力的BO实施能带来更好的缓解结果(Buschke & Sinclair, 2019)。BO的成功不仅应考虑生态可行性，还应将经济、社会和生态问题综合考虑。而我国BO研究刚刚起步，相关实践近乎空白，亟需借鉴国外BO经验和策略，为我国生物多样性保护与经济发展矛盾寻求解决路径。

(1)明确BO地位和实施路径。我国对生物多样性损失的补偿集中于经济补偿(陈进, 2022)，具有资金压力大、生态成本高、生物多样性保护面临困境等问题(赵阳等, 2024)。且未明确BO价值和地位，更缺乏对BO的应用。在生物多样性法律方面也存在孤立、分散、模糊的特点，不能对BO形成统领性和综合性的法律指导(荆珍和张鑫, 2023)。因此，应充分利用我国土地公有制的优势和政府在用地规划方面的主导作用，一是，建议在立法上明确BO地位，将BO策略纳入生物多样性保护领域的法律体系。二是，严控土地开发利用对生物多样性的影响，将缓

解等级和NNL设为开发的必要条件; 对BO单独立法, 并将生境网络规划、自然保护地体系、关键栖息地识别等相关规划成果应用到抵消点范围的分级分类选定。三是, 制定BO实施细则, 明确执法程序及各级职责, 制定本土化的生物多样性损失核算量化指标体系和计算标准。四是, 探索建立生物多样性信用市场(李京梅等, 2023), 将其作为BO实施的媒介, 指导生境补偿的高效实施并压缩时间成本。五是, 拓宽资金渠道, 将BO融入美丽乡村建设、高校社会服务、银行企业绿色金融、企业社会责任、开发商开发前许可、社会生态保护机构融资和社会互助基金等项目中, 创新筹措方式。

(2)推动BO实施。英国BO经验表明, 应优先建立大型公共基础设施实施BO计划, 将灰色基础设施与绿色基础设施综合考虑, 进行系统性优化, 以寻求生态与文明最大化统一的最优解。同时将BO与规划结合, 如英国通过生物多样性行动计划(biodiversity action plan, BAP)、自然改善区(nature improvement areas, NIA)、国家公园(national parks)等国家战略, 利用NIAs、Living Landscapes、Futurescapes和ThinkBig10等生物多样性保护项目, 提供地方的优先抵消地点(Baker et al., 2014)。

因此需在国土空间规划背景下, 将BO与美丽乡村建设、基础设施建设、城市更新、生物多样性保护、“三线”划定、自然保护地体系建设等战略和国家发展系统工程紧密结合。探寻自然保护地体系建设与大型基础设施建设、“三线”划定与周边社区开发、美丽乡村建设与城市开发建设间的抵消关系, 推动实施BO计划。

(3)加强BO效能优化研究。一是, 探寻本土化、高效、基础实效的生物多样性损益核算量化方法, 以及定期更新的生物多样性核算量化指标体系和评估标准, 整合多源数据建立动态数据库, 充分利用数据库的实时监测、动态预警和动态分析等功能, 提高开发前生物多样性核算量化和开发后生物多样性收益评估的等效性。二是, 加强BO在综合景观管理和规划中的应用, 加强地理学、生态学和经济学交叉研究, 聚合学科优势。三是, 加强自下而上的参与与支持, 加强社会组织、高校、志愿者等在抵消技术、组织宣传、技术培训、监测设施网络建设、社区生计福祉服务和职业技能人才培养等方面的探索和实践(赵宁和王昭璇, 2021)。

参考文献

Apostolopoulou E, Adams WM (2019) Cutting nature to fit: Urbanization, neoliberalism and biodiversity offsetting in England. Geoforum, 98, 214–225.

Apostolopoulou E, Greco E, Adams W (2019) Biodiversity offsetting and the production of equivalent natures: A Marxist critique. ACME, 17, 861–892.

Baker J, Sheate WR, Bennett T, Payne D, Tucker G, White O, Forrest S (2014) Evaluation of the Biodiversity Offsetting Pilot Programme. Collingwood Environmental Planning Limited, London.

Barral S, Ghosh R, Corbera E (2025) The politics of influence in biodiversity offsetting. Nature Sustainability, 8, 350–357.

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme) (2012) Standard on Biodiversity Offsets. Business and Biodiversity Offsets Programm (BBOP), Washington, DC.

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme) (2018) The BBOP Principles on Biodiversity Offsets. https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2018/10/The-BBOP-Principles_20181023.pdf. (accessed on 2025-10-24)

BCA (Biodiversity Credit Alliance) (2024) Definition of a Biodiversity Credit. https://www.biodiversitycreditalliance.org/wp-content/uploads/2024/05/Definition-of-a-Biodiversity-Credit-Rev-220524.pdf. (accessed on 2025-10-24)

BCA (Biodiversity Credit Alliance) (2025) High-Level Principles to Guide the Biodiversity Credit Market. https://www.biodiversitycreditalliance.org/wp-content/uploads/2025/07/WEF_High_Level_Principles_to_Guide_the_Biodiversity_Credit_Market_2025.pdf. (accessed on 2025-10-24)

Brown MA, Clarkson BD, Barton BJ, Joshi C (2013) Ecological compensation: An evaluation of regulatory compliance in New Zealand. Impact Assessment and Project Appraisal, 31, 34–44.

Bull JW, Lloyd SP, Strange N (2017) Implementation gap between the theory and practice of biodiversity offset multipliers. Conservation Letters, 10, 656–669.

Bull JW, Strange N (2018) The global extent of biodiversity offset implementation under no net loss policies. Nature Sustainability, 1, 790–798.

Bull JW, Suttle KB, Gordon A, Singh NJ, Milner-Gulland EJ (2013) Biodiversity offsets in theory and practice. Oryx, 47, 369–380.

Buschke FT, Sinclair SP (2019) Adding ecological and evolutionary processes to restoration biodiversity offset models using neutral theory. Diversity and Distributions, 25, 1351–1361.

CBD (Convention on Biological Diversity) (2021) Post-2020

Global Biodiversity Framework: Scientific and Technical Information to Support the Review of the Updated Goals and Targets, and Related Indicators and Baselines. https://www.cbd.int/doc/c/e823/b80c/8b0e8a08470a476865e9b203/sbstta-24-03-add2-rev1-en.pdf. (accessed on 2025-10-24)

CESINE (Conservation and Ecosystem Services in the New Biodiversity Economy) (2013) Biodiversity Offsetting in the UK: Implications and Policy Recommendations. https://www.geog.cam.ac.uk/files/research/projects/biodiversityeconomy/ policybrief2.pdf. (accessed on 2025-10-24)

Chen J (2022) Progresses and development trend of horizontal ecological compensation in river basin. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 39(2), 1–6, 20. (in Chinese with English abstract) [陈进 (2022) 流域横向生态补偿进展及发展趋势. 长江科学院院报, 39(2), 1–6, 20.]

Chen ZG, Wang YF (2023) “Biodiversity offset” in natural resources conservation: An ecological compensation policy tool for conservation and development balance. Natural Resources Information, (4), 7–13. (in Chinese with English abstract) [陈志刚, 王宇飞 (2023) 探索自然资源保护中的“生物多样性抵消”——一种平衡保护发展的生态补偿策略. 自然资源情报, (4), 7–13.]

CIEEM (Chartered Institute of Ecology and Environmental Management) (2023) Biodiversity Net Gain Metric 4.0 Published. https://cieem.net/biodiversity-net-gain-metric-4-0-published/. (accessed on 2025-10-24)

Curran M, Hellweg S, Beck J (2014) Is there any empirical support for biodiversity offset policy? Ecological Applications, 24, 617–632.

Defra (2013) Biodiversity Offsetting in England Green Paper. https://consult.defra.gov.uk/biodiversity/biodiversity_offsetting/supporting_documents/20130903Biodiversity%20offsetting%20green%20paper.pdf. (accessed on 2025-10-24)

Droste N, Alkan Olsson J, Hanson H, Knaggård Å, Lima G, Lundmark L, Thoni T, Zelli F (2022) A global overview of biodiversity offsetting governance. Journal of Environmental Management, 316, 115231.

EPA (United States Environmental Protection Agency) (2008) Compensatory Mitigation for Losses of Aquatic Resources: Final Rule. https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-03/documents/2008_04_10_wetlands_wetlands_mitigation_final_rule_4_10_08.pdf. (accessed on 2025-10-24)

Gelcich S, Vargas C, Carreras MJ, Castilla JC, Donlan CJ (2017) Achieving biodiversity benefits with offsets: Research gaps, challenges, and needs. Ambio, 46, 184–189.

Gelot S, Bigard C (2021) Challenges to developing mitigation hierarchy policy: Findings from a nationwide database analysis in France. Biological Conservation, 263, 109343.

Gibbons P, MacIntosh A, Constable AL, Hayashi K (2018) Outcomes from 10 years of biodiversity offsetting. Global Change Biology, 24, e643–e654.

Gray WB, Shimshack JP (2011) The effectiveness of environmental monitoring and enforcement: A review of the empirical evidence. Review of Environmental Economics and Policy, 5, 3–24.

Grimm M, Köppel J (2019) Biodiversity offset program design and implementation. Sustainability, 11, 6903.

Hagen M, Kissling WD, Rasmussen C, Carstensen DW, Dupont YL, Kaiser-Bunbury N, O’Gorman EJ, Olesen JM, De Aguiar MAM, Brown LE (2012) Biodiversity, species interactions and ecological networks in a fragmented world. Advances in Ecological Research, 46, 89–120.

Jing Z, Zhang X (2023) Analysis of the legal realization path of biodiversity offsetting in China. Gansu Theory Research, (2), 89–98. (in Chinese with English abstract) [荆珍, 张鑫 (2023) 我国生物多样性抵消的法律实现路径探析. 甘肃理论学刊, (2), 89–98.]

Jones HP, Jones PC, Barbier EB, Blackburn RC, Rey Benayas JM, Holl KD, McCrackin M, Meli P, Montoya D, Mateos DM (2018) Restoration and repair of Earth’s damaged ecosystems. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 285, 20172577.

Kangas J, Kullberg P, Pekkonen M, Kotiaho JS, Ollikainen M (2021) Precision, applicability, and economic implications: A comparison of alternative biodiversity offset indexes. Environmental Management, 68, 170–183.

Lave R, Robertson M (2017) Biodiversity offsetting. In: The Routledge Handbook of the Political Economy of Science (eds Tyfield D, Lave R, Randalls S, Thorpe C). Taylor and Francis, Abingdon, UK.

Le Texier M, Gelot S, Pioch S (2024) Big Cities, Big Impacts? A spatial analysis of 3,335 ecological offsets in France since 2012. Journal of Environmental Management, 357, 120704.

Li HX, Ren J, Li N, Fu BR, Song YT, Xu H (2022) Research hotspot and case analysis of ecological compensation based on bibliometrics. Ecological Science, 41(4), 171–180. (in Chinese with English abstract) [李皓芯, 任婧, 李娜, 付保荣, 宋有涛, 徐鹤 (2022) 基于文献计量的国内外生态补偿研究热点与案例分析. 生态科学, 41(4), 171–180.]

Li JM, Zhang HM, Wang N (2023) Paths and institutional arrangements for the value realization of biodiversity products: Experiences and inspirations of foreign bio-banking. Acta Ecologica Sinica, 43, 198–207. (in Chinese with English abstract) [李京梅, 张慧敏, 王娜 (2023) 生物多样性产品价值实现的路径与制度安排——国外生物多样性银行经验借鉴与启示. 生态学报, 43, 198–207.]

Mann C (2015) Strategies for sustainable policy design: Constructive assessment of biodiversity offsets and banking. Ecosystem Services, 16, 266–274.

Maron M, Ives CD, Kujala H, Bull JW, Maseyk FJF, Bekessy S, Gordon A, Watson JEM, Lentini PE, Gibbons P, Possingham HP, Hobbs RJ, Keith DA, Wintle BA, Evans

MC (2016) Taming a wicked problem: Resolving controversies in biodiversity offsetting. BioScience, 66, 489–498.

Maron M, von Hase A, Quétier F, Sonter LJ, Theis S, zu Ermgassen SOSE (2025) Biodiversity offsets, their effectiveness and their role in a nature positive future. Nature Reviews Biodiversity, 1, 183–196.

Moilanen A, Kotiaho JS (2018) Fifteen operationally important decisions in the planning of biodiversity offsets. Biological Conservation, 227, 112–120.

Moilanen A, Kotiaho JS (2021) Three ways to deliver a net positive impact with biodiversity offsets. Conservation Biology, 35, 197–205.

Moilanen A, Lehtinen P (2025) Simple analysis of biodiversity response functions and multipliers for biodiversity offsetting and other applications. Environmental Modelling & Software, 185, 106322.

Moreno-Mateos D, Maris V, Béchet A, Curran M (2015) The true loss caused by biodiversity offsets. Biological Conservation, 192, 552–559.

Needham K, de Vries FP, Armsworth PR, Hanley N (2019) Designing markets for biodiversity offsets: Lessons from tradable pollution permits. Journal of Applied Ecology, 56, 1429–1435.

NSW Government (2024) Biodiversity Credits. https://www.environment.nsw.gov.au/topics/animals-and-plants/biodiversity-offsets-scheme/about/how-scheme-works/biodiversity-credits. (accessed on 2025-10-24)

Pope J, Morrison-Saunders A, Bond A, Retief F (2021) When is an offset not an offset? A framework of necessary conditions for biodiversity offsets. Environmental Management, 67, 424–435.

Qin P, Xiang W (2023) Legislative perfection of wildlife damage compensation system from the perspective of biodiversity protection. China Soft Science, (4), 201–212. (in Chinese with English abstract) [秦鹏, 向往 (2023) 生物多样性保护视域下野生动物致害补偿制度的立法完善. 中国软科学, (4), 201–212.]

Raihan A (2024) Exploring the relationship between biodiversity and carbon offset in ecological compensation. In: The International Conference on New Quality Productive Forces and Sustainable Development. Xi'an University of Technology, Xi'an.

Rainey HJ, Pollard EHB, Dutson G, Ekstrom JMM, Livingstone SR, Temple HJ, Pilgrim JD (2015) A review of corporate goals of No Net Loss and Net Positive Impact on biodiversity. Oryx, 49, 232–238.

Rayment M, Haines R, McNeil D, Conway M, Tucker G, Underwood E (2014) Study on Specific Design Elements of Biodiversity Offsets: Biodiversity Metrics and Mechanisms for Securing Long Term Conservation Benefits. European Commission, DG Environment, London.

Rubec CDA, Hanson AR (2009) Wetland mitigation and compensation: Canadian experience. Wetlands Ecology and Management, 17, 3–14.

Shmelev SE (2025) Biodiversity offset schemes for Indonesia: Pro et contra. Sustainability, 17, 6283.

Sonter LJ, Dade MC, Watson JEM, Valenta RK (2020) Renewable energy production will exacerbate mining threats to biodiversity. Nature Communications, 11, 4174.

South Australia (2025) Significant Environmental Benefits (Offsets). https://www.environment.sa.gov.au/topics/native-vegetation/protecting-native-vegetation/significant-environmental-benefits-offsets. (accessed on 2025-10-24)

Studeny AC, Buckland ST, Illian JB, Johnston A, Magurran AE (2011) Goodness-of-fit measures of evenness: A new tool for exploring changes in community structure. Ecosphere, 2, art15.

Sturm A, Wätzold F, Westphal L, Querhammer L (2022) A DSS based on ecological-economic modelling to facilitate the implementation of biodiversity offsets and agri-environment schemes in grasslands. In: 42. GIL-Jahrestagung, Künstliche Intelligenz in der Agrar-und Ernährungswirtschaft, pp. 283–288. Agroscope, Tänikon, Ettenhausen, Schweiz.

Treweek J, Butcher B, Temple H (2010) Biodiversity offsets: Possible methods for measuring biodiversity losses and gains for use in the UK. Practice, 69, 29–32.

UK Government (2013) London-West Midlands Environmental Statement. https://www.gov.uk/government/collections/ hs2-phase-one-environmental-statement-documents. (accessed on 2025-10-24)

Vaissière AC, Levrel H, Scemama P (2017) Biodiversity offsetting: Clearing up misunderstandings between conservation and economics to take further action. Biological Conservation, 206, 258–262.

Willemen L, Barger NN, ten Brink B, Cantele M, Erasmus BFN, Fisher JL, Gardner T, Holland TG, Kohler F, Kotiaho JS, von Maltitz GP, Nangendo G, Pandit R, Parrotta JA, Potts MD, Prince SD, Sankaran M, Brainich A, Montanarella L, Scholes R (2020) How to halt the global decline of lands. Nature Sustainability, 3, 164–166.

World Bank (2016) Biodiversity Offsets: A User Guide, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/344901481176051661/biodiversity-offsets-a-user-guide. (accessed on 2025-10-24)

World Bank (2017) The World Bank Environmental and Social Framework. http://documents.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/114278-WPREVISED-PUBLIC-Environmental-and-Social-Framework.pdf. (accessed on 2025-10-24)

World Bank (2020) Insights from the Kalagala Biodiversity

Offset Associated with the Bujagali Power Project in Uganda. https://www.oecd.org/en/topics/environment.html. (accessed on 2025-10-24)

Yuan GH, Xi X, Zhou W, Su ZL (2020) Research on biodiversity compensation system in New South Wales. Natural Resource Economics of China, 33(1), 21–27, 61. (in Chinese with English abstract) [袁国华, 席晶, 周伟, 苏子龙 (2020) 新南威尔士州生物多样性补偿制度研究. 中国国土资源经济, 33(1), 21–27, 61.]

Zhao N, Wang ZX (2021) The predicament and solution of biodiversity compensation for wildlife habitats in China. Journal of Jiangxi University of Science and Technology, 42(5), 25–30. (in Chinese with English abstract) [赵宁, 王昭璇 (2021) 我国野生动物栖息地生物多样性补偿的困境与出路. 江西理工大学学报, 42(5), 25–30.]

Zhao Y, Liu YQ, Wan X, Ding LM (2024) Study on market-based realization of ecosystem product value in national parks: Taking biodiversity offsets and credits as an example. National Park, 2, 296–307. (in Chinese with English abstract) [赵阳, 刘艳青, 万霞, 丁黎明 (2024) 国家公园生态产品市场化新路径——以生物多样性抵消和信用机制为例. 国家公园(中英文), 2, 296–307.]

zu Ermgassen SOSE, Baker J, Griffiths RA, Strange N, Struebig MJ, Bull JW (2019) The ecological outcomes of biodiversity offsets under “no net loss” policies: A global review. Conservation Letters, 12, e12664.

(责任编委: 徐靖　责任编辑: 李会丽)

附录　Supplementary Material

https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025187

附录 1 国外主要核算量化方法概述

Appendix 1 An overview of the main accounting and quantitative methods abroad

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
面积法 Area-method	——	面积、生境类型、通用抵消比率 Area, habitat type, general offset ratio	抵消量=相同生境类型面积*通用抵消比率 Offset amount = Area of the same habitat type * General offset ratio	方法简单、核算成本低 The method is simple and the accounting cost is low	忽略生态系统质量变化、生物多样性特征 Ignore changes in ecosystem quality and the characteristics of biodiversity
主要根据生境质量制定抵消比率 The offset ratio is mainly determined based on the quality of the habitat	澳大利亚-栖息地公顷法 Australia - habitat hectare method	面积、生境质量(生境结构、组成、功能，有价值物种指标，连通性、斑块大小等景观层面指标) Area, habitat quality (habitat structure, composition, function, valuable species indicators, connectivity, patch size and other landscape-level indicators)	抵消量=面积*依托生境质量制定的抵消比率； 规定限制：相同或同类生境抵消，向上抵消被奖励“鼓励性比率”；抵消比率：保护意义非常高、高、中等，总生物多样性单位分别乘 2、1.5、1 抵消比率； 实施：高价值生境的抵消质量须达到丧失的 90%，且新种植面积占抵消总生境公顷的比例小于 10%，而中等价值抵消两个比例为 50% (Parkes et al, 2003)。 Offset amount = Area * The offset ratio determined based on the quality of the dependent habitat; Provisional restrictions: For the same or similar habitats, the upward offset is rewarded with the "encouraging ratio";	透明度高、灵活性强、方法便捷、处理低价值生境损失更高效 High transparency, strong flexibility, convenient methods, and more efficient handling of low-value habitat losses.	度量指标：指标主观、评分粗糙；仅适用于独特性低、具非珍稀物种的生境(zu Ermgassen et al, 2019)。 Measurement indicators: The indicators are subjective and the scoring is rough; they are only applicable to habitats with low uniqueness and non-endangered species.

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
			Offset ratio: For habitats with high, medium, or low conservation significance, the offset ratios are 2, 1.5, and 1 respectively for each unit of total biodiversity; Implementation: The offset quality of high-value habitats must reach 90% of the lost area, and the proportion of new planted area to the total offset habitat hectares should be less than 10%, while for medium-value habitats, the two proportions are 50%.		
	英国-乘积法/矩阵法(The biodiversity metric 4.0) britain - product method / matrix method	面积、生境状况(根据规定生境类别等评分)、生境独特性(基于英国生境分类, 如 UKHab 等评分)、生境战略意义(是否列入国家特殊科学兴趣地点 Site of Special Scientific Interest, SSSI、英国优先栖息地 UK Priority Habitats 等空间保护战略评分)、风险。Area, habitat condition (scored according to specified habitat categories, etc.), habitat uniqueness (based on the UK	抵消量=面积(公顷/植物篱单位/水道单位)*生境状况(0、1、1.5、2、2.5、3)*生境独特性(1-5)*生境战略意义(1、1.10、1.15)*风险系数; 规定限制: 高独特性生境需在同等独特性范围内补偿, 低独特性生境被赋予低的条件权重, 从而避免“伪生态补偿”; 风险系数: 考虑抵消难度(创建或恢复生境等技术风险)、时间风险(创建或恢复生境所需时间)、空间风险(如损、益生物多样性的位置关系, 越远风险系数越大; 景观规模影响等)三个风险系数(CIEEM, 2023)。 Offset amount = Area (hectare/hedge unit/waterway unit) * Habitat condition (0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3) * Habitat uniqueness (1-5) * Habitat strategic significance (1, 1.10, 1.15) * Risk coefficient; Regulation restrictions: High-uniqueness habitats need to be compensated within the	透明度高、灵活性强、处理低价值生境损失更高效 High transparency, strong flexibility, and more efficient handling of low-value habitat losses	度量指标: 忽略了对物种、生境功能、连通性、植物资源等方面生态价值及生态系统价值度量; 缺少文化性、社会性、地域考量, 缺乏对社区与生境间社会联系、社区间福祉差异的关注; 度量标准: 依靠专家经验, 主观, 评分尺度粗糙; 实施: 对生物多样性增益指导不足, 不产生间接效益, 难评估影响和恢复行动

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
		Habitat Classification, Such as scores like UKHab, habitat strategic significance (whether included in spatial conservation strategies such as Site of Special Scientific Interest, SSSI, UK Priority Habitats, etc.), risks	same uniqueness range, while low-uniqueness habitats are assigned low conditional weights, thereby avoiding "pseudo-ecological compensation". Risk coefficient: Consider three risk coefficients: offsetting difficulty (technical risks such as creating or restoring habitats), time risk (the time required to create or restore habitats), and spatial risk (such as the positional relationship between damage and benefit to biodiversity, the greater the risk coefficient the farther away; the impact of landscape scale, etc.).		的等效性；成本高，对开发商和 BO 实施者造成压力(Marshall et al, 2024) Measurement indicators: Ignoring the measurement of ecological value and ecosystem value in aspects such as species, habitat functions, connectivity, and plant resources; There is a lack of cultural, social and regional considerations, as well as a lack of attention to the social connections between communities and habitats and the differences in well-being among communities.

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
					Measurement criteria: Relying on expert experience, subjective, and rough scoring scale; Implementation: Insufficient guidance on biodiversity gain, no indirect benefits are generated, and it is difficult to assess the equivalence of impact and restoration actions. High costs put pressure on developers and BO implementers
	南澳大利亚: 重大环境效益(SEB)方法 South Australia: significant environmental	面积、植被状况、保护意义、景观背景评级(LCR)(均根据 GPS 信息、冠幅、树高、相关物种和生境目录等详细指标评分) Area, vegetation condition, conservation significance,	抵消量=面积(公顷)*植被状况(0-80)*保护意义(1-1.7)*景观背景(1-1.25)*植被实际损失系数(植被实际清除程度从稍微修剪到完全清除 0-1); 此外, 根据清除后修复情况、缓解抵消不确定性等因素以大于 1 的系数形式增加生物多样性损失总量; 生物多样性收益总量=面积*(积极收益-负面影响);	透明度高、灵活性强、利于保护本土植物 High transparency, strong flexibility and conducive to protecting native plants	度量指标: 损益信息不平衡: “损”的位置、性质、程度都是确定的, “益”的评估不确定; “损”的评估忽视了生态质量评估(如目标生物群价值、连通性

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
	benefit (SEB) methods	and landscape background rating (LCR) (all scored based on detailed indicators such as GPS information, crown width, tree height, relevant species and habitat catalogues)	通过 LCR 等确定抵消点(Government of South Australia, 2024)。 Offset amount = Area (hectares) * Vegetation condition (0-80) * Conservation significance (1-1.7) * Landscape background (1-1.25) * Actual vegetation loss coefficient (the actual degree of vegetation removal ranges from slight pruning to complete removal, 0-1); In addition, according to repair after removal, ease offset uncertainty factors in the form of greater than 1 coefficient increases total biodiversity loss; The total benefit from biodiversity = area * (positive benefit - negative impact); Offset point determined by the LCR, etc;		等); “益”的抵消行动欠缺对原生态系统属性的考虑 Measurement indicators: Imbalance of profit and loss information: The location, nature and degree of "loss" are all determined, while the assessment of "profit" is uncertain. The assessment of "damage" neglects the ecological quality assessment (such as the value of the target biota, connectivity, etc.); The offsetting action of "benefit" lacks consideration of the attributes of the original ecosystem

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
主要根据目标物种制定抵消比率 The offset ratio is mainly determined based on the target species	矿业公司 Rio Tinto-QMM 开发优先级物种的全球分布度量单位 The mining company Rio Tinto-QMM is developing unit of global distribution metric for priority species	全球分布范围、特有性、物种濒危等级、生境依赖度等(World Rainforest Movement, 2016) Global distribution range, uniqueness, species endangered status, habitat dependence, etc	根据核算要素制定评分表，优先对高分物种采取抵消措施，分配更大抵消比率(World Bank Group, 2016)。 Based on the accounting elements, a scoring table is formulated, and priority is given to taking offset measures for high-scoring species, with a larger offset ratio allocated.	考虑了物种的生态价值 The ecological value of the species was taken into consideration	度量指标: 濒危等级、生境依赖度等指标主观性强；群体水平分析比单个物种分析更可取；单个物种分析应以单个物种在生态系统中具关键作用为前提。 度量标准: 特化种所需抵消时间和条件比泛化种更多，抵消有效性难度增大; Measurement indicators: Indicators such as endangered status and habitat dependence are highly subjective; Group-level analysis is more preferable than individual species analysis. The analysis of individual species should be based on the premise

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
					that the individual species plays a key role in the ecosystem. Metrics: specialized needs more than the generalization of offset time and conditions, offset effectiveness harder;
	美国栖息地评估程序(HEP) Habitat assessment program (HEP) of the United States	目标物种的生境需求(生境结构、功能等指标，由 栖息地适宜性指数模型即 HSI 评分)The habitat requirements of the target species (indicators such as habitat structure and function, evaluated by the habitat suitability index model, namely the HSI score)	栖息地单元损失量 =栖息地适宜性指数*面积(US Army Corps of Engineers' Sacramento District, 2014) The loss of habitat Units (HUs) = Habitat Suitability Indices (HSIs) * area	可针对不同物种制定 HSI 模型 HSI models can be developed for different species	度量指标：没考虑景观层面、生态系统层面生态功能，即使完成抵消规模和生物量，生态功能不一定增加； 度量标准：基于目标物种计算的生态系统规模和质量存在生态阈值，会限制增益(如为鲑鱼建造的产卵区只能在一定程度上提高生产力)；监测困难，成本高；

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
					Measurement indicators: Without taking into account the ecological functions at the landscape level and the ecosystem level, even if the scale and biomass are offset, the ecological functions do not necessarily increase. Measurement criteria: There are ecological thresholds for the scale and quality of ecosystems calculated based on target species, which would limit gains (for example, spawning areas built for salmon can only increase productivity to a certain

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
					extent). Difficult to monitor and costly;
	美国资源等效分析(REA) Resource equivalence analysis (REA) of the United States	物理资源(如物种数量、生物量、栖息地面积、类型、质量、结构等) Physical resources (such as the number of species, biomass, habitat area, type, quality, structure, etc.)	基于“资源-资源”的抵消方法，考虑物理资源的数量或面积等效性(U.S. Department of Labor, 2017) The cancellation method based on "Resource-to-Resource" takes into account the quantity or area equivalence of physical resources	依托存量数据 Relying on existing data	忽略抵消滞后性带来的资源变化等时间因素 Ignore the time factors such as resource changes caused by offsetting lag
主要考虑生态系统相关指标 Mainly consider indicators related to the ecosystem	西澳大利亚环境保护局(EPA)净环境效益 Net environmental benefits of the Western Australian environmental protection agency (EPA)	生态价值(例如生态系统健康，生态系统组成、结构和功能，如原生植被结构完整性)； 其他利用价值(有利于公众利益的舒适、安全、健康、审美、文化、精神用途) Ecological value (such as ecosystem health, ecosystem composition, structure and function, such as the integrity of native vegetation	优先在同一区域、同一生物区域、优先保护区域抵消；抵消比率大于 1:1(Environmental Protection Authority of Western Australia, 2005) Prioritize within the same area, the same biological area, and the priority protection area to offset; The offset ratio is greater than 1:1	透明度高、生物多样性测量全面 High transparency and comprehensive measurement of biodiversity	度量指标：难评估每个维度的影响和恢复行动的等效性；标准化的指标体系忽视地方特性； 度量标准：量化难度大(Simpson et al, 2022)。 Measurement indicators: It is difficult to assess the impact of each dimension and the equivalence of recovery actions; The

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
		structure); Other utilization values (comfortable, safe, healthy, aesthetic, cultural and spiritual uses that are beneficial to the public interest)			standardized indicator system neglects local characteristics. Metrics: quantification is difficult;
	南非西开普省的草案省级指南 Western Cape of South Africa’s draft provincial guideline	生态系统濒危状况、生境条件、景观层面指标(生态系统联系、梯度和连接性等)、使用价值、文化价值 The endangered status of ecosystems, habitat conditions, landscape-level indicators (such as ecosystem connections, gradients and connectivity, etc.), use value, and cultural value	抵消量=受影响生态系统的面积*根据国家空间生物多样性评估确定的抵消比率; 抵消比率: 根据生态系统濒危状况由高到低赋予 30、20、5、0 抵消比率, 再根据生境条件、景观层面指标修订抵消比率; 利用景观层面指标, 如生态系统联系、梯度和连接性等, 确定抵消点相对于空间生物多样性规划和保护优先事项的位置(De Wit, 2006)。 Offset amount = Area of the affected ecosystem * Offset ratio determined based on national spatial biodiversity assessment; Offset ratio: Assign offset ratios of 30, 20, 5, and 0 based on the severity of ecosystem endangerment from high to low, and then revise the offset ratio according to habitat conditions and landscape-level indicators; Using landscape-level indicators, such as ecosystem connectivity, gradients, and connectivity, determine the		

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
			location of offset points relative to spatial biodiversity planning and protection priorities;		
	美国生境等效分析(HEA) Habitat equivalence analysis (HEA) in the United States	生态系统服务(如洪水调节、碳封存、授粉服务、土地覆被管理、人类开发程度等) Ecosystem services (such as flood regulation, carbon sequestration, pollination services, land cover management, human development levels, etc.)	基于“服务-服务”(Service-to-Service)的补偿方法，量化生态系统服务的损失与恢复，实现功能上的等效补偿； 常用的计量单位是面积和时间上的总服务量，或以服务公顷年为单位，并折现至当前价值(Milon & Dodge, 2001) Service-to-Service compensation method, quantify the loss and recovery of ecosystem services, and achieve functional equivalent compensation; The commonly used measurement units are the total service volume in terms of area and time, or in units of service hectares per year, and discounted to the current value	考虑损益的时间性; 考虑社会、经济问题; 考虑间接影响； 利用协同效应； 适用于生境条件差异不大的区域(Efroymson et al, 2004) Consider the temporal aspect of gains and losses; Take into account social and economic issues; Consider the indirect effects; Utilize synergy; Applicable to regions with relatively similar	需服务流量、恢复速率、折现率等动态数据，难度大、成本高 It requires dynamic data such as service traffic, recovery rate, and discount rate, which is difficult and costly

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
				environmental conditions	
核算多种生态系统状态指标 Calculate multiple ecosystem state indicators	关键生物多样性变量 Essential biodiversity variables, EBVs	物种种群、物种性状、遗传组成、群落组成、生态系统功能与结构等主要指标 The main indicators include species populations, species traits, genetic composition, community composition, ecosystem functions and structures, etc.	根据生态独特性高低或物种重要性大小，设立不同的指标体系； 多重比较并预测多个生态系统不同状态下的生物量和价值量(Kissling et al, 2018) Different indicator systems should be established based on the level of ecological uniqueness or the importance of species. Make multiple comparisons and predict the biomass and value of multiple ecosystems under different states	具时间敏感性、具地域特点、数据能反映生态特征 Time-sensitive, region-specific, and the data can reflect ecological characteristics	基准线动态、测量难、成本高；数据质量、聚合、交叉引用的关联处理难度大；损失和收益难等价 The baseline is dynamic, difficult to measure and costly. The association processing of data quality, aggregation, and cross-reference is difficult. Losses and gains are hard to be equivalent
利用空间规划方法 Utilizing spatial planning methods	生态网络理论和进化模型 Ecological network theory and	生态网络要素识别和分析(廊道、生境斑块识别，生境破碎化程度等)、物种间相互作用(如食物网，关键物种，捕食、共生、传粉关	利用生态网络分析、景观网络模型、进化模型构建多维度、动态化指标体系; 并指导最优选址、优先保护物种类型、及符合气候和时空变化的抵消方案;	动态、定量地分析、预测、优化生态网络功能损益(Moreno-Mateos et al, 2015)	测量难、成本高，开发商的长期资助及抵消有效性的不确定性加剧 Measurement is difficult and costly, and the

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
	evolutionary model	系)、遗传多样性、适应性进化、长期种群存续能力 Identification and analysis of ecological network elements (such as corridor and habitat patch identification, degree of habitat fragmentation, etc.), interspecies interactions (such as food web, key species, predation, symbiosis, pollination relationships), genetic diversity, adaptive evolution, and long-term population survival capacity	Construct a multi-dimensional and dynamic index system by using ecological network analysis, landscape network models, and evolution models. And guide the optimal location, the types of priority protected species, and conform to the time and space change of climate and offset programs;	Dynamically and quantitatively analyze, predict and optimize the functional gains and losses of the ecological network.	uncertainty of the effectiveness of long-term funding and offsetting by developers has intensified
核算生态经济复合指标 Calculate the composite indicators of ecological economy	DSSEcopay AllerGruen®决策工具 DSSEcopay AllerGruen® decision-making Tool	物种和生境特征、土地利用措施、景观结构及功能等(Sturm et al, 2022) Species and habitat characteristics, land use measures, landscape structure and functions, etc.	结合生态和经济因素的决策支持系统，专注于时空明确的建模，旨在优化生态补偿机制； 得出土地利用措施对目标物种和栖息地类型的影响，计算当地栖息地质量、成本效益 A decision support system that combines ecological and economic factors, focusing on spatio-temporal clear modeling, aims to optimize the ecological compensation mechanism. Obtain the impact of land use measures on	进行生态价值和经济价值的兑换、有效指导抵消实施 Carry out the exchange of ecological value and economic value and effectively guide the	没有充分反映出抵消对相关栖息地或物种的间接好处； 仅适用于生境独特性不高的生境类型 The indirect benefits of offsetting the relevant habitats or species have

核算量化方法 Accounting quantification method	国家/方法名称 Country/Method name	核算要素 Costs accounting by elements	损益度量概述 Overview of profit and loss measurement	优点 Merit	劣势 Disadvantaged
			target species and habitat types, and calculate the local habitat quality and cost-effectiveness	implementation of offsetting	not been fully reflected; It is only applicable to habitat types with low uniqueness

参考文献

CIEEM (2023) Biodiversity Net Gain Metric 4.0 Published. https://cieem.net/biodiversity-net-gain-metric-4-0-published/. (accessed on 2025-03-25)

De Wit M (2006) Provincial Guideline on Biodiversity Offsets. Department of Environmental Affairs and Development Planning. Provincial Government of the Western Cape. (accessed on 2025-03-25)

Efroymson RA, Nicolette JP, Suter GW (2004) A framework for net environmental benefit analysis for remediation or restoration of contaminated sites. Environmental Management, 34, 315-331.

Environmental Protection Authority of Western Australia(2005)Guidance for the Assessment of Environmental Factors Western Australia (in accordance with the Environmental Protection Act 1986). https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/Policies_and_Guidance/GS3-Separation-distances-270605.pdf. (accessed on 2025-03-25)

Government of South Australia (2024) Guide for calculating a significant environmental benefit.https://cdn.environment.sa.gov.au/environment/docs/Native-Veg/SEB-Changes-1-Sep-24/Guide-for-a-Significant-Environmental-Benefit_1-Sept-2024.pdf. (accessed on 2025-03-25)

Kissling WD, Ahumada JA, Bowser A, Fernandez M, Fernández N, García E A, Guralnick RP, Isaac NJB, Kelling S, Los W, McRae L, Mihoub JB, Obst M, Santamaria M, Skidmore AK, Williams KJ, Agosti D, Amariles D, Arvanitidis C, Bastin L, Leo FD, Egloff W, Elith J, Hobern D, Martin D, Pereira HM, Pesole G, Peterseil J, Saarenmaa H, Schigel D, Schmeller DS, Segata N, Turak E, Uhlir PF, Wee B, Hardisty AR (2018) Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance at a global scale. Biological reviews, 93, 600-625.

Marshall, CA, Wade K, Kendall, IS, Porcher H, Poffley J, Bladon AJ, Dicks LV, Treweek J (2024) England’s statutory biodiversity metric enhances plant, but not bird nor butterfly, biodiversity. Journal of Applied Ecology, 61, 1918-1931.

Milon JW, Dodge RE (2001) Applying habitat equivalency analysis for coral reef damage assessment and restoration. Bulletin of marine science, 69, 975-988.

Moreno-Mateos, D., Maris, V., Béchet, A., & Curran, M. (2015). The true loss caused by biodiversity offsets. Biological Conservation, 192, 552-559.

Parkes, D., Newell, G., & Cheal, D. (2003). Assessing the quality of native vegetation: the 'habitat hectares' approach. Ecological management & restoration, 4, S29-S38.

Simpson KH, de Vries FP, Dallimer M, Armsworth PR, Hanley N (2022). Ecological and economic implications of alternative metrics in biodiversity offset markets. Conservation Biology, 36, e13906.

Sturm A, Wätzold F, Westphal L, Querhammer L (2022). A DSS based on ecological-economic modelling to facilitate the implementation of biodiversity offsets and agri-environment schemes in grasslands. In 42. GIL-Jahrestagung, Künstliche Intelligenz in der Agrar-und Ernährungswirtschaft (pp. 283-288). Gesellschaft für Informatik eV.

U.S. Department of Labor (2017) REA Impact Study: Implementation Report.https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASP/legacy/files/REA-Impact-Study-Implementation-Report.pdf. (accessed on 2025-03-25)

US Army Corps of Engineers' Sacramento District (2014) Appendix F Habitat Evaluation Procedure Cost Effectiveness/Incremental Cost Analysis. https://www.spk.usace.army.mil/Portals/12/documents/civil_works/Delta/DeltaStudy/FinalEIS/Appendix-F_Delta-HEP-Report.pdf?ver=2018-09-14-162500-980. (accessed on 2025-03-25)

World Bank Group (2016) Biodiversity Offsets: A User Guide, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/344901481176051661/biodiversity-offsets-a-user-guide. (accessed on 2025-10-24)

World Rainforest Movement(2016)Rio Tinto in Madagascar. https://www.wrm.org.uy//wp-content/uploads/2016/06/Article_Rio_Tinto_in_Madagascar.pdf. (accessed on 2025-03-25)

zu Ermgassen SOSE, Baker J, Griffiths RA, Strange N, Struebig MJ, Bull JW (2019) The ecological outcomes of biodiversity offsets under "no net loss" policies: A global review. Conservation Letters, 12, e12664.

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25299, pages 1–9
doi: 10.17520/biods.2025299
cstr: 32101.14.biods.2025299

•生物多样性保护融资与企业参与专题•

生物多样性信用机制：中外实践比较与启示

王茜璐[1]，王禹兮[2]，王也[1]，赵阳[1]，王新[1*]

1. 生态环境部对外合作与交流中心，北京 100035; 2. 首都经济贸易大学金融学院，北京 100070

摘要: 《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》提出将生物多样性信用作为一种新兴融资工具，助力弥补资金缺口。《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》倡导“建立市场化生物多样性保护恢复补偿机制”。为了解生物多样性信用机制发展，本文采用案例比较法，从信用量化、政策推行与市场交易3个方面，对美国、英国、澳大利亚等国案例与国内实践(江西湿地银行、福建南平生态银行和浙江丽水生态信用评价)的比较结果显示，我国生物多样性补偿机制需进一步增强政策强制力、核算科学性与市场活跃度，并在注重“经济等效性”的同时，更加关注“生态等效性”和惠益分享公平性。建议“三步骤”实施路径：(1)制定方法学，为生物多样性信用量化提供科学性、标准化和透明度，并经第三方机构认证增加市场认可度。(2)通过自下而上的试点成功交易，为自上而下的法律政策提供必要的决策依据。(3)在供给侧平衡优化经济等效性：通过国家公园立法，赋予保护者将保护成果转化为生物多样性信用获利的权利，包括经营性(信用交易)和投资性(信用融资)权利；在需求侧提升强化生态等效性：强化开发者满足生物多样性“无净损失”专门规定的义务，通过修订《生态保护补偿条例》和《环境影响评价法》纳入生物多样性损益量化、生态稀缺性评估，层级缓解、影响抵消和信用有效期 ≥ 30年等核心要求；最终，在信用供需两侧形成“法律规范+市场激励”双轮驱动模式，成为促进绿水青山向金山银山转化的有效机制。

关键词: 生物多样性信用；生物多样性抵消；昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架

王茜璐, 王禹兮, 王也, 赵阳, 王新 (2026) 生物多样性信用机制：中外实践比较与启示. 生物多样性, 34, 25299. doi: 10.17520/biods.2025299; cstr: 32101.14.biods.2025299.

Wang QL, Wang YX, Wang Y, Zhao Y, Wang X (2026) Comparative analysis of biodiversity credits mechanisms in China and abroad and implications for China. Biodiversity Science, 34, 25299. doi: 10.17520/biods.2025299; cstr: 32101.14.biods.2025299.

Comparative analysis of biodiversity credits mechanisms in China and abroad and implications for China

Qianlu Wang[1], Yuxi Wang[2], Ye Wang[1], Yang Zhao[1], Xin Wang[1*]

1 *Foreign Environmental Cooperation Center (FECO), Ministry of Ecology and Environment (MEE), Beijing 100035, China*
2 *School of Finance, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China*

ABSTRACT

Background & Aim: Biodiversity credit is the ecological measure of biodiversity gain and loss, quantifying the results of ecological conservation into standardized units that can be traded. Through the creation and sale of biodiversity credits, it can provide a market solution for biodiversity financing. To elucidate the evolutionary trajectory and developmental trends of biodiversity credit mechanisms, this study employs a comparative case study approach. It contrasts international frameworks—specifically those implemented in the United States, the United Kingdom, and Australia—with domestic initiatives in China. These include the Jiangxi Wetland Banking, Fujian Nanping Ecological Banking, Zhejiang Lishui Eco-Credit Evaluation, and biodiversity-themed green bonds. The analysis is structured around three key dimensions: the methodology for credit accounting, the system of constraints and incentives, and the market-based operational model. Analysis of China’s biodiversity compensation mechanism has revealed that three aspects need to be improved: weak policy enforceability, non-standardized scientific accounting, and insufficient market activity. The root cause of these shortcomings can be attributed to the mechanism’s predominant

收稿日期 Received: 2025-07-29; 接受日期 Accepted: 2025-12-05
基金项目：国家重点研发计划(2024YFF1307605) Supported by the National Key Research and Development Program of China (2024YFF1307605)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: wang.xin@fecomee.org.cn

focus on economic compensation. This approach prioritizes “economic equivalence” at the expense of “ecological equivalence”, thereby failing to ensure the functional integrity of the ecosystems being compensated.
Suggestions: We propose a three-step implementation pathway: First, develop methodologies to ensure scientific rigor, standardization, and transparency in quantifying biodiversity credits, with third-party certification to enhance market recognition. Second, facilitate successful bottom-up pilot transactions to provide essential decision-making support for top-down legal and policy frameworks. Efforts should be made on both sides. Supply side: enact national park legislation to grant conservationists the right to monetize conservation outcomes as biodiversity credits; Demand side: mandate developers to comply with specific obligations for achieving “no net loss” of biodiversity by revising the Regulations on Ecological Protection Compensation and the Environmental Impact Assessment Law. This includes incorporating core requirements such as quantifying biodiversity gains and losses, assessing ecological scarcity, implementing mitigation hierarchy and offsetting measures, and ensuring a credit validity period of ≥ 30 years. Only with “legal compulsion + market incentives” model successfully put into effect, can biodiversity credit become an effective mechanism to support high-quality development goals, and help make lucid waters and lush mountains become invaluable assets.
Key words: biodiversity credits; biodiversity offsetting; Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)

生物多样性信用(biodiversity credits)的产生来源于生物多样性抵消(biodiversity offsetting)项目, 类似于碳抵消(carbon offsetting)项目产生碳信用(carbon credits)。因此, “生物多样性损益的生态量度”是生物多样性信用的早期定义, 用于计算开发项目与生物多样性银行基于损益相抵原则开展信用交易所需的抵消额度(Scheiner, 2012); 随着近年来的创新实践, 尤其是生物多样性净增益”(biodiversity net gains, BNG)的提出, 使生物多样性信用的内涵和外延广义化, 成为一种可代表生物多样性保护成果的交易单位(Taskforce on Nature Markets, 2023), 用途从原本被动抵消转变为主动投资, 目标也从确保“无净损失” (no net loss, NNL)扩展为追求总体增长或净正面影响(net positive impact, NPL); 世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)将其定义为“一种经济工具, 为能够带来生物多样性净增益的措施, 如保护或恢复物种、生态系统或自然栖息地提供资金” (Ducros & Steele, 2022), 主要应用于: (1)强制性抵消。开发商为满足“无净损失”要求而购买信用, 作为获得项目开发许可证的前置条件(胡远洋, 2022; 马朋林和郝欣欣, 2022); (2)自愿性市场。企业为提升“环境、社会和公司治理” (environmental, social and governance, ESG)评级、披露生物多样性信息或履行社会责任而认购信用(赵阳, 2021; 彭昀月等, 2024)。

虽然我国生物多样性融资领域已取得较大进展, 但目前仍远不能满足保护资金需求。例如, 江西湿地银行、福建南平森林银行和浙江丽水生态信用评价等信用实践已初现成效, 但受制于生物多样性信用定义的模糊性、度量的复杂性和交易的困难性, 融资效力远未发挥出来。本文探索从强制性抵消与自愿性市场两方面完善生物多样性信用机制, 通过梳理国际发展脉络、中外实践比较、异同点分析和差距识别, 提炼适配中国国情的成功经验, 旨在建立健全生物多样性多元化投融资机制, 以破解资金困局并构建长效“造血”功能。

1 生物多样性信用机制的国际发展

生物多样性信用概念起源于企业与生物多样性抵消项目(BBOP, 2009), 作为抵消额度的生态量度。迄今为止, 已有37个国家通过生物多样性抵消立法, 但只有澳大利亚、美国、英国和哥伦比亚等少数国家有效实施(韩丽丽等, 2025), 原因在于信用供需匹配难度较大。从供给侧看, 信用量化需采用全国统一标准, 鼓励保护者将保护成果转化为信用交易获利。从需求侧看, 一是强制性抵消需配套行业许可证、国家标准、特许经营和信息披露等约束硬化条件; 二是自愿性市场需采取生态认证、绿色评级和信贷优惠等激励优化举措。下面从3个方面总结英国、美国和澳大利亚等国的成功经验(Box 1)。

1.1 信用量化

生物多样性信用核算的主流方法包括4类, 各类方法的特色与适用场景不同。(1)当量法(澳大利亚)。以受威胁物种或生态系统的损失量为基准, 量化开发活动造成的生态损害价值, 并转换为需补偿的“信用当量” (NSW Department of Planning and

Box 1 国外成熟的生物多样性信用市场机制比较

比较维度	美国 湿地缓解银行	澳大利亚 生物多样性银行	英国 生物多样性净增益认证	哥伦比亚 栖息地银行
适用法律	联邦《清洁水法》	联邦《环境保护和生物多样性保护法》, 联邦《环境抵消政策》	《环境法》《开发项目纳入生物多样性净增益设计和实施的过程规范》	《环境许可法》
交易单位	1信用 = 1 ha功能完整湿地	修复需求当量法(如大堡礁珊瑚礁1%修复率对应1,000信用单位)	生物多样性单位(BU)	自愿性生物多样性信用(VBC); 1 VBC = 保护/恢复10 m^2森林30年
主要指标	湿地面积(ha) × 栖息地质量权重系数	生态系统积分 = 基线生物多样性价值 × 恢复有效性系数, 与物种积分加权计算	多维度指标涵盖物种种群、栖息地质量、生态功能与结构等核心要素	物种保护数量、栖息地恢复面积、碳固定量、社区惠益分配率
供需模式	许可证制度: 开发者事先从政府管理的湿地银行认购足量信用, 作为获得开发许可的前提条件	许可证制度: 开发者事先从政府管理的生物银行认购足量信用, 作为获得开发许可的前提条件	许可证制度: 开发者事先从政府管理的生物多样性净增益(biodiversity net gains, BNG)平台认购足量信用, 作为获得开发许可的前提条件	自愿交易: 保护组织将"生物多样性信用+碳信用"捆绑销售, 价格为30美元/信用含10 m^2林保护+1吨碳汇, 用于企业认购
评估方法	以受影响的栖息地面积作为主要衡量指标, 辅以生态功能权重	以受影响生态系统和物种的补偿需求当量为基准	量化栖息地类型、物种多样性和生态功能	综合IUCN红色名录风险等级、保护年限、生态连通性、社区参与和碳信用
统一度量工具	《统一缓解评估方法》	《生物多样性银行认证方法学》	《生物多样性净增益认证指南》《生物多样性度量工具3.1》	基于IUCN红色名录风险等级和生态连通性量化信用
实施范围	湿地生态系统, 覆盖全国	所有开发项目, 覆盖全国	所有开发项目, 覆盖全国	IUCN红色名录包括的高风险生态系统
空间调整	本地补偿, 邻近性优先; 若高价值栖息地受损或异地需提高补偿比例	允许异地补偿, 需满足生态等效性(如同一生态区、同类栖息地)	采取优先场内补偿, 其次场外(异地就近)补偿的分级机制	允许跨区域补偿, 需通过科学评估确保生态连通性
保护期限	信用有效期 ≥ 项目开发影响时间	抵消效果至少长达30年, 需长期监测和维护	至少30年, 要求持续监测和适应性管理	至少30年, 通过社区协议和长期租赁确保保护地稳定性
平台登记	湿地抵消银行账户系统由美国陆军工程兵团管理	生物多样性抵消银行认证数据库, 记录生态系统和物种积分交易	通过"BNG Register"平台完成信用认证和交易, 资金进入政府生态基金	Terrasos交易平台, 登记碳和生物多样性信用, 与Verra国际标准对接
独立认证	美国陆军工程兵团审批湿地银行资质, 核发信用额度	环境部核发生物多样性信用, 独立第三方验证	英国标准协会发布标准, 第三方机构核证	国际标准认证(Verra, 2023)
效益展示	2016年全国湿地信用销售额67亿美元	累计保护5.7万ha大堡礁珊瑚礁	开发商需承担信用购买成本和30年维护费用; 2023年全国5亿英镑信用销售额	累计售出180万美元的VBC信用单位
典型项目案例	佛罗里达州大沼泽地修复项目, 通过湿地银行抵消房地产开发影响	新南威尔士州煤矿修复项目, 通过生物多样性抵消银行补偿矿区生态破坏	伦敦泰晤士河畔开发项目, 通过BNG认证实现10%净增益	Bosque de Niebla云雾森林项目, 保护眼镜熊(*Tremarctos ornatus*)和黄耳长尾鹦鹉(*Psephotellus chrysopterygius*)栖息地
优势与挑战	成熟的市场机制, 存在本地局限性, 异地抵消的生态等效性受质疑	机制成熟, 但生态重建区需要大量土地, 土地成本高	适配城市基础设施开发, 跨区域生态效益转移存在争议	森林项目扩展性高, 未涉及湿地和海洋, 方法学移植需本地化调整

Environment, 2023)。(2)面积法(美国)。以受影响的栖息地面积为核心指标, 如: 1信用单位 = 1ha功能完整湿地。湿地功能完整性标准包含水文、土壤等8个生态指标(刘金淼等, 2018)。(3)多维度法(英国)。不仅考虑生境面积、质量和稀缺性, 还整合了补偿难度、保护期限和空间风险等动态调整因素, 并采取优先场内补偿, 其次场外(异地就近)补偿的分级机制。首先将生境类型按稀缺性分为高/中/低三级(分别赋分3/2/1分), 再按生态功能完整性赋予1–3倍的条件系数(完整原生植被 = 3.0, 退化区 = 1.2), 生境类型分 × 条件系数 = 信用值, 如保护1 ha高级生境(3分)且条件优(3倍)可获9信用单位

(https://www.gov.uk/government/statistics/england-biodiversity-indicators)。(4)多变量法(国际框架)。如关键生物多样性变量法(essential biodiversity variables, EBVs)包含6大类21种指标: 遗传组分(种内遗传多样性、遗传分化、有效群体大小等)、物种种群(物种分布、物种丰度等)、物种特征(形态学、生理学、物候学等)、群落组成(群落丰度、系统分类学、系统发育多样性等)、生态系统功能(初级生产力、生态系统物候学等)和生态系统结构(生物覆盖、生态系统分布等)。作为国际框架, 可以协调不同国家的方法学, 科学支撑全球可比性(Sarmiento & Morgan, 2023)。

1.2 政策推行

政策推行分为强制性和激励性两种, 前者拉动抵消需求, 后者创造信用供给。

一是强制性政策, 专门要求开发者实现“无净损失”。(1)国家立法, 如澳大利亚《环境和生物多样性保护法1999》(Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999)衍生的《环境补偿政策》(Environmental Offsets Policy 2012)纳入了生物多样性无净损失要求; (2)国家标准, 如英国《环境法2021》(Environment Act 2021)推动出台《商业开发项目纳入生物多样性净增益设计和实施的过程规范》(BS 8683: 2021 Process for Designing and Implementing Biodiversity Net Gain. Specification), 强制项目开发不仅要满足无净损失, 还要实现至少10%的生物多样性净增益; (3)许可证制度, 如美国《清洁水法》(Clean Water Act)修订后, 增加针对湿地侵占的“404条款”, 再由404条款派生出“404许可证”, 将湿地“无净损失”作为开发商获得许可证的前置条件。

二是激励性政策, 赋予保护者将保护成果转化为信用并经营获利的权利。(1)全国统一信用平台。截至2020年, 美国湿地缓解银行(Wetlands Mitigation Banking)保护了全国范围内的369,882 ha湿地及河流, 2016年交易总额为67亿美元(颜宁聿等, 2020); 英国“生物多样性净增益认证中心”由英国环境、食品和农村事务部直接运营管理(UK Government, 2023); 澳大利亚《大堡礁2050长期可持续发展计划》(Reef 2050 Long Term Sustainability Plan)催生出“珊瑚礁信用”市场机制, 将每信用单位对应1 kg溶解无机氮或538 kg沉积物的减少量, 经由第三方审计, 进入市场交易(Pollination, 2023)。(2)全国统一信用认证。英国《生物多样性净增益认证指南》(UK Department for Environment, Food & Rural Affairs, 2021), 美国《联邦湿地补偿银行导则》(Federal Guidance for the Establishment, Use, and Operation of Mitigation Banks 1995)和澳大利亚《生物多样性银行认证方法学》(Bio-Banking Certification Assessment Methodology, BCAM) (表1)既可量化开发活动造成的损失量, 又能核算缓解活动产生的收益量, 并提供“损益相抵”核证标准。

1.3 信用交易

信用交易作为生物多样性补偿市场化运作的核心载体, 通过强制性抵消与自愿性市场双轨并行, 实现了生态责任从行政约束向经济杠杆的转化。

一是强制性抵消。主要在已出台强制抵消政策的国家实施。美国湿地缓解银行允许新建和修复湿地的公共或私营机构将保护成果转化为信用单位与占用湿地的开发商交易(胡远洋, 2022); 澳大利亚生物多样性银行(Bio-banking)与英国生物多样性净增益认证机制的工作原理与美国类似, 都要求遵循“层级缓解” (避免→最小化→修复→抵消)的优先序列, 抵消作为最后手段。

二是自愿性市场。哥伦比亚栖息地银行(Habitat Banking)由于没有抵消立法支持, 所以采取“生物多样性信用+碳信用”捆绑认证方式, 每信用单元含10 m^2森林保护 + 1吨碳汇, 售价30美元, 信用有效期 ≥30年。通过“双信用”使行业约束力与市场吸引力得以增强, 弥补了法律强制性不足(The Wallacea Trust, 2023)。美国湿地缓解银行、澳大利亚生物多样性银行每年的信用交易额为30–70亿美元, 英国生物多样性净增益认证中心年交易额在5–10亿英镑之间, 它们并不是真正的银行, 而是用来提供抵消额度的“信用储备库”; 采用以透明度著称的银行信贷模式, 保证账户登记和交易流程的可追溯性, 采用“损益相抵”原则, 将开发者(企业)的生态责任转嫁给自身的等价交换平台(赵阳等, 2024a)。马来西亚没有建立全国统一的信用登记交易平台, 但棕榈油行业协会与保护区签署抵消协议, 为100 m^2雨林恢复面积支付的信用单价为10–30美元; 美国湿地协会根据《濒危物种法》(Endangered Species Act)

表1　澳大利亚Warkworth Mine煤矿项目应用《生物多样性银行认证方法学》量化生物多样性损失量和收益量实例
Table 1　Application case of Bio-Banking Certification Assessment Methodology (BCAM) to quantify biodiversity loss & gain in the Warkworth Mine Coal Project, Australia

受开发项目影响类型 Types affected by development project	影响面积 Area affected (ha)	影响面积换算为信用损失量 Area affected converted into credit loss	4个重建区实现信用增益量 Credit realized in four eco-reconstruction areas	信用差额(净增益) Credit difference (net gain)
生态系统类型 Ecosystem type				
沙林地 Sands woodland	72.12	3,043	Southern区与Northern区通过“场内补偿” (重建区位于项目区域内)实现的信用增益量分别为11,231和4,214; Goulburn区与Bowditch区通过“场外补偿” (重建区位于项目区域外)实现的信用增益量分别为16,717和4,985 Credits realized in on-site reconstruction in Southern & Northern areas are 11,231 and 4,214; credits realized in off-site reconstruction in Goulburn & Bowditch areas are 16,717 and 4,985	37,463 – 31,700 = 5,763
沙草地 Sands grassland	0.67	16		
灰铁树林 Grey box-ironbark woodland	614.64	23,384		
修复的澳洲灰铁树林 Regenerating grey box-ironbark woodland	6.43	108		
铁皮斑点灰箱林 Ironbark-spotted gum grey box forest	16.61	633		
灰铁树林衍生草地 Grey box-ironbark woodland derived grassland	378.6	4,516		
总计 Total	1,089.1	31,700	37,463	5,763
物种栖息地类型 Habitat type of species				
大食蚁兽觅食栖息地 Giant anteater foraging habitat	709.5	18,932	Southern区与Northern区通过场内补偿实现的信用增益量分别为3,845和895; Goulburn区与Bowditch区通过场外补偿实现的信用增益量分别为30,001和20,498 Credits realized on-site reconstruction in Southern & Northern areas are 3,845 and 895; credits realized in off-site reconstruction in Goulburn & Bowditch areas are 30,001and 20,498	56,630 – 37,294 = 19,336
大耳蝙蝠繁殖栖息地 Large-eared pied bat breeding habitat	10.5	139		
南方鼠耳蝠繁殖栖息地 Southern myotis breeding habitat	237	18,223		
总计 Total	957	37,294	56,630	19,336

成立“物种银行”, 拥有通过认证的739个濒危青蛙和蝴蝶信用, 用于抵消的每个信用平均售价逾2万美元(Radjabov, 2023)。

2　国内生物多样性信用实践比较

2.1　国内生物多样性信用机制进展

我国目前地方层面已创新开展零星的自愿性交易, 主要集中在生态产品领域。当地政府通过整合湿地、森林等碎片化资源, 实施集约化管理, 开展产业化经营, 以生态银行模式运作, 在生物多样性信用量化、激励约束政策和市场自愿交易等方面做出了有益尝试。

2.1.1　江西湿地银行

江西湿地银行首创“省级定额+市县动态调整”管控机制, 创建“占补平衡”指标交易的市场需求。(1)管控湿地总量。2021年出台《江西省“湿地银行”建设试点实施方案》, 建立全省统一的湿地资源数据库, 明确省、市、县三级湿地面积约束性目标, 通过省级定额, 调整市县达标指标。(2)建立信息平台。允许产权主体通过自主修复或合作开发, 以新增修复湿地面积为核心指标, 生态功能提升为辅助指标, 还包括湿地生态产品开发权(如生态旅游、农牧渔复合经营)、碳汇权益等衍生权益, 打包形成可交易指标并在在线平台登记、挂牌, 吸引企业和社会资本通过“公私合营”等模式参与修复与经营。(3)明确定价方法。参考“生态系统生产总值” (gross ecosystem product, GEP)框架, 量化湿地在水源涵养、固碳减排、生物多样性维护等方面的综合价值, 形成指标定价基准, 根据市场供需和修复成本, 允许指标所有者在合理区间自主定价或动态调整(余燕和钟南涛, 2022)。

2.1.2　福建南平生态银行

南平市分别建立“森林生态银行” “水生态银行” “文旅生态银行”试点。以森林生态银行为例, 其运行机制可归纳为3个方面: 一是建立市县级台账, 将分散、零碎的林业资源集约化整合, 便于规模化经营。二是政府成立公司, 统筹运营生态资产, 具体涵盖4个方面: (1)林地经营权: 碎片化林地整合

后的租赁、赎买和托管权益, 采用森林管理委员会(Forest Stewardship Council, FSC)认证标准, 提升木材出口溢价。(2)林票: 5年期林权资产证券化产品, 用于银行质押贷款或延长经营资质期限。(3)林业碳汇: 碳汇核算参考核证碳标准(verified carbon standard, VCS), 探索竹林碳汇项目潜力。(4)林下空间经营权。发放“林下空间经营权证”, 用于种植中药材等经济作物。三是吸引社会资本, 投资开发碳汇、林下经济, 参与林地赎买、租赁。通过实施“政府主导+企业运营+林农参与”的治理体系, 多项社会经济指标均实现大幅增长(张林波等, 2023)。

2.1.3 浙江丽水生态信用评价

浙江丽水生态信用评价涵盖企业、村集体和个人3类主体, 将信用评价与环境权益挂钩。以企业主体为例: 一是建立信用评价模型, 聚焦企业清洁生产(单位能耗、污染物排放)。二是将生态信用积分与贷款优惠挂钩, 如提高企业排污权抵押贷款额度, 生态环境绩效纳入绿色信贷评级, 提供“两山贷”“GEP贷”。三是制定《生态信用评价规范》省级标准, 提高量化标准透明度, 如企业清洁生产认证+20分, 每万元产值能耗下降1% +5分, 村集体水质Ⅱ类以上+15分, 优先获得生态补偿资金等。四是构建“丽水山耕”品牌, 注册为全国首个含有地级市名的集体商标, 包含多个当地特色农林牧副渔和文旅生态产品, 由政府与企业共同营建, 适合互联网渠道销售(郑卓联等, 2022)。

比较国内上述实践的异同点发现: 江西湿地银行的信用单位是单一的占补平衡指标; 福建南平生态银行的信用较为多样: 林票、经营权证和新型碳汇; 浙江丽水则将企业能耗与减污降碳等行为量化成为积分, 给与贷款增信优惠。三者存在指标交易、权益交易和积分增信的差异, 从共性来看, 三者都是依赖地方政府推动平台搭建、制定规则和初始交易撮合, 均属于基于本地资源禀赋市场创新, 但都没有形成跨区域流通的标准化信用单位。

2.2 生物多样性信用机制中外实践比较

与国际相比, 中国生物多样性信用市场呈现“地方试点创新活跃、全国统一市场尚未形成”的特点。江西湿地银行、福建南平生态银行、浙江丽水生态信用评价机制与美国湿地缓解银行、澳大利亚生物多样性银行、英国生物多样性净增益认证等国际案例相比, 企业认购生物多样性的内在动力普遍不足, 其动机仅有少数是受ESG评级与信息披露的市场要求所驱动; 更多情况下, 交易依赖于政府撮合, 或通过省级定额, 形成达标指标, 市县级横向交换(刘耕源等, 2021)。具体分析如下:

一是政策约束力。中国目前依赖《生态保护补偿条例》等行政法规和地方政策, 如《江西省“湿地银行”建设试点实施方案》, 国家层面尚缺乏将生物多样性影响“抵消净零”作为开发项目强制性前置条件的明确规定。开发商购买生物多样性信用基于“行政指导”而非“合规必需”, 导致需求侧不稳定、市场规模有限; 国际案例如美国《清洁水法》、澳大利亚《环境与生物多样性保护法》和英国《环境法》均为联邦法律, 强制要求“无净损失”甚至“净增益”, 并通过法律派生出许可证制度, 具有全国统一效力, 是刚性需求的核心来源。哥伦比亚栖息地银行虽无国内立法支持, 但采用国际认证, 具有行业约束力(Porras & Steele, 2020)。

二是核算科学性。国内采用“一地一策”。《丽水生态信用评价框架》行为积分的量化沿用“生态系统生产总值”核算体系, 未纳入濒危等级、物种丰度等生物多样性核心指标; 福建南平生态银行以面积为基础, 辅以环境监测数据, 生态功能量化仍需完善。各地规则差异大导致信用无法跨区域互认, 信用交易模式可复制性弱, 难以形成全国市场; 英国、美国和澳大利亚均采用全国统一的多维度量化模型。如英国BNG的“生境类型×条件系数”模型、澳大利亚的“修复需求当量法”, 均引入生态稀缺性权重, 用来分类生态系统风险等级, 且涵盖物种、栖息地功能、生态连通性等关键指标, 并设置空间/时间调整系数(如异地补偿需提高比例, 信用有效期 ≥30年), 确保信用在全国范围内可比、可交易、可追溯。

三是市场活跃度。国内生物多样性信用流动性不强, 以省内交易为主, 无跨省能力, 缺乏激励(信用认证)和约束(信息披露)措施, 企业参与度低(秦涛等, 2025), 主要是受到几方面制约: (1)需求侧: 企业购买信用多为提升ESG形象, 而非法律义务; (2)供给侧: 处于初期市场阶段, 信用流动性不足, 依赖政府补贴, 如江西湿地银行年交易额仅为3,000万元, 福建林票、碳汇未形成稳定市场; (3)长

效监管与权益分配机制不完善。监管周期短: 项目保护期通常5–8年, 无法保障生态效果持久性; 社区参与弱: 收益分配多依赖政府“普惠激励”, 而非制度化分享; (4)国际接轨不足: 信用未对接Verra等国际标准, 无法进入全球市场, 限制了信用价值和融资渠道。国际案例采用立法强制力、核算科学性、交易透明度和流程标准化等多样化手段, 打破行政或地理限制, 统一全国信用平台。同时, 实施第三方长期监测, 保证信用有效期 ≥ 30年, 并通过明确社区收益分配比例, 保障公平性。

通过国内实践与国际案例比较, 可以发现中外生物多样性恢复补偿的治理逻辑存在差异。中国更多的是依靠行政法规的柔性指导, 美国、英国、澳大利亚则为来自国家或联邦立法的刚性约束。这导致市场由不同因素驱动: 国外的生物多样性信用需求由法律条款派生出的许可证制度拉动, 强制企业事先认购足量信用作为项目开发的前置条件; 我国的信用交易则主要依赖行政指标分配和政府撮合。究其背后深层次原因, 主要有以下3方面:

(1)法律体系。中国法系属于大陆法系, 在立法传统与司法实践上与英美法系(隶属于海洋法系)不同。美国法官可以通过判例扩大《清洁水法》的适用性, 而中国成文法体系更依赖行政细则。例如, 《中华人民共和国环境影响评价法》和《生态保护补偿条例》没有对项目量化生物多样性损益, 评估生态稀缺性、实施强制抵消(如无净损失)和信用有效期(如 ≥30年)提出具体要求。

(2)政策设计。我国制定生态补偿制度, 以经济补偿为主, 补偿标准以经济等效性优先。例如, 《生态保护补偿条例》将“财政纵向补偿” (中央对地方的转移支付) 和“横向补偿” (区域间协商)作为两大支柱, 未对“生态功能等价”做出明确规定, 制度设计仍有进一步细化和落实的空间。

(3)实施主体。我国生态补偿以政府为实施主体, 以市场为辅助手段。例如, 福建南平生态银行开展的林地碎片化整合, 其优先保障工业和基建用地的做法, 与地方经济增长目标相契合; 江西湿地银行的交易数据显示, 在其“占补平衡”指标实现的3,000万元年度交易额中, 超过80%由地方国企与政府城投公司认购, 私营企业自主购买比例显著偏低。这表明, 当前补偿机制的市场化程度不足, 市场主体需要改变, 市场供需关系需要完善。

3 构建生物多样性信用机制建议

当前, 我国建立生物多样性机制所需环境日渐完善。(1)已有政策。2021年《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》要求, 让保护修复生态环境获得合理回报, 让破坏生态环境付出相应代价, 其本质上已提出“损益相抵”的交易原则; 2022年《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》倡导推动完善生态环保信用制度, 创新信用融资服务和产品; 2024年中国人民银行等四部门印发的《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》, 明确提出“建立生态信用行为激励机制”与企业降碳、减污、扩绿等表现挂钩。(2)已有要求。《湿地保护修复制度方案》《耕地占补平衡考核办法》从占地面积和生态功能上, 提出了“先补后占、占补平衡” “替代修复, 等量恢复”等类似于“无净损失”的抵消要求。(3)已有基金。《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》形成了向企业征收、由政府管理的专项保护基金。(4)已有实践。如江西湿地银行出售“占补平衡”指标, 以及福建南平生态银行、浙江丽水生态信用评价、千岛湖水基金、安徽九龙峰保护区委托管理等地方做法, 采用“一地一策”的信用机制。(5)已有创新。2024年深圳红树林保护项目产生的碳汇减排量, 以485元/吨的价格被某化妆品企业购买。溢价如此之高, 不只因为红树林碳汇, 重要的是国家一级保护动物黑脸琵鹭(*Platalea minor*)的保护价值。这是信用认可度高的证据, 如果加以认证背书, 还能吸引ESG投资, 如哥伦比亚栖息地银行, 发行收益与生物多样性绩效挂钩的绿色债券如南非犀牛债券(赵阳等, 2024b)。

建议围绕3大支柱进一步完善我国生物多样性信用机制。强制性抵消以立法为核心, 确保“无净损失”; 自愿性市场以激励为驱动, 提升流动性; 积极探索第三个支柱: 绿色化金融。采取“生物多样性信用+碳信用”双认证方式, 使保护项目具备的协同增效和多重价值得以展示, 增强对金融机构和私营部门的投资吸引力。三大支柱相互支撑、有机衔接, 共同构成“法律强制+市场激励+金融创新”的系统框架, 为中国实现“自然受益”转型及《昆蒙框架》提

出的“2050年净积极影响”目标提供坚实的机制保障。具体行动建议如下:

3.1 强制性抵消

解决“政策约束力不足”的问题。(1)制定国家生物多样性信用认证方法学。基于“关键生物多样性变量”国际框架, 发挥卫星遥感大数据的技术能力和“全国一盘棋”的制度优势, 对内统一各地不同的核算标准, 对外增强国际可比性, 展示《生物多样性公约》履约成果。(2)修订法律催生许可证制度。修订《生态保护补偿条例》和《环境影响评价法》, 提升“生态等效性”权重并促进与“经济等效性”协调平衡, 要求重点区域(如长江经济带、国家公园周边)的开发项目(如采矿、基建)必须实现生物多样性无净损失, 未达标者不予发放施工许可。(3)发布“商业开发项目纳入生物多样性净增益的设计和实施过程规范”国家标准。纳入生境面积、质量和稀缺性, 整合保护期限(信用有效期 ≥30年)、空间因素(允许异地抵消, 如长三角地区开发商购买青海三江源湿地修复信用时, 需提高补偿比例, 确保生态等效性)和场内场外的分级补偿机制, 致力于打破跨区域交易壁垒, 构建全国统一的强制抵消框架。

3.2 自愿性市场

解决“市场活跃度低”的问题。通过自下而上的试点交易, 探索成功案例以支撑国家决策。一是ESG激励政策。(1)修订《上市公司可持续发展报告指引》, 增加“占补平衡” “等量恢复” “无净损失”的适用范围, 倒逼企业自愿认购生物多样性信用以提升ESG表现。(2)生物多样性信用积分纳入ESG评级体系, 根据企业积分给予优惠, 如用地指标、绿色信贷、市场准入、特许经营、生态认证、税收减免等。二是扩大信用供给和流动性。(1)建立国家级“信用储备池”, 整合碎片化资源(如江西湿地占补平衡指标、福建南平森林修复量、浙江丽水企业生态信用), 在统一平台登记和交易; (2)推动信用第三方认证(如英国BNG认证), 增强市场信任度, 吸引中小企业和社会资本参与; (3)在信用量化中纳入惠益公平分享以增加信用估值, 在权益分配中确保地方社区公平获益。例如, 借鉴国际案例(如哥伦比亚栖息地银行), 通过社区共管协议保障信用长期稳定性。

3.3 绿色化金融

解决生态信用评价“一地一策”碎片化问题。(1)生态资源打包估值须量化生物多样性信用作为基本原则, 纳入各地“两山贷”与“GEP贷”审核标准; (2)鼓励通过“生物多样性信用+碳信用”双认证, 将盈利能力弱的保护类项目与经营性项目打包实施, 使项目具备多重效益; 给予“双信用”认证打包项目生态补偿、税收减免、政府担保、财政托底和贴息贷款等优惠, 增强项目吸引力, 拉动企业投资; (3)通过国家公园立法, 激励保护者将保护成果转化为生物多样性信用, 用于获得经营性和投资性收入的权利。根据《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》“将生物多样性保护纳入《绿色债券支持项目目录》”倡导, 探索以生物多样性为主题的绿色债券融资。例如, 大熊猫国家公园债券的票息与红外相机监测种群数量挂钩; 海南红树林债券以双信用认证溢价+生态旅游收入作为还款来源; 长江生态补偿债券由流域下游政府带头认购, 拉动企业投资, 资金用于上游信用生产。

参考文献

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme) (2009) Biodiversity Offset Cost-Benefit Handbook. BBOP, Washington, DC.

Ducros A, Steele P (2022) Biocredits to Finance Nature and People: Emerging Lessons. International Institute for Environment and Development (IIED), London & Edinburgh. https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/2022-11/21216IIED.pdf. (accessed on 2023-08-16)

Han LL, He YJ, Zhu ZF, Wang C (2025) Research status, hotspots and enlightenment of biodiversity credit—Visual analysis based on CiteSpace. Acta Ecologica Sinica, 45, 2529–2543. (in Chinese with English abstract) [韩丽丽, 何友均, 朱震锋, 王超 (2025) 生物多样性信用研究现状、热点及启示——基于CiteSpace的可视化分析. 生态学报, 45, 2529–2543.]

Hu YY (2022) Research progress on biodiversity offsetting. Biodiversity Science, 30, 21266. (in Chinese with English abstract) [胡远洋 (2022) 生物多样性抵消的研究进展. 生物多样性, 30, 21266.]

Liu GY, Yan NY, Yang Q, Zhao Y (2021) Research on Eco-bank operation mechanism and local transformation: A case study. Natural Resource Economics of China, 34(2), 4–13, 48. (in Chinese with English abstract) [刘耕源, 颜宁聿, 杨青, 赵勇 (2021) 生态银行运行机制与本土化改造研究: 案例实证. 中国国土资源经济, 34(2), 4–13, 48.]

Liu JM, Sun FX, Li LP (2018) The experience of American wetland mitigation banking and its enlightenment to China. Environmental Protection, 46(8), 75–79. (in Chinese) [刘金淼, 孙飞翔, 李丽平 (2018) 美国湿地补偿银行机制及对我国湿地保护的启示与建议. 环境保护, 46(8), 75–79.]

Ma PL, Hao XX (2022) Application of biodiversity credit in mine biodiversity compensation—A case study on the coal mine biodiversity compensation in New South Wales, Australia. Land and Resources Information, (3), 24–32. (in Chinese) [马朋林, 郝欣欣 (2022) 生物多样性信用在矿山生物多样性补偿中的应用——以新南威尔士州煤矿生物多样性补偿为例. 国土资源情报, (3), 24–32.]

NSW Department of Planning and Environment (2023) What are Biodiversity Credits? http://www.environment.nsw.gov.au/topics/animals-and-plants/biodiversity-offsets-scheme/buying-selling-credits-market-information/what-are-biodiversity-credits. (accessed on 2025-06-16)

Peng YY, Jin T, Zhang XQ (2024) Biodiversity credits: Concepts, principles, transactions and challenges. Biodiversity Science, 32, 23300. (in Chinese with English abstract) [彭昀月, 靳彤, 张小全 (2024) 生物多样性信用的概念、原则、交易和挑战. 生物多样性, 32, 23300.]

Pollination (2023) State of Voluntary Biodiversity Credit Markets: A Global Review of Biodiversity Credit Schemes. https://pollinationgroup.com/wp-content/uploads/2023/10/Global-Review-of-Biodiversity-Credit-Schemes-Pollination-October-2023.pdf. (accessed on 2025-08-16)

Porras I, Steele P (2020) Making the Market Work for Nature: How Biocredits Can Protect Biodiversity and Reduce Poverty. International Institute for Environment and Development (IIED), London & Edinburgh https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/16664IIED.pdf. (accessed on 2025-06-16)

Qin T, Yu H, Ren LJ, Zhu R (2025) "Eco-bank" models: Comparison, development dilemmas and innovative strategies. World Forestry Research, 38(2), 129–136. (in Chinese with English abstract) [秦涛, 于航, 任立久, 朱然 (2025) "生态银行"模式比较、发展困境与创新策略. 世界林业研究, 38(2), 129–136.]

Radjabov T (2023) Biodiversity Credit—An Effective Trade-off Mechanism. https://www.undp.org/uzbekistan/blog/biodiversity-credit-effective-trade-mechanism. (accessed on 2025-06-16)

Sarmiento M, Morgan S (2023) Biodiversity Credits: An Opportunity to Create a New Financing Framework (Commentary). https://news.mongabay.com/2023/02/biodiversity-credits-an-opportunity-to-create-a-new-crediting-framework-commentary. (accessed on 2025-06-16)

Scheiner SM (2012) A metric of biodiversity that integrates abundance, phylogeny, and function. Oikos, 121, 1191–1202.

Taskforce on Nature Markets (2023) Biodiversity Credit Markets: The Role of Law, Regulation and Policy. https://www.globallandscapesforum.org/publication/biodiversity-credit-markets. (accessed on 2025-06-16)

The Wallacea Trust (2023) Methodology for Quantifying Units of Biodiversity Gain. https://wallaceatrust.org/wp-content/uploads/2022/12/Biodiversity-credit-methodology-V3.pdf. (accessed on 2025-02-28)

UK Department for Environment, Food & Rural Affairs (2021) Process for Designing and Implementing Biodiversity Net Gain Specification. https://www.en-standard.eu/bs-8683-2021-process-for-designing-and-implementing-biodiversity-net-gain-specification. (accessed on 2025-06-16)

UK Government (2023) England Biodiversity Indicators. https://www.gov.uk/government/statistics/england-biodiversity-indicators. (accessed on 2025-06-16)

Verra (2023) SD VISta Nature Framework v0.1 for Public Consultation. https://verra.org/wp-content/uploads/2023/09/SD-VISta-Nature-Framework-v0.1-for-Public-Consultation.pdf. (accessed on 2025-06-20)

Yan NY, Liu GY, Fan ZL (2020) Research on eco-bank operation mechanism and localization transformation: A literature review. Natural Resource Economics of China, 33(12), 10–24. (in Chinese with English abstract) [颜宁聿, 刘耕源, 范振林 (2020) 生态银行运行机制与本土化改造研究: 文献综述. 中国国土资源经济, 33(12), 10–24.]

Yu Y, Zhong NQ (2022) Jiangxi's first "wetland bank" was established. Land Greening, (2), 8. (in Chinese) [余燕, 钟南清 (2022) 江西首家"湿地银行"挂牌成立. 国土绿化, (2), 8.]

Zhang LB, Cheng L, Xiang WJ, Hao CZ, Yang BY, Liang T (2023) The development history, operation mode and improvement suggestions of China's "forest ecological bank"—A case study of Nanping City, Fujian Province. Environmental Protection, 51(17), 21–26. (in Chinese with English abstract) [张林波, 程亮, 相文静, 郝超志, 杨彬煜, 梁田 (2023) 我国"森林生态银行"的发展历程、运行模式与完善建议——以福建省南平市为例. 环境保护, 51(17), 21–26.]

Zhao Y (2021) Enterprises Participated in Biodiversity Case Study and Industry Analysis. Shanghai Science and Technology Academic Publishing House, Shanghai. (in Chinese) [赵阳 (2021) 企业参与生物多样性案例研究和行业分析. 上海科学技术文献出版社, 上海.]

Zhao Y, Liu YQ, Wan X, Ding LM (2024a) Study on market-based realization of ecosystem product value in national parks: Taking biodiversity offsets and credits as an example. National Park, 2, 296–307. (in Chinese with English abstract) [赵阳, 刘艳青, 万霞, 丁黎明 (2024a) 国家公园生态产品市场化新路径——以生物多样性抵消和信用机制为例. 国家公园(中英文), 2, 296–307.]

Zhao Y, Wang Y, Ding LM (2024b) Implications of the rhino bond for China green bond market and Kunming Biodiversity Fund. Biodiversity Science, 32, 24363. (in Chinese with English abstract) [赵阳, 王也, 丁黎明 (2024b) "犀牛债券"对我国绿色债券和昆明生物多样性基金的启示. 生物多样性, 32, 24363.]

Zheng ZL, Zhao ZL, Jiang TT, Zheng QW (2022) Thoughts and suggestions on establishing and perfecting ecological credit system in Zhejiang Province—Based on Lishui ecological credit practice. China Engineering Consultants, (9), 67–70. (in Chinese) [郑卓联, 赵祖亮, 蒋婷婷, 郑启伟 (2022) 浙江省建立健全生态信用体系的思考和建议——基于丽水生态信用实践. 中国工程咨询, (9), 67–70.]

(责任青年编委: 赵富伟　责任编辑: 李会丽)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE
2026, 34 (1): 25241, pages 1–16
doi: 10.17520/biods.2025241
cstr: 32101.14.biods.2025241

•生物多样性保护融资与企业参与专题•

自然保护区生物多样性抵消价值实现的理论框架与运行机制

黎明[1], 秦响玲[1], 朱玉茹[1], 熊文[2*]

1. 湖北工业大学经济与管理学院, 武汉 430068; 2. 湖北工业大学土木建筑与环境学院, 武汉 430068

摘要: 在公共财政主导的自然保护区制度体系下, 生物多样性抵消作为一种自然资产市场化工具, 为解决保护与发展的资金困境提供了创新路径。本文基于自然资本理论与制度经济学的分析框架, 系统探究了生物多样性抵消的理论基础与运行机制, 旨在揭示生物多样性抵消市场构建的内在逻辑与实施路径, 助力构建自然保护区持续运维机制与长效发展策略。研究表明, 生物多样性抵消机制作为平衡保护与发展的市场化工具, 已发展成为自然资产具现的重要途径, 并在全球范围内形成了可供借鉴的实践框架; 通过构建自然保护区的生物多样性抵消运行机制可以有效推进生物多样性抵消产品的价值实现。因此, 自然保护区的生物多样性抵消价值实现可以依托科学的成本效益分析体系, 聚焦于生物多样性抵消产品开发与交易体系的构建, 推动生物多样性抵消与自然保护区发展的深度融合。

关键词: 自然保护区; 生物多样性抵消; 理论框架; 运行机制

黎明, 秦响玲, 朱玉茹, 熊文 (2026) 自然保护区生物多样性抵消价值实现的理论框架与运行机制. 生物多样性, 34, 25241. doi: 10.17520/biods.2025241; cstr: 32101.14.biods.2025241.

Li M, Qin XL, Zhu YR, Xiong W (2026) Theoretical framework and operational mechanisms of value realization in biodiversity offsetting for nature reserves. Biodiversity Science, 34, 25241. doi: 10.17520/biods.2025241; cstr: 32101.14.biods.2025241.

Theoretical framework and operational mechanisms of value realization in biodiversity offsetting for nature reserves

Ming Li[1], Xiangling Qin[1], Yuru Zhu[1], Wen Xiong[2*]

1 *School of Economics and Management, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China*
2 *School of Civil Engineering Architecture and Environment, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China*

ABSTRACT

Background & Aims: Within nature reserves governed by a public finance-dominated institutional framework, biodiversity offsetting has emerged as a market-based instrument that offers an innovative solution to the persistent funding tension between conservation and development. Drawing on the analytical perspectives of natural capital theory and institutional economics, this study systematically examines the theoretical foundations and operational mechanisms of biodiversity offsetting. The objective is to clarify the internal logic and practical pathways for establishing biodiversity offsetting markets, thereby contributing to the development of sustainable operational models and long-term strategies for nature reserves.

Methods: This study employed an integrated analytical framework that combines natural capital theory with institutional economics to systematically explore the theoretical underpinnings and operational mechanisms of biodiversity offsetting.

Results: The findings indicated that biodiversity offsetting, as a market-based instrument for reconciling conservation

收稿日期 Received: 2025-06-25; 接受日期 Accepted: 2025-12-01
基金项目: 国家社会科学基金(13BJY016)、教育部人文社会科学研究项目(17YJC790176)、国际合作项目(WWFPO3050)、湖北商务服务发展中心开放基金重点项目(2017Z001)、湖北省社科联思想库项目(HBSXK201612)、湖北省教育厅人文社科项目(19Y043)和中华环境保护基金会项目(ZXKY20250044) Supported by the National Social Science Fund of China (13BJY016), Humanities and Social Sciences Research Project of Ministry of Education (17YJC790176), International Cooperation Project (WWFPO3050), Key Project of Open Fund of Hubei Business Service Development Center (2017Z001), Think Tank Project of Hubei Provincial Social Science Association (HBSXK201612), Humanities and Social Sciences Project of Hubei Provincial Department of Education (19Y043), and Project of China Environmental Protection Foundation (ZXKY20250044)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: 751525983@qq.com

and development objectives, had evolved into a critical pathway for the monetization of natural assets and had provided valuable reference frameworks for international practice. The establishment of biodiversity offsetting mechanisms within nature reserves can effectively promote the realization of value from biodiversity offsetting products.
Conclusion: The realization of biodiversity offsetting value in nature reserves can be achieved through the application of robust scientific cost-benefit analysis frameworks, the targeted development of biodiversity offsetting products, and the construction of dedicated trading platforms. Moreover, fostering the deep integration of biodiversity offsetting mechanisms with the sustainable development goals of nature reserves is essential for ensuring their long-term viability.
Key words: nature reserves; biodiversity offsetting; theoretical framework; operational mechanisms

在全球生态环境持续恶化、生物多样性丧失加速的背景下，自然保护区作为区域物种保护的关键载体，通过实施严格保护举措为生物多样性营造了稳定生存环境，为全球生物多样性保护做出了重要贡献。据《2024年保护地球报告》，自2020年以来，国际社会在自然保护地和保留地的覆盖范围上取得了重大进展，全球新增的保护面积超过228.34万km^2 (UNEP, 2024)。在2022年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)上通过的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》中更是强调了自然保护区在生态保护与可持续发展中的重要地位，明确要求增加保护区范围以实现全球30%陆地、海洋和水域的有效保护目标(CBD, 2022a)。尽管国际社会对生物多样性保护的承诺持续增加，但资金投入与需求之间仍然存在巨大缺口。研究显示，全球每年至少需要1,030亿至1,780亿美元用于保护区的管理、维护、监测以及生态修复等工作，但现实情况中243亿美元的资金额度与维持保护体系正常运转的680亿美元的额度相去甚远(CRI, 2020)。

在以公共财政资金主导的自然保护区制度体系下，自然保护区迫切需要拓展可替代的资金渠道以支持其生物多样保护与持续发展的建设目标(Buschke et al., 2019)。生物多样性抵消作为国际上支持生物多样性保护与修复的重要市场工具，在恢复退化的保护区方面具有潜在应用价值(Kigonya et al., 2024)。生物多样性抵消通过强调任何涉及生物多样性损失的开发须由异地生态等价收益予以对待补偿的核心机制，已在世界范围内广泛应用，依托多样化的生态衍生产品特别是以“生物多样性信用”为代表的生态产品，生物多样性抵消已发展成为各国用以推进自然保护区维持机制的重要市场激励措施(Maron et al., 2016)。

中国作为全球生物多样性热点区域，现有各级各类自然保护区约2,750处，占国土面积的15%以上，涵盖森林、湿地、荒漠、海洋等多种生态系统类型。据2022年统计数据，国家与地方对保护区财政投入总额约280亿元，资金缺口高达120亿元/年(Waldron et al., 2020)。近年来，粗放式发展导致的栖息地破碎化与传统保护模式的资金瓶颈叠加，自然保护区亟需探索适配本土的制度设计以应对生物多样性保护与恢复的需要。2019年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，对建立以国家公园为主体的自然保护地体系进行全面部署，明确支持金融和社会资本参与自然保护地建设管理项目(https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5407657.htm)。因此，如何发挥自然保护区丰富的生物多样性资源优势，探索自然保护区自然资产价值实现的市场机制成为自然保护区破解当前资金困局与构建造血机制的关键环节。本文拟从生物多样性抵消的理论框架、运行机制等维度展开系统研究，旨在全面揭示其内在逻辑与实现路径，提炼适配中国国情的成功经验与举措，助力中国自然保护区维持机制与持续发展的建设。

1 生物多样性抵消的发展动态

1.1 生物多样性抵消概念溯源与发展

生物多样性抵消源于20世纪60年代提出的生物多样性补偿机制，但完整抵消概念及实践则出现于20世纪70年代美国的湿地缓解银行计划(Damiens et al., 2021)，湿地缓解银行(Wetland Mitigation Banking)通过恢复、保护、新建或扩充现有湿地的形式来产生湿地信用，开发商可以通过缓解银行购买抵消信用来补偿其开发活动对湿地生态系统造成的破坏(Robertson, 2004)。该补偿体系要求湿地缓解银行主办方须具备建造湿地的专业技术并且能够满足补偿要求，湿地缓解银行可在补偿前就开展

湿地信用交易以对接开发商环境责任, 通过成功建造的补偿湿地来弥补受损湿地。随后抵消概念逐渐进入国际视野, 在商业与生物多样性补偿计划(Business and Biodiversity Offsets Programme, BBOP)等环保组织的积极推动下, 生物多样性抵消被明确定义为“在采取适当的预防和缓解措施后, 为补偿项目开发对生物多样性造成的重大残余不利影响而采取的行动所产生的可衡量的保护成果。生物多样性抵消的目标是在物种组成、栖息地结构和生态系统功能以及与生物多样性相关的人类使用和文化价值方面, 实现生物多样性的无净损失, 最好是净增加” (BBOP, 2012)。虽然生物多样性抵消概念来源于生态补偿, 但生态补偿的概念相对宽泛, 生物多样性抵消更为强调无净损失与生物多样性增益。生态保护工作通常遵循避免、最小化、修复和抵消的缓解层级顺序, 生物多样性抵消作为缓解层级的最后一步, 通常用于补偿不可避免的损害的保护行动, 在采取避免和减少负面影响的相关措施之后才能被使用(Arlidge et al., 2018)。

随着全球范围生物多样性抵消机制的持续深化, 其应用场景逐步从分散的栖息地修复工作拓展到系统化的自然保护领域(图1)。大量基于零散项目的生物多样性抵消模式普遍面临生态等价效率低下、生态效益碎片化、长期监管体系缺乏和监管成本高昂等问题, 自然保护区因其稳定的生物多样性本底资源和生态保护长期承诺等特质, 成为兑现生物多样性无净损失与生物多样性收益的关键区域。在此背景下, 自然保护区生物多样性抵消产品成为有效衔接生态保护需求与经济发展诉求的新型制度工具, 其产品本质是通过市场化机制深挖自然保护区自然资产与生态管护的潜在经济势能, 而且自然保护区作为法定保护的生态空间, 在该区域内开发的抵消产品遵循增益性原则且满足环境合规要求, 抵消产品的收益可用于提升保护区生态质量和生态韧性以实现保护区资金保障体系的全面优化和保护区自我维持机制的构建。




图1　生物多样性抵消概念形成及发展动态(改编自Maron et al., 2025)

Fig. 1　Conceptual development and trends in biodiversity offsetting (adapted from Maron et al., 2025)

1.2 生物多样性抵消国际实践探索

1.2.1 生物多样性抵消实践

国际生物多样性抵消项目的多元实践表明，跨地域、跨行业的生态补偿机制可通过创新设计实现保护与发展的动态平衡(Box 1)。2012年英国德文郡启动的生物多样性抵消试点项目，通过系统恢复本土生态系统建立开发活动与生态保护的协调机制，为欧盟“无净损失”政策提供实证基础(Taherzadeh & Howley, 2018)；美国加州的Elsie Gridley缓解银行自2006年运营以来，利用湿地信用交易模式，累计恢复湿地面积逾1,200 ha，有效保护了濒危物种加州虎螈(*Ambystoma californiense*) (RES, 2025)；澳大利亚Warkworth煤矿(2015年)与巴西卡拉加斯铁矿(2011年)项目分别通过关键栖息地修复和森林生态系统重建，有效验证了在工业活动区域开展生态修复与生物多样性保护的可能性(Gastauer et al., 2024; Yancoal Australia, 2025)；马来西亚沙巴州Kuamut计划(2015年)采用林地性质变更与社区共管双重机制，在5年内使婆罗洲猩猩(*Pongo pygmaeus*)栖息地扩大23%，为热带雨林地区的生物多样性保护提供了可持续发展模式(Permian Global, 2025)；而马达加斯加RTQMM (Rio Tinto QIT Madagascar Minerals)项目(2005年)通过造林项目与社区协同发展计划，不仅恢复6,000 ha退化林地，更带动当地居民收益提升(Koh et al., 2019)。

根据上述生物多样性抵消实践案例，当补偿规模与开发强度匹配超过1：1.5 (如澳大利亚)、社区参与度高于60% (马来西亚)且监管周期覆盖生态恢复全生命周期(美国)时，生物多样性抵消可有效实现生态服务价值增值与区域可持续发展的协同演进。概而言之，生物多样性抵消项目的成功依赖于科学核算体系、刚性监管框架与在地化协同机制的结合。例如，澳大利亚新南威尔士州生物银行计划通过立法确立“生物多样性信用”的标准化核算方法，建立政府主导的强制交易市场，在近10年间推动超20万ha生态修复项目顺利推进；英国“生物多样性净增益3.0”计量框架，将栖息地质量、物种丰度及生态连通性纳入综合评估，辅以第三方审计和长期管护基金制度，有效提升了生物多样性抵消项目的执行效率。但高质量的生态数据获取需面对较高的人力成本与时间成本(Kate et al., 2004)，加之自愿机制缺乏约束力、生态等价性难以保障、监管机制不足及政策协同缺失等共同构成了影响生物多样性抵消项目实施成效的重要原因(Defra, 2014)。因此，有效的生物多样性抵消机制需建立在科学的监测评估体系与监管审计体系基础之上，依托政策与

Box 1 生物多样性抵消实践

项目名称	项目地点	项目目的	项目内容	项目收益
德文郡生物多样性抵消试点项目	英格兰德文郡	测试生物多样性抵消系统的可行性和有效性，为政策制定提供依据	通过恢复和保护当地生态系统来补偿开发活动的负面影响，项目实施效果采用生物多样性危害情况与减缓可能性数字评分进行	35个政策生物多样性抵消试点项目累计创收60万英镑(Taherzadeh & Howley, 2018)
Elsie Gridley缓解银行	美国加利福利亚州索拉诺县	为临时池塘草甸和溪流栖息地及相关联的几种稀有、受威胁和濒危物种提供场外缓解机会	保护和恢复了众多湿地和临时池塘，并为加州虎螈(*Ambystoma californiense*)、蝌蚪虾、仙女虾等多种特殊生态物种提供栖息地	当前拥有超过607 ha的陆地和水体信用(RES, 2025)
Warkworth煤矿生物多样性补偿项目	澳大利亚新南威尔士州的猎人谷	抵消煤矿扩建对周边生物多样性造成的负面影响	在场外建立生物多样性补偿区域，如保护特定栖息地来抵消煤矿扩建对生物多样性的影响，同时制定生物多样性管理计划	Warkworth煤矿扩建共产生了31,700个生态系统生物多样性信用额度和37,293个物种生物多样性信用额度(Yancoal Australia, 2025)
RTQMM抵消项目	马达加斯加东南部阿诺西地区	抵消钛矿开采对濒危森林和狐猴栖息地的影响	保护红树林和低地雨林；资助社区森林管理计划	保护6,000 ha森林，稳定狐猴种群(Gastauer et al., 2024)
Kuamut热带雨林计划	马来西亚沙巴州	通过保护和恢复森林来实现生物多样性抵消	通过重新分类将项目区域从生产林(II类森林)改为严格保护的I类森林，消除商业砍伐的威胁，并确保森林能够再生	保护了83,381 ha的热带森林(Permian Global, 2025)
卡拉加斯国家森林S11D Eliezer Batista铁矿生物多样性抵消项目	巴西帕拉州	实现采矿活动对生物多样性造成的损失与森林恢复抵消收益的平衡	实施森林恢复活动，包括植被恢复、土壤改良等，以恢复因采矿而退化的土地，提高生物多样性种群的生物值	在公司管理区域内实现了379个生物多样性信用单位收益(Koh et al., 2019)

法律层面的刚性约束和全民生态共治理念框架，才能切实推进自然资产价值实现。

1.2.2 生物多样性抵消信用

当前大多数环境政策框架要求项目方必须优先考虑影响的规避、减量和修复措施(Phalan et al., 2018)，针对经授权且不可避免的负面影响，则由开发商实施的环境抵消措施来补偿，以实现生态系统服务、栖息地和生物多样性的“无净损失” (zu Ermgassen et al., 2019)。抵消机制还包括由缓解银行提供并经监管机构批准的第三方抵消，这些抵消以生物多样性信用额的形式进行买卖，从而形成一个动态的市场环境(Stein et al., 2000)。与生物多样性抵消不同的是，适用于自由市场的生物多样性信用并非直接用于抵消项目开发所致的生态损失，而是通过构建一种非抵消性的融资途径，用于支持保护、恢复及应对生物多样性丧失驱动因素的干预措施(Biodiversity Credit Alliance, 2024)。因此，由国家立法保障的生物多样性抵消信用涵盖生态系统信用、栖息地或物种单位、湿地抵消信用等类型(表1)，通过强制市场获取资金用于生态系统的保护、监测、科研及教育等工作。

(1)生态系统信用和物种信用(澳大利亚)。新南威尔士州生物银行(NSW Health Statewide Biobank)计划作为基于市场的生物多样性信用创新机制，依托“生态系统信用”与“物种信用”两类标准化抵消产品的开发与运营，将生物多样性保护与市场交易相结合，为解决生物多样性丧失问题提供了创新途径(Webb et al., 2025)，该计划依托生物多样性计算器对单位面积生态价值进行量化测算，精准确定信用证类型及配额，使开发者能根据项目生态影响购买对应信用额度。同时根据生物银行协议从法律层面将信用证生成与土地保护义务永久绑定，为生物多样性抵消产品的长期有效性提供了坚实基础。协议根据土地价值与植被状况等特征将信用价格动态调节为2,500–9,500澳元之间，从而保证了生态价值与市场价值的精准对应。交易体系中，开发商作为主要买方履行生态补偿责任，具备合格生态资产的土地所有者作为卖方获取保护收益。

(2)原生植被信用(澳大利亚)。BushBroker生态补偿机制是澳大利亚维多利亚州政府发起的以市场化手段平衡开发与生态保护的市场机制，其核心在于通过“净收益”原则推动原生植被质量提升与范围扩张。当开发区域缺乏适宜保护地块，或开发商不具备长期植被管护能力时，可通过登记、交易原生植被信用积分(native vegetation credits, NVCs)实现生态补偿。NVCs代表原生植被覆盖面积或生态质量的增量，以法定形式附着于土地产权证书和原生植被积分登记册并纳入政府监管。NVCs价格由市场供需决定，形成从新植株信用积分(最低500澳元)到高价值栖息地信用积分(最高4万澳元)的差异化

表1 基于监管市场机制的生物多样性抵消信用项目

Table 1 Biodiversity offsetting credit program under regulatory market mechanisms

项目 Program	信用形式 Credit type	单位价格 Unit price	时间跨度 Duration
生物银行 BioBanking (澳大利亚 Australia)	生态系统信用; 物种信用 Ecosystem credits; species credits	2,500–9,500澳元 AUD 2,500–9,500	永久保护 Permanent protection
生物多样性补偿计划 Biodiversity Offsets Scheme (澳大利亚 Australia)	原生植被信用(NVCs); (栖息地、大型老树、新植株) Native vegetation credits (NVCs); (habitat, large old trees, new plantings)	栖息地: 20,000–40,000澳元; 大型老树: 20,000–40,000澳元; 新植株: 500–2,300澳元 Habitat: AUD 20,000–40,000; large old trees: AUD 20,000–40,000; new plantings: AUD 500–2,300	永久保护 Permanent protection
缓解银行 Conservation Banking (美国 United States)	栖息地或物种单位 Habitat or species units	2,500–300,000美元 USD 2,500–300,000	永久保护 Permanent protection
湿地和溪流缓解银行 Wetland and Stream Mitigation Banking (美国 United States)	湿地抵消信用; 溪流抵消信用 Wetland mitigation credits; stream mitigation credits	湿地: 3,000–653,000美元; 溪流: 15–700美元 Wetlands: USD 3,000–653,000; Streams: USD 15–700	永久保护 Permanent protection

来源 Source: Quesada (2015)

定价体系。交易体系中，开发商作为买方通过购买NVCs履行生态责任，符合生态评估标准的土地所有者作为卖方提供可生成NVCs的用地资源，而BushBroker作为中立平台仅承担信息登记、协议制定及流程监管职能。

(3)栖息地或物种单位(美国)。美国保护性银行(Conservation Banking)机制作为平衡生态保护与开发需求的市场化解决方案，通过发行物种/栖息地信用实现生物多样性损失的量化补偿(Poudel et al, 2019)。该机制以“保护性开发”为核心理念，允许土地所有者通过永久性生态保护承诺换取信用销售收益、产权完整性保障及税收优惠。该机制采用保护性银行信用以表征特定物种的单位栖息地、生态廊道等生态单元，保护性银行信用的价格范围在2,500美元至30万美元之间，信用的平均价格为31,683美元(Madsen et al., 2010)。交易体系中开发商与政府机构根据项目生态影响按需购买信用，企业、环保机构与私有土地主作为供给方运营生态银行，这种多元化的市场参与者结构促进了信用交易的市场活跃度，显著提升了生物多样性抵消市场的资源配置效率。

(4)湿地和溪流抵消信用(美国)。美国补偿性缓解计划(conservation offsets)作为水资源生态修复的市场化工具，旨在为水资源恢复、建立、提升和/或保护行动来创建补偿机制。该机制构建了湿地与溪流生态信用体系，要求银行赞助商对修复场地实施永久性管护，确保湿地功能在信用交易后持续生效。交易以生态服务量为基准，交易单位涵盖不同类型湿地和溪流生态系统的抵消信用，其中湿地信用价格范围在3,000–653,000美元之间，平均信用价格为74,535美元，溪流价格范围在15–700美元之间，平均价格为260美元。交易体系中需求侧涵盖诸如政府机构、企业及非营利组织等多元主体，供给侧由专业补偿银行主导信用生成与销售。

2 自然保护区生物多样性抵消价值实现的理论框架

2.1 生物多样性抵消价值实现的理论框架

生物多样性抵消机制以生态学与经济学理论跨学科融合为基石，构建起“价值量化-产权配置-市场转化”的三维理论框架(图2)。基于生态系统服务理论，自然资本中的生物多样性资源、水源涵养、气候调节等生态功能作为生态产品的构建基础(Vaissière et al., 2020)，而公共物品理论则很好地阐释了自然资产的非排他性和非竞争性特征(Simpson et al., 2021)，二者的协同在揭示生物多样性抵消产




图2 自然保护区生物多样性抵消产品价值实现的理论框架

Fig. 2 Theoretical framework for value realization of biodiversity offsetting products in nature reserves. NbS, Nature-based solutions; ESG, Environmental, social, and governance; MBI, Market-based instrument.

品本质的同时提出了生物多样性抵消产品的发展方向与供给模式; 生态环境价值理论为自然资本存量量化及生态补偿基准提供坚实基础, 产权理论帮助生态产品明确产权和收益归属(Primmer et al., 2019), 生态环境价值理论与产权理论深度融合则为生物多样性抵消市场的运行与资源配置效率提升提供了支撑; 借助生态补偿理论与外部性理论的实践耦合, 生物多样性保护的正外部性得以转化为交易信用(Calvet et al., 2015), 帮助自然保护区实现生态服务可持续供给与经济价值转化的动态平衡。

自然保护区生物多样性抵消机制的构建源自生物多样性保护与新兴市场拓展的现实需求。基于生态学角度, 在生态环境退化严重的大背景下, 需要基于自然的解决方案(nature-based solutions, NbS)理念(Folkard-Tapp et al., 2021)来明确生态修复的发展方向与规范生态修复流程, 以最大化生态收益。而生态等价性原则(Maseyk et al., 2016)则要求修复措施与开发损毁的生态价值对等, 给生物多样性抵消的开展提供了建设原则, 为生物多样性抵消产品的开发与交易提供了科学论证基础。基于经济学角度, 生物多样性抵消概念的提出构建了生态价值向货币价值转化的现实路径, 在切实经济收益的驱动下, 相关部门可以通过构建法律和政策体系, 打造市场交易体系与环境、社会和公司治理(environmental, social, and governance, ESG)社会责任联动引导社会资本介入生态保护, 鼓励企业自然资本核算将生态价值纳入决策体系辅以市场工具(market-based instrument, MBI)优化资源配置, 最终实现生态修复成本内部化与保护效益规模化的协同发展。

2.2 生物多样性抵消价值评估框架

综合已有研究, 生物多样性抵消指标体系已形成涵盖生态系统结构与功能、物种多样性、生态功能与服务、社会经济与治理等多维度的综合框架(表2)。在生态系统层面, 指标聚焦生态系统匹配度和补偿面积比, 同时纳入植被覆盖度、土壤健康及水文条件等质量参数(IUCN, 2016; Maron et al., 2018);

表2 生物多样性抵消指标体系

Table 2 Biodiversity offsetting indicator system

一级指标 Primary indicator	二级指标 Secondary indicator	三级指标 Tertiary indicator	参考来源 Reference
生态系统结构与功能 Ecosystem structure and function	生态系统类型与面积 Ecosystem type and area	生态系统类型匹配度(如森林、湿地等) Ecosystem type equivalence (e.g. forests, wetlands)	IUCN, 2016
		补偿区与受影响区的面积比 Area ratio between offset site and impacted site	Maron et al., 2018
	生态系统质量 Ecosystem quality	植被覆盖度与群落结构 Vegetation cover and community structure	Gardner et al., 2013
		土壤健康与水文条件 Soil health and hydrological conditions	Quétier & Lavorel, 2011
物种多样性 Species diversity	物种组成 Species composition	关键物种保护 Protection of key species	CBD, 2022b
		物种丰富度与相似性 Species richness and similarity	Kessler et al., 2009
	种群动态 Population dynamics	种群数量与繁殖成功率 Population size and reproductive success	Gibbons & Lindenmayer, 2007
生态功能与服务 Ecosystem function and service	生态功能 Ecological functions	碳储存与固存 Carbon storage and sequestration	IPBES, 2019
		水文调节 Hydrological regulation	Rolls et al., 2018
	生态系统服务 Ecosystem services	人类福祉关联 Links to human well-being	MA, 2005
社会经济与治理 Socio-economic and governance	社会公平性 Social equity	社区参与与权益保障 Community participation and rights protection	Klein et al., 2015
	经济可持续性 Economic sustainability	长期资金机制 Long-term financing mechanisms	Pirard, 2012
	治理与合规性 Governance and compliance	法律合规性 Legal compliance	BBOP, 2012

物种维度则通过关键物种保护率、物种丰富度相似性及种群动态评估生物多样性完整性(Gibbons & Lindenmayer, 2007; CBD, 2022b); 生态功能指标进一步将碳汇能力、水文调节效能与人类福祉关联纳入核算, 强调自然资本对可持续发展的支撑作用(MA, 2005; IPBES, 2019); 社会经济与治理指标则关注社区参与公平性、资金可持续性及法律合规性(BBOP, 2012; Klein et al., 2015)。然而, 相对全面的指标体系仍然面临着跨系统服务可比性不足、动态监测体系缺乏等现实难题, 未来需构建标准化生态当量模型并强化多方共治机制, 以提升指标的科学性与实践效能。

当前研究主要利用单一指标(如栖息地或生态系统的面积、物种丰富度)来表征生物多样性(Azuero-Pedraza & Thomas, 2024), 但单一指标体系难以充分反映生态系统的复杂性, 其评估结果与生物多样性抵消要求的无净损失存在偏差(Yan et al., 2024)。因此, 构建适用于不同区域及不同市场的生物多样性抵消单元及测量体系成为生物多样性价值具现的关键环节(Koh et al., 2019)。英国发布的《生物多样性指标3.0》则在生物多样性指标的设计中充分考量了指标的可获得性与可操作性, 构建了以栖息地种类和环境条件(面积、生态条件、地理位置、生态连接性)为核心的评价体系(Knight-Lenihan, 2020; Defra, 2021, 2023)。与采用碳当量作为交易单位的碳交易体系不同的是, 生物多样性尚未有全球认可的通用测量标准(Yan et al., 2024), 生物多样性抵消市场迫切需要开发普适性的生物多样性交易单元以促进生物多样性的增值和市场运行(Dupont, 2017)。

2.3 生物多样性抵消价值评估的范围界定

生物多样性抵消通过产生可衡量的保护效益来补偿开发造成的不可避免的损害, 被视为缓解层级中的最终选项。该框架下开发商可直接实施抵消项目, 或向第三方机构购买抵消信用额度以履行其生态补偿责任(Phalan et al., 2018)。因此, 生物多样性抵消价值评估可从生态等价性、市场交易性和长期有效性三方面予以界定。其中, 生态等价性用以确定保护效益的可衡量性, 市场交易模式保证了抵消信用的价值实现, 长期监管体系则从根本上为生物多样性价值提供了合规保障。

(1)生态等价性。生态等价性是自然保护区生物多样性抵消产品的核心特征, 要求修复或保护地区生态效益与开发损失在类型、质量、规模和功能上与开发区域相匹配(Bull & Strange, 2018)。基于生态等价性原则, 首先, 要求开发商在项目审批阶段采取严格的减缓措施, 完成开发区域生态系统的基线调查, 记录关键物种的分布、栖息地结构、土壤特性和生态功能等生物多样性关联指标并制定保护方案; 其次, 根据监测评估结果, 选择相似立地条件与生态潜力的区域建设生态修复区, 与受损区域地理邻近、生态特征连贯的同区域自然保护区可作为优选恢复区域, 保证重建或者恢复栖息地生态网络与生态受损区域生态当量匹配; 最后, 构建长期监测和适应性管理等长效机制, 确保补偿区域的生物多样性水平逐步达到或超过开发前的基线状态。生物多样性抵消的生态等价性考量需兼顾经济等价性等内容的评价, 即补偿地应具备与损失地相似的经济产出潜力, 能够与损失地原本的经济产出相平衡, 这在一定程度上保证了生态保护与经济的协同。现实情景中, 生物多样性抵消实践中常面临补偿区域与原栖息地生态特征不匹配、功能恢复滞后或量化标准不统一等挑战, 部分抵消项目难以真正实现“无净损失”。

(2)市场交易性。生物多样性抵消通过标准方法体系和市场化机制将生态保护转化为可量化、可流通的生态环境收益, 并推动生物多样性抵消产品建设和市场交易机制的运行。生物多样性抵消的根本理念是利用市场激励来维持自然资本存量平衡(O’Neill, 2023), 通过建立生物多样性管理规范和生物多样性监测评估体系, 允许自然保护区等保护单元开发生物多样性抵消信用, 并出售抵消信用额度以获得经济收益; 同时构建生物多样性抵消政策、自愿与强制市场体系, 鼓励企业认购信用额度达到“无净损失”的监管要求。因此, 生物多样性抵消产品的核心建立在统一的生物多样性信用核算体系基础之上, 依托公开透明的信用交易市场和配套的监管体系, 可以将不同生态系统的补偿需求量化为具有经济价值的信用单位, 帮助开发者通过购买生物多样性信用间接完成生态修复工作以履行补偿义务。

(3)长期有效性。长期可持续性是自然保护区生

物多样性抵消产品的基本要求，强调保护措施必须确保维持修复后生态系统的结构完整性和功能稳定性，并能够应对气候变化等不确定性因素的干扰，最终实现生物多样性“无净损失”目标的代际延续(Almeida Souza et al., 2023)。这一特性要求将抵消项目纳入区域生态安全格局进行全生命周期管理，通过法律约束、市场激励和社区共管等多元手段，规避因监管缺位或资金链断裂导致的生态绩效衰减风险。综上，生物多样性抵消的长期有效机制依赖于生态、制度和社会层面的系统性设计。首先，通过永久性地权、开发方终身责任制及生态信用质押规则等政策体系确保生态修复成果免受短期利益行为的冲击；其次，借助监控技术与管护体系的全面提升构建生态系统监管与维护系统，增强抵消区域应对气候变化的生态韧性与动态适应能力；最后，通过强化全民生态共治机制切实保证抵消项目利益相关者的切身收益，从而形成生态知识的传承体系，确保当代开发活动不透支未来生态资本。通过上述机制的集成，确保生物多样性抵消项目能够在一定生命周期内将生态功能衰减控制在一定阈值，从而实现抵消活动能够对标生态系统维持的时空成本，真正实现代际公平的持续发展目标。

3 自然保护区生物多样性抵消运行机制

3.1 生物多样性抵消市场运行机制构建

生物多样性抵消作为平衡生态保护与经济发展的创新机制，其价值实现运行机制可解析为“资源资产化–资产资本化–产品货币化”等核心环节(图3)。资源资产化主要通过科学评估自然保护区生物多样性的生态服务价值，建立资源产权界定与核算标准，将生态资源转化为可量化、可交易的资产形态。资产资本化则依托绿色金融工具和政策创新将生态资产转化为可流通的资本要素，形成市场化投融资机制(黎明等, 2025a)。产品货币化可以通过搭建交易平台实现抵消产品的供需匹配与价值实现，通过开发商购买生物多样性信用抵消开发行为对自然环境的负面影响。

资源资产化环节是自然保护区生物多样性抵消产品价值实现项目落地的前提，主要任务是通过生态修复与环境治理恢复生物多样性价值，核算生物多样性资源以形成可量化的生态资源存量。自然保护区的资源资产化建立于丰富的生态环境资源基础之上，保护区可以通过生态修复与环境治理提高生态系统的稳定性和生物多样性，同时配合土地综合整治以改善生物多样性生态空间。

资产资本化环节则聚焦于生物多样性抵消配额分配工作，旨在解决生物多样性资源分布不均、归属界定模糊等问题。参照《中华人民共和国自然保护区条例》，明确生物多样性资源的所有权、使用权、收益权等权属关系，资源所有权主体可依据自身意愿与实际需求，通过确权登记与评估核算将生物多样性资产流转至交易平台。该过程须由相关领域专家对监测报告与核证报告进行严格评审。自然保护区则可以根据评审结果，结合自身的生态保




图3 自然保护区生物多样性抵消产品价值实现运行机制

Fig. 3 Operational mechanism for realizing the value of biodiversity offsetting products in nature reserves

护目标与区域发展需求, 合理确定产品的交易规模与配额分配方案, 为生物多样性抵消产品的顺利交易创造有利条件。

产品货币化在完成资源资产化与资产资本化环节的准备工作后, 将自然保护区生物多样性抵消产品推向市场进行交易, 以实现生物多样性抵消价值的现实落地。该过程需要综合考虑市场供需关系、政策导向、生态成本等因素, 以确定生物多样性抵消产品的正式价格, 并将其推向交易市场。自然保护区借助规范的交易市场和交易平台实现自然资产的具现, 保证生物多样性收益按照既定比例回馈用于支持自然保护区生物多样性的持续保护与修复工作, 形成保护与发展的良性循环。

如图3所示, 自然保护区生物多样性抵消价值实现机制的运行涉及供给方、需求方、监管机构、第三方认证机构及金融机构等利益主体。(1)供给方。自然保护区本身承载着高价值的生物多样性资源, 可通过提升保护区内的生态质量或增强生态系统韧性来生成可交易的抵消信用额度。(2)需求方。因开发活动对生态造成影响的企业及为了提升企业声誉的企业需要通过购买生物多样性抵消信用额度来平衡其开发活动所带来的生态损失, 以满足相关法规和政策的生态保护要求, 或提高企业声誉形象。(3)监管机构。相关政府部门主要负责制定和完善生物多样性抵消相关的法律法规、政策标准, 对整个抵消产品价值实现过程进行监督管理, 包括对供给方的资源管理和信用额度生成的合规性审查, 对需求方购买和使用抵消信用额度的监督, 以及对市场交易秩序的维护等。(4)第三方认证机构。主要职责是对供给方所申报的生物多样性资源状况、生态提升措施以及生成的抵消信用额度进行独立、客观、专业的评估和认证。(5)金融机构。主要是政策性银行与绿色信贷机构等, 通过提供融资、信用流转服务或开发生态衍生产品促进生物多样性保护。

3.2 生物多样性抵消产品体系建设

生物多样性抵消产品体系是通过市场化机制将生态损害转化为可量化交易的标准化产品, 其核心架构可以概括为管理体系、生态规划与经济架构3个层级。针对目前保护区存在的问题, 亟需在系统解析保护区生态本底特征与生物多样性资源潜力的基础上, 结合国内外政策导向与市场化需求, 构建科学规范的产品体系(图4):

(1)建设目标。自然保护区生物多样性抵消产品体系的建设目标是实现保护区生物多样性资源的有效保护与可持续利用, 通过科学合理的抵消产品开发, 为保护区的管理和维护提供稳定的资金来源, 推动生态系统的长期稳定与健康运行。具体而言, 旨在形成以生物多样性保护为核心的生态产品体系, 有效发挥自然保护区生物多样性资源优势, 在满足自然保护区生态保护与建设需求的同时兼顾自然保护与生态收益的协同。

(2)管理体系。自然保护区生物多样性抵消产品体系建设涉及跨部门的有效协同。保护区管理部门在规划监督方面发挥主导作用, 企业负责开发与运营并承担相应的生态责任, 科研机构提供科学支撑, 社会组织与公众则积极参与监督和宣传, 形成多元生态共治的良好格局。建设客体涵盖保护区内的生物多样性资源以及生态保护的各类活动, 保护区需明确资源类型、资源特征与资源边界以保证抵消活动的规范开展。建设工具包括监测技术、市场机制以及监管体系等举措, 构建完善的监测体系以获取准确资源信息, 完善市场机制鼓励多元生态协同治理, 建立长期监管体系保证抵消产品的生态收益, 同时建设中须关注生物多样性抵消产品开发与运营的合法性、规范性与伦理性, 制定并完善相关标准以保障抵消产品的经济效益。

(3)经济架构。自然保护区生物多样性抵消产品体系的建设, 强调协同开发模式、突破单一主体开发的局限, 通过构建多元主体协同开发机制, 推动生物多样性保护从被动补偿转向政府主导与市场辅助的多元化资金保障体系。政府监管、科研机构、企业、社会组织和公众等多主体在协同开发过程中相互协作、资源共享, 共同推动生物多样性抵消产品的开发与实施。政府可以构建以生物多样性信用为主的市场体系, 通过自愿性与强制性规范的建设, 引导企业与社会组织参与自然保护区建设和生物多样性抵消产品的开发, 通过完善生物多样性抵消产品营销规范与管理体系, 切实保证自然保护区的生态收益与经济收益。

(4)生态规划。为确保自然保护区生物多样性抵消产品体系的有效建设与运行, 保护区需在生态补偿机制的基础上构建生物多样性抵消市场运行策




图4　自然保护区生物多样性抵消产品体系建设框架

Fig. 4　Framework for developing a biodiversity offsetting product system in nature reserves

略以确保生态损失得到有效补偿。依托政府调控和全民共治的协同机制，构建生物多样性产品的市场机制，引导社会资本介入生物多样性保护。在科学监管核算体系的技术支撑体系下，保护区可以确保抵消区域与开发区的生态当量匹配，以对标生物多样性抵消产品的无净损失，目标同时力争实现生物多样性增益。针对生态当量区域适配性与社区利益分配机制缺失等实践挑战，保护区需要构建科学的顶层设计，将生物多样性抵消机制与社区协同发展机制纳入保护区生态衍生产品开发策略，助力自然保护区多元化资金保障体系与自我维持机制的建设。

3.3　生物多样性抵消交易体系架构

自然保护区生物多样性抵消产品交易体系以技术支撑、审核评估、登记交易、市场激励与全周期监测五大核心模块为支柱，构建科学化、市场化的生态保护闭环机制(图5)。技术支撑体系通过生态基线评估与栖息地模型量化生物多样性损失与增益；审核评估体系由跨学科专家委员会主导，依托第三方认证机构，验证项目实施的科学性和可行性，确保项目开发的合规性；登记交易体系借助定价机制融合边际保护成本、生态敏感性溢价及市场供需动态，提升交易透明性与流动性；市场激励体系通过“生态贡献积分–ESG考核”联动政策，将抵消信用采购纳入企业评级指标，辅以税收抵免、绿色信贷优先权等工具，激发市场主体参与积极性；监测评估体系则通过标准化核算与动态监管，动态追踪植被覆盖度、目标物种种群等关键指标，结合标准化核算与风险预警机制，确保项目成效并降低开发风险。

(1)技术支撑体系。自然保护区需提交详细的生物多样性保护或修复方案，清晰界定目标物种、实施范围及监测计划等关键要素；通过生态基线评估以确保项目满足“额外性”和“永久性”要求，选择合适的损失/增益量化方法，精准评估生物多样性在项目实施过程中的变化；建设生物多样性抵消项目的成本核算体系，为项目预算编制和成本效益分析提供科学依据。




图5　自然保护区生物多样性抵消产品交易体系架构
Fig. 5　Architecture of the trading system for biodiversity offsetting products in nature reserves

(2)审核评估体系。组建由生态学专家、环境保护专业人士以及相关领域学者构成的专业审核委员会，由委员会开展生物多样性评估方法学评审、项目开发审核与评估、生态标签评估以及生物多样性抵消产品的签发等工作，为市场提供可信的生物多样性抵消产品；第三方认证机构依托生物多样性抵消方法学体系量化生态效益，利用栖息地等价分析等工具计算信用额度，评估项目对生态网络的整体贡献，配合监管机构完成项目合规审核。

(3)登记交易体系。建立完善的管理体系，支持生物多样性抵消产品备案、登记、收储和交易等环节，为交易双方提供便捷高效的服务，保障交易的规范性和安全性；抵消产品登记系统全面记录项目的备案、登记、流转、应用以及注销等全周期信息并保证信息的可追溯性和透明性；采用标准化方法实现生态效益到可交易信用的转化，综合机会成本、保护成本与市场需求情况构建灵活定价机制，针对高敏感区域与濒危物种栖息地构建溢价机制。

(4)市场激励体系。构建市场激励机制，推动生物多样性保护从被动补偿转向主动投资(黎明等, 2025b)，设计配套的生态贡献积分体系，将抵消信用采购纳入企业评级指标，激发市场主体积极参与生物多样性抵消产品的购买；结合国家和地方的生态保护政策，针对特定的市场买方主体制定相应的考核指标，构建评级与ESG联动体系，辅以税收抵免、绿色信贷优先权等激励措施，鼓励参加生物多样性抵消项目开发与交易体系建设。

(5)监测评估体系。建立贯穿项目全周期的动态监测与评估体系是确保生物多样性保护目标持续达成的关键环节。项目前期需制定详细的监测计划，明确监测指标，构建科学合理的监测框架；参考国际标准和最佳实践，精准识别实施生物多样性抵消的潜在区位，优先开展潜在抵消区位的生态效益、系统风险分析与量化评估；项目实施须从项目进程、资金配置、体系保障等方面衡量绩效，同时整合关键生态指标，精准评估抵消项目的生态效益。

4　自然保护区生物多样性抵消价值实现的建议

4.1　构建生物多样性抵消的成本效益评估体系

综合国际生物多样性抵消项目开展情况，生物多样性抵消项目的成本涵盖直接经济投入与隐性社会成本两方面：直接成本包括生态基线调查、栖息地修复及长期监管费用；间接成本则涉及项目监管成本、市场交易成本、土地性质变更所致的边际成本等方面。收益可以概括为生态服务价值增量与协同效益两部分。成功的生物多样性抵消项目可以恢复甚至提升栖息地生态服务价值，特别是碳汇增益与水资源调配均伴生巨大的经济价值与社会效益，此外，生物多样性抵消的开展可为新兴业态与生态服务货币化提供重要助力。当然，生态恢复的滞后效应与生态当量区域适配性也是生物多样性

项目成本效益核算需要关注的重要内容, 前者涉及到长期监管体系构建的成本, 而后者则关系到生物多样性生态收益科学性的问题。国际上将生物多样性资源的价值分为使用价值和非使用价值两大类(Pearce & Moran, 2013), 而传统核算体系难以捕捉生物多样性的非市场价值, 这就需要就生物多样性抵消项目有针对性地构建动态评估模型, 以破解成本沉没与收益迟滞的结构性矛盾。因此, 生物多样性抵消项目成本效益分析需通过系统性评估确保抵消方案的经济可行性与生态有效性(图6)。

本文将生物多样性抵消成本效益分析流程解构为4个层级予以说明。活动1: 识别开发项目对生物多样性产生的直接与间接残余影响, 明确影响范围和程度; 活动2: 评估抵消活动对项目区及保护区生态、社会与经济的影响, 界定不同主体的成本与效益边界; 活动3: 通过量化生态修复成本、市场交易成本及长期生态增益、社会收益等指标, 验证初步抵消方案是否符合成本效益平衡要求, 并在必要时调整抵消设计以最大限度提升净效益; 活动4: 通过动态监测与适应性管理, 确保抵消活动实现生物多样性"无净损失"目标并兼顾社区发展需求与市场可持续性。

4.2 完善生物多样性抵消市场的制度设计

生物多样性抵消市场通过为减缓层级中的最终环节引入灵活性与成本效益机制, 形成了一种创新的环境保护范式, 通过推进生物多样性抵消信用交易, 将保护活动引导至能以最低成本实现最优生态效益的区域, 从而提升整体保护效率并优化环境成效。依托健全的政策体系与监管机制, 生物多样性抵消市场不仅将生物多样性损失纳入核算体系, 创造了过去缺失的保护性经济激励, 更通过责任转移机制将保护义务从公共财政承担转向由造成生态影响的开发主体负责, 实现了环境成本的外部性内部化。同时, 该机制使国家公园、自然保护区等土地管理者能够因实施保护行动而获得经济回报, 为长期生态管护提供了持续动力。当然, 生物多样性抵消与信用市场目前仍处于发展初期, 各类框架与标准存在显著差异且尚未形成统一规范。尽管多国已强制推行生物多样性抵消制度, 但由于执行与监管环节的薄弱, 这些计划往往难以达到预期效果,




图6 生物多样性抵消成本效益分析流程(改编自BBOP, 2009)

Fig. 6 Process of cost-benefit analysis for biodiversity offsetting (adapted from BBOP, 2009)

市场参与者可以在不承担实质责任的情况下宣称取得保护成果, 最终可能削弱整个机制的公信力。研究显示, 在已实施的生物多样性抵消项目中, 仅35%实现了“无净损失”的承诺(zu Ermgassen et al., 2019)。且因抵消机制设计的差异导致生态损失与补偿效益之间可能产生显著的时间滞后效应, 这在项目周期内反而会加剧生物多样性损失(Pope et al., 2021)。因此, 虽然生物多样性抵消机制为协调发展与保护目标提供了可行路径, 但在实施过程中仍面临生态不确定性、治理体系缺陷、社会公正争议及伦理困境等重大挑战。要使抵消机制真正助力生物多样性保护, 必须将其建立在坚实的生态科学基础之上, 辅以完善的监管框架, 融入更广泛的保护规划体系, 并遵循透明、包容且符合道德规范的实践准则。唯有通过审慎规划和战略部署, 生物多样性抵消才能作为多元化保护战略的组成部分, 为全球自然保护与生态修复的宏伟目标提供支撑。

4.3 推进生物多样性抵消运行的保障体系建设

生物多样性抵消机制作为平衡生态保护与发展的市场化工具, 依托制度设计与核算体系的构建, 已发展成为自然资产具现的重要途径, 并在全球范围内形成了可供借鉴的实践框架。然而, 发达国家可以通过立法约束与精细化核算模型实现的生物多样性抵消增益难以在发展中国家等效兑现。中国作为生物多样性热点国家, 通过国家公园体制改革与生态保护红线制度, 已在政府主导和市场协同的保护区管理长效机制方面开展了大量的实践探索, 但受限于生态产权界定模糊与跨区域交易壁垒等现实困境, 自然保护区生物多样性抵消机制仅限于学界理论探讨。为推动生物多样性抵消机制在中国获得有效实施与创新突破, 需从基础框架、市场机制与制度保障3个层面系统推进: (1)基础框架层面, 应着力构建本土生态当量核算体系与生态资产数据库, 重点突破生态资产产权界定难题, 通过开展生物多样性热点区域生态产权登记试点, 明确自然保护区等生态空间的权属关系与使用权流转机制; (2)市场机制层面, 需设计多层次生物多样性交易体系, 在生态保护红线和国家公园区域设立生态信用银行, 将植被修复、栖息地营造等生态工程产生的增益转化为可交易信用, 同时创新发展与生态绩效挂钩的绿色金融产品, 探索建立“保护者受益、损害者补偿”的市场化长效机制(赵阳等, 2024); (3)制度保障层面, 须将生物多样性抵消机制有机融入国家公园体制与生态保护红线制度, 修订《中华人民共和国自然保护区条例》明确技术规范与适用条件, 建立从项目审批到效果评估的全过程监管制度, 同时构建政府、企业、社区多元共治架构, 并将生物多样性抵消成效纳入地方政府生态文明建设考核体系。通过这3个维度的协同推进, 最终实现从被动抵消到主动增益的范式跃迁, 为全球生物多样性治理提供兼具创新性与实操性的中国方案。

参考文献

Almeida Souza B, Rosa JCS, Campos PBR, Sánchez LE (2023) Evaluating the potential of biodiversity offsets to achieve net gain. Conservation Biology, 37, e14094.

Arlidge WNS, Bull JW, Addison PFE, Burgass MJ, Gianuca D, Gorham TM, Jacob C, Shumway N, Sinclair SP, Watson JEM, Wilcox C, Milner-Gulland EJ (2018) A global mitigation hierarchy for nature conservation. BioScience, 68, 336–347.

Azuero-Pedraza CG, Thomas VM (2024) Incorporating biodiversity impacts in land use decisions. Ecological Modelling, 497, 110852.

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme) (2009) Biodiversity Offset Cost-Benefit Handbook. https://www.forest-trends.org/publications/biodiversity-offset-cost-benefit-handbook/. (accessed on 2025-05-13)

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme) (2012) Standard on Biodiversity Offsets. https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/BBOP_Standard_on_Biodiversity_Offsets_1_Feb_2013.pdf. (accessed on 2025-05-06)

Biodiversity Credit Alliance (2024) Definition of a Biodiversity Credit. https://www.biodiversitycreditalliance.org/products-knowledge/. (accessed on 2025-11-15)

Bull JW, Strange N (2018) The global extent of biodiversity offset implementation under no net loss policies. Nature Sustainability, 1, 790–798.

Buschke FT, Brownlie S, Manuel J (2019) The conservation costs and economic benefits of using biodiversity offsets to meet international targets for protected area expansion. Oryx, 53, 732–740.

Calvet C, Napoléone C, Salles JM (2015) The biodiversity offsetting dilemma: Between economic rationales and ecological dynamics. Sustainability, 7, 7357–7378.

CBD (Convention on Biological Diversity) (2022a) Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. https://www.cbd.int/gbf. (accessed on 2025-05-06)

CBD (Convention on Biological Diversity) (2022b) Post-2020 Global Biodiversity Framework. https://www.cbd.int/doc/c/409e/19ae/369752b245f05e88f760aeb3/wg2020-05-l-02-en.

pdf. (accessed on 2025-05-13)
CRI (The University of Cambridge Conservation Research Institute) (2020) Protecting 30% of the Planet for Nature: Costs, Benefits and Economic Implications. https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf. (accessed on 2025-05-06)
Damiens FLP, Porter L, Gordon A (2021) The politics of biodiversity offsetting across time and institutional scales. Nature Sustainability, 4, 170–179.
Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) (2014) Evaluation of the Biodiversity Offsetting Pilot Programme. https://www.researchgate.net/publication/299503845_Evaluation_of_the_Biodiversity_Offsetting_Pilot_Programme. (accessed on 2025-05-06)
Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) (2021) Calculate Biodiversity Value with the Statutory Biodiversity Metric. https://www.gov.uk/guidance/biodiversity-metric-calculate-the-biodiversity-net-gain-of-a-project-or-development. (accessed on 2025-05-13)
Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) (2023) Statutory Biodiversity Metric Tools and Guides. https://www.gov.uk/government/publications/statutory-biodiversity-metric-tools-and-guides. (accessed on 2025-05-13)
Dupont V (2017) Biodiversity offsets in NSW Australia: The biobanking scheme versus negotiated offsets in urban areas. Journal of Environmental Law, eqw031.
Folkard-Tapp H, Banks-Leite C, Cavan EL (2021) Nature-based Solutions to tackle climate change and restore biodiversity. Journal of Applied Ecology, 58, 2344–2348.
Gardner TA, Von Hase A, Brownlie S, Ekstrom JMM, Pilgrim JD, Savy CE, Theo Stephens RT, Treweek JO, Ussher GT, Ward G, Kate K (2013) Biodiversity offsets and the challenge of achieving no net loss. Conservation Biology, 27, 1254–1264.
Gastauer M, Pinheiro T, Caldeira CF, Ramos SJ, Coelho RR, Fonseca DS, Tyski L, de Rezende Cardoso AL, de Sá Carvalho Neto C, Guimarães L, de Medeiros Sarmento PS (2024) Large-scale forest restoration generates comprehensive biodiversity gains in an Amazonian mining site. Journal of Cleaner Production, 443, 140959.
Gibbons P, Lindenmayer DB (2007) Offsets for land clearing: No net loss or the tail wagging the dog? Ecological Management & Restoration, 8, 26–31.
IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) (2019) Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. https://www.ipbes.net/global-assessment. (accessed on 2025-05-13)
IUCN (International Union for Conservation of Nature) (2016) Biodiversity Offsets: A User Guide. https://iucn.org/resources/issues-brief/biodiversity-offsets. (accessed on 2025-05-06)
Kate K, Bishop J, Bayon R (2004) Biodiversity Offsets: Views, Experience, and the Business Case. The World Conservation Union, London.
Kessler M, Abrahamczyk S, Bos M, Buchori D, Putra DD, Gradstein SR, Höhn P, Kluge J, Orend F, Pitopang R, Saleh S, Schulze CH, Sporn SG, Steffan-Dewenter I, Tjitrosoedirdjo SS, Tscharntke T (2009) Alpha and beta diversity of plants and animals along a tropical land-use gradient. Ecological Applications, 19, 2142–2156.
Kigonya R, Byakagaba P, Ssenyonjo E, Nakakaawa Jjunju C (2024) “Biodiversity offsetting” in Uganda’s protected areas: A pathway to restoration of forest biodiversity? Environmental Management, 73, 1134–1149.
Klein C, McKinnon MC, Wright BT, Possingham HP, Halpern BS (2015) Social equity and the probability of success of biodiversity conservation. Global Environmental Change, 35, 299–306.
Knight-Lenihan S (2020) Achieving biodiversity net gain in a neoliberal economy: The case of England. Ambio, 49, 2052–2060.
Koh NS, Hahn T, Boonstra WJ (2019) How much of a market is involved in a biodiversity offset? A typology of biodiversity offset policies. Journal of Environmental Management, 232, 679–691.
Li M, Qin XL, Zhu YR, Yang Q (2025a) Operational mechanisms, framework architectures, and paradigmatic exploration in biodiversity finance development. China Forest Products Industry, 62(10), 7–14. (in Chinese with English abstract) [黎明, 秦响玲, 朱玉茹, 杨倩 (2025a) 生物多样性金融发展运行机制、框架体系与模式探索. 林产工业, 62(10), 7–14.]
Li M, Zhu YR, Qin XL (2025b) The internal logic and realization path of green investment and development of biodiversity. Hainan Finance, (8), 34–41. (in Chinese with English abstract) [黎明, 朱玉茹, 秦响玲 (2025b) 生物多样性绿色投资发展的内在逻辑与实现路径. 海南金融, (8), 34–41.]
MA (Millennium Ecosystem Assessment) (2005) Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf. (accessed on 2025-05-13)
Madsen B, Carroll N, Moore BK (2010) State of Biodiversity Markets Report: Offset and Compensation Programs Worldwide. https://www.undp.org/publications/state-biodiversity-markets-offset-and-compensation-programs-worldwide. (accessed on 2025-05-13)
Maron M, Brownlie S, Bull JW, Evans MC, von Hase A, Quétier F, Watson JEM, Gordon A (2018) The many meanings of no net loss in environmental policy. Nature Sustainability, 1, 19–27.
Maron M, Ives CD, Kujala H, Bull JW, Maseyk FJF, Bekessy S, Gordon A, Watson JEM, Lentini PE, Gibbons P, Possingham HP, Hobbs RJ, Keith DA, Wintle BA, Evans MC (2016) Taming a wicked problem: Resolving controversies in biodiversity offsetting. BioScience, 66, 489–498.
Maron M, von Hase A, Quétier F, Sonter LJ, Theis S, zu Ermgassen SOSE (2025) Biodiversity offsets, their effectiveness and their role in a nature positive future. Nature Reviews Biodiversity, 1, 183–196.
Maseyk F, Barea LP, Stephens R, Possingham HP, Dutson G, Maron M (2016) A disaggregated biodiversity offset accounting model to improve estimation of ecological

equivalency and no net loss. Biological Conservation, 204, 322–332.

O'Neill J (2023) The Routledge Handbook of Commodification. Routledge, London.

Pearce D, Moran D (2013) The Economic Value of Biodiversity. Routledge, London.

Permian Global (2025) Kuamut Rainforest Conservation Project. https://permianglobal.com/projects/kuamut-rainforest-conservation-project/. (accessed on 2025-05-06)

Phalan B, Hayes G, Brooks S, Marsh D, Howard P, Costelloe B, Vira B, Kowalska A, Whitaker S (2018) Avoiding impacts on biodiversity through strengthening the first stage of the mitigation hierarchy. Oryx, 52, 316–324.

Pirard R (2012) Market-based instruments for biodiversity and ecosystem services: A lexicon. Environmental Science & Policy, 19, 59–68.

Pope J, Morrison-Saunders A, Bond A, Retief F (2021) When is an offset not an offset? A framework of necessary conditions for biodiversity offsets. Environmental Management, 67, 424–435.

Poudel J, Zhang DW, Simon B (2019) Habitat conservation banking trends in the United States. Biodiversity and Conservation, 28, 1629–1646.

Primmer E, Varumo L, Kotilainen JM, Raitanen E, Kattainen M, Pekkonen M, Kuusela S, Kullberg P, Kangas JAM, Ollikainen M (2019) Institutions for governing biodiversity offsetting: An analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy, 81, 776–784.

Quesada IA (2015) International Cooperation for Biodiversity Conservation: An Economic Analysis. PhD dissertation, Wageningen University and Research, Wageningen.

Quétier F, Lavorel S (2011) Assessing ecological equivalence in biodiversity offset schemes: Key issues and solutions. Biological Conservation, 144, 2991–2999.

RES (Resource Environmental Solutions) (2025) Elsie Gridley Mitigation Bank. https://res.us/projects/elsie-gridley-mitigation-bank/. (accessed on 2025-05-06)

Robertson MM (2004) The neoliberalization of ecosystem services: Wetland mitigation banking and problems in environmental governance. Geoforum, 35, 361–373.

Rolls RJ, Heino J, Ryder DS, Chessman BC, Growns IO, Thompson RM, Gido KB (2018) Scaling biodiversity responses to hydrological regimes. Biological Reviews, 93, 971–995.

Simpson K, Hanley N, Armsworth P, de Vries F, Dallimer M (2021) Incentivising biodiversity net gain with an offset market. Q Open, 1, qoab004.

Stein ED, Tabatabai F, Ambrose RF (2000) PROFILE: Wetland mitigation banking: A framework for crediting and debiting. Environmental Management, 26, 233–250.

Taherzadeh O, Howley P (2018) No net loss of what, for whom?: Stakeholder perspectives to biodiversity offsetting in England. Environment, Development and Sustainability, 20, 1807–1830.

UNEP (United Nations Environment Programme) (2024) Protected Planet Report 2024. https://www.unep.org/resources/report/protected-planet-report-2024. (accessed on 2025-05-06)

Vaissière AC, Quétier F, Calvet C, Levrel H, Wunder S (2020) Biodiversity offsets and payments for environmental services: Clarifying the family ties. Ecological Economics, 169, 106428.

Waldron A, Adams V, Allan J, Arnell A, Asner G, Atkinson S; Baccini A, Baillie JEM, Balmford A, Beau JA, Brander L, Brondizio E, Bruner A, Burgess N, Burkart K, Butchart S, Button R, Carrasco R, Cheung W, Christensen V, Clements A, Coll M, di Marco M, Deguignet M, Dinerstein E, Ellis E, Eppink E, Ervin J, Escobedo A, Fa J, Fernandes-Llamazares A, Fernando S, Fujimori S, Fulton B, Garnett S, Gerber J, Gill D, Gopalakrishna T, Hahn N, Halpern B, Hasegawa T, Havlik P, Heikinheimo V, Heneghan R, Henry E, Humpenoder F, Jonas H, Jones K, Joppa L, Joshi AR, Jung M, Kingston N, Klein C, Krisztin T, Lam V, Leclere D, Lindsey P, Locke H, Lovejoy TE, Madgwick P, Malhi Y, Malmer P, Maron M, Mayorga J, van Meij H, Miller D, Molnar Z, Mueller N, Mukherjee N, Naidoo R, Nakamura K, Nepal P, Noss RF, Leary BO, Olson D, Abrantes JP, Paxton M, Popp A, Possingham H, Prestemon J, Reside A, Robinson C, Robinson J, Sala E, Scherrer K, Spalding M, Spenceley A, Steenbeck J, Stehfest E, Strassborg B, Sumaila R, Swinnerton K, Sze J, Tittensor D, Toivonen T, Toledo A, Torres PN, Van Zeist WJ, Vause J, Venter O, Vilela T, Visconti P, Vynne C, Watson R, Watson J, Wikramanayake E, Williams B, Wintle B, Woodley S, Wu WC, Zander K, Zhang YC, Zhang YP (2020) Protecting 30% of the Planet for Nature: Costs, Benefits and Economic Implications. https://www.conservation.cam.ac.uk/files/waldron_report_30_by_30_publish.pdf. (accessed on 2026-02-21)

Webb J, Fujii H, Rowlings D, Grace P, Mundree S, Managi S, Wilson C (2025) Prospects for integration of carbon and biodiversity credits: An Australian case study review. Sustainability Science, doi: 10.1007/s11625-024-01603-5.

Yan NY, Liu GY, Ulgiati S, Yang ZF (2024) Biodiversity conservation strategies from no net loss to net gain. A multidimensional accounting method. Earth's Future, 12, e2024EF004652.

Yancoal Australia (2025) Mount Thorley Warkworth. https://www.yancoal.com.au/our-sites/mount-thorley-warkworth/. (accessed on 2025-05-06)

Zhao Y, Liu YQ, Wan X, Ding LM (2024) Study on market-based realization of ecosystem product value in national parks: Taking biodiversity offsets and credits as an example. National Park, 2, 296–307. (in Chinese with English abstract) [赵阳, 刘艳青, 万霞, 丁黎明 (2024) 国家公园生态产品市场化新路径——以生物多样性抵消和信用机制为例. 国家公园(中英文), 2, 296–307.]

zu Ermgassen SOSE, Baker J, Griffiths RA, Strange N, Struebig MJ, Bull JW (2019) The ecological outcomes of biodiversity offsets under "no net loss" policies: A global review. Conservation Letters, 12, e12664.

(责任编委: 徐靖　责任编辑: 李会丽)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25269, pages 1–9
doi: 10.17520/biods.2025269
cstr: 32101.14.biods.2025269

•生物多样性保护融资与企业参与专题•

生物多样性公益捐赠对《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》的贡献

杨方义[1*], 靳彤[2], 申小莉[3], 张立[4], 杨彪[5]

1. 苏州高新区碳中和国际研究院, 江苏苏州 215011; 2. 世界银行驻华代表处, 北京 100020; 3. 中国科学院植物研究所植被与环境变化重点实验室, 北京 100093; 4. 北京师范大学生物多样性与生态工程教育部重点实验室, 北京 100875; 5. 北京市企业家环保基金会, 北京 100089

摘要: 非国家行为体(non-state actors)参与生物多样性治理是落实《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》和《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》的关键路径和重要组成部分。生物多样性公益捐赠资金能够推动非国家行为体参与生物多样性治理, 弥补生物多样性公共资金不足。联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)为中国非国家行为体参与生物多样性治理提供了机遇。2021年, 中国10家非国家行为体组织在COP15第一阶段会议期间承诺2030年前动员25.5亿元人民币公益捐赠用于生物多样性保护。本文系统梳理过去5年中国非国家行为体生物多样性公益捐赠的进展及成效。2020–2024年间, 11家规模较大的公益基金会与生物多样性相关的公益支出为34.3亿元人民币, 其中, 7家参与COP15承诺的基金会共计投入15.5亿元公益捐赠用于生物多样性保护, 现已完成2030年承诺目标的60.7%。这些生物多样性公益捐赠支持了非国家行为体组织在受威胁物种保护、栖息地和重要区域的保护和修复、推动生物多样性主流化等领域开展了大量卓有成效的工作。研究发现当前中国生物多样性公益捐赠具有一定局限性, 例如较高比例的资金用于造林为主的生态系统恢复、与企业和公共资金的协同不足。本文建议中国生物多样性公益捐赠应加强与国家行动的协同, 推动企业参与生物多样性保护, 共同致力于推动实现中国生物多样性保护目标和《昆蒙框架》行动目标。

关键词: 生物多样性公益捐赠; 昆蒙框架; 生物多样性保护战略与行动计划

杨方义, 靳彤, 申小莉, 张立, 杨彪 (2026) 生物多样性公益捐赠对《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》的贡献. 生物多样性, 34, 25269. doi: 10.17520/biods.2025269; cstr: 32101.14.biods.2025269.
Yang FY, Jin T, Shen XL, Zhang L, Yang B (2026) The contribution of philanthropic funding to China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2023–2030). Biodiversity Science, 34, 25269. doi: 10.17520/biods.2025269; cstr: 32101.14.biods.2025269.

The contribution of philanthropic funding to China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2023–2030)

Fangyi Yang[1*], Tong Jin[2], Xiaoli Shen[3], Li Zhang[4], Biao Yang[5]

1 *International Academy of Carbon Neutrality at Suzhou High-tech District, Suzhou, Jiangsu 215011, China*
2 *China Representative Office, World Bank Group, Beijing 100020, China*
3 *Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China*
4 *Ministry of Education Key Laboratory for Biodiversity Science and Ecological Engineering, Beijing Normal University, Beijing 100875, China*
5 *SEE Foundation, Beijing 100089, China*

ABSTRACT

Background & Aims: Both the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) and China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2023–2030) (China's NBSAP) have highlighted the engagement of non-state actors in biodiversity conservation. Philanthropic funding provided to non-state actors for biodiversity conservation purposes can significantly fill the public funding gap. The Fifteenth Meeting of the Conference of the

收稿日期 Received: 2025-07-13; 接受日期 Accepted: 2025-12-26
基金项目: 公民生物多样性保护联盟CBD支持项目 Supported by the CBD initiative of Civil Society Alliance for Biodiversity Conservation
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: fangyi.y@139.com

Parties (COP15) to the Convention on Biological Diversity provided a unique opportunity for Chinese non-state actors to conserve China's biodiversity. In 2021, during the first phase of COP15 in Kunming, a coalition of 10 Chinese non-state actors pledged to mobilize RMB 2.55 billion (USD 359 million) for biodiversity conservation by 2030.
Method: The study provides a systematic analysis by tracking the spending, outputs and outcomes of the pledge made in COP15 over the past five years, offering a systematic analysis of how biodiversity philanthropic funding in China has been mobilized and what results have been attained.
Results: During 2020–2024, 11 major biodiversity-related philanthropic foundations invested a total of RMB 3.43 billion (USD 481 million) on biodiversity conservation activities. Among them, the seven foundations that made funding pledge at COP15 have spent RMB 1.55 billion (USD 217 million), equivalent to 60.7% of the total pledged amount. This funding has enabled non-state actors to deliver tangible results in the conservation of threatened species, habitat and area-based conservation, and biodiversity mainstreaming in China. The study also identified limitations of China's conservation philanthropic funding: a disproportionate share of funding has flowed to afforestation-based "ecological restoration", while comparatively less has been allocated to aligning with national programs or transforming private sector's business models.
Conclusion: The study recommends that Chinese philanthropic funding should deepen collaboration with government-led biodiversity conservation initiatives to achieve the targets and goals of the NBSAP, and that transforming private sectors' business models toward nature positivity should also be prioritized.
Key words: conservation philanthropic funding; Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF); National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP)

2022年, 中国作为联合国《生物多样性公约》(Convention on Biological Diversity, CBD)第十五次缔约方大会(COP15)主席国, 推动在COP15第二阶段会议上通过了包含4个长期目标和23个行动目标的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(以下简称《昆蒙框架》), 为直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画了新的蓝图(李亦欣等, 2023)。

国家生物多样性战略和行动计划(National Biodiversity Strategy and Action Plan, NBSAP)是指导国家生物多样性保护的总体规划, 也是CBD履约的核心工具(刘立等, 2025)。中国于2024年发布了《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》(以下简称中国NBSAP), 成为COP15后首批更新NBSAP的缔约方。中国NBSAP与《昆蒙框架》的行动目标紧密对接, 为全球生物多样性治理贡献中国智慧(姜雪原等, 2025)。全社会的方法(whole-society approach)[①]是《昆蒙框架》强调的实施路径之一, 中国NBSAP也采用全社会的方法, 将非国家行为体(non-state actors, NSAs)纳入中国NBSAP执行的关键参与方。

《昆蒙框架》目标需要资金的投入作为保障, 资金问题是《昆蒙框架》的核心问题, 其制度安排直接关系到《昆蒙框架》能否落实, 关系到人类能否最终扭转生物多样性丧失的趋势(李亦欣等, 2023)。在分析2010年CBD爱知目标失败的原因中, 除了目标设定等缺陷外, 没有足够的生物多样性资金支持也是一个重要方面(魏伟等, 2021)。研究估计2030年前全球每年生物多样性资金的缺口可达5,980–8,240亿美元(Deutz et al, 2020)。生物多样性保护的资金有公共渠道、私营部门等不同的来源(OECD, 2020)。其中, 政府公共资金是生物多样性资金的最大来源(Yang et al., 2024)。

来自公众和企业的生物多样性公益捐赠逐渐成为生物多样性治理资金来源之一。比如, 在美国, 包括生物多样性公益捐赠在内的环境捐赠虽然只占所有公益捐赠的3%, 但生物多样性捐赠正在成为捐赠的焦点, 保持迅速增长态势(Gruby et al., 2021; Cavalcante et al., 2025)。在海洋生物多样性治理领域, 慈善捐赠的规模已和国际官方发展援助规模相当(California Environmental Associates, 2021), 成为生物多样性治理不可忽视的力量。

在全球层面, 学术界和公益行业就生物多样性公益捐赠对生物多样性治理的贡献缺乏系统梳理和研究(Gruby et al., 2023)。中国关于非国家行为体和生物多样性公益捐赠的规模、成效的研究和梳理也十分欠缺。中国履行CBD国家报告中很少有关于非国家行为体和公益捐赠贡献的定量描述。因此,

①《昆蒙框架》将全社会的方法定义为"依赖于各级政府以及社会各方参与者的行动与合作"的方法和途径.

本文聚焦非国家行为体提供的生物多样性公益捐赠及其所实施的生物多样性行动，通过梳理过去5年主要生物多样性公益捐赠的额度和资助方向，定量分析生物多样性公益捐赠对中国NBSAP的贡献及资助空缺，以期有效调动社会资源参与生物多样性保护和推动NBSAP的落地实施。

1 数据收集及分析方法

公益慈善基金会是中国非国家行为体参与生物多样性保护的主要资金来源，它们是生物多样性公益捐赠资金的主要提供方。截至2025年5月，中国内地注册的基金会总数为9,745家(https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList)，生态环境捐赠占全社会公益捐赠总额比例约为1.9% (清华大学公益慈善研究院, 2024)。

本研究选取11家内地规模较大或专注于生物多样性保护资助的公益慈善基金会，其中的7家基金会在COP15的筹备进程中(联合了其他3家民办非企业社会组织)承诺在2030年前投资人民币25.5亿元(约3.59亿美元)用于保护10万km^{2}的自然区域，并鼓励和引导100多家机构参与承诺行动，为COP15的成功召开和《昆蒙框架》的通过发挥了积极的促进作用(刘文慧等, 2025)。这11家基金会提供了中国内地的绝大多数生物多样性公益捐赠。受限于数据来源，本研究没有对民办非企业、境外非政府组织(NGO)在华实施的生物多样性治理项目进行统计。

基于这11家基金会公开的年度报告及财务报告，本研究对其2020–2024年间的公益支出和项目成果进行了数据整理和分析。首先，统计了基金会所捐赠的生物多样性公益项目及其额度，包含与受威胁物种保护、重要栖息地保护、生态系统修复及生物多样性主流化相关的项目。然后，将项目按资助方向划分为不同的类别，并与中国NBSAP中27项优先行动和《昆蒙框架》的23项行动目标对应，以分析这些公益捐赠对中国履约和全球《昆蒙框架》实施的具体贡献。由于11家基金会存在相互资助的情况，本研究识别了此类资助，并未重复统计。在分析过程中，本文整理了公益基金会年度报告中披露的保护成果数据，按照2025年2月CBD在罗马举办的COP16续会上通过的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的监测框架》(https://www.cbd.int/doc/c/1e13/f20d/81cd8447744640bbd21e008f/cop-16-l-26-rev1-en.pdf)推荐的监测指标中选取适用于生物多样性公益捐赠的关键可量化行动指标，系统整理了11家基金会的生物多样性保护成果，并分析其对于中国NBSAP行动目标的贡献。

2 结果

2.1 中国生物多样性公益捐赠规模与资助方向

2020–2024年间，北京市企业家环保基金会等11家环境基金会的公益支出为48.5亿元人民币，扣除基金会之间相互资助产生的重复计算，这11家基金会与生物多样性相关的公益支出为34.3亿元人民币，占其公益支出总额的70.7% (表1)；生物多样性相关议题投入在所有公益支出中占有绝对优势。其中，7家参与COP15自主承诺的基金会公益支出为28.8亿元人民币，与生物多样性相关的支出为15.5亿元，完成COP15期间承诺资金额的60.7%。这表明中国COP15非国家行为体自主承诺正在稳步落实，并有望超额完成目标。

11家基金会在生物多样性领域的投入以生态修复及造林为主，总计投入金额为23.1亿元人民币，占生物多样性相关开支的67.5%。在重要栖息地保护和自然保护地方面的投入排第二，11家基金会牵头实施了公益保护地、其他有效的区域保护措施(以下简称OECMs)等项目，投入资金接近3.73亿元人民币，占生物多样性相关开支的10.9%。包括生物多样性公众宣传在内的生物多样性主流化投入资金为3.4亿元人民币，占比9.5%。受威胁野生动植物保护上的投入排第四，资助金额达2.0亿元人民币，占生物多样性相关开支的5.9%。在COP15召开后，中国基金会开始设立国际合作项目，支持其他发展中国家的生物多样性保护。例如，深圳红树林基金会在国际合作上的投入达2,100万元人民币，参与了中国发起的国际红树林中心的筹备等(表2)。

2.2 生物多样性公益捐赠对中国NBSAP的主要贡献

COP15推动了中国内地生物多样性公益捐赠的快速发展，并且为中国生物多样性公益捐赠提供了战略方向指引。通过与《昆蒙框架》行动目标和中国NBSAP优先行动比对，本研究发现中国生物多样性公益捐赠主要开展的工作方向与《昆蒙框架》

表1　中国主要基金会生物多样性资金投入情况(2020–2024)

Table1　The biodiversity spending by China's leading foundations (2020–2024)

基金会名称 Foundations name	是否参与COP15自主承诺 COP15 funding pledge	公益支出 Philanthropic funding (￥)	生物多样性相关公益支出 Biodiversity related spending (￥)	生物多样性相关支出占比 Percentage of biodiversity-related spending
北京市企业家环保基金会(SEE基金会) Society of Entrepreneurs and Ecology (SEE) Foundation	是 Yes	1,083,158,958	848,492,351	78.3%
中华环境保护基金会 China Environmental Protection Foundation	是 Yes	571,896,429	246,001,025	43.0%
内蒙古老牛慈善基金会 Lao Niu Foundation①	是 Yes	302,594,221	42,666,304	14.1%
中国绿色碳汇基金会 China Green Carbon Foundation	是 Yes	296,396,109	210,219,279	70.9%
桃花源基金会 Paradise Foundation	是 Yes	143,980,444	123,817,180	86.0%
万科基金会 Vanke Foundation	是 Yes	410,104,597	3,882,500	1.0%
深圳市质兰公益基金会 Zhilan Foundation②	否 No	18,986,030	15,958,900	84.1%
云南省绿色环境发展基金会 Yunnan Green Environment Development Foundation	是 Yes	76,232,776	73,413,084	96.3%
中国绿化基金会 China Green Foundation	否 No	1,664,525,743	1,622,245,059	97.5%
深圳市红树林湿地保护基金会 Mangrove Conservation Foundation	否 No	165,408,406	139,607,488	84.4%
深圳市一个地球自然基金会 One Planet Foundation	否 No	136,468,600	109,896,600	80.5%
重复计算值 Double accounting		22,093,591	7,650,000	
总计(扣除重复计算) Total (deducting double accounting)		4,847,658,722	3,428,549,770	70.7%

表2　2020–2024年中国主要生物多样性公益捐赠主要投入行动方向及资金占比

Table 2　The main actions taken by Chinese philanthropic funding for biodiversity conservation over the past five years (2020–2024)

投入行动方向 Main actions	资金量 Total amount of funding (￥)	占比 Percentage
物种保护 Threatened species conservation	202,218,159	5.9%
栖息地及其保护 Habitat and area-based conservation	373,195,789	10.9%
生态修复及造林 Ecological restoration and afforestation	2,313,187,016	67.5%
气候变化及碳汇 Climate change and carbon sink	85,989,632	2.5%
生物多样性主流化 Biodiversity mainstreaming	325,591,097	9.5%
城市生物多样性 Urban biodiversity	107,231,543	3.1%
国际项目 International collaboration	21,136,534	0.6%

行动目标和中国NBSAP优先行动相对应(图1), 识别出的适合非国家行为体实施的《昆蒙框架》行动目标和中国NBSAP优先行动都有公益捐赠资金覆盖, 这表明中国的生物多样性公益捐赠已经形成比较完整的布局和基础。

具体而言, 在2020–2024年间, 11家基金会的生物多样性公益捐赠取得的保护成果主要包括:

第一, 填补受威胁野生动植物保护公共资金不足和灵活性不足。虽然中国生物多样性捐赠在受威胁野生动植物保护领域的资金投入占比不高, 但由于社会捐赠资金的灵活性, 公益捐赠能快速地通过公民科学和物种监测对未受国家公共资金覆盖的受威胁野生动植物开展保护行动(表3)。11家基金会年报披露了在超过35个受威胁物种的保护上开展了工作, 其中针对雪豹(*Panthera uncia*)、华北豹(*P. pardus japonensis*)等大型猫科动物, 以及中华穿山甲(*Manis pentadactyla*)、勺嘴鹬(*Calidris pygmaea*)、中华凤头燕鸥(*Thalasseus bernsteini*)等受威胁物种的快速行动, 为公共资金的参与和介入提供了科学支持。

第二, 通过公益保护地和OECMs等重要区域的保护措施, 助力实现"3030"目标。中国正在形成

① 老牛慈善基金会2024年年报未发布, 此处公益支出数据只包括2020–2023年期间的数据.

② 质兰基金会2024年年报未发布, 此处公益支出数据只包括2020–2023年期间的数据.




图1　非国家行为体公益资助方向与中国NBSAP优先行动及《昆蒙框架》行动目标的对应关系

Fig. 1　The correlation between the strategies of non-state actors and the priority actions of China's NBSAP and the targets of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF). NSA, Non-state actors; OECMs, Other area-based effective conservation measures; NbS, Nature-based solutions

以国家公园为主体的自然保护地体系, 该体系的目标是到2035年覆盖18%的陆域国土面积。中国正在形成多层级、多类型的自然保护地体系(魏辅文等, 2021)。在保护地不可能无限制扩大范围的约束条件下, 通过社会参与推动建立OECMs将可能助力中国实现《昆蒙框架》的"3030"目标。COP15之后, 中国非国家行为体在OECMs探索上开展了大量试点工作, 中华环保基金会、华泰公益基金会、山水自然保护中心联合发起OECMs案例征集, 首批12个"中国潜力OECMs典型案例"和34个"中国潜力OECMs入围案例", 展现了近年来我国在就地保护和创新OECMs领域所作出的努力和取得的成效, 为中国探索OECMs机制提供了经验。

第三, 推动城市生物多样性保护和自然教育。公众科学的兴起有效地向公众传递了城市生物多样性保护的理念(杨军等, 2025)。城市生物多样性保护正在成为中国生物多样性公益捐赠的热点领域。生物多样性公益捐赠正在支持各类城市自然观察

表3　中国生物多样性公益捐赠资助项目涵盖的受威胁物种
Table 3　Threatened species conserved by China's foundation

中文名/英文名 Chinese name/English name	拉丁名 Latin name	IUCN物种红色名录等级 IUCN Red List category	国家重点保护野生动物名录等级 National Protected Wildlife List class
雪豹 Snow leopard	*Panthera uncia*	易危 Vulnerable (VU)	一级 First class
亚洲金猫 Asian golden cat	*Catopuma temminckii*	近危 Near Threatened (NT)	二级 Second class
荒漠猫 Chinese mountain cat	*Felis bieti*	易危 Vulnerable (VU)	二级 Second class
华北豹 North China leopard	*Panthera pardus japonensis*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
大熊猫 Giant panda	*Ailuropoda melanoleuca*	易危 Vulnerable (VU)	一级 First class
东北虎 Amur tiger	*Panthera tigris altaica*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
孟加拉虎 Bengal tiger	*Panthera tigris tigris*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
云豹 Cloud leopard	*Neofelis nebulosa*	易危 Vulnerable (VU)	一级 First class
青头潜鸭 Baer's Pochard	*Aythya baeri*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class
东黑冠长臂猿 Cao-vit gibbon	*Nomascus nasutus*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class
亚洲象 Asian elephant	*Elephas maximus*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
安徽麝 Anhui musk deer	*Moschus anhuiensis*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
白唇鹿White-lipped deer	*Cervus albirostris*	易危 Vulnerable (VU)	一级 First class
菲氏叶猴 Phayre's leaf monkey	*Trachypithecus phayrei*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
喜山长尾叶猴 Nepal gray langur	*Semnopithecus schistaceus*	近危 Near Threatened (NT)	二级 Second class
巫山巴鲵 Wushan salamander	*Liua shihi*	易危 Vulnerable (VU)	二级 Second class
威氏鼷鹿 Williamson's mouse-deer	*Tragulus williamsoni*	易危 Vulnerable (VU)	二级 Second class
海南长臂猿 Hainan black crested gibbon	*Nomascus hainanus*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class
黔金丝猴 Grey snub-nosed monkey	*Rhinopithecus brelichi*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class
朱鹮 Crested ibis	*Nipponia nippon*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
中华穿山甲 Chinese pangolin	*Manis pentadactyla*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class
丹顶鹤 Red-crowned crane	*Grus japonensis*	易危 Vulnerable (VU)	一级 First class
黑脸琵鹭 Black-faced spoonbill	*Platalea minor*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
东方白鹳 Oriental stork	*Ciconia boyciana*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
中华白海豚 Indo-Pacific humpback dolphin	*Sousa chinensis*	易危 Vulnerable (VU)	一级 First class
蒙新河狸 Sino-Mongolian beaver	*Castor fiber birulai*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
遗鸥 Relict gull	*Ichthyaetus relictus*	易危 Vulnerable (VU)	一级 First class
东北豹 Amur leopard	*Panthera pardus orientalis*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class
秦岭细鳞鲑 Qinling lenok	*Brachymystax tsinlingensis*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
天行长臂猿 Skywalker hoolock gibbon	*Hoolock tianxing*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
金斑喙凤蝶 Golden birdwing	*Teinopalpus aureus*	易危 Vulnerable (VU)	二级 Second class
马麝 Alpine musk deer	*Moschus sifanicus*	濒危 Endangered (EN)	一级 First class
福建小腺蛙 Little gland frog	*Glandirana minima*	极危 Critically Endangered (CR)	二级 Second class
黄胸鹀 Yellow-breasted bunting	*Emberiza aureola*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class
中华凤头燕鸥 Chinese crested tern	*Thalasseus bernsteini*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class
勺嘴鹬 Spoon-billed sandpiper	*Calidris pygmaea*	极危 Critically Endangered (CR)	一级 First class

和自然教育活动, 并推动城市生物多样性友好设施的监测和建设。本研究观察的基金会中, 深圳市红树林湿地保护基金会、深圳市一个地球自然基金会、中国绿化基金会等都将城市生物多样性保护作为战略方向, 在深圳、上海、北京等地推动和参与了一系列城市公园、口袋花园和生物多样性友好建筑的建设和运营。

第四, 积极参与生物多样性国际治理。COP15激发了中国公众和社会参与生物多样性国际治理和国际交流的积极性和热情。从COP15第一阶段昆

明会议到第二阶段蒙特利尔会议，再到COP16卡利会议，中国基金会参与国际合作与交流的热情与日俱增。并逐渐开始与国际组织合作，通过设立合作基金或参与国际组织项目的方式，加强与国际组织和国际非政府组织的交流合作。在2020–2025年间，深圳市红树林湿地保护基金会参与了国际红树林中心的筹备，北京市企业家环保基金会(SEE基金会)发起设立了“蓝色伙伴关系行动”资助专项，支持东南亚的社区组织开展海洋保护工作。

3 中国生物多样性公益捐赠的局限性

COP15推动了中国生物多样性公益捐赠的增加。但由于中国生物多样性公益捐赠规模较小，且主要资金来源于企业捐赠，缺乏独立性，导致生物多样性公益捐赠存在一些问题和不足。

3.1 以造林为主的生态修复资金占比过大

由于植树造林成果快速可见，捐赠者对以造林为主的生态修复比较关注。在过去的5年中，人工造林类的公益捐赠投入占生物多样性公益捐赠的67.5%。不能忽视的是，单一纯林可能会对动物多样性和森林生物多样性造成危害(魏辅文等, 2021)。如果中国生物多样性公益捐赠能够将人工造林策略调整为多重效益森林的营造和森林景观恢复，将可以提高造林类项目的生物多样性成果，并避免人工造林给生物多样性和生态系统带来的负面危害。

3.2 与政府生物多样性保护工程协同不足

中国生物多样性保护资金绝大多数来自于政府公共资金。虽然公益捐赠在生物多样性资金中占比较小，但其可以通过灵活机制，引导和提升国家公共资金的有效性。过去5年，生物多样性公益捐赠与政府公共资金形成合力的领域主要集中在受威胁物种保护上，推动政府实施相关受威胁物种的保护行动，形成捐赠资金和政府公共资金的合力。但在其他领域和方向，生物多样性公益捐赠与国家生物多样性保护工程和项目的协同缺失。例如生物多样性公益捐赠支持的公益保护地、OECMs等创新，由于缺乏与国家公园和自然保护地决策部门合作机制，导致公益保护地和OECMs的民间行动缺乏相应的法律法规认可，这在很大程度上制约了生物多样性保护捐赠的投入和参与的热情。

3.3 缺乏跨机构的协调与合作

虽然中国的生物多样性公益捐赠规模不大，主要由11家基金会和其资助的少数几家著名的民办非企业组织实施。但这些机构之间的合作欠缺，从本研究观察的基金会披露的年报看，不少基金会在雪豹、中华穿山甲等关键物种，以及大熊猫国家公园、三江源国家公园等区域的保护上都在开展工作，但并未形成项目之间的协同，存在重复投入的情况。各组织在知识分享和协作上尚有改善的余地。机构之间的合作可以提高生物多样性公益捐赠资金使用效率，将资金用到最需要的领域。

3.4 推动企业参与生物多样性保护不足

中国生物多样性公益捐赠主要来源于企业或企业建立的基金会，公众捐赠的占比较低。本研究观察的11家基金会，其生物多样性捐赠资金主要来自于蚂蚁集团、腾讯公司、美团公司、汇丰银行、广汽集团、华泰证券、顺丰公司、中金公司等企业及企业基金会。

推动企业通过生物多样性管理和信息披露，改善自身业务对生物多样性保护的贡献，是非国家行为体应重点关注的领域。但在2020–2024年间，本研究观察的基金会几乎没有开展相关企业生物多样性信息披露和目标设定的相关工作，也没有实施项目以推动捐赠企业制定生物多样性战略和披露生物多样性信息。

4 建议及展望

COP15为中国非国家行为体和生物多样性公益捐赠参与生物多样性保护提供了指引，生物多样性公益捐赠可以为《昆蒙框架》和中国NBSAP的优先行动领域积极发挥作用。

建议在中国生物多样性主管部门的支持下，中国的非国家行为体和生物多样性公益捐赠机构应与生物多样性主管部门按照《昆蒙框架》和NBSAP的优先行动方向，形成更加紧密的合作关系，定期量化评估社会组织的贡献，优化未来5年的工作策略。

第一，在生物多样性主管部门支持下，定期更新资助战略。主管部门和基金会之间应定期开展信息分享并建立协调机制，评估生物多样性公益捐赠对中国NBSAP行动目标的贡献。及时进行生物多样

性资金的空缺分析, 调整生物多样性公益捐赠战略和方向, 引导生物多样性公益捐赠资金用于缺乏公共资金投入、但能够撬动政府和企业投入的领域, 例如针对未受有效保护的受威胁野生动植物物种的保护行动。适当调整过高的造林类生态修复的资金投入。

第二, 在基金会战略制定中, 积极与国家生态工程形成协同。主要基金会应在战略制定中, 充分考虑与国家公园、自然保护地等国家重大生态工程和项目的协同。加大公益保护地、OECMs等议题的政策倡导, 为公益保护地、OECMs等获得法律和政府认可并促进生物多样性公益资金投入提供政策支持。

第三, 构建基金会之间的交流平台, 共享知识产品, 减少重复投资。主要基金会可以按照NBSAP的行动目标, 构建不同议题的交流平台, 积极分享项目经验, 共享知识产品, 提升项目效益, 减少项目之间的重复投入和资金浪费。

第四, 支持企业制定生物多样性战略和信息披露政策。基金会应该在企业参与生物多样性保护的信息披露和目标设定上加大资金投入, 开展研究, 为企业参与生物多样性保护提供支持, 支持捐赠企业率先开展生物多样性信息披露, 减少和避免生物多样性破坏。

第五, 进行生物多样性公益捐赠的系统成果披露与评估。11家基金会在资助信息披露上, 目前未与《昆蒙框架》和NBSAP行动目标相对应, 导致无法形成系统的定量报告。建议未来中国生物多样性公益捐赠在进行信息披露和成效评估过程中, 主动参照《昆蒙框架》和NBSAP的指标体系, 这样有助于生物多样性主管部门和科研人员准确地分析生物多样性公益捐赠的进展和成果。

致谢: 感谢三位匿名评审的悉心评审和修改建议。

ORCID

杨方义 https://orcid.org/0009-0005-7930-3067
靳彤 https://orcid.org/0000-0003-2521-0381
张立 https://orcid.org/0000-0002-9006-9970

参考文献

California Environmental Associate (2021) A Decade of Ocean Funding: Landscape Trends 2010–2020. https://oursharedseas.com/funding/. (accessed on 2025-09-10)

Cavalcante AFM, Negacz K, Pattberg P (2025) Biodiversity governance in Latin America: Analyzing the role and relevance of non-state and sub-national cooperative initiatives. Biological Conservation, 305, 111053.

Deutz A, Heal GM, Niu R, Swanson E, Townshend T, Zhu L, Delmar A, Meghji A, Sethi SA, Tobin-de la Puente J (2020) Financing Nature: Closing the Global Biodiversity Financing Gap. The Paulson Institute, the Nature Conservancy, and the Cornell Atkinson Center for Sustainability. https://www.paulsoninstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/financing-nature_full-report_final-with-endorsements_101420.pdf/. (accessed on 2026-1-17)

Gruby RL, Enrici A, Betsill M, Le Cornu E, Basurto X (2021) Opening the black box of conservation philanthropy: A co-produced research agenda on private foundations in marine conservation. Marine Policy, 132, 104645.

Gruby RL, Miller DC, Enrici A, Garrick D (2023) Conservation philanthropy: Growing the field of research and practice. Conservation Science and Practice, 5, e12977.

Institute for Philanthropy of Tsinghua University (2024) China Giving Report. (in Chinese) [清华大学公益慈善研究院 (2024) 中国慈善捐赠报告.] https://www.givingchina.org. (accessed on 2025-11-15)

Jiang XY, Xu JY, Sheng XM, Zhu Y (2025) Synergies and differences between the China National Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2023–2030) and the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Biodiversity Science, 33, 24575. (in Chinese with English abstract) [姜雪原, 徐嘉忆, 盛学敏, 朱源 (2025) 《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》与《昆蒙框架》的协同与差异. 生物多样性, 33, 24575.]

Li YX, Li YY, Zhang YXY, Liu WH (2023) The progress and prospect of the financial arrangements under the Convention on Biological Diversity. Biodiversity Science, 31, 23077. (in Chinese with English abstract) [李亦欣, 李圆圆, 张杨心怡, 刘文慧 (2023) 《生物多样性公约》资金问题最新进展及展望. 生物多样性, 31, 23077.]

Liu L, Zang MY, Ma Y, Wan YQ, Hu FL, Lu XQ, Liu Y (2025) Measures, progress and prospects of central-local cooperation in the implementation of the National Biodiversity Strategy and Action Plan. Biodiversity Science, 33, 24532. (in Chinese with English abstract) [刘立, 臧明月, 马月, 万雅琼, 胡飞龙, 卢晓强, 刘燕 (2025) 央地协同推动国家生物多样性战略和行动计划执行的措施、进展与展望. 生物多样性, 33, 24532.]

Liu WH, Duan HX, Zhang FC, Liu HO, Li ZY, Zhang WG, Du LS (2025) The analysis of the implementation pathways for achieving biodiversity governance goals through a whole-of-government and whole-of-society approach. Research of Environmental Sciences, 38, 9–17. (in Chinese with English abstract) [刘文慧, 段禾祥, 张风春, 刘海鸥, 李子圆, 张

文国, 杜乐山 (2025) 以全政府和全社会方法推动生物多样性治理目标实现路径分析. 环境科学研究, 38, 9–17.]

OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) (2020) A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/04/a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance_ad660ace/25f9919e-en.pdf. (accessed on 2025-09-10)

Wei FW, Ping XG, Hu YB, Nie YG, Zeng Y, Huang GP (2021) Main achievements, challenges, and recommendations of biodiversity conservation in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 36, 375–383. (in Chinese with English abstract) [魏辅文, 平晓鸽, 胡义波, 聂永刚, 曾岩, 黄广平 (2021) 中国生物多样性保护取得的主要成绩、面临的挑战与对策建议. 中国科学院院刊, 36, 375–383.]

Wei W, Shen XL, Liu YN (2021) Toward developing a new funding mechanism to support post-2020 biodiversity conservation. Biodiversity Science, 29, 259–268. (in Chinese with English abstract) [魏伟, 申小莉, 刘忆南 (2021) 2020年后生物多样性保护需要建立新的资金机制. 生物多样性, 29, 259–268.]

Yang FY, Tao Z, Zhang L (2024) Trends and dynamics of philanthropic funding for biodiversity conservation in China. Conservation Science and Practice, 6, e13059.

Yang J, Yang XD, Liu XY, Zhou J (2025) Perspectives of urban biodiversity studies in China serving Target 12 of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Biodiversity Science, 33, 25104. (in Chinese with English abstract) [杨军, 杨旭东, 刘心怡, 周景 (2025) 面向《昆蒙框架》目标12的中国城市生物多样性研究展望. 生物多样性, 33, 25104.]

(责任编委: 肖凌云　责任编辑: 周玉荣)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25246, pages 1–22
doi: 10.17520/biods.2025246
cstr: 32101.14.biods.2025246

•生物多样性保护融资与企业参与专题•

企业生物多样性保护驱动路径与模式

蒙仁嘉[1,2], 秦涛[1], 汤心萌[1*]

1. 北京林业大学经济管理学院, 北京 100083; 2. 暨南大学经济与社会研究院, 广州, 510632

摘要: 当前全球生物多样性保护面临严峻的资金缺口问题, 亟需市场资金参与以缓解资金压力。同时, 生物多样性风险已成为企业重要的系统性风险, 迫使企业必须积极应对。因此, 亟需在微观企业层面展开深入研究, 以系统揭示企业生物多样性保护的内在驱动机制, 为我国企业深化生物多样性保护实践提供理论支撑。基于此, 本文构建“技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景驱动”三维分析框架, 针对我国沪深A股2006–2022年1,714家上市公司, 运用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法, 从组态视角解析企业生物多样性保护的驱动机制。研究发现: (1)技术资源禀赋、组织治理结构和环境情景驱动三者协同构成企业生物多样性保护的必要条件; (2)识别出4种典型企业生物多样性保护驱动路径, 包括企业治理引导型、财务状况驱动型、市场压力倒逼型以及自然禀赋依托型, 其分别能够解释大约14%、16%、18%和23%企业的生物多样性保护策略; (3)我国企业保护行为呈现“外部驱动主导、主动引领为辅”特征; (4)驱动与阻碍路径存在“非对称性”, 低水平保护企业主要受限于内部环境受限型和环境引导失效型两种情境。本研究识别出的差异化驱动路径可为政府部门制定生物多样性保护分类指导政策、精准激励企业参与提供科学依据。本文通过拓展技术–组织–环境框架并运用组态视角, 构建了三维分析框架, 系统揭示了企业生物多样性保护的多元并发驱动机制, 深化了对微观企业环境责任行为的理论认知。

关键词: 生物多样性; 企业保护行为; 驱动路径; 技术–组织–环境理论; 组态分析

蒙仁嘉, 秦涛, 汤心萌 (2026) 企业生物多样性保护驱动路径与模式. 生物多样性, 34, 25246. doi: 10.17520/biods.2025246; cstr: 32101.14.biods.2025246.

Meng RJ, Qin T, Tang XM (2026) The driving path and mode of enterprises' biodiversity conservation. Biodiversity Science, 34, 25246. doi: 10.17520/biods.2025246; cstr: 32101.14.biods.2025246.

The driving path and mode of enterprises' biodiversity conservation

Renjia Meng[1,2], Tao Qin[1], Xinmeng Tang[1*]

1 *School of Economics and Management, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China*
2 *Institute for Economic and Social Research, Jinan University, Guangzhou 510632, China*

ABSTRACT

Background & Aims: Global conservation of biodiversity is currently confronting severe challenges, among which the funding gap is particularly pronounced. There is an urgent need for innovative mechanisms to channel market-based capital into conservation efforts and to stimulate corporate initiative. However, there is a significant structural imbalance exists within the current academic literature. Research at the macro level, focusing on conservation governance philosophies and development models, is relatively abundant. In contrast, studies at the micro level, particularly those investigating the driving mechanisms of corporate behavior, remain scarce. A systematic understanding of the specific pathways and models through which enterprises can enhance their biodiversity conservation performance has yet to be fully developed. Consequently, there is a critical imperative to conduct in-depth research at the micro enterprise level. Such research is essential to systematically unravel the intrinsic driving mechanisms behind corporate biodiversity conservation, thereby providing a theoretical foundation for Chinese

收稿日期 Received: 2025-06-30; 接受日期 Accepted: 2025-12-05
基金项目: 国家博士后创新人才支持计划(GZC20230251)、国家博士后面上项目(2024M750194)和中央高校基本科研业务费专项资金(200-GK122401318; YT6000052) Supported by the Postdoctoral Fellowship Program of China Postdoctoral Science Foundation (GZC20230251), China Postdoctoral Science Foundation General Program (2024M750194), and Fundamental Research Funds for the Central Universities (200-GK122401318; YT6000052)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: xinmengtang@bjfu.edu.cn

enterprises to deepen their practical engagement in biodiversity protection.
Methods: In light of this research gap, this study undertakes dual efforts at both theoretical and methodological levels. First, through a theoretical extension and contextual adaptation of the traditional technology–organization–environment (TOE) framework, we construct a three-dimensional integrated analytical framework termed "technical resource endowment–organizational governance structure–environmental context-driven". This framework provides a systematic antecedent explanation for corporate biodiversity conservation behaviors. Second, leveraging panel data from 1,714 A-share listed companies on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges' (2006–2022), we empirically dissect the multiple driving pathways for corporate biodiversity conservation. This is achieved by applying the fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) method, which allows for an examination from a configurational perspective of causal conditions.
Results: (1) Within the modified TOE theoretical framework, the synergistic interaction of technical resource endowment, organizational governance structure, and environmental context-driven constituted a necessary condition for forming effective pathways driving high levels of corporate biodiversity conservation. No single dimension of these conditions was sufficient to effectively promote corporate biodiversity conservation on its own. (2) We identified several typical configurations leading to high levels of corporate biodiversity conservation. These archetypes included the corporate governance guided model, the financial condition driven model, the market pressure forced model, and the natural endowment reliant model. These configurations could explain the biodiversity conservation strategies of approximately 14%, 16%, 18%, and 23% of the sampled enterprises, respectively. (3) The current state of corporate biodiversity conservation in China was characterized by a distinct predominance of external drivers, with proactive leadership playing a supplementary role. Specifically, enterprises that were passively adapting, driven primarily by market pressures or natural resource endowments, collectively accounted for about 41% of the sample. In contrast, systematically proactive enterprises, characterized by active governance improvements or dedicated financial investments, constituted only 30%. (4) A significant "asymmetry" existed between the pathways that drive high levels of biodiversity conservation and those associated with low levels. Enterprises demonstrating low levels of biodiversity protection were primarily constrained by two specific situational configurations: the internal environment constrained type and the environmental guidance ineffective type.
Implications & Contributions: The differentiated driving pathways identified in this research offer a scientific basis for government agencies to formulate categorized guidance policies for biodiversity conservation. This enables more precise and targeted incentives to encourage corporate participation, moving beyond a one-size-fits-all approach. This study makes significant theoretical contributions by extending the TOE framework and employing a configurational perspective. The construction of the three-dimensional analytical framework systematically uncovers the multiple, concurrent driving mechanisms of corporate biodiversity conservation. This deepens the theoretical understanding of environmental responsibility behaviors at the micro-enterprise level, highlighting the complex interplay of factors that shape corporate action in this critical domain.
Key words: biodiversity; corporate conservation behavior; driving pathways; technology–organization–environment theory; configuration analysis

生物多样性是指所有动植物、微生物物种及其所在生态系统、形成的生态过程所构成的总和, 主要包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性3个层次(https://legal.un.org/avl/ha/cpbcbd/cpbcbd.html)。作为自然资本的核心要素, 生物多样性不仅维持着生态系统的稳定性与功能完整性, 更为人类社会提供了关键的生态系统服务(崔楚云等, 2022)。但在气候变化与人类活动的双重压力下, 生物多样性正面临严峻危机(耿宜佳等, 2020)。当前物种灭绝速率已达地质背景值的数十至数百倍, 约100万种物种面临灭绝威胁(IPBES, 2019)。中国作为生物多样性大国同样面临严峻挑战, 《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023–2030年)》指出15%–20%的高等植物物种濒临灭绝(https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202401/W020240123333807288143.pdf)。然而, 全球生物多样性保护面临巨大的资金挑战。据联合国环境规划署测算, 年度保护资金缺口高达7,000–8,240亿美元, 而实际投入远不足以满足需求(Díaz & Malhi, 2022; https://www.biodiversityrisk.org/)。尤为关键的是, 当前保护资金约80%–85%依赖公共财政, 市场主体参与严重不足。企业作为全球经济活动的主体, 其投入与自身经济地位极不匹配(Díaz & Malhi, 2022)。同时, 生物多样性风险已成为企业重要的系统性风险, 直接威胁

农业、制药和旅游等多个关键行业的市场价值(Narain et al., 2022)。标普500覆盖的企业因生物多样性相关的供应链中断年均损失达1,200亿美元,占总利润的7.3% (Kalhoro & Kyaw, 2024)。这表明,企业亟需关注生物多样性保护,将其提升至战略管理高度已成为企业可持续发展的必然选择。

然而,当前学术研究呈现出显著的结构性失衡:宏观层面的保护治理理念与发展模式研究较为丰富,而微观层面的企业生物多样性保护行为研究则相对薄弱,尤其是关于企业提升生物多样性保护水平的具体实施路径与运作模式尚未形成系统性认识。早期研究主要基于制度理论视角,将企业保护行为解读为对外部规制压力的被动响应。代表性研究如Reale等(2019)采用访谈分析方法,对巴西证券交易所7家上市公司的生物多样性保护实践进行了深入剖析。Smith等(2019)则以智利林业和鲑鱼养殖业为例,揭示了不同行业的监管环境与利益相关者参与形式对企业保护行为差异的影响机制。随着自然资源基础观等战略管理理论的引入,研究重心逐步转向生物多样性作为战略资产的价值创造潜力。IPBES (2019)首次系统量化了生物多样性丧失的经济影响,推动保护研究从传统生态学领域向企业环境责任范畴拓展。Flammer等(2025)基于金融机构交易数据,明确论证了生物多样性项目能为投资者带来超额收益。Affinito等(2025)研究指出,在风险因素持续增加的背景下,企业生物多样性保护已从传统的社会责任范畴升级为战略性核心议题。类似地,Kopnina等(2024)、Ali等(2024)以及Bassen等(2024)的研究均证实,行业领先企业正通过将生物多样性保护深度整合至商业模式创新中,以获取额外的保护溢价。国内学者汤心萌和秦涛(2025)的研究揭示了积极的生物多样性保护行为对企业融资能力的促进作用。吴慧慧等(2025)则证实了生物多样性风险信息披露对企业债券融资成本具有长期非线性优化效应。

关于企业生物多样性保护的驱动机制虽有少量研究,但主要局限于案例研究或定性分析。基于案例分析方法,Toukabri和Alwadai (2024)与Ali等(2024)分别探讨了董事会治理和外部投资者对企业生物多样性保护的驱动作用。国内学者宋阳等(2025)从我国能源企业实践出发,探索了生物多样性保护的主流化管理路径。综上所述,现有学术研究主要聚焦于宏观层面的保护治理理念与发展模式探讨,而在微观企业层面,相关研究仍显不足,难以为企业提升生物多样性保护实践提供充分的理论支撑。

鉴于此,本文在理论和方法层面展开双重工作,系统推进企业生物多样性保护驱动机制的研究,总结形成企业生物多样性保护驱动路径与模式。首先,通过对传统技术–组织–环境(technology–organization–environment, TOE)框架的理论拓展和情境化调适,构建了“技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景驱动”的三维整合分析框架,为企业生物多样性保护行为提供了系统性的前因解释。其次,基于2006–2022年沪深主板A股1,714家上市公司的面板数据,运用模糊集定性比较分析(fuzzy-set qualitative comparative analysis, fsQCA)方法,从条件组态视角实证解析了企业生物多样性保护的多元驱动路径。

1 理论基础与分析框架

1.1 TOE理论基础

TOE理论是由Tornatzky等(1990)提出的系统性分析工具,为研究组织行为提供了多维度的理论分析框架。该理论最初用于解释技术创新在组织中的采纳与扩散机制,随着理论发展与应用拓展,逐渐成为分析组织战略决策过程的主流理论范式。TOE理论包含3个相互关联的核心维度:技术维度关注技术本身的特性对组织决策的影响,包括技术的先进性、兼容性、复杂性和相对优势等关键特征;组织维度着重考察组织内部结构特征对决策过程的影响,包括组织规模、资源禀赋、管理机制和组织文化等内部条件;环境维度则聚焦外部环境因素对组织行为的塑造作用,包括市场竞争、政策法规、社会文化等宏观环境要素(Chau & Tam, 1997; 谭海波和张楠, 2016)。TOE理论系统性和灵活性的优势,已被广泛应用于企业绿色环保行为、企业社会责任行为以及企业可持续发展决策等多个研究领域,成为分析组织行为的重要理论工具之一(Vishwakarma et al., 2022; 曾经纬和李柏洲, 2022)。

尽管TOE理论因其系统性的分析视角和广泛的应用适应性,在探究组织行为驱动因素和复杂因果关系的研究中得到普遍应用,但其理论发展仍存

在两个关键局限性, 这也对本文研究企业生物多样性保护的驱动机制提出了挑战(谭海波等, 2019; 李雪琴等, 2024)。(1) TOE理论在3个核心维度的操作化测量方面缺乏统一标准。作为一个高度概括性的理论模型, TOE理论框架的具体测量指标因研究领域和对象存在显著差异。且相较于西方成熟的研究体系, TOE理论框架的各维度在中国情境下的本土化表征指标仍需深入探索。(2) TOE理论在解释多重因素的组合效应方面存在理论空白。TOE理论仅关注各维度的独立影响, 而忽视了多因素的协同效应, 难以充分揭示多维要素的非线性组合效应。这种局限性在分析企业生物多样性保护时尤为突出, 其不仅涉及企业内部的技术和管理因素, 还受到外部制度环境和自然条件的共同影响, 各因素间的交互关系错综复杂(Díaz & Malhi, 2022; 汤心萌和秦涛, 2025)。

鉴于此, 本研究对TOE理论的适应性和组态效应两个层面进行了创新性改进: (1)对传统TOE理论进行了适应性拓展, 将其拓宽至企业生物多样性保护场景中的应用。将传统"技术–组织–环境"细化拓展为"技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景驱动", 该整合性的更新后的TOE理论框架更贴合中国企业参与生物多样性保护的现实情境。(2)引入新兴的组态分析研究范式, 以弥补传统TOE理论在分析多重条件组合效应方面的不足。组态分析方法的核心优势在于能够识别不同组合模式, 并会通过非单一、非线性、非因果对称的勾稽关系来共同形塑组织结果, 揭示各维度要素之间可能存在的协同或替代关系(Fiss, 2011; 贾建锋等, 2024)。引入组态分析方法能够更好地理解中国企业生物多样性保护行为背后的技术、组织、环境等多重驱动复杂因果机制, 突破传统TOE理论线性分析范式的局限。

1.2 "技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景驱动"分析框架

考虑到中国企业生物多样性保护的特殊实践情境以及复杂非线性过程(Mi et al., 2021; Yang et al., 2021), 本文对传统TOE理论进行了理论拓展和情境化调适, 构建了专门针对企业生物多样性保护研究的"技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景驱动"理论分析框架, 旨在系统揭示整合性的企业生物多样性保护的驱动路径和模式(图1)。

1.2.1 技术资源禀赋: 财务状况对生物多样性保护技术实施的资源支持

企业生物多样性保护启动阶段, 保护技术实践差异性主要取决于财务资源门槛, 而非技术可及性。事实上, 由于生物多样性保护技术的高成本性以及长周期性, 其可行性受制于企业的财务能力与可持续性。基于资源基础观理论, 生物多样性保护




图1 "技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景驱动"的理论框架

Fig. 1 Theoretical framework of technical resource endowment–organizational governance structure–environmental context-driven

的技术实践包含两类差异化投入: “硬技术资本”与“软技术能力”, 前者依赖资产规模支撑的投入能力, 后者考验财务健康程度保障的持续能力(覃予和王翼虹, 2020; 任晓松等, 2024)。

同时, 在中国情境下分析企业生物多样性保护差异化路径, 纳入资产规模与财务风险两项指标具有重要意义。其一, 中国企业存在“规模导向型增长”与“融资约束型投资”的结构性特征(邓可斌和曾海舰, 2014), 且在规模较大企业中, 绿色信贷政策对企业可持续发展绩效的正向冲击更为显著(姜燕和秦淑悦, 2022)。其二, 中国资本市场风险敏感度高, 企业财务风险与社会责任投资者信心及环境、社会和公司治理(environmental, social, and governance, ESG)评级表现高度相关(张鲜华和秦东升, 2024)。此外, 中国生物多样性保护尚处于政策驱动早期阶段, 政策激励的不确定性使企业财务稳健性成为技术投入持续性的关键保障。因此, 本文从企业资产规模与财务风险两个维度, 探讨技术资源禀赋对企业生物多样性保护路径的影响。

第一, 企业资产规模。作为“硬技术资本”的关键资源禀赋门槛, 企业资产规模直接决定生物多样性保护技术实践的规模与深度。大规模生物多样性保护项目本质属于“资源密集型和技术响应型”, 即资产规模与企业技术投入能力呈显著正相关关系(Ai et al., 2024)。其一, 规模经济效应可使企业降低单位生物多样性保护技术成本; 其二, 资产基础支持企业开展战略性生物多样性保护技术投资。由此可见, 资产规模不仅影响技术实施的规模与质量, 也使大型企业成为行业技术革新与保护范式转型的核心力量。

第二, 企业财务风险。通过对“软技术能力”动态调节, 企业风险控制影响生物多样性保护技术实践的可持续性边界。由于财务风险水平不同, 不同企业会呈现差异化的技术行为模式(Zhao et al., 2022)。高财务风险企业面临短期生存压力, 往往被迫采取技术降级策略, 陷入“意愿–能力”困境。相比之下, 中低等财务风险企业具有最优战略灵活性, 既无破产危机, 又能通过环保实践提升资本市场评价, 倾向选择性投入生物多样性保护技术。这表明财务风险水平实质上构成了企业生物多样性保护技术投入以及持续性的关键制约因素。

1.2.2 组织治理结构: 治理能力对生物多样性保护组织效能的制度支撑

在企业生物多样性保护的实施过程中, 企业组织治理结构发挥基础性的制度支撑作用。随着可持续发展理念的深化, 生物多样性保护已从传统的合规性要求逐步演变为企业战略管理的重要组成部分, 使得公司治理机制在保护实践中的关键作用日益凸显(Makpotche et al., 2024; Kamarudin et al., 2025)。基于代理理论和利益相关者理论的双重视角, 组织治理主要通过“决策广度”和“监督深度”两个核心维度影响企业生物多样性保护的战略定位和实施效能, 前者体现在董事会规模所决定的决策包容性和多元性, 后者反映为独立董事占比所保障的监督专业性和有效性。

并且这两个组织治理指标在TOE框架的中国本土化调试中具有理论与现实意义。首先, 我国大型上市企业中, 事业部制组织结构形式较为普遍, 组织结构整体高度趋同, 董事会结构成为影响企业履行环境与社会责任的重要制度变量(楼园和魏文姬, 2011; 杨存, 2022[①])。其次, 企业的可持续发展和政策支持体系之间存在紧密关联, 董事会决策的多元性和独立性与企业环境行为显著正相关, 会影响企业对政策信号的响应质量(任广乾等, 2021)。因此, 本文将从董事会规模和董事会独立性两个治理要素入手, 深入探究组织治理结构对企业生物多样性保护的差异化驱动路径及机制。

第一, 董事会规模。作为反映“决策广度”的关键指标, 董事会规模直接影响生物多样性保护战略的多元性和包容性。其一, 知识多样性和社会网络资源丰富度可提升董事会对生物多样性保护相关议题的认知深度和关注度, 有利于企业获取相关的技术和专家支持; 其二, 决策审慎性增强能够平衡生物多样性保护项目的短期利润与长期生态价值(王锋正和陈方圆, 2018; 余伟和郭小艺, 2023)。由此可见, 适度扩大的董事会规模拓展了企业生物多样性保护决策的视野和维度, 为其提供了必要的知识储备和社会资本, 也是保护战略科学性和前瞻性的制度保障。

第二, 董事会独立性。作为“监督深度”的核心

① 杨存 (2022) 环境、社会责任和公司治理(ESG)表现对企业价值的影响研究——基于A股上市公司的实证分析. 海南大学, 海口.

指标, 董事会独立性是防范生物多样性保护“象征性实践”的关键机制。其一, 独立董事可有效减少管理层短视行为; 其二, 独立董事显著降低了企业环境违规概率, 提高生物多样性保护的信息披露质量; 其三, 通过引入环保专家作为独立董事, 建立外部问责机制, 将社会监督内化为治理结构(崔伟和陆正飞, 2008)。这表明, 高水平的董事会独立性不仅构成了防范生物多样性保护流于形式的关键制度保障, 更为环境要素深度融入企业战略决策体系提供了必要的治理机制。

1.2.3 环境情景驱动: 外部环境对生物多样性保护战略选择的约束与激励

在企业生物多样性保护的外部驱动层面, 外部环境要素构成了影响企业实践的重要情境因素。基于制度理论和自然资本理论的双重视角, 环境要素主要通过“市场环境”和“自然环境”两个维度对生物多样性保护战略选择产生约束与激励效应。其中, “市场环境”维度主要涵盖市场认可度、区域经济发展水平和环境规制强度等外部性因素, “自然环境”维度则聚焦国家公园建设和自然保护区面积等自然因素。

基于中国特色社会主义市场经济以及幅员辽阔的自然资源情境, 本文从市场环境与自然环境两个方面分析企业生物多样性保护行为, 兼具现实意义和理论必要性。首先, 从市场环境来看, 中国经济正处于全面绿色转型阶段, 政府行为与公众环境关注的协同效应对企业绿色转型具有显著正向作用, 政府与社会公众共同形成的以政策规制与社会监督为核心的压力可有效影响企业生态保护行动(马平平等, 2024)。与此同时, 区域经济发展水平和产业结构差异使得企业所面对的地方市场绿色化发展水平并不均衡, 整体经济绿色发展的能力与韧性可通过生产要素配置优化等手段提升。因此, 市场环境不仅塑造了企业对生物多样性保护的经济激励, 也反映了不同区域制度压力与市场约束的差异性。其次, 从自然环境来看, 中国具有独特的生态地理格局与高度分化的自然资源禀赋, 生态系统服务功能在不同地区差异显著。随着国家公园体系和生态保护红线制度的逐步建立, “以生物多样性保护为核心目标” “中央和地方财政投入持续增加并探索多元化资金渠道”等一系列举措也加快跟进, 企业所处地区的生态脆弱性与自然保护区密度顺势成为影响其环境战略响应的重要考量(谢高地等, 2015; 张建亮等, 2019)。由此, 本文旨在揭示外部环境通过“市场环境”约束与“自然环境”激励双重路径影响企业生物多样性保护决策的内在机理。

第一, 市场环境维度作为企业生物多样性保护战略的重要外部驱动因素, 通过需求拉动、资源支持和强制约束三重交互作用机制, 系统性地影响企业的保护行为决策(汤心萌和周晓光, 2024)。本文重点考察市场认可度、区域经济水平以及环境规制强度3个关键子维度的作用机理。(1)市场认可度。在“需求拉动机制”的驱动下, 企业为追求市场认可度, 其生物多样性保护行为会受到决策的显著影响。当企业在环境保护方面表现出色时, 能有效提升其在资本市场的估值水平, 这种正向的市场反馈机制形成良性循环后, 将持续激励企业加大生物多样性保护投入, 以维持和提升其市场声誉与社会认可度。(2)区域经济水平。“资源支持机制”体现在区域经济发展水平对生物多样性保护提供资源支持上。经济发展水平较高的区域通常具备更完善的环保基础设施和政策支持体系, 这种优越的制度环境为企业开展系统性的生物多样性保护实践提供了必要的物质基础和制度保障。(3)环境规制强度。通过“强制约束机制”, 环境规制倒逼企业采取生物多样性保护实践。政府部门通过建立健全环境监管制度体系, 将生物多样性保护要求内化为企业经营决策的基本约束条件, 促使企业通过技术创新和管理优化等途径不断提升生物多样性保护实践水平(周晓光和汤心萌, 2022)。

第二, 自然环境维度作为生物多样性保护的自然资源禀赋物质基础, 通过空间邻近效应产生系统性影响。本文重点解析国家公园建设与自然保护区面积两个核心要素的作用机制: (1)国家公园建设。2021年我国正式设立第一批国家公园, 包括三江源国家公园、大熊猫国家公园等首批5个国家公园体系。当企业运营区域与国家公园毗邻时, 其生产经营活动直接作用于高价值的生态系统, 这种地理邻近性既带来了特殊的生物多样性保护责任, 也创造了独特的生物多样性保护发展机遇(谢花林等, 2024)。(2)自然保护区面积。保护区的空间规模直接影响区域生物多样性存量。当企业所在区域的自

然保护区覆盖范围较大时, 意味着该地区拥有更为完整的生态链条和物种多样性, 这种自然资本禀赋既构成了企业发展的生态约束条件, 也为其可持续经营提供了天然的生物多样性实践基础(何思源等, 2021; Cheng et al., 2023)。

综上所述, 本研究系统提出了多层次的驱动企业生物多样性保护的分析框架(附录1)。有效的企业生物多样性保护实践需要3个维度的协同配合: 技术维度提供必要的资源保障, 组织维度构建制度化的决策体系, 而环境维度则形成外部的约束与激励。在组态分析的视角下, 技术、组织、环境维度并非孤立运作, 而是通过复杂的交互作用共同塑造企业的保护行为。因此, 本文将基于组态分析的方法, 实证探讨技术资源禀赋、组织治理结构和环境情景因素如何相互联动驱动企业生物多样性保护实践进程。

2 研究设计

2.1 研究方法

为弥补传统TOE理论在分析多重条件组合效应方面的不足, 本研究采用fsQCA方法(杜运周和贾良定, 2017), 分析了中国企业生物多样性保护行为背后的复杂因果机制。fsQCA方法由Ragin和Fiss (2008)提出, 是一种整合了定性分析与定量分析优势的研究方法。fsQCA以集合论和布尔代数运算为基础, 站在组态研究视角分析复杂因果关系中的充分条件和必要条件问题, 以探讨不同前因条件组合对结果变量的具体影响(Dul, 2016)。fsQCA的分析过程包括以下几个步骤: (1)定义研究问题, 明确前因变量与结果变量, 并将其转化为模糊集合值; (2)构建真值表, 列出所有条件组合及其对应的结果; (3)通过布尔代数简化原因特征组合, 识别出最简的充分条件组合; (4)分析条件组合的必要性与充分性, 揭示不同条件组合对结果的影响机制; (5)进行敏感性分析以验证结果的稳健性(张明和杜运周, 2019; 戴正和包国宪, 2023)。

相较较于传统的回归分析和案例研究中常见的定量方法, 如结构方程模型(structural equation model, SEM)和面板数据回归模型(panel data regression model), fsQCA具有两个显著特征。首先, fsQCA能够处理复杂因果关系以及识别导致相同结果的不同条件组态, 即多重并发因果和多路径等效性, 这有助于揭示各因素间交互影响结果的作用以及互补与替代关系。而传统的面板数据回归模型和SEM方法通常假设因果关系是线性且单一的, 更适合处理简单的因果链条, 很难有效应对多重因素交织的情境, 这与本研究中的许多因素是通过多重条件的交互作用共同影响企业生物多样性保护的情况不相符(夏鑫等, 2014; 张明和杜运周, 2019)。其次, fsQCA承认因果关系的非对称性, 即导致结果出现的条件组合与导致结果不出现的条件组合可能完全不同。而面板数据回归模型和SEM在处理因果关系非对称性时存在一定局限, 它们通常假设导致某一结果的原因与未导致该结果的条件是对称的, 导致正向与反向因果机制混淆。因此, 本文尝试在使用fsQCA组态分析的基础上, 分析企业生物多样性保护背后各因素之间复杂的交互作用和多元驱动机制(Kraus等, 2018)。

2.2 变量选择

2.2.1 结果变量

本文采用汤心萌和秦涛(2025)测算的企业生物多样性指数衡量企业在生物多样性保护方面的表现, 该指数通过创新的研究方法体系, 系统性地评估了我国上市企业在生物多样性保护方面的信息披露水平。具体而言, 汤心萌和秦涛(2025)基于互联网爬虫技术所得的2006–2022年间1,714家上市企业的11,867份企业社会责任报告和企业ESG报告, 综合使用“网络爬虫技术–文本词典构建–文本分析法–熵值法”多种定量分析方法, 捕捉和衡量我国上市公司报告中企业涉及生物多样性保护相关的信息程度。

企业报告作为信息传递的重要载体, 其披露内容能够有效反映企业的战略取向和行为特征。特别是企业年报作为公司定期对外沟通的标准化工具, 其中关于生物多样性保护的信息披露程度, 不仅体现了企业对生物多样性保护的认知水平, 更反映了其在生物多样性保护方面的实际行动。因此, 汤心萌和秦涛(2025)基于企业报告文本分析构建的生物多样性保护指数, 能够较为准确地衡量企业在生物多样性保护方面的实际表现。

2.2.2 前因变量

根据“技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景

驱动”分析框架, 选择以下9个前因变量(表1)。(1)企业资产规模。本文采用公司年末资产总额取自然对数, 作为衡量该公司当年企业规模的指标, 一般来说公司规模越大, 抵抗各类风险的能力也就越强, 公司业绩自然越好。(2)企业财务风险。借鉴聂紫聪(2022), 本文选取各公司年末资产负债率作为其财务风险衡量指标, 公司的年末资产负债率越大, 其财务杠杆越高, 面临的财务风险也越大。(3)董事会规模。有关企业治理的文章中多使用公司当年董事会人数来表示该企业的董事会规模, 故本文也依照已有研究采用该指标进行测度。(4)董事会独立性。本文选取样本数据当年独立董事年末在职人数占董事会年末在职人数的比例作为董事会独立性的衡量指标, 该指标越大, 则董事会独立性越高。(5)市场认可度。本文使用每股收益来衡量企业的市场认可度, 因为每股收益能较好反映出投资者愿意为每一普通股股权与企业共同享有的收益或承担的亏损, 较好反映出公司在证券市场上的资本竞争能力。(6)区域经济水平。本文以样本企业注册地所在省市当年的人均国内生产总值为指标, 对其所在区域的经济发展水平进行衡量。(7)环境规制强度。参考任广乾等(2024)研究, 选取地区工业污染治理完成投资与第二产业增加值之比来衡量环境规制强度。(8)国家公园建设。为便于识别、分析和解释国家公园建设这一政策实施前后给各省带来的影响(Wooldridge, 2016; https://www2.econ.univpm.it/servizi/hpp/lucchetti/didattica/basic.pdf), 并使得后续的定量研究更简洁直观, 参考已有文献(朱臻等, 2022; 杨虹等, 2025), 本文以2021年国家公园正式设立年份为时间分界点, 国家公园所在省份为地理分界点, 构造一个国家公园设立时间与所在地理区域交互的0–1虚拟变量。具体而言, 若样本数据中企业的注册地所在省份未包含国家公园, 虚拟变量标记为0; 若包含, 企业注册地所记为1。(9)自然保护区面积。本文直接采用中华人民共和国生态环境部公布的《全国自然保护区统计表》中各省份当年国家

表1　企业生物多样性保护驱动路径研究变量汇总

Table 1　Summary of research variables for the driving path of enterprises' biodiversity conservation

变量类型 Variable type	变量名称 Variable name	缩写 Symbols	变量描述 Variable description	来源 Data sources
结果变量 Result variable	企业生物多样性保护指数 Enterprise biodiversity conservation index	*BDI*	企业生物多样性保护表现 The performance of enterprises in biodiversity conservation	汤心萌和秦涛, 2025
前因变量 Antecedent variable	企业资产规模 Enterprise asset scale	*SIZE*	年末资产总额(亿元)取自然对数 The total assets at the end of the year (hundred million yuan) are taken as the natural logarithm	https://data.csmar.com/
	企业财务风险 Enterprise financial risk	*LEV*	年末资产负债率(%) Year-end asset-liability ratio (%)	https://data.csmar.com/
	董事会规模 Board size	*BSIZE*	董事会年末在职人数(人) The number of people on the board of directors at the end of the year	https://data.csmar.com/
	董事会独立性 Board independence	*BI*	独立董事年末在职人数占董事会年末在职人数的比例(%) The proportion of independent directors in service at the end of the year to the total number of directors in service at the end of the year (%)	https://data.csmar.com/
	市场认可度 Market recognition	*EPS*	税后利润比股本总数(%) After-tax profit ratio to total share capital (%)	https://data.csmar.com/
	区域经济水平 Regional economic level	*PGDP*	各省年度人均地区生产总值(亿元) Annual per capita regional GDP of each province (hundred million yuan)	https://data.csmar.com/
	环境规制强度 Intensity of environmental regulation	*ER*	工业污染治理投资总额比第二产业增加值(%) Total investment in industrial pollution control to the added value of the secondary industry (%)	https://data.csmar.com/
	国家公园建设 National park construction	*NP*	以2021年为分界点的5个正式设立国家公园的0–1变量 The 0–1 variable of the five officially established national parks with 2021 as the dividing point	https://www.stats.gov.cn/; https://www.mee.gov.cn/
	自然保护区面积 Area of nature reserve	*NRA*	各省市当年统计本地各级自然保护区面积总和(10^4 ha) The total area of nature reserves at all levels in each province and municipality as tallied in the current year (10^4 ha)	https://www.stats.gov.cn/; https://www.mee.gov.cn/

级、省级、市级和县级共4级自然保护区面积合计数作为衡量指标。

2.3 研究样本

本研究以2006–2022年沪深主板A股的1,714家上市公司为研究对象。样本筛选基于以下标准: 考虑到企业社会责任报告和ESG报告是披露生物多样性保护信息的主要渠道, 本文重点选取在此期间发布过相关报告的上市公司。同时, 通过Python网络爬虫技术, 系统采集巨潮资讯网(证监会指定信息披露平台, http://www.cninfo.com.cn/new/index)公布的企业社会责任报告和ESG报告, 经过数据清洗和整理, 最终获得由1,714家上市公司构成的基础研究样本。

2.4 数据校准

fsQCA方法中的数据校准是指将变量数据转化为集合数据, 赋予案例集合隶属度的过程, 是定性比较分析的基础(杜运周和贾良定, 2017)。具体而言, 根据定性比较分析中的前提条件和案例情况将变量校准为隶属度介于0和1之间的集合。对于校准方法的选择, 本文借鉴张明和杜运周(2019)的研究, 运用直接法将变量校准为模糊集; 在隶属度阈值设定上, 遵循已有研究做法(Ragin & Fiss, 2008), 将完全隶属、交叉点和完全不隶属的校对点设定为0.9、0.5及0.1共3个锚点, 即对应样本数据中各变量的90%分位数点、50%分位数点和10%分位数点(简兆权等, 2020; Yin & Ran, 2023), 将原始连续变量数据转变为介于0和1之间的模糊隶属分数, 对9个前因变量进行校准。使用fsQCA 3.0软件分析各变量校准瞄点及描述性统计(附录2)。

3 实证分析

3.1 必要条件分析

在进行条件组态分析前, 需首先对各个条件的必要性逐一检验。根据数据结果对无法单独作为必要条件的各个前因变量展开充分条件分析, 并通过“布尔代数最小化”识别出对目标案例解释力度最大的条件组态。本文将认定必要条件的一致性水平最低值设为0.9, 即当某一条件的一致性水平大于0.9时, 则认为该条件为必要条件。由单个条件的必要性检验结果可知(表2), 企业资产规模、企业财务风

表2 企业生物多样性保护驱动路径的前因变量必要条件分析

Table 2 Necessary condition analysis of antecedent variable for the driving path of enterprises' biodiversity conservation

条件变量 Condition variable	高水平企业生物多样性保护指数 High-level of enterprise biodiversity conservation index		低水平企业生物多样性保护指数 Low-level of enterprise biodiversity conservation index	
	一致性 Consistency	覆盖率 Coverage rate	一致性 Consistency	覆盖率 Coverage rate
企业资产规模 Enterprise asset scale	0.6527	0.8281	0.6667	0.5267
~企业资产规模 ~Enterprise asset scale	0.6269	0.7514	0.7824	0.5838
企业财务风险 Enterprise financial risk	0.6434	0.7930	0.6993	0.5365
~企业财务风险 ~Enterprise financial risk	0.6240	0.7693	0.7301	0.5603
董事会规模 Board size	0.6680	0.8511	0.7605	0.6032
~董事会规模 ~Board size	0.6886	0.8220	0.8123	0.6036
董事会独立性 Board independence	0.5268	0.7680	0.5686	0.5160
~董事会独立性 ~Board independence	0.6679	0.7132	0.7443	0.4947
市场认可度 Market recognition	0.6187	0.8156	0.6612	0.5426
~市场认可度 ~Market recognition	0.6530	0.7559	0.7753	0.5587
区域经济水平 Regional economic level	0.6093	0.8097	0.6661	0.5510
~区域经济水平 ~Regional economic level	0.6621	0.7611	0.7699	0.5509
环境规制强度 Intensity of environmental regulation	0.6253	0.7707	0.7489	0.5746
~环境规制强度 ~Intensity of environmental regulation	0.6548	0.8073	0.7011	0.5380
国家公园建设 National park construction	0.0351	0.6447	0.0310	0.3539
~国家公园建设 ~National park construction	0.9648	0.6153	0.9689	0.3846
自然保护区面积 Area of nature reserve	0.6032	0.7825	0.6841	0.5524
~自然保护区面积 ~Area of nature reserve	0.6549	0.7690	0.7306	0.5340

险、董事会规模等除国家公园建设外的条件变量无论是处于“存在”还是“缺失” (用“ ~ ”表示)状态, 对结果变量解释的一致性水平均小于0.9, 这表明这些变量均无法单独成为解释高或低企业生物多样性保护成因的必要条件, 体现了企业生物多样性保护驱动因素的复杂性, 有必要继续采用fsQCA组态分析进行进一步研究。而在进行必要性检验时, 条件变量为“缺失”状态的国家公园建设, 无论是在高水平还是低水平企业生物多样性保护中的必要性检测一致性水平均大于0.9, 故初步判断国家公园建设的“缺失”是组态分析中的必要条件, 在后续使用软件进行标准分析出现的条件变量对结果变量影响案例选择弹窗中, 将国家公园建设的案例状态选为“Absent”, 其他变量均为“Present or Absent”。

3.2 条件组态分析

校准后的数据运用fsQCA3.0软件的“真值表分析”, 得到企业生物多样性保护的前因条件组态。参考Fiss (2011), 构建真值表过程中, 将组态分析的初始一致性门槛设定为0.85, 不一致性比例减少(proportional reduction in inconsistency, PRI)门槛为0.7, 鉴于本研究为大样本数据, 在保留96%的原始案例数基础上, 将案例覆盖门槛数设定为8。又根据Fiss (2011)中间解和简约解的论述, 借鉴杜运周和贾良定(2017), 将中间解和简约解进行匹配并识别核心条件。具体而言, 本文将同时出现在中间解和简约解中的条件视为核心条件(用“●”表示), 只出现在中间解的视为边缘条件(用“■”表示), 二者表明条件变量取值较高; 同时在中间解和简约解中缺失的则视为核心条件缺失(用“⊗”表示), 只在中间解中缺失的视为边缘条件缺失(用“⊠”表示); ○意味着条件变量的存在对于结果而言无关紧要。

3.2.1 高水平企业生物多样性保护的前因组态

高水平企业生物多样性保护的前因组态分析结果展示了企业生物多样性保护的4条典型驱动路径(表3)。表中每一纵列代表一种可能的前因条件组态, 分别为: H1、H2、H3和H4。由表3可知, 解的一致性为0.8238, 超过阈值0.8, 这意味着4类条件组态的企业生物多样性保护案例中, 82.38%的企业生物多样性保护呈较高水平。解的覆盖度为0.8898, 代表4条驱动路径可以解释88.98%的高水平企业生物多样性保护案例。解的一致性和覆盖度均高于临界值, 表明实证分析有效。基于条件组态, 可以进一步识别企业治理、企业财务状况、市场环境以及自然禀赋在企业高水平生物多样性保护中的差异

表3 高水平企业生物多样性保护的前因组态

Table 3 The antecedent configuration of high-level enterprise biodiversity conservation

条件组态 Conditional configuration	H1	H2	H3	H4	
				H4a	H4b
企业资产规模 Enterprise asset scale	⊠	●	⊠	●	●
企业财务风险 Enterprise financial risk	○	●	⊠	●	●
董事会规模 Board size	●	○	○	●	●
董事会独立性 Board independence	⊠	○	○	⊠	■
市场认可度 Market recognition	⊠	●	●	⊠	●
区域经济水平 Regional economic level	■	■	⊠	■	■
环境规制强度 Intensity of environmental regulation	⊠	⊗	■	⊠	⊠
国家公园建设 National park construction	○	⊗	⊠	○	○
自然保护区面积 Area of nature reserve	⊠	⊠	⊠	■	■
原始覆盖度 Raw coverage	0.1443	0.1634	0.1754	0.1272	0.0936
唯一覆盖度 Unique coverage	0.0010	0.0020	0.0024	0.0015	0.0006
解的覆盖度 Overall solution coverage	0.8898				
解的一致性 Overall solution consistency	0.8238				

H: 高水平生物多样性指数; 数字1–4: 实现高水平生物多样性指数的第1–4种前因组态。●表示核心条件出现; ⊗表示核心条件缺失; ■表示边缘条件出现; ⊠表示边缘条件缺失; ○表示该条件的存在对结果而言无关紧要。

H, High-level biodiversity index; Numbers 1–4: The first to fourth antecedent configurations for achieving high-level biodiversity indices. ● indicates the presence of a core condition; ⊗ indicates the absence of core condition; ■ indicates the presence of a peripheral condition; ⊠ indicates the absence of peripheral condition; ○ indicates “don’t care” condition.

化适配关系。

对表3的结果进行分析, 高水平企业生物多样性保护呈现典型的4类条件组态特征: (1)组态H1: 核心条件为董事会规模, 边缘条件为区域经济水平时, 即使企业资产规模、市场认可度、环境规制强度以及自然保护区面积等作为边缘条件缺失, 企业实现的依然是高水平生物多样性保护; (2)组态H2: 企业资产规模和企业财务风险作为核心条件存在, 环境规制强度和国家公园建设作为核心条件缺失, 区域经济水平作为边缘条件存在, 自然保护区作为边缘条件缺失, 该路径依旧会驱使企业实现高水平的生物多样性保护; (3)组态H3: 市场认可度作为核心条件存在, 国家公园建设作为边缘条件存在, 资产规模、财务风险等作为边缘条件缺失, 该状态下的企业生物多样性保护仍是高水平的; (4)组态H4: 核心条件是自然保护区面积, 共包括2条子路径, 子路径a的区域经济水平及自然保护区面积是边缘条件, 子路径b在原有基础上多出市场认可度作为核心条件, 且同样以区域经济水平和自然保护区面积作为边缘条件, 最终实现高水平生物多样性保护。总的看来, 企业实现高水平生物多样性保护存在着复杂的前因机制, 影响企业生物多样性保护的路径存在显著差异。

3.2.2 低水平企业生物多样性保护的前因组态

由于组态分析具有非线性、因果非对称性的特点, 为更准确全面地识别企业生物多样性保护的驱动路径, 本文参考杜运周等(2020), 一并分析造成企业低水平生物多样性保护的前因组态(表4)。在样本数据中存在4个低水平企业生物多样性保护的条件组态, 分别为L1、L2、L3和L4, 总体解的一致性为0.7786, 覆盖度为0.7694, 表明各组合共计解释了76.94%的非高水平生物多样性保护的企业样本。

对表4的结果进行分析, 低水平企业生物多样性保护呈现典型的4类条件组态特征: (1)组态L1: 核心条件缺失为企业资产规模和董事会规模, 核心条件为环境规制强度和自然保护区面积, 即使存在起次要作用的独立董事规模条件, 企业也无法实现高水平的生物多样性保护; (2)组态L2: 环境规制强度仍作为核心条件存在, 边缘条件转变为市场认可度, 但当企业资产规模和独立董事规模作为核心条件缺失时, 企业实现低水平的生物多样性保护; (3)组态L3: 核心条件为自然保护区面积, 独立董事规模以及市场认可度作为边缘条件存在, 但资产规模

表4 低水平企业生物多样性保护的前因组态

Table 4 The antecedent configuration of low-level enterprise biodiversity conservation

条件组态 Conditional configuration	L1	L2	L3	L4
企业资产规模 Enterprise asset scale	⊗	⊗	⊗	○
企业财务风险 Enterprise financial risk	○	⊠	○	○
董事会规模 Board size	⊗	○	⊗	■
董事会独立性 Board independence	■	⊗	■	⊗
市场认可度 Market recognition	○	■	■	⊗
区域经济水平 Regional economic level	○	⊠	⊗	⊗
环境规制强度 Intensity of environmental regulation	●	●	○	●
国家公园建设 National park construction	⊠	⊠	⊠	⊠
自然保护区面积 Area of nature reserve	●	⊠	●	■
原始覆盖度 Raw coverage	0.2238	0.2106	0.1585	0.2821
唯一覆盖度 Unique coverage	0.0037	0.0028	0.0026	0.0267
解的覆盖度 Overall solution consistency	0.7694			
解的一致性 Overall solution coverage	0.7786			

L表示低水平生物多样性指数; 数字1–4表示实现低水平生物多样性指数的第1–4种前因组态。●表示核心条件出现; ⊗表示核心条件缺失; ■表示边缘条件出现; ⊠表示边缘条件缺失; ○表示该条件的存在对结果而言无关紧要。

L, Low-level biodiversity index; Numbers 1–4, The first to fourth antecedent configurations achieving low-level biodiversity indices. ● indicates the presence of a core condition; ⊗ indicates the absence of core condition; ■ indicates the presence of a peripheral condition; ⊠ indicates the absence of peripheral condition; ○ indicates “don’t care” condition.

和区域经济水平作为核心条件缺失时, 企业实现的是低水平生物多样性保护; (4)组态L4: 当独立董事规模、市场认可度和区域经济水平作为核心条件缺失时, 无论是否存在董事会规模和自然保护区面积, 企业都无法实现高水平的生物多样性保护。

为简化分析, 根据核心条件缺失来源, 低水平生物多样性保护组态可进一步将特征归为两种类型: (1)企业内生因素作为核心条件缺失, 主要包括组态条件L1和L2, 即企业自身治理缺陷或财务短板等内部组态条件的缺失, 这些关键要素的匮乏制约企业生物多样性保护措施的实施效能。(2)企业外生因素作为核心条件缺失, 主要包括组态条件L3和L4, 主要源于外部环境支持不足, 包括市场激励缺失或自然资源禀赋薄弱等外部组态条件的限制, 导致企业缺乏实施生物多样性保护的外在动力和基础条件。

4 企业生物多样性保护的驱动路径和模式分析

4.1 高水平企业生物多样性保护的驱动路径和模式分析

通过横向对比高水平企业生物多样性保护的4个组态的条件构成和核心要素, 总结归纳出高水平企业生物多样性保护的驱动路径和模式(表5)。

4.1.1 企业治理引导型

发挥“董事会治理效应”, 通过构建多元化、专业化、规模化的董事会管理层, 作为企业关键治理杠杆, 发挥“决策广度–资源整合–长期导向”三重机制以引导资源流向生物多样性保护项目, 影响企业生物多样性保护成效。具体而言, 较大规模的董事会能容纳更多元的专业背景, 促使生物多样性议题进入战略议程。此外, 适度扩大的董事会能抑制短期主义, 延长生态项目的投资回报容忍度。对比组态H1和L2可发现, 当行业所处的宏观环境波动较强、企业自身规模一般、财务风险较大时, 该类公司生物多样性保护水平较高很大程度上是受公司整体治理驱动, 较大的、综合的董事会规模为良好的公司治理提供有利条件。这意味着, 企业治理能力能够有效破除决策局限、短视行为、财务限制等客观禀赋条件对企业生物多样性保护项目的限制。“企业治理引导型” 生物多样性保护路径能够解释约14%的企业生物多样性保护案例。

4.1.2 财务状况驱动型

激活“财务乘数效应”, 通过形成规模化、稳健性、风险低的企业财务体系, 为企业重塑资源竞争优势, 发挥“资源规模–风险缓冲–投资韧性”三重机制为企业生物多样性实践项目提供可持续支撑, 驱动企业生物多样性保护。具体而言, 较大规模企业凭借更充裕的现金流和融资能力, 可承担生物多样性或生态栖息地保护的长期投入。同时, 稳健的财务风险控制为企业提供决策安全边际, 使生物多样性项目能抵御市场波动。此外, 健康的财务状况赋予企业更长远的投资视野, 研究发现这类企业对生物多样性相关技术的研发投入强度显著高出行业均值。对比组态H2、H4和L4可发现, 当企业自身资产规模和风险控制状况良好, 且资本市场认可度较高时, 该类公司较高的生物多样性保护水平很大程度上是受企业充沛的投资资金驱动, 充足且低风险的财务资金为企业生物多样性保护项目提供有韧性的可持续支持。这意味着, 对于生物栖息地和生物多样性保护类的长期性、复杂性、大规模项目, 健康且韧性的财务状况是驱动企业可持续进行生物多样性保护的重要决定因素。“财务状况驱动型”生物多样性保护路径能够解释约16%的企业生物多样性保护案例。

4.1.3 市场压力倒逼型


借势“市场倒逼效应”。当企业自身财务能力和管理能力较弱, 且外部资源竞争激烈时, 市场的生物多样性保护投资偏好会通过“投资者预期–竞争压力–市场定位”三重机制, 倒逼企业调整形象和市场定位, 从而形成生物多样性保护策略。具体而言, 市场对ESG或生物多样性保护投资偏好的增强形成刚性约束, 迫使企业被动调整战略。同时, 国家经济转型需求为这类企业提供政策套利空间, 促使其通过“环保标签”抢占细分市场, 将倒逼压力转化为可持续竞争优势。对比组态H3和L4可发现, 当企业自身财务能力较弱、管理水平一般、自然条件中的初始禀赋一般时, 资本市场的关注和偏好对企业生物多样性保护的推手作用被放大。这意味着, 公司顺应市场环境投资偏好改变, 并凭借本地区环境规制要求顺势做出行动调整, 向生物多样性保护、环境保护方向靠拢, 争取尽快寻找到适合当前大众环

表5　高水平企业生物多样性保护的驱动路径和模式分析

Table 5　Analysis of the driving path and mode of biodiversity conservation in high-level enterprises

驱动路径 Driving path	基本构成条件 Basic constituent conditions	核心驱动条件 Core driving conditions	内容阐释 Content explanation	特点 Features
企业治理引导型(H1) Enterprise governance guidance (H1)	企业资产规模 *SIZE* 董事会独立性 *BI* 市场认可度 *EPS* 区域经济水平 *PGDP* 环境规制强度 *ER* 自然保护区面积 *NRA*	董事会规模 *BSIZE*	多元化、专业化、规模化的董事会管理层作为企业关键治理杠杆，通过“决策广度–资源整合–长期导向”机制，引导资源流向生物多样性保护项目，影响企业生物多样性保护成效 The diversified, professional and large-scale board management team, as a key governance lever of the enterprise, guides resources towards biodiversity conservation projects through the mechanism of “decision-making breadth– resource integration–long-term orientation”, influencing the effectiveness of the enterprise’s biodiversity conservation	发挥“董事会治理效应”，强调企业治理的主动性和灵活性 Give full play to the “board governance effect” and emphasize the initiative and flexibility of corporate governance
财务状况驱动型(H2) Financial-driven (H2)	市场认可度 *EPS* 区域经济水平 *PGDP* 环境规制强度 *ER* 自然保护区面积 *NRA* 国家公园建设 *NP*	企业资产规模 *SIZE* 企业财务风险 *LEV*	规模化、稳健性、风险低的企业财务状况为企业重塑资源竞争优势，通过“资源规模–风险缓冲–投资韧性”机制，为企业生物多样性实践项目提供可持续支撑，驱动企业生物多样性保护 The financial status of large-scale, stable and low-risk enterprises helps them reshape their resource competitive advantages. Through the mechanism of “resource scale–risk buffer–investment resilience”, it provides sustainable support for the enterprise’s biodiversity practice projects and drives the protection of enterprise biodiversity	激活“财务乘数效应”，强调资金支持的战略性和可持续性 Activate the “financial multiplier effect” and emphasize the strategic and sustainable nature of financial support
市场压力倒逼型(H3) Market pressure-driven (H3)	企业资产规模 *SIZE* 企业财务风险 *LEV* 区域经济水平 *PGDP* 环境规制强度 *ER* 国家公园建设 *NP* 自然保护区面积 *NRA*	市场认可度 *EPS*	当企业自身财务和管理能力较弱，且外部资源竞争激烈时，市场的生物多样性保护投资偏好迫使企业调整并适应，通过“投资者预期–竞争压力–市场定位”机制，倒逼企业调整企业形象和市场定位，探索生物多样性保护策略 When a company’s own financial and management capabilities are weak and the competition for external resources is fierce, the market’s investment preference for biodiversity conservation forces the company to adjust and adapt. Through the mechanism of “investor expectations–competitive pressure–market positioning”, the company is compelled to adjust its corporate image and market positioning and explore strategies for biodiversity conservation	借势“市场倒逼效应”，强调压力竞争的革新性和转型性 Taking advantage of the “market-driven effect”, it emphasizes the innovative and transformative nature of pressure competition

表5 (续) Table 5 (continued)

驱动路径 Driving path	基本构成条件 Basic constituent conditions	核心驱动条件 Core driving conditions	内容阐释 Content explanation	特点 Features
自然禀赋依托型(H4a & H4b) Natural endowment dependent (H4a & H4b)			在自身情况稳健基础上，企业所处区域拥有丰富、独特、密集的生物多样性自然禀赋资源，形成独具特色的生态资源耦合优势，通过“生态本底–资源富集–资源溢价”机制，将企业区位禀赋转化为保护动能，赋能企业生物多样性保护实践 Based on its own stable situation, the region where the enterprise is located possesses rich, unique and dense natural endowment resources of biodiversity, forming a distinctive ecological resource coupling advantage. Through the mechanism of “ecological background-resource enrichment-resource premium”, the enterprise’s location endowment is transformed into protection momentum, empowering the enterprise’s biodiversity protection practice	释放“自然禀赋效应”，强调地理区位和自然禀赋的重要性和独特性 Unleash the “natural endowment effect”, emphasizing the significance and uniqueness of geographical location and natural endowment

●表示核心条件存在；○表示边缘条件存在；■表示核心条件缺失；□表示边缘条件缺失。变量缩写全称见表1。
● indicates the presence of a core condition; ○ indicates the presence of a peripheral condition; ■ indicates the presence of a core condition; □ indicates the presence of a peripheral condition. The full names of variable abbreviations are listed in Table 1.

保意识加重的市场定位，保持优势发展地位。“市场压力倒逼型”生物多样性保护路径能够解释约18%的企业生物多样性保护案例。

4.1.4 自然禀赋依托型

释放“自然禀赋效应”。在企业自身情况稳健基础上，依托企业处于生物多样性栖息地或生物多样性密集的独特地理区位和自然禀赋优势，发挥“生态本底–资源富集–资源溢价”三重机制，将企业区位禀赋转化为保护动能，赋能企业生物多样性保护实践。具体而言，具备显著自然资源优势的企业，如核心产区与自然保护区重叠度较高，依托自然生态条件将生物多样性保护内化为竞争优势，同时，通过“禀赋升级”实现可持续价值转化。这意味着，生物多样性禀赋和资源，作为这类企业的核心竞争力，会受到企业更多关注和支持，企业追求长期盈利的可持续获利动机会转化为生物多样性保护动力。对比组态H4a、H4b和L4可发现，当企业财务状况良好，且治理水平较高(H4a)，以及外部市场环境友好时(H4b)，企业所处地区的生物多样性禀赋充沛程度成为企业进行生物多样性保护的关键动力。“自然禀赋依托型”生物多样性保护路径能够解释约23%的企业生物多样性保护案例。

总体而言，我国企业生物多样性保护路径可归纳为4种典型模式：企业治理引导型、财务状况驱动型、市场压力倒逼型和自然禀赋依托型。且大约14%、16%、18%和23%的企业分别采用上述4类路径提升生物多样性保护水平。这一分布表明，当前我国企业生物多样性保护实践呈现“被动适应为主、主动引领为辅”的特征，受资本市场压力倒逼或依托自然区位优势而开展保护的企业占比最高(合计达41%)，而通过完善治理机制或强化资金投入进行系统性保护的企业相对较少(合计仅30%)。

4.2 低水平企业生物多样性保护的限制路径和成因分析

考虑组态分析在高低水平结论上的分化性和非对称性特征，进一步对比低水平企业生物多样性保护的4个组态的条件限制和核心缺失条件，总结归纳出低水平企业生物多样性保护的限制路径和成因(表6)。

4.2.1 内生因素约束型

受限于“内生因素约束效应”，作为关键制约瓶颈，企业的治理能力欠佳及资产体量有限等内生性禀赋缺陷通过“治理短板–资源匮乏–能力受限”传导机制，削弱企业生物多样性保护的决策效能与执行

表6　低水平企业生物多样性保护的限制路径和成因分析

Table 6　Analysis of the limiting paths and causes of biodiversity conservation in low-level enterprises

限制路径 Restricted path	基本缺失条件 Basic missing conditions	核心缺失条件 Core missing conditions	内容阐释 Content explanations	特点 Features
内生因素约束型(L1 & L2) Endogenous factor constraint (L1 & L2)	环境规制强度 *ER* 国家公园建设 *NP* 区域经济水平 *PGDP* 自然保护区面积 *NRA*	企业资产规模 *SIZE* 董事会规模 *BSIZE* 董事会独立性 *BI*	企业治理能力欠佳及资产体量有限等企业内生性禀赋缺陷，作为关键制约瓶颈，通过“治理短板–资源匮乏–能力受限”传导机制，削弱企业生物多样性保护的决策效能与执行基础，导致保护实践难以突破低水平均衡 The inherent endowment deficiencies of enterprises such as poor corporate governance capabilities and limited asset volumes, as key constraints, weaken the decision-making efficiency and implementation foundation of enterprises in biodiversity conservation through the transmission mechanism of “governance shortcomings–resource scarcity–capacity limitations”, making it difficult for conservation practices to break through the low-level equilibrium	受限于“内生因素约束效应”，强调企业自身短板的限制性和刚性 Constrained by the “endogenous factor constraint effect”, it emphasizes the limitations and rigidity of the enterprise’s own shortcomings
外源因素抑制型(L3 & L4) Exogenous factor inhibitory (L3 & L4)	环境规制强度 *ER* 董事会独立性 *BI* 董事会规模 *BSIZE* 自然保护区面积 *NRA*	区域经济水平 *PGDP* 市场认可度 *EPS* 国家公园建设 *NP*	投资市场低迷与区域经济发展滞后构成的双重外源压力，通过“需求抑制–投入受限–反馈缺失”作用链条，削弱企业开展生物多样性保护的经济激励与社会认同，形成低水平保护的路径依赖，生物多样性保护呈现弱态 The dual external pressures formed by the sluggish investment market and the lagging regional economic development, through the chain of action of “demand suppression–input limitation–feedback deficiency”, weaken the economic incentives and social recognition for enterprises to carry out biodiversity conservation, resulting in a path dependence of low-level conservation and a weak state of biodiversity conservation	受限于“外源因素抑制效应”，强调外部因素的叠加性和封锁性 Constrained by the “inhibitory effect of external factors”, it emphasizes the superposition and blocking nature of external factors

●表示核心条件存在; ○表示边缘条件存在; ■表示核心条件缺失; □表示边缘条件缺失。变量缩写全称见表1。

● indicates the presence of a core condition; ○ indicates the presence of a peripheral condition; ■ indicates the presence of a core condition; □ indicates the presence of a peripheral condition. The full names of variable abbreviations are listed in Table 1.

基础，从而导致保护实践难以突破低水平制约。在组态L1和L2中，“公司财务+企业管理”两个条件组合而成的企业内部环境中存在至少两个核心条件缺失，环境规制或自然保护区面积为核心条件，国家公园作为边缘条件缺失。该组态表明无论自然环境政策如何，只要公司财务状况较差、管理水平低下，企业就会产生低水平的生物多样性保护行为。这一现象的产生很大程度上需归因于公司自身内部条件、架构尚不成熟，较小的公司规模导致企业不具备环境保护甚至生物多样性保护的能力，因为这是一项耗时耗力的工作，小公司初期的关注点更多在企业生存和壮大，所以在生物多样性保护方面的投入较少。并且较小的董事会规模会造成企业内部管理混乱，独立董事占比较低不利于对下层组织的监管约束，致使董事会未能较好地发挥治理监督职能，公司管理层未能在企业履行社会责任方面发挥应有的作用，从而导致企业的生物多样性保护程度低。

4.2.2　外源因素抑制型

受限于“外源因素抑制效应”，投资市场低迷与区域经济发展滞后构成的双重外源压力通过“需求抑制-投入受限-反馈缺失”作用链条，削弱企业开展生物多样性保护的经济激励与社会认同，形成低水平保护的路径依赖，生物多样性保护呈现弱态。在组态L3和L4中，市场认可度、区域经济指标和董事会独立性为核心缺失条件，国家公园为边缘缺失条件。该组态说明无论企业内部条件如何，只要市场投资环境低迷、区域经济发展缓慢再加上公司董事会独立性较低，企业的生物多样性保护就会呈弱态。该类公司生物多样性保护程度低的原因很大程度上是由于环境政策引导作用无效或者说市场经济周期处于下行期。无效的、冗余的政策引导或资金支持并不会吸引企业加入隶属于环保事业的众多分支之一的生物多样性保护，从而无法促进企业

有意愿加强该方面的投入。此外, 经济周期中衰退期的影响是系统性的, 对于企业、行业而言当务之急是保障基本运转、寻找新的出路, 故而在生物多样性保护行动上显得有心无力。

总体而言, 我国企业生物多样性保护的高低分化路径基本呈现出对称性的驱动–抑制结论。企业提升生物多样性保护成效主要通过以下两条路径实现: 一是遵循内生驱动型路径(企业治理引导型或财务状况驱动型), 通过完善企业治理结构或强化财务能力, 以董事会专业化治理和可持续资金投入为杠杆, 主动构建保护机制; 二是遵循外源响应型路径(市场压力倒逼型和自然禀赋依托型), 通过顺应资本市场绿色偏好或依托区位生态禀赋, 将外部压力或资源优势转化为保护动能。

4.3 代表性案例分析

基于数据结构和实践经验两方面原因, 选取了4家在生物多样性保护领域具有典型示范意义的上市公司进行深入剖析, 具体阐释企业推进生物多样性保护的不同驱动路径。

(1)广州达安基因股份有限公司。该公司是“企业治理引导型”生物多样性保护的典型代表, 其完善的治理结构为生态保护实践提供了制度保障。公司董事会9人组成中包含3名独立董事(占比33.33%), 39.9%的资产负债率和366.332亿元的总资产规模, 展现了稳健的企业治理能力, 直接推动了生物多样性保护的系统性实施。一方面, 董事会将生态保护纳入战略决策, 建立专项治理机制, 包括设立生物多样性保护委员会、制定《基因资源保护管理办法》等制度文件; 另一方面, 董事会连续3年发布生物多样性专项报告, 通过完善的信息披露机制确保治理效能。在具体实践中, 公司依托治理优势, 主导制定行业标准《生物医药企业生物多样性保护指南》, 建立10万余份生物遗传资源的全生命周期管理体系, 并在生产基地推行“绿色工厂”计划, 实现2022年实验动物使用量降低15%的显著成效。该案例证明, 健全的企业治理体系能够有效引导资金、技术等资源向生物多样性保护领域配置, 实现经济效益与生物多样性保护效益的良性互动。

(2)云南白药集团股份有限公司。该公司是“财务状况驱动型”生物多样性保护的典型案例,作为医药行业龙头企业, 其坚实的财务能力为生物多样性保护提供了基础。公司2022年末总资产达542.38亿元, 资产负债率仅为28.7%, 经营性现金流持续保持强劲, 为生态保护提供了坚实的财务后盾, 突出的财务优势直接转化为生物多样性保护的实施能力。首先, 公司设立每年不低于营业收入1.5%的生态专项基金(2022年实际投入2.86亿元), 系统支持滇重楼(*Paris polyphylla* var. *yunnanensis*)等濒危药用植物资源保护; 其次, 依托资金优势建立全球首个“生物医药种质资源库”, 累计保存3.2万份珍稀药用生物遗传资源。该案例展现出稳健的财务状况如何赋能企业实现“保护–收益–再投入”的良性循环, 为重资产行业平衡经济效益与生物多样性保护责任提供了可复制的实践范式。

(3)山东晨鸣纸业集团股份有限公司。该公司是“市场压力倒逼型”生物多样性保护的典型案例。作为国内造纸行业龙头企业, 面对欧盟“零毁林”法规和国内环保督察的双重压力, 公司被迫进行战略转型。2021年起, 晨鸣纸业投入18.6亿元实施“林浆纸一体化”改造, 将原料采购半径控制在200 km内, 实现木材溯源覆盖率100%。在投资者ESG诉求日益强烈的背景下, 公司主动公开披露供应商毁林风险评估报告, 并承诺2025年前实现100%可持续认证木浆采购。该案例揭示了市场倒逼机制如何通过供应链重构、信息披露和产品升级三重路径, 迫使传统高耗能企业将生物多样性保护转化为新的竞争优势。

(4)西藏旅游股份有限公司。该公司是“自然禀赋依托型”生物多样性保护的典型案例。作为西藏自治区唯一旅游类上市公司, 该公司的核心景区80%以上面积位于国家级自然保护区内, 坐拥青藏高原独特的生态系统和物种资源, 构建了“生态资产–旅游产品–保护投入”的价值闭环。其一, 将景区门票收入的15%专项资金用于高原湿地保护和濒危物种监测, 累计投入超2.3亿元; 其二, 开发生态研学以及观鸟旅行等特色产品, 2023年相关业务收入占比达38%; 其三, 公司创新性地发行“雪山生态债券”, 既募集资金用于周边社区生态补偿, 又维持了景区生态完整性。该案例诠释了自然禀赋如何通过科学的商业化路径, 保障经济和生物多样性保护双重效应的平衡。

从数据结构上看, 上述4家企业的生物多样性

保护指数测算均值远高于样本中80%的企业; 而从实践经验上看, 这4家企业的自身条件和外界因素各自与本文归纳的4种高水平保护路径相吻合, 体现在企业财务表现、管理设置、公司规章报告等具体内容上。总之, 通过分析可以看到代表企业的发展与归纳的路径匹配程度较高。

5 稳健性分析

参考Fiss (2011)以及张明和杜运周(2019)对定性比较分析研究的稳健性检验方法, 在保持样本案例频数为8的前提下, 采用以下两种方式进行稳健性检验。(1)将PRI门槛由0.7提高到0.75, 真值表分析结果中高水平企业生物多样性保护和低水平企业生物多样性保护的前因条件各组态中的一致性和覆盖度数值有所变化, 但整体组态分布没有实质性变化。(2)调整校准门槛, 在原上、下界的基础上进行微调, 将所有前因变量的完全隶属点由90%分位数调整为95%分位数, 完全不隶属点由10%分位数调整为5%分位数, 其他处理方式不变。进行真值表分析后发现, 高水平企业生物多样性保护和低水平企业生物多样性保护的组态数量和组态条件均未发生实质性变化, 拟合参数的一致性和覆盖度差异不足以保证有意义且相同的实质性检验。因此, 可以认为本文的组态分析研究结论依然稳健。

6 研究结论与政策建议

6.1 研究结论

本文在理论和方法层面展开双重工作。首先, 通过对传统TOE框架的理论拓展和情境化调适, 构建了“技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景驱动”的三维整合分析框架, 为企业生物多样性保护行为提供了系统性的前因解释。其次, 基于2006–2022年沪深主板A股1,714家上市公司的面板数据, 运用fsQCA方法, 从条件组态视角实证解析了企业生物多样性保护的多元驱动路径。通过上述研究设计, 本文主要得出以下结论: (1)在修正的TOE理论框架下, 技术资源禀赋、组织治理结构和环境情景驱动三者协同形成有效的企业生物多样性保护驱动路径的必要条件, 而单一条件维度难以有效推动企业生物多样性保护。(2)典型的高水平企业生物多样性保护驱动模式包括企业治理引导型、财务状况驱动型、市场压力倒逼型以及自然禀赋依托型, 其分别能够解释大约14%、16%、18%和23%企业的生物多样性保护策略。(3)当前我国企业生物多样性保护呈现明显的“外部驱动主导、主动引领为辅”特征, 由市场压力或自然禀赋驱动的被动适应型企业合计占比达41%, 而通过主动完善治理或资金投入的系统保护型企业仅占30%。(4)驱动与阻碍企业生物多样性保护的路径存在显著“非对称性”, 低水平生物多样性保护企业主要受限于内部环境受限型和环境引导失效型两种情境。

总体而言, 本文具有以下三重研究贡献: (1)本文深化了对于微观层面的企业生物多样性保护行为驱动机制的学术认知。尽管学界已普遍认识到企业参与生物多样性保护的紧迫性, 但研究主要停留在宏观层面的保护治理理念和发展模式, 而微观层面的企业行为研究却相对匮乏, 特别是在驱动机制解析、路径识别和模式创新等关键问题上尚未形成系统性的理论体系。本文系统考察了企业生物多样性保护的前因条件、作用机制和路径选择, 不仅拓展了企业环境责任研究的理论边界, 也为弥合宏观政策与微观实践之间的“知行鸿沟”提供了新的理论视角。(2)本文拓宽了传统TOE理论框架在中国企业生物多样性保护场景中的应用。基于资源基础观理论、代理理论和利益相关者理论等, 创新性地将传统TOE理论框架拓展为“技术资源禀赋–组织治理结构–环境情景驱动”的三维整合分析框架。不仅突破了传统TOE模型在企业环境行为研究中的简单套用局限, 更通过理论的本土化调适, 显著提升了该框架对中国企业生物多样性保护实践的解释力, 为分析我国企业环境治理行为提供了更具适用性的研究工具。(3)本研究系统揭示了我国企业生物多样性保护的差异化驱动机制与实施路径。运用模糊集定性比较分析方法, 本文具体识别出4条差异化的企业生物多样性保护驱动路径, 以及2条制约路径。这一研究成果不仅为政府部门实施分类指导政策提供了科学依据, 同时也为企业突破参与障碍指明了改进方向, 对于构建和完善生物多样性保护的市场化参与机制具有重要的理论价值和实践意义。

6.2 政策建议

基于本研究对企业生物多样性保护驱动路径的系统分析, 建议构建分类指导、精准施策的政策

体系。

(1)实施精准化的分类激励政策。针对不同驱动类型企业的特点设计差异化激励措施。对于治理引导型企业, 建议在现有税收优惠基础上, 对设立生物多样性保护专项委员会的企业给予额外的加计扣除。对于财务状况驱动型企业, 可建立绿色信贷优先通道(张承惠等, 2016), 将生物多样性保护投入与贷款额度挂钩。对于市场压力倒逼型企业, 建议在出口退税政策中增设生物多样性保护系数(李欣, 2012; 金洋等, 2024), 依据保护成效给予额外退税。对于自然禀赋依托型企业, 建议允许其生态保护投入按一定比例折算为用地指标, 用于生态旅游等配套开发。

(2)建立强制性与激励性并重的信息披露制度。首先, 在重点行业上市公司中强制实施《企业生物多样性保护信息披露指引》, 要求量化披露保护投入、成效及供应链风险评估; 其次, 逐步将披露范围扩展至全部上市公司; 最后, 构建第三方认证体系, 对披露质量达到AAA级的企业给予再融资审核绿色通道待遇。要特别要求市场压力倒逼型企业每季度更新供应商生物多样性合规情况, 自然禀赋依托型企业按年度发布生态系统服务价值评估报告。

(3)创新市场化参与机制。其一, 开发生物多样性保护信用金融产品, 允许企业将经核证的生态保护成效按照标准用于债务融资担保。其二, 在碳排放权交易市场中试点引入“生物多样性保护因子”, 高耗能企业可通过购买生态保护信用折抵碳排放配额。其三, 建立跨区域的生态保护积分交易平台, 重点区域企业可通过帮扶其他地区生态建设来获取发展所需的环保指标。

(4)不同行业的企业可结合自身特点兼顾主营业务长远发展和生物多样性保护行动。对于主营业务与生物多样性高度关联的行业(如生物医药、农业、造纸等), 企业可将生物多样性保护转化为核心战略的一部分, 并在业务发展中实现生态可持续性。具体而言, 可以加强对该类行业的企业生态影响评估, 建立完善的环境管理体系, 实施可持续原材料采购策略(如森林产品的可持续认证、无害化农业生产等)。另外, 还可以设置奖励机制激励企业研发绿色技术和创新产品, 降低对生物多样性负面影响的同时创造商业价值。对于主营业务与生物多样性关联度较低的行业(如信息技术、金融、汽车等), 企业可以通过供应链管理和企业社会责任发挥积极作用。建议这些企业通过推动供应商采取可持续的生产方式, 提升对环境保护的重视。此外, 企业可以通过支持生物多样性相关的公益项目, 实施生态补偿措施, 或将资金投向支持生物多样性保护的绿色基金和生态项目。通过与环保组织、政府以及其他企业的合作, 这些行业也能促进生态保护目标的实现, 同时提升其品牌形象和社会责任感。

6.3 不足与展望

本研究仍存在一定的局限性。首先, 在样本选择上, 本研究仅限于上市公司, 这可能在某种程度上影响研究结论的广泛适用性。其次, 在研究变量的测度方面, 尽管采用了现有的文本信息进行分析, 但仍可能受到数据来源及处理方法的影响, 存在一定的测度偏差。未来可在此基础上, 通过拓展样本与优化测量方法, 进一步提升研究的解释力。最后, 本研究虽识别出企业生物多样性保护的差异化路径, 但受限于数据颗粒度与研究篇幅, 未能针对不同路径类型企业设计出兼具普适性与微观可操作性的具体实施方案。这有待未来通过案例深描与行业定制化研究加以推进, 以推动保护策略从理论建构走向管理实践。

致谢: 感谢在研究过程中所有提供帮助的同行。

参考文献

Affinito F, Butchart SHM, Nicholson E, Hirsch T, Williams JM, Campbell JE, Ferrari MF, Gabay M, Gorini L, Stroil BK, Kohsaka R, Painter B, Pinto JC, Scholz AH, Straza TRA, Tshidada N, Vallecillo S, Widdicombe S, Gonzalez A (2025) Assessing coverage of the monitoring framework of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and opportunities to fill gaps. Nature Ecology & Evolution, 9, 1280–1294.

Ai MY, Luo F, Bu Y (2024) Green innovation and corporate financial performance: Insights from operating risks. Journal of Cleaner Production, 456, 142353.

Ali R, García-Sánchez IM, Aibar-Guzmán B, Rehman RU (2024) Is biodiversity disclosure emerging as a key topic on the agenda of institutional investors? Business Strategy and the Environment, 33, 2116–2142.

Bassen A, Buchholz D, Lopatta K, Rudolf AR (2024) Biodiversity management and stock price crash risk.

Business Strategy and the Environment, 33, 4788–4805.
Chau PYK, Tam KY (1997) Factors affecting the adoption of open systems: An exploratory Study1. MIS Quarterly, 21, 1–24.
Cheng AT, Sims KRE, Yi YY (2023) Economic development and conservation impacts of China's nature reserves. Journal of Environmental Economics and Management, 121, 102848.
Cui CY, Hou YL, Wang TY, Wen YL (2022) Biodiversity conservation supported by finance: Global practice and policy enlightenment. Biodiversity Science, 30, 22326. (in Chinese with English abstract) [崔楚云, 侯一蕾, 王天一, 温亚利 (2022) 金融支持生物多样性保护: 全球实践及政策启示. 生物多样性, 30, 22326.]
Cui W, Lu ZF (2008) Board size, independence and accounting information transparency: Empirical evidences from Chinese capital market. Nankai Business Review, 11(2), 22–27. (in Chinese) [崔伟, 陆正飞 (2008) 董事会规模、独立性与会计信息透明度——来自中国资本市场的经验证据. 南开管理评论, 11(2), 22–27.]
Dai Z, Bao GX (2023) Qualitative comparative analysis: Applications and improvements in Chinese public administration. China Public Administration Review, 5(2), 188–212. (in Chinese with English abstract) [戴正, 包国宪 (2023) QCA在中国公共管理研究中的应用: 问题与改进. 公共管理评论, 5(2), 188–212.]
Deng KB, Zeng HJ (2014) The financial constraints in China. Economic Research Journal, 49(2), 47–60, 140. (in Chinese with English abstract) [邓可斌, 曾海舰 (2014) 中国企业的融资约束: 特征现象与成因检验. 经济研究, 49(2), 47–60, 140.]
Díaz S, Malhi Y (2022) Biodiversity: Concepts, patterns, trends, and perspectives. Annual Review of Environment and Resources, 47, 31–63.
Du YZ, Jia LD (2017) Configuration perspective and qualitative comparative analysis (QCA): A new way of management research. Management World, 33(6), 155–167. (in Chinese) [杜运周, 贾良定 (2017) 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路. 管理世界, 33(6), 155–167.]
Du YZ, Liu QC, Cheng JQ (2020) What kind of ecosystem for doing business will contribute to city-level high entrepreneurial activity? A research based on institutional configurations. Management World, 36(9), 141–155. (in Chinese with English abstract) [杜运周, 刘秋辰, 程建青 (2020) 什么样的营商环境生态产生城市高创业活跃度? ——基于制度组态的分析. 管理世界, 36(9), 141–155.]
Dul J (2016) Necessary condition analysis (NCA): Logic and methodology of 'necessary but not sufficient' causality. SSRN Electronic Journal, 19, 10–52.
Fiss PC (2011) Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research. Academy of Management Journal, 54, 393–420.
Flammer C, Giroux T, Heal GM (2025) Biodiversity finance. Journal of Financial Economics, 164, 103987.
Geng YJ, Tian Y, Li JS, Xu J (2020) Progress and prospects of the Post-2020 Global Biodiversity Framework. Biodiversity Science, 28, 238–243. (in Chinese with English abstract) [耿宜佳, 田瑜, 李俊生, 徐靖 (2020) "2020年后全球生物多样性框架"进展及展望. 生物多样性, 28, 238–243.]
He SY, Wang BJ, Wang GP, Wei Y (2021) Rural livelihood transition and industrial development in protected areas: Experience and inspiration. Acta Ecologica Sinica, 41, 9207–9215. (in Chinese) [何思源, 王博杰, 王国萍, 魏钰 (2021) 自然保护地社区生计转型与产业发展. 生态学报, 41, 9207–9215.]
IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) (2019) Summary for Policymakers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, Germany.
Jia JF, Liu WP, Du YZ, Zhao RN, Jiang JX (2024) Multiple paths for improving green technology innovation efficiency from the perspective of institutional configuration. Nankai Business Review, 27(2), 51–59. (in Chinese with English abstract) [贾建锋, 刘伟鹏, 杜运周, 赵若男, 蒋金鑫 (2024) 制度组态视角下绿色技术创新效率提升的多元路径. 南开管理评论, 27(2), 51–59.]
Jian ZQ, Liu N, Huang RY (2020) Effect on ambidextrous innovation by dynamic capability and firm size—An empirical study based on fsQCA. Science & Technology Progress and Policy, 37(19), 77–86. (in Chinese) [简兆权, 刘念, 黄如意 (2020) 动态能力、企业规模与双元创新关系研究——基于fsQCA方法的实证分析. 科技进步与对策, 37(19), 77–86.]
Jiang Y, Qin SY (2022) Promotion mechanism of green credit policy on sustainable development performance of enterprises. China Population Resources and Environment, 32(12), 78–91. (in Chinese with English abstract) [姜燕, 秦淑悦 (2022) 绿色信贷政策对企业可持续发展绩效的促进机制. 中国人口·资源与环境, 32(12), 78–91.]
Jin Y, Tu CD, Du WZ, Liu L, Xu WW (2024) Analysis and stability assessment of biodiversity in Su-Xi-Chang region. Remote Sensing Information, 39(6), 30–37. (in Chinese with English abstract) [金洋, 屠长达, 杜维真, 刘玲, 许伟伟 (2024) 苏锡常地区生物多样性分析与稳定性评估. 遥感信息, 39(6), 30–37.]
Kalhoro MR, Kyaw K (2024) Manage biodiversity risk exposure? Finance Research Letters, 61, 104989.
Kamarudin KA, Mohamad Ariff A, Azmi NA, Mohd Suffian MT (2025) Nonlinear effects of board size and board independence on corporate sustainability performance: International evidence. Corporate Governance, 25, 860–883.
Kopnina H, Zhang SR, Anthony S, Hassan A, Maroun W (2024) The inclusion of biodiversity into environmental, social, and governance (ESG) framework: A strategic

integration of ecocentric extinction accounting. Journal of Environmental Management, 351, 119808.

Kraus S, Ribeiro-Soriano D, Schüssler M (2018) Fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) in entrepreneurship and innovation research—The rise of a method. International Entrepreneurship and Management Journal, 14, 15–33.

Li X (2012) Comparison and Suggestions on Environment Policies. PhD dissertation, Chinese Academy of Fiscal Science, Beijing. (in Chinese with English abstract) [李欣 (2012) 环境政策研究. 博士学位论文, 中国财政科学研究所, 北京.]

Li XQ, Zheng ZJ, Han XF (2024) Riding the wave of data: Government data governance empowering corporate digital innovation. Journal of Quantitative & Technological Economics, 41(12), 68–88. (in Chinese with English abstract) [李雪琴, 郑酌基, 韩先锋 (2024) 乘“数”而上: 政府数据治理赋能企业数字创新. 数量经济技术经济研究, 41(12), 68–88.]

Lou Y, Wei WJ (2011) An empirical analysis on isomophism of large listed companies in China—New institutional view. Research on Economics and Management, 32(7), 111–115, 119. (in Chinese with English abstract) [楼园, 魏文姬 (2011) 大型上市企业组织结构趋同的实证分析——基于新制度主义视角. 经济与管理研究, 32(7), 111–115, 119.]

Ma PP, Zhang M, Wang LK (2024) Public environmental concerns and corporate green transformation: The dual examination of government environmental regulations and the internal capacity of enterprises. China Population Resources and Environment, 34(6), 112–123. (in Chinese with English abstract) [马平平, 张明, 王龙可 (2024) 公众环境关注与企业绿色转型: 政府环境规制与企业内部能力的双重审视. 中国人口·资源与环境, 34(6), 112–123.]

Makpotche M, Bouslah K, M’Zali B (2024) Corporate governance and green innovation: International evidence. Review of Accounting and Finance, 23, 280–309.

Mi XC, Feng G, Hu YB, Zhang J, Chen L, Corlett RT, Hughes AC, Pimm S, Schmid B, Shi SH, Svenning JC, Ma KP (2021) The global significance of biodiversity science in China: An overview. National Science Review, nwab032.

Narain D, Teo HC, Lechner AM, Watson JEM, Maron M (2022) Biodiversity risks and safeguards of China’s hydropower financing in Belt and Road Initiative (BRI) countries. One Earth, 5, 1019–1029.

Nie ZC (2022) Research on influencing factors of ESG information disclosure of listed companies in heavy pollution industries—Based on fuzzy set qualitative comparative analysis. Commercial Accounting, (19), 38–43. (in Chinese) [聂紫聪 (2022) 重污染行业上市公司ESG信息披露的影响因素研究——基于模糊集定性比较分析. 商业会计, (19), 38–43.]

Qin Y, Wang YH (2020) Environment regulation, financing constraints and heavy-polluting enterprises’ investment path selection in greening innovation. Collected Essays on Finance and Economics, (10), 75–84. (in Chinese with English abstract) [覃予, 王翼虹 (2020) 环境规制、融资约束与重污染企业绿色化投资路径选择. 财经论丛, (10), 75–84.]

Ragin CC, Fiss PC (2008) Net effects analysis versus configurational analysis: An empirical demonstration. In: Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond (ed. Ragin CC), pp. 190–212. University of Chicago Press, Chicago.

Reale R, Magro TC, Ribas LC (2019) Biodiversity conservation actions as a tool to improve the management of sustainable corporations and their needs ecosystem services. Journal of Cleaner Production, 219, 1–10.

Ren GQ, Lai HF, Zhao LF (2024) Environmental regulation, digital transformation and green technology innovation—A study based on empirical evidence of Chinese listed manufacturing companies. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), (3), 28–42. (in Chinese with English abstract) [任广乾, 赖浣峰, 赵乐凡 (2024) 环境规制、数字化转型与绿色技术创新——来自中国工业企业的数据分析. 北京理工大学学报(社会科学版), (3), 28–42.]

Ren GQ, Zhou XY, Li XY, Liu L (2021) Nature of property right, corporate governance and enterprise environmental behavior. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 23(2), 44–55. (in Chinese with English abstract) [任广乾, 周雪娅, 李昕怡, 刘莉 (2021) 产权性质、公司治理与企业环境行为. 北京理工大学学报(社会科学版), 23(2), 44–55.]

Ren XS, Sun S, Ma Q, Shao S (2024) New energy vehicle promotion policy, financing constraints and green technology innovation. Management Review, 36(1), 131–148. (in Chinese with English abstract) [任晓松, 孙莎, 马茜, 邵帅 (2024) 新能源汽车推广政策、融资约束与绿色技术创新. 管理评论, 36(1), 131–148.]

Smith T, Paavola J, Holmes G (2019) Corporate reporting and conservation realities: Understanding differences in what businesses say and do regarding biodiversity. Environmental Policy and Governance, 29, 3–13.

Song Y, Liu J, He SL, Xu W, Cheng C, Liu B, Yu JQ (2025) Mainstreaming path of biodiversity conservation for Chinese energy enterprises. Biodiversity Science, 33, 24345. (in Chinese with English abstract) [宋阳, 柳军, 何少林, 徐薇, 程琛, 刘博, 余绩庆 (2025) 我国能源企业生物多样性保护主流化管理路径. 生物多样性, 33, 24345.]

Tan HB, Fan ZT, Du YZ (2019) Technology management capability, attention distribution and local government website construction: A configurational analysis based on the TOE framework. Journal of Management World, 35(9), 81–94. (in Chinese with English abstract) [谭海波, 范梓腾, 杜运周 (2019) 技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设——一项基于TOE框架的组态分析. 管理世界,

35(9), 81–94.]
Tan HB, Zhang N (2016) Opening government data: History, value and path. Academic Forum, 39(6), 31–34, 53. (in Chinese) [谭海波, 张楠 (2016) 政府数据开放: 历史、价值与路径. 学术论坛, 39(6), 31–34, 53.]
Tang XM, Qin T (2025) Chinese enterprises' biodiversity disclosure index construction and financing effects. Biodiversity Science, 33, 24264. (in Chinese with English abstract) [汤心萌, 秦涛 (2025) 中国企业生物多样性信息披露指数及其融资效应研究. 生物多样性 33, 24264.]
Tang XM, Zhou XG (2024) Research on characteristics of China's green economy efficiency and its changing trend in the new period: Temporal and spatial distribution, regional differences, and convergence characteristics. Operations Research and Management Science, 33(6), 151–157. (in Chinese with English abstract) [汤心萌, 周晓光 (2024) 中国绿色经济效率特征及其新时期变化趋势研究: 时空分布、地区差异、收敛性特点. 运筹与管理, 33(6), 151–157.]
Tornatzky LG, Fleischer M, Chakrabarti AK (1990) The processes of technological innovation. In: The Processes of Technological Innovation (eds Tornatzky LG, Fleischer M), pp. 27–50. Lexington Books, Lanham, Mayland, USA.
Toukabri M, Alwadai AM (2024) Corporate commitments to biodiversity disclosure and sustainable board. Do NGO directors on board matter? Recent evidence from S&P 500 companies. Journal of Corporate Accounting & Finance, 35, 109–145.
Vishwakarma A, Dangayach GS, Meena ML, Gupta S (2022) Analysing barriers of sustainable supply chain in apparel & textile sector: A hybrid ISM-MICMAC and DEMATEL approach. Cleaner Logistics and Supply Chain, 5, 100073.
Wang FZ, Chen FY (2018) Board governance, environmental regulation and green technology innovation—Empirical test based on listed companies in China's heavy polluting industry. Studies in Science of Science, 36, 361–369. (in Chinese with English abstract) [王锋正, 陈方圆 (2018) 董事会治理、环境规制与绿色技术创新——基于我国重污染行业上市公司的实证检验. 科学学研究, 36, 361–369.]
Wooldridge JM (2016) Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edn. Cengage Learning, Boston.
Wu HH, Zhang YC, Chen Y (2025) Biodiversity risk information disclosure and corporate bond financing cost—Based on the dual perspectives of information effect and risk effect. Finance and Economy, (4), 28–43. (in Chinese with English abstract) [吴慧慧, 张雨辰, 陈滢 (2025) 生物多样性风险信息披露与企业债券融资成本——基于信息效应和风险效应双重视角. 金融与经济, (4), 28–43.]
Xia X, He JM, Liu JY (2014) Research logic of qualitative comparative analysis: On its implications for economic management research. Journal of Finance and Economics, 40(10), 97–107. (in Chinese with English abstract) [夏鑫, 何建民, 刘嘉毅 (2014) 定性比较分析的研究逻辑——兼论其对经济管理学研究的启示. 财经研究, 40(10), 97–107.]
Xie GD, Zhang CX, Zhang CS, Xiao Y, Lu CX (2015) The value of ecosystem services in China. Resources Science, 37, 1740–1746. (in Chinese with English abstract) [谢高地, 张彩霞, 张昌顺, 肖玉, 鲁春霞 (2015) 中国生态系统服务的价值. 资源科学, 37, 1740–1746.]
Xie HL, Liu Q, Chen B, Chen QR, Zeng HC (2024) Value realization of ecological products in national parks: Basic logic, core mechanism and typical model. Economic Geography, 44(8), 158–169. (in Chinese with English abstract) [谢花林, 刘琼, 陈彬, 陈倩茹, 曾宏琛 (2024) 国家公园生态产品价值实现——基本逻辑、核心机制与典型模式. 经济地理, 44(8), 158–169.]
Yang H, Zhu Z, Shen YQ, Yang J, Qian WR (2025) Does the establishment of national park system pilot areas improve the incomes of farmers in local communities: Based on empirical data from Qianjiangyuan National Park. China Population, Resources and Environment, 35(1), 193–204. (in Chinese with English abstract) [杨虹, 朱臻, 沈月琴, 杨俊, 钱文荣 (2025) 国家公园体制试点区设立是否能改善当地社区农户收入?——基于钱江源国家公园的实证分析. 中国人口·资源与环境, 35(1), 193–204.]
Yang HJ, Gou XH, Yin DC (2021) Response of biodiversity, ecosystems, and ecosystem services to climate change in China: A review. Ecologies, 2, 313–331.
Yin WL, Ran WX (2023) Explaining firm performance during the COVID-19 with fsQCA: The role of supply network complexity, inventory turns, and geographic dispersion. Sage Open, 13, doi: 10.1177/21582440231173671.
Yu W, Guo XY (2023) Research on the impact of gender diversity of board on corporate green innovation. Soft Science, 37(7), 52–57. (in Chinese with English abstract) [余伟, 郭小艺 (2023) 董事会性别多样性对企业绿色创新的影响研究. 软科学, 37(7), 52–57.]
Zeng JW, Li BZ (2022) Driving paths of enterprise green ambidextrous innovation from the configuration perspective. China Population, Resources and Environment, 32(2), 151–161. (in Chinese with English abstract) [曾经纬, 李柏洲 (2022) 组态视角下企业绿色双元创新驱动路径. 中国人口·资源与环境, 32(2), 151–161.]
Zhang CH, Xie MZ, Zhang LP, Tian H, Wang G, Chen N, Zhuo X (2016) The developmental logic and framework of China's green finance. Journal of Modern Finance, (2), 17–28. (in Chinese with English abstract) [张承惠, 谢孟哲, 张丽平, 田辉, 王刚, 陈宁, 卓贤 (2016) 发展中国绿色金融的逻辑与框架. 金融论坛, (2), 17–28.]
Zhang JL, Wang Z, Xu WG (2019) On classification of China's protected area with national parks as main parts. Journal of Nanjing Forestry University (Humanities and Social Sciences Edition), 19(3), 57–69. (in Chinese with English abstract) [张建亮, 王智, 徐网谷 (2019) 以国家公园为主体的自然保护地分类方案构想. 南京林业大学学报(人文

社会科学版), 19(3), 57–69.]

Zhang M, Du YZ (2019) Qualitative comparative analysis (QCA) in management and organization research: Position, tactics, and directions. Chinese Journal of Management, 16, 1312–1323. (in Chinese) [张明, 杜运周 (2019) 组织与管理研究中QCA方法的应用: 定位、策略和方向. 管理学报, 16, 1312–1323.]

Zhang XH, Qin DS (2024) Test of synergy between ESG performance and financial performance. Finance and Accounting Monthly, 45(12), 43–49. (in Chinese) [张鲜华, 秦东升 (2024) ESG履责表现与财务绩效的协同效应检验. 财会月刊, 45(12), 43–49.]

Zhao J, Dong KY, Dong XC, Shahbaz M, Kyriakou I (2022) Is green growth affected by financial risks? New global evidence from asymmetric and heterogeneous analysis. Energy Economics, 113, 106234.


Zhou XG, Tang XM (2022) Heterogeneous environmental regulation and green economic efficiency from the perspective of spatiotemporal consistency. Systems Engineering—Theory & Practice, 42, 2114–2128. (in Chinese with English abstract) [周晓光, 汤心萌 (2022) 时空一致视角下异质性环境规制与绿色经济效率. 系统工程理论与实践, 42, 2114–2128.]

Zhu Z, Chai JL, Ning K (2022) The impacts of the establishment of national park system pilots on wildlife incidents and farmers' adaptive behaviors. Chinese Rural Economy, (11), 82–101. (in Chinese with English abstract) [朱臻, 柴金露, 宁可 (2022) 国家公园体制试点设立对野生动物肇事及农户适应性行为的影响. 中国农村经济, (11), 82–101.]

(责任青年编委: 赵富伟　责任编辑: 李会丽)

附录　Supplementary Material

https://www.biodiversity-science.net/CN/10.17520/biods.2025246



附录 1 企业生物多样性保护驱动路径和模式分析框架

Appendix 1 Analysis framework for driving paths and patterns of enterprises' biodiversity conservation

附录 2　研究变量校准瞄点及描述性统计

Appendix 2 Research variable calibration focus and descriptive statistics

变量类型 Variable type		变量代码 Variable symbols			描述性统计 Descriptive statistics			
		完全隶属点(90%) Complete membership point (90%)	交叉点(50%) Intersection point (50%)	完全不隶属点(10%) Completely non-subordinate points (10%)	均值 Mean	标准差 SD	最大值 Max	最小值 Min
结果变量 Result variable	企业生物多样性保护指数 Enterprise biodiversity conservation index	0.23	0.00	0.00	0.09	0.39	15.84	0.00
前因变量 Antecedent variable	企业资产规模 Enterprise asset scale	25.61	23.08	21.37	23.32	1.76	31.31	18.26
	企业财务风险 Enterprise financial risk	0.78	0.50	0.20	0.50	0.22	3.11	0.00
	董事会规模 Board Size	12.00	9.00	7.00	9.23	2.19	21.00	4.00
	董事会独立性 Board independence	44.44	36.36	33.33	37.51	5.75	80.00	0.00
	市场认可度 Market recognition	1.46	0.39	0.01	0.60	1.32	35.41	-37.06
	区域经济水平 Regional economic level	89705.23	35804.04	13698.5	43538.56	30405.77	129118.60	441.36
	环境规制强度 Intensity of environmental regulation	0.0042	0.0014	0.0003	0.0021	0.0020	0.0310	0.00
	国家公园建设 National park construction	0.00	0.00	0.00	0.03	0.18	1.00	0.00
	自然保护区面积 Area of nature reserve	285.70	56.49	13.40	180.62	404.95	4150.30	9.00

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25342, pages 1–11
doi: 10.17520/biods.2025342
cstr: 32101.14.biods.2025342

•生物多样性保护融资与企业参与专题•

A股上市公司生物多样性信息披露对供应链韧性的影响

秦洋, 吾买尔江·艾山*, 魏文涛, 迪丽尼嘎·沙木沙克

新疆大学经济与管理学院, 乌鲁木齐 830046

摘要: 在生物多样性丧失已经对全球经济构成严重威胁的背景下, 企业生物多样性信息披露能否提升供应链韧性已成为学术界关注的重点之一。本研究通过分析企业生物多样性信息披露对供应链韧性影响的理论机制, 基于文本分析法构建了企业生物多样性信息披露指标, 并使用2011–2023年中国制造业A股上市公司数据进行实证检验。研究发现, 企业生物多样性信息披露能够显著提高供应链韧性, 该结论在经过内生性和稳健性检验后仍然成立。异质性分析表明, 企业生物多样性信息披露对供应链议价能力高企业和管理者短视主义强企业的供应链韧性提升作用更强。机制检验表明, 改善企业环境、社会和治理表现, 提高供应链透明度和稳定性是提升供应链韧性的重要路径。本研究为推动企业可持续发展、提高供应链韧性和安全水平提供了重要参考。

关键词: 企业生物多样性信息披露; 供应链韧性; 文本分析法

秦洋, 吾买尔江·艾山, 魏文涛, 迪丽尼嘎·沙木沙克 (2026) A股上市公司生物多样性信息披露对供应链韧性的影响. 生物多样性, 34, 25342. doi: 10.17520/biods.2025342; cstr: 32101.14.biods.2025342.
Qin Y, Wumaierjiang A, Wei WT, Diliniga S (2026) The impact of biodiversity information disclosure on supply chain resilience of A-share listed companies. Biodiversity Science, 34, 25342. doi: 10.17520/biods.2025342; cstr: 32101.14.biods.2025342.

The impact of biodiversity information disclosure on supply chain resilience of A-share listed companies

Yang Qin, Aishan Wumaierjiang*, Wentao Wei, Shamushake Diliniga

School of Economics and Management, Xinjiang University, Urumqi 830046, China

ABSTRACT

Background & Aim: In the context of biodiversity loss posing a serious threat to the global economy, whether corporate biodiversity information disclosure can improve the resilience of supply chains has become one of the focuses of academic attention. By analyzing the theoretical mechanism of the impact of corporate biodiversity information disclosure on supply chain resilience, this paper constructs enterprise biodiversity indicators based on text analysis methods, and uses the data of China's manufacturing A-share listed companies from 2011 to 2023 for empirical testing.

Results: The results showed that corporate biodiversity information disclosure can significantly improve supply chain resilience, and this conclusion was still valid after the endogeneity and robustness tests. Heterogeneity analysis showed that corporate biodiversity information disclosure had a stronger effect on the improvement of supply chain resilience of enterprises with high supply chain bargaining power and short-sighted managers. The mechanism test showed that improving corporate environmental, social, and governance performance, improving supply chain transparency and improving supply chain stability were important ways for corporate biodiversity information disclosure to enhance supply chain resilience.

收稿日期 Received: 2025-08-25; 接受日期 Accepted: 2026-01-15
基金项目: 新疆生产建设兵团科技计划项目(SRS2025218)和新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市企事业单位委托项目(202118140044) Supported by the Xinjiang Production and Construction Corps Science and Technology Plan Project (SRS2025218) and Projects Commissioned by Enterprises and Institutions in Urumqi, Xinjiang Uygur Autonomous Region (202118140044)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: omarjanh@xju.edu.cn

Suggestions & Perspectives: This paper provides an important reference for promoting sustainable development of enterprises and improving the resilience and security of supply chains.
Key words: corporate biodiversity information disclosure; supply chain resilience; text analysis methods

从2015年9月联合国可持续发展目标(sustainable development goals, 简称SDGs)中的第十五个目标提到要“遏制生物多样性的丧失”, 到联合国环境规划署(UN Environment Programme, UNEP)的2024年年度报告中提到“全球应加快应对生物多样性丧失问题”, 都表明全球正面临生物多样性丧失的重大挑战, 生物多样性丧失对全球经济构成了严重威胁。生物多样性与环境气候危机紧密相连, 2024年首届世界物种大会(World Species Congress)指出实现《巴黎协定》(The Paris Agreement)的必要条件在于成功保护、恢复和管理生物多样性, 生物多样性对世界经济和全球可持续发展至关重要, 保护生物多样性迫在眉睫。当前, 机构投资者对企业生物多样性议题的关注度在不断提升(Ali et al., 2024), 但过往企业生物多样性研究在很大程度上被学者忽视(Giglio et al., 2023), 企业是环境保护的重要微观载体之一, 深入研究生物多样性的企业效应对于促进企业可持续发展具有重要的理论和实践意义(Treepongkaruna, 2024)。

党的二十大报告指出要“提升产业链供应链韧性和安全水平”, 这不仅能够应对外循环不确定性的干扰, 也能在内循环背景下发展新质生产力, 有利于促进现代化产业体系的建设和完善(洪银兴和王坤沂, 2024)。在当今世界面临大变局、新挑战的易变性、不确定性、复杂性、模糊性(volatility、uncertainty, complexity, ambiguity, VUCA)背景下, 企业如何确保供应链稳定性、提升供应链韧性和安全水平是企业应对百年未有之大变局的关键。已有研究大多从金融视角对企业生物多样性进行讨论(Flammer et al., 2025), 关于企业生物多样性信息披露和供应链韧性的关系尚未探讨。深入探讨企业生物多样性信息披露和供应链韧性的关系, 能够为提升产业链供应链韧性和安全水平贡献重要的现实意义。

已有研究对供应链韧性影响因素的探讨大多围绕数字化和智能化展开。一方面, 有学者认为数字化转型能提升产业链供应链韧性。从供应链上下游视角来看, 下游企业数字化转型可以增强产业链供应链韧性(陶锋等, 2023)。从供应链网络视角来看, 数字化转型同群效应与产业链供应链韧性关系密切, 企业数字化转型存在纵横网络下的同群效应, 并且数字化同群效应能够提升产业链供应链韧性(卢现祥和胡颖, 2024)。从政策视角来看, 供应链创新与应用试点工作能够显著提升供应链韧性(张树山和谷城, 2024)。另一方面, 也有学者认为人工智能应用可以提升供应链韧性。企业人工智能发展有助于提升供应链韧性(邓慧慧等, 2024), 强化产业链供应链安全稳定(辛大楞和邱悦, 2025), 智能制造能够提升产业链供应链韧性(张伯伟和马凡慧, 2024)。除此之外, 全国统一大市场建设也是提升企业供应链韧性的重要举措(王珍珠等, 2025)。

企业生物多样性的相关研究不仅对企业生物多样性信息披露存在的问题进行了阐述(赵阳和李宏涛, 2022), 还构建了中国企业生物多样性信息披露指数(汤心萌和秦涛, 2025)。一方面, 已有生物多样性的企业效应研究大多从金融学的视角探究企业生物多样性对公司金融的影响(Flammer et al., 2025), 企业生物多样性不仅会影响股票价格(Giglio et al., 2023), 还会降低股价崩盘风险(Bassen et al., 2024)。不仅如此, 也有学者研究了生物多样性与企业环境绩效间的关系, 企业生物多样性保护与企业环境信息披露联系紧密(Chen et al., 2025), 企业生物多样性关注能够缓解环境、社会和企业治理(environmental, social, and governance, ESG)评级分歧(He et al., 2025)。另一方面, 已有研究也对企业如何管理企业生物多样性进行了探讨。制度因素和公司治理是影响企业生物多样性披露的重要因素(Hambali & Adhariani, 2024), 传统文化(孟怡珺等, 2025)、利益相关者参与(Boiral & Heras-Saizarbitoria, 2017)、员工参与(Boiral et al., 2019)等多方主体参与能够改善企业生物多样性水平。董事会是管理企业生物多样性的重要主体, 异质性董事会(Velte, 2023)、董事会性别多样性(Haque & Jones, 2020)、女性董事占比(Issa & Zaid, 2023)等因素也是影响企业生物多样性的重要因素。管理者短视会显著抑制

企业生物多样性(Zhao et al., 2025)。

鉴于此, 本文旨在探讨企业生物多样性信息披露和供应链韧性的关系。通过文本分析法统计企业生物多样性关键词词频和熵值法测度企业供应链韧性, 从微观企业角度理解生物多样性信息披露对供应链韧性的影响, 深入剖析了生物多样性信息披露提升供应链韧性的作用机制, 以期为提升产业链供应链韧性和安全水平提供重要的启示。

1 理论分析与研究假设

1.1 企业生物多样性信息披露对供应链韧性的直接影响

在全球生物多样性危机的严峻背景下, ESG框架已成为全球商业领域的主流话语体系, 生物多样性保护也从企业社会责任的范畴跃升为战略性经营要素(Zhu & Carrasco, 2025)。在商业领域中, 碳排放、气候与环境等问题成为企业重点关注的焦点, 其与企业的信誉提升、股票回报、财务价值及经营绩效密切相关。近年来生物多样性在企业内部的战略地位也日益凸显, 关注生物多样性的企业在战略选择和制定过程中往往会考虑更多外部因素, 从而在宏观层面做出更为前瞻性的规划。

基于Freeman (1984)提出的利益相关者理论, 企业关注生物多样性能够有效协调各方的利益关系, 有助于降低企业供应链协调成本。从外部价值链视角来看, 企业关注生物多样性能够推动上下游合作伙伴协同参与生态保护实践, 通过建立环境风险共担机制促进资源共享与风险分散, 进而提升供应链网络韧性。企业重视生物多样性, 向外界传达出负责任的企业形象, 不仅能够改善企业在金融市场的表现(Flammer et al., 2025), 也有利于企业声誉的维护与提升。企业愿意为生物多样性的保护投入成本, 不仅是向企业利益相关者传递出经营状况良好、运转稳健的信号, 还能使利益相关者与企业合作更加紧密, 认同企业的文化理念。企业与上游供应商合作, 共同推动可持续资源供给, 可降低环境风险, 促进企业与上下游企业的信任合作, 提高企业合作效率和稳定性。同时, 也会吸引上下游企业积极寻求与目标企业合作, 促进企业运转的良性循环, 并提高企业在外部环境不确定性情况下的供应链稳定性, 使其在遭受外力冲击后能够快速恢复至正常运营阶段。

基于Pfeffer和Salancik (1979)提出的资源依赖理论, 企业所拥有的人、财、物和信息等资源都与生态系统密切相关, 这种“自然资本”是企业一切经营活动的源头和基础。从企业内部来看, 企业关注生物多样性能够引导企业将生物多样性保护纳入战略规划体系, 通过优化生产流程管理、构建绿色创新机制, 从而强化供应链的稳定性和竞争力。同时, 为生物多样性进行成本投入, 本质上是对企业资源投资风险的一种“对冲”, 识别和评估与生物多样性相关的风险, 从而降低企业陷入困境时的危害性。

1987年联合国世界环境和发展委员会提交的《我们共同的未来》报告, 正式提出了可持续发展模式。基于可持续发展理论, 企业优化内部资源管理, 能够减少浪费, 提高资源利用效率, 通过跨部门合作整合资源, 共同提高供应链韧性的可持续性。随着社会各界对可持续发展关注度的不断提高, 关注生物多样性可以提升企业品牌形象, 增强消费者对企业的信任和忠诚度, 消费者更愿意购买那些注重环境保护的企业产品, 这种良性循环为企业提供了更多的资金支持, 促进企业提升抗风险能力。关注生物多样性能够为企业带来差异化竞争优势, 企业通过宣传其生物多样性保护措施, 可吸引更多的合作伙伴, 提升市场份额。此外, 关注生物多样性可以增强员工对企业的认同感和归属感, 员工更愿意为那些注重社会责任和环境保护的企业工作, 从而提高员工的工作积极性和忠诚度。企业内部可以通过员工培训和教育, 提高员工对生物多样性保护的意识, 促进企业更好地履行社会责任。员工可以成为企业生物多样性保护的宣传者和践行者, 推动企业可持续发展。这种内外双循环的合理运作, 能够促进企业建立稳定完整的供应链体系, 进一步应对企业内外环境的变化, 在变化中寻求稳定可持续的供应链提升路径, 为企业的长期发展奠定坚实基础。

综上所述, 本文提出假设1: 企业生物多样性信息披露能够提升供应链韧性。

1.2 企业生物多样性信息披露对供应链韧性的间接影响

生物多样性信息披露能够提升企业环境治理

水平(Zhu & Carrasco, 2025), 其本质是企业对非经济效益的真实关注, 能够抑制“漂绿”行为的发生(Chen et al., 2025)。企业进行生物多样性信息披露会为企业在绿色供应链中提供更清晰的定位, 绿色供应链在企业进行绿色产品创新和绿色过程创新中具有重要作用。基于Teece和Pisano (1994)提出的动态能力理论, 变化的生物多样性会动态支撑企业内部ESG披露情况, 同时倒逼企业关注ESG的改善。生物多样性信息披露借助数据化的呈现方式为相关驱动机制提供有效支持。企业ESG监管分析通过外部制度压力形成约束, 促使企业遵循ESG发展目标, 进而推动外部监管融入供应链内部治理体系。同时, 这些驱动机制也为企业保持供应链稳定运行提供了相应动力。最后, ESG风险管理则为企业在实施过程中提供了反馈与调整, 进而实时监管供应链上下游的风险, 从而提高企业供应链韧性水平。

基于Spence (1973)提出的信号理论, 供应链透明度反映了企业所处供应链的信息环境, 与企业自身的信息环境不同, 供应链透明度体现了企业上下游企业的信息。首先, 生物多样性信息披露具有信息流动效应, 通过信息披露能够提高企业供应链透明度, 稳定企业供应链韧性能力, 从而提高企业供应链韧性。企业在供应链所处的上下游均具有成本投入, 而供应链上下游的稳定状况是动态波动的, 在不同情况下所需的成本投入是具有差异的, 当供应链风险较高或企业拥有“讨价还价”的供应商和客户时, 企业所需的谈判资金会大幅提高; 而随着供应链透明度的不断提高, 企业主动披露本企业的供应链优势和所拥有的独特资源, 一方面能提高企业融资水平, 支持其应对不同风险的供应链供给, 提高企业供应链上下游的稳定性(Montecchi et al., 2021), 另一方面供应链信息披露也可缓解企业内外信息不对称, 减少企业融资成本, 避免企业因资金问题而降低企业供应链韧性水平。其次, 供应链透明化有利于企业证明自身合规性, 及时避免因经营过程中的违规行为而面临法律风险和名誉损失, 降低企业的合规成本。企业所处的外部环境受到当地监管部门的规范化控制, 而企业供应链透明度的提高有助于企业识别和减少供应链供给中的“法律问题”, 同时企业通过供应链透明度获取上下游供应商和客户的信息能更有效地使用企业资源, 减少浪费, 提高资源的利用效率。最后, 供应链透明化具有合作效应。透明化的供应链信息能够激发企业内部成员的认同, 寻找合作企业, 推动新技术、新流程和新产品的开发, 使供应链企业获取更优质的供应商和大客户, 而与供应商和客户的不断合作, 会建立更广泛的供应链合作网络, 推动供应链的可持续发展, 从而多源头协同提高供应链韧性。

供应链稳定性不仅能够增强各方利益主体间的信任水平, 降低沟通成本, 也能促进企业研发投入水平、开拓新兴市场。首先, 从供应链企业内部合作看, 与供应链上下游供应商和客户维持稳定关系能够降低企业经营成本, 维持稳定的生产流程, 提高企业的盈利能力和抗风险水平(王雄元和彭旋, 2016)。当外部风险来临时, 供应链稳定水平能够发挥协同效应, 帮助目标企业及供应链上下游企业一同对抗风险, 从而进一步维持供应链韧性的水平; 此外, 供应链的稳定有助于企业内部员工熟悉业务流程, 提高员工专业化水平, 改善企业内部工作效率(董浩和闫晴, 2025), 促进企业间信息整合和交流合作, 增强供应链的可靠性和效率。随着供应链稳定性的进一步提升, 供应链企业会整体扩大生产规模、加大创新研发投入(蒋殿春和鲁大宇, 2022)。其次, 从供应链企业外部竞争看, 企业管理层会时刻保持对市场动态的高度关注, 在供应链长期相对稳定的情况下, 企业面对竞争关系更具有主动权, 能够将更多资源投入到创新研发等领域, 通过竞争主动权保持在市场中的领先地位, 从而增强供应链韧性。

综上所述, 本文提出假设2: 企业生物多样性信息披露能够通过提升企业ESG表现、供应链透明度和稳定性对供应链韧性产生正向影响。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

考虑到数据可获得性, 本文选取2011–2023年我国制造业A股上市公司为研究对象。其中, 企业供应链韧性的相关数据来源于国泰安(CSMAR, https://data.csmar.com/)和中国研究数据服务平台(CNRDS, https://www.cnrds.com)数据库, 生物多样性数据来源于企业年报, 控制变量均来源于CNRDS数据库。本文在样本选取中剔除了有退市风险(ST)、特别转让(PT)和在样本期间内退市的

企业。

2.2 模型构建

为了检验企业生物多样性信息披露对供应链韧性的影响，本文构建以下计量模型:

$$SCR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 BD_{it} + Controls + \delta_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中，SCR_{it}表示企业i年份t的供应链韧性水平，BD_{it}表示企业i年份t的生物多样性信息披露水平，$Controls$表示一系列企业层面的控制变量，δ_i表示个体固定效应，γ_t表示年份固定效应，ε_{it}是随机扰动项，α_0表示常数项。根据研究假设，预计α_1的符号显著为正。

2.3 变量选取

2.3.1 被解释变量: 供应链韧性

本文参考苏栋芳等(2025)的方法，从恢复能力、运营能力、更新能力、抵抗能力和供需匹配能力5个维度衡量供应链韧性水平。具体来说，采用残差法测度企业绩效在不同时期受到外部冲击的变化，以此来衡量供应链的恢复能力；采用应付(收)账款周转率衡量供应链运营能力；采用企业发明专利授权量加1取对数形式衡量供应链更新能力；采用应收账款与企业主营业务收入的比值并取自然对数衡量供应链抵抗能力；采用企业现期存货净值与上一期存货净值变化的绝对值并取自然对数衡量供需匹配能力。最后使用熵值法对上述5个维度进行综合测算，得到企业供应链韧性水平(*SCR*)。

2.3.2 解释变量: 企业生物多样性信息披露

本文采用文本分析法对企业年报进行生物多样性关键词统计。具体而言，首先使用Python对2011–2023年上市公司年报进行抓取；然后参考He等(2024)构建生物多样性关键词词典，包含生物多样性、生态系统、生态学、栖息地等关键词；最后采用文本分析法统计关键词词频。在此基础上，本文使用生物多样性关键词词频占比衡量企业生物多样性信息披露水平(*BD*)。

2.3.3 控制变量

借鉴苏栋芳等(2025)，本文选取了企业规模、企业年龄、资产负债率、现金流比率、营业收入增长率等一系列企业层面的控制变量。所有变量的具体定义和符号见Box 1。被解释变量、解释变量和控制变量的描述性统计见表1。

Box 1 企业生物多样性信息披露对供应链韧性影响的变量定义

变量类型	变量名称	变量符号	变量度量
被解释变量	供应链韧性	*SCR*	熵值法对5个维度的测算
解释变量	生物多样性信息披露	*BD*	文本分析法统计的关键词词频占比
控制变量	企业规模	*Size*	总资产取对数
	企业年龄	*Age*	当年年份 − 公司上市年份 + 1取自然对数
	资产负债率	*Lev*	总负债/总资产
	现金流比率	*CF*	经营活动产生的现金流量净额/总资产
	营业收入增长率	*Growth*	本年营业收入总额/上一年营业收入总额
	股权集中度	*Top*	第一大股东持股数量/总股数
	两职合一	*Dual*	董事长与总经理是否同一人
	董事会规模	*Board*	年末董事人数 + 1取对数
	审计水平	*Big4*	是否经由四大会计师事务所审计

表1 主要变量的描述性统计

Table 1 Descriptive statistics of main variables

变量 Variables	样本量 Sample size	平均值 Mean	标准差 SD	最小值 Minimum	最大值 Maximum
SCR	23,908	0.1702	0.0424	0.0767	0.6648
BD	23,908	0.0002	0.0006	0.0000	0.0158
Size	23,392	22.1127	1.1325	19.9313	26.2203
Age	23,137	2.9396	0.3018	1.9459	3.5264
Lev	23,221	0.3907	0.1844	0.0533	0.8875
CF	23,238	0.0509	0.0617	–0.1569	0.2473
Growth	23,283	0.1366	0.2847	–0.5218	2.1005
Top	21,180	35.6378	13.8408	8.0800	75.0000
Dual	23,136	0.3320	0.4709	0.0000	1.0000
Board	22,495	2.1271	0.1600	1.7918	2.7081
Big4	23,596	0.0507	0.2194	0.0000	1.0000

变量信息见Box 1。

Variable information is provided in Box 1.

3 实证结果与分析

3.1 基准回归

表2展示了企业生物多样性信息披露对供应链韧性影响的基准回归结果，本文所有回归均采用企业层面的聚类稳健标准误。其中模型1没有加入控制变量和固定效应，模型2仅加入了企业和年份固定效应，模型3、模型4和模型5依次加入表1中的控制变量。结果显示，企业生物多样性信息披露的核

表2　企业生物多样性信息披露影响供应链韧性(*SCR*)的回归结果

Table 2　Regression results on the impact of corporate biodiversity disclosure on supply chain resilience (*SCR*)

变量 Variables	模型1 Model 1	模型2 Model 2	模型3 Model 3	模型4 Model 4	模型5 Model 5
被解释变量 DV	*SCR*	*SCR*	*SCR*	*SCR*	*SCR*
BD	7.8110***	4.6669***	3.2630**	3.8238***	4.7584***
	(1.5777)	(1.4298)	(1.4033)	(1.4698)	(1.5950)
Size			0.0162***	0.0164***	0.0166***
			(0.0009)	(0.0010)	(0.0010)
Age			–0.0007	0.0035	0.0051
			(0.0064)	(0.0067)	(0.0067)
Lev			–0.0205***	–0.0202***	–0.0198***
			(0.0029)	(0.0031)	(0.0032)
CF				0.0246***	0.0223***
				(0.0040)	(0.0041)
Growth				0.0028***	0.0026***
				(0.0007)	(0.0007)
Top				0.0001***	0.0002***
				(0.0001)	(0.0001)
Dual					0.0003
					(0.0008)
Board					0.0023
					(0.0032)
*Big*4					–0.0039
					(0.0032)
固定效应 Fixed effect	否 No	是 Yes	是 Yes	是 Yes	是 Yes
常数项 Constant	0.1687***	0.1693***	–0.1778***	–0.2022***	–0.2177***
	(0.0007)	(0.0003)	(0.0260)	(0.0276)	(0.0286)
样本量 Sample size	23,908	23,672	22,345	19,521	18,252
R^2	0.011	0.688	0.697	0.712	0.713

变量信息见Box 1; ***, **分别表示在1%和5%的水平上差异显著; 括号内数值为聚类稳健标准误。

Variable information is provided in Box 1; ***, ** denote significant differences at the 1% and 5% levels respectively; values in parentheses represent cluster-robust standard errors. DV, Dependent variables.

心解释变量估计系数在1%的显著性水平上显著为正, 表明企业生物多样性信息披露对供应链韧性具有显著的正向影响, 假设1成立。

3.2　内生性检验

考虑到基准回归中可能存在的反向因果和样本选择带来的内生性问题, 本文使用工具变量法和Heckman两步法对内生性问题进行探讨。一方面, 考虑到企业生物多样性信息披露和供应链韧性间可能存在的反向因果关系, 本文使用工具变量法进行识别检验。选取滞后一期的核心解释变量作为企业生物多样性信息披露的工具变量, 满足工具变量的选取要求。工具变量法的回归结果如模型1所示(表3), 在考虑内生性问题后企业生物多样性信息披露对供应链韧性的估计系数在5%的显著性水平上显著为正, 并且第一阶段*F*值远大于10, 不存在弱工具变量和过度识别问题。模型1的回归结果表明(表3), 在考虑内生性问题后研究结论仍然成立。

另一方面, 考虑到样本选择偏差问题可能对企业生物多样性影响供应链韧性的基准回归结果造成影响, 本文继续选择Heckman两步法缓解样本选择偏差问题。通过第一阶段的Probit回归计算逆米尔斯比率(inverse mills ratio, IMR), 而后将逆米尔斯比率作为控制变量带入到基准回归模型中, 结果如模型2所示(表3), 企业生物多样性信息披露的估计系数仍在1%的显著性水平上显著为正, 说明在考虑样本选择偏差问题后结论与前文结果一致。

3.3　稳健性检验

首先, 替换核心解释变量。分别采用企业生物多样性关键词中文字数占比(*BD*2)和字符数占比(*BD*3)替换基准回归中的核心解释变量。其次, 考虑到遗漏变量可能对研究结论的干扰, 本文参考已有相关研究加入了地区层面的控制变量(苏栋芳等, 2025), 包括经济发展水平(*PGDP*), 采用地区人均GDP的对数形式衡量; 政府干预程度(*GI*), 采用地区政府财政一般支出与地区GDP的比值衡量; 开放水平(*Open*), 采用地区进出口总额与GDP的比值衡量; 城市化水平(*Urban*), 采用城镇人口占总人口的比例衡量。模型3、模型4和模型5展示了稳健性检验的回归结果(表3), 结果显示替换后企业生物多样性信息披露和加入地区层面控制变量后的企业生物多样性信息披露的估计系数在1%的显著性水平上显著为正, 验证了本文回归结果的稳健性。

4　异质性分析和机制检验

4.1　异质性分析

4.1.1　供应链议价能力异质性

考虑到企业生物多样性信息披露对供应链韧

表3　内生性和稳健性检验

Table 3　Endogeneity and robustness tests

变量 Variables	模型1 Model 1	模型2 Model 2	模型3 Model 3	模型4 Model 4	模型5 Model 5
被解释变量 DV	*SCR*	*SCR*	*SCR*	*SCR*	*SCR*
模型设定 Model Specification	工具变量法 Instrumental variable approach	Heckman两步法 Heckman two-step	替换为*BD2* Replace with *BD2*	替换为*BD3* Replace with *BD3*	遗漏变量检验 Omitted variable test
BD	4.9932**	4.9384***			4.9433***
	(2.3226)	(1.6824)			(1.7678)
BD2			6.7162***		
			(2.2833)		
BD3				12.1476***	
				(4.2373)	
Size	0.0169***	0.0160***	0.0166***	0.0166***	0.0175***
	(0.0011)	(0.0013)	(0.0010)	(0.0010)	(0.0011)
Age	0.0074	0.0006	0.0051	0.0050	0.0058
	(0.0076)	(0.0095)	(0.0067)	(0.0067)	(0.0074)
Lev	–0.0206***	–0.0224***	–0.0198***	–0.0198***	–0.0222***
	(0.0036)	(0.0037)	(0.0032)	(0.0032)	(0.0037)
CF	0.0217***	0.0258***	0.0223***	0.0223***	0.0204***
	(0.0045)	(0.0045)	(0.0041)	(0.0041)	(0.0047)
Growth	0.0026***	0.0026***	0.0026***	0.0026***	0.0024***
	(0.0008)	(0.0008)	(0.0007)	(0.0007)	(0.0008)
Top	0.0001**	0.0001*	0.0002***	0.0002***	0.0001**
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)
Dual	0.0005	0.0002	0.0003	0.0003	0.0000
	(0.0009)	(0.0010)	(0.0008)	(0.0008)	(0.0010)
Board	0.0037	0.0033	0.0023	0.0024	0.0013
	(0.0034)	(0.0036)	(0.0032)	(0.0032)	(0.0036)
Big4	–0.0045	–0.0068**	–0.0039	–0.0039	–0.0037
	(0.0032)	(0.0028)	(0.0032)	(0.0032)	(0.0034)
PGDP					0.0050
					(0.0030)
GI					0.0018
					(0.0142)
Open					–0.0004**
					(0.0002)
Urban					0.0008
					(0.0091)
固定效应 Fixed effect	是 Yes	是 Yes	是 Yes	是 Yes	是 Yes
常数项 Constant		–0.1902***	–0.2175***	–0.2180***	–0.2923***
		(0.0392)	(0.0286)	(0.0286)	(0.0517)
样本量 Sample size	15,394	13,190	18,252	18,252	14,574
R^2		0.759	0.713	0.713	0.715

BD2: 生物多样性关键词中文字数占比; *BD3*: 生物多样性关键词字符数占比; *PGDP*: 经济发展水平; *GI*: 政府干预程度; *Open*: 开放水平; *Urban*: 城市化水平; 其他变量信息见Box 1; ***, **, *分别表示在1%、5%、10%的水平上差异显著; 括号内数值为聚类稳健标准误。*BD2*, Proportion of Chinese characters in biodiversity keywords; *BD3*, Proportion of character count in biodiversity keywords; *PGDP*, Level of economic development; *GI*, Level of government intervention; *Open*, Level of openness; *Urban*, Level of urbanization; Other Variable information is provided in Box 1; ***, **, * denote significant differences at the 1%, 5%, and 10% levels respectively; values in parentheses represent cluster-robust standard errors. DV, Dependent variables.

性的影响可能会因为供应链议价能力高低产生异质性效果, 本研究采用上市公司前五大供应商和客户采购与销售比例之和的均值衡量供应链议价能力(李颖等, 2023), 按照中位数将样本划分为供应链议价能力高企业样本和供应链议价能力低企业样本, 供应链议价能力异质性的分组回归结果如模型1和模型2所示(表4)。结果显示, 企业生物多样性信息披露对供应链韧性的影响在供应链议价能力高企业样本中显著, 在供应链议价能力低样本中虽为正但不显著。可能的原因是供应链议价能力高的企业具有更小的转型成本, 生物多样性关注有助于供应链议价能力高企业更快地融入绿色供应链增强供应链韧性。

4.1.2　管理者短视主义异质性

企业生物多样性信息披露可能会受到管理者短视主义的影响(Zhao et al., 2025), 从而引发对供应链韧性的异质性影响。因此, 本文借鉴已有研究的做法(胡楠等, 2021), 采用文本分析法对管理者短视主义进行测度, 按照中位数将样本划分为管理者短视主义强企业样本和管理者短视主义低企业样本, 模型3和模型4展示了管理者短视主义异质性的回归结果(表4)。企业生物多样性信息披露对供应链韧性的提升作用虽然都显著为正, 但是在管理者短视主义强样本中企业生物多样性信息披露对供应链韧性的提升作用更强且更显著。原因可能是, 企业对生物多样性的关注是企业可持续发展的重要组成部分, 能够缓解管理者短视主义所带来的局限性问题, 因此企业生物多样性信息披露对供应链韧性的提升作用在管理者短视主义强企业样本中更显著。

4.2　机制检验

为检验企业生物多样性信息披露对供应链韧性的影响机制, 本文分别从改善企业ESG表现、提高供应链透明度以及提升供应链稳定性3个维度展开分析。具体而言, 本文对华证ESG评级进行1–9分的赋值来衡量企业ESG表现(*ESG*); 采用上市公司明确披露名称的供应商和客户数量占前五大供应商和客户的比例(宫晓云等, 2022)衡量供应链透明度(*ST*); 采用前五大供应商采购金额波动率衡量供应链稳定性水平(*SS*)。本文参考蔡庆丰等(2024)对上述机制进行检验, 结果如表5所示。首先, 改善ESG

表4　生物多样性信息披露对供应链韧性(*SCR*)影响的异质性分析

Table 4　Heterogeneity analysis of the impact of biodiversity information disclosure on supply chain resilience (*SCR*)

变量 Variables	模型1 Model 1	模型2 Model 2	模型3 Model 3	模型4 Model 4
被解释变量 DV	*SCR*	*SCR*	*SCR*	*SCR*
分组变量 GV	议价能力高 HBP	议价能力低 LBP	短视强 HSS	短视低 LSS
BD	5.1530***	3.5297	5.8280***	4.4526*
	(1.8281)	(3.1560)	(1.5752)	(2.6477)
Size	0.0166***	0.0170***	0.0149***	0.0177***
	(0.0015)	(0.0013)	(0.0013)	(0.0013)
Age	0.0012	0.0089	0.0099	0.0054
	(0.0105)	(0.0086)	(0.0086)	(0.0099)
Lev	–0.0199***	–0.0188***	–0.0234***	–0.0177***
	(0.0048)	(0.0041)	(0.0042)	(0.0045)
CF	0.0240***	0.0156***	0.0254***	0.0194***
	(0.0062)	(0.0054)	(0.0055)	(0.0062)
Growth	0.0029**	0.0021**	0.0017	0.0028***
	(0.0013)	(0.0009)	(0.0010)	(0.0011)
Top	0.0002**	0.0001	0.0002***	0.0001
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)
Dual	0.0009	–0.0005	–0.0001	–0.0001
	(0.0012)	(0.0012)	(0.0012)	(0.0011)
Board	0.0025	0.0043	0.0024	0.0057
	(0.0041)	(0.0044)	(0.0042)	(0.0044)
Big4	0.0026	–0.0104***	–0.0084**	0.0022
	(0.0047)	(0.0035)	(0.0033)	(0.0051)
固定效应 Fixed effect	是 Yes	是 Yes	是 Yes	是 Yes
常数项 Constant	–0.2054***	–0.2424***	–0.1952***	–0.2451***
	(0.0452)	(0.0359)	(0.0370)	(0.0404)
样本量 Sample size	8,528	9,286	9,084	8,517
R^2	0.752	0.695	0.725	0.715

变量信息见Box 1; ***, **, *分别表示在1%、5%、10%的水平上差异显著; 括号内数值为聚类稳健标准误。

Variable information is provided in Box 1; ***, **, * denote significant differences at the 1%, 5%, and 10% levels respectively; values in parentheses represent cluster-robust standard errors. DV, Dependent variables; GV, Grouping variables. HBP, High bargaining power; LBP, Low bargaining power; HSS, High short-sightedness; LSS, Low short-sightedness.

表现机制的回归结果显示(表5的模型1), 企业ESG表现越好, 企业生物多样性信息披露对供应链韧性的提升作用越强, 并且估计系数在1%的显著性水平上显著为正, 检验结果与预期一致。其次, 提高供应链透明度机制的检验结果显示(表5的模型2),

表5　生物多样性信息披露影响供应链韧性(*SCR*)的机制检验

Table 5　Mechanism verification of biodiversity information disclosure affects supply chain resilience (*SCR*)

变量 Variables	模型1 Model 1	模型2 Model 2	模型3 Model 3
被解释变量 DV	*SCR*	*SCR*	*SCR*
中介变量 MV	*ESG*	*ST*	*SS*
BD	4.2711***	5.2486***	2.3814
	(1.5383)	(1.5416)	(2.4657)
ESG	0.0002		
	(0.0003)		
BD × *ESG*	1.1750***		
	(0.4445)		
ST		–0.0015	
		(0.0055)	
BD × *ST*		12.6794*	
		(7.2299)	
SS			0.0001
			(0.0014)
BD × *SS*			6.9250**
			(3.4715)
Size	0.0166***	0.0165***	0.0167***
	(0.0010)	(0.0010)	(0.0014)
Age	0.0052	0.0052	0.0063
	(0.0067)	(0.0069)	(0.0092)
Lev	–0.0197***	–0.0199***	–0.0164***
	(0.0032)	(0.0034)	(0.0045)
CF	0.0221***	0.0229***	0.0214***
	(0.0041)	(0.0043)	(0.0052)
Growth	0.0026***	0.0025***	0.0020**
	(0.0007)	(0.0008)	(0.0009)
Top	0.0002***	0.0001***	0.0001
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)
Dual	0.0003	0.0004	0.0005
	(0.0008)	(0.0009)	(0.0010)
Board	0.0024	0.0026	0.0034
	(0.0032)	(0.0034)	(0.0042)
Big4	–0.0040	–0.0043	–0.0014
	(0.0032)	(0.0033)	(0.0041)
固定效应 Fixed effect	是 Yes	是 Yes	是 Yes
常数项 Constant	–0.2178***	–0.2162***	–0.2221***
	(0.0286)	(0.0294)	(0.0398)
样本量 Sample size	18,252	17,367	11,004
R^2	0.713	0.714	0.702

ESG: 企业环境、社会和治理的表现; *ST*: 供应链透明度; *SS*: 供应链稳定性水平; 其他变量信息见Box 1; ***, **, *分别表示在1%、5%、10%的水平上差异显著; 括号内数值为聚类稳健标准误。

ESG, Corporate environmental, social, and governance performance; *ST*, Supply chain transparency; *SS*, Supply chain stability level; Other variable information is provided in Box 1; ***, **, * denote significant differences at the 1%, 5%, and 10% levels respectively; values in parentheses represent cluster-robust standard errors. DV, Dependent variables; MV, Mediating variable.

当供应链透明度水平较高时, 企业生物多样性信息披露对供应链韧性的提升作用更强, 且对应的估计系数在10%的显著性水平上显著为正, 验证了提高供应链透明度机制的成立。最后, 提升供应链稳定性机制的检验结果如表5的模型3所示, 结果显示企业生物多样性信息披露能够通过提升供应链稳定性对供应链韧性产生正向影响, 且估计系数在5%的显著性水平上显著为正。以上结论验证了企业生物多样性信息披露对供应链韧性影响的改善企业ESG表现、提高供应链透明度和提升供应链稳定性3个机制, 假设2成立。

5 结论与建议

VUCA情境下产业链供应链韧性和安全性建设是促进经济高质量发展的关键, 企业生物多样性关注能否提升供应链韧性已成为学术界关注的重点之一。本文通过分析企业生物多样性信息披露对供应链韧性影响的理论机制, 基于文本分析法构建了企业生物多样性信息披露指标, 并使用2011–2023年中国制造业A股上市公司数据进行实证检验。研究发现: 企业生物多样性信息披露能够显著提高供应链韧性, 该结论在经过内生性和稳健性检验后仍然成立。异质性分析表明, 企业生物多样性信息披露对供应链议价能力高企业和管理者短视主义强企业的供应链韧性提升作用更强。机制检验表明, 改善企业ESG表现、提高供应链透明度和提升供应链稳定性是企业生物多样性信息披露提升供应链韧性的重要路径。基于上述结论, 本文提出以下政策建议:

(1)政府应出台专门针对企业生物多样性保护的法律法规, 明确企业在生物多样性保护中的责任和义务, 鼓励企业进行生物多样性信息披露。从政府层面来看, 政府应要求企业对其经营活动对生物多样性的影响进行评估, 并采取相应的保护措施。对于违反生物多样性保护法规的企业, 应设定严格的处罚措施, 提高违法成本, 确保企业切实履行保护责任。对积极参与生物多样性保护的企业给予税收优惠、财政补贴、绿色信贷融资等支持, 引导投资者对企业供应链信息等非财务指标的关注, 将资金投入更具发展潜力的企业。从企业层面来看, 企业应将生物多样性纳入运营管理过程中, 积极进行生物多样性信息披露。要提升企业内部对生物多样性的关注度, 认识到生物多样性信息披露的重要性。通过对接国际主流的生物多样性披露框架, 提升企业生物多样性信息披露的价值, 能够更好地应对生物多样性风险。

(2)应加强产业链供应链管理, 完善产业链供应链风险监测平台。通过整合企业、行业协会、金融机构等各方数据, 对产业链供应链的运行情况进行实时监测, 及时发现潜在风险。推动产业链供应链多元化布局, 鼓励企业优化产业链供应链布局, 减少对单一供应商、单一市场的依赖, 降低因供应商中断、市场波动等因素对供应链的影响。同时支持企业加强与国内外不同地区供应商的合作, 建立多元化的供应商体系, 提高产业链供应链的稳定性和韧性, 加大对产业链供应链数字化基础设施建设的投入, 推动企业采用物联网、大数据、人工智能等数字技术, 实现产业链供应链的智能化管理和运营。

(3)企业应重视供应链信息的披露情况, 利用供应链的声誉效应与合作效应降低融资约束和促进企业可持续发展, 同时完善供应链稳定与透明的监管体系, 建立供应链稳定与透明评价指标体系, 定期对供应链稳定与透明情况进行评估和考核。此外, 促进ESG理念在供应链中的应用, 加强对ESG理念的宣传推广, 引导企业将ESG理念融入到供应链管理中, 鼓励企业开展ESG评级和认证, 将ESG表现作为企业供应链合作的重要考量因素, 推动整个供应链的可持续发展。鼓励企业引进具有先进供应链管理经验的人才, 提升企业的供应链管理水平, 为供应链稳定与透明、ESG发展提供人才支撑, 助力企业高质量发展。

参考文献

Ali R, García-Sánchez IM, Aibar-Guzmán B, Rehman RU (2024) Is biodiversity disclosure emerging as a key topic on the agenda of institutional investors? Business Strategy and the Environment, 33, 2116–2142.

Bassen A, Buchholz D, Lopatta K, Rudolf AR (2024) Biodiversity management and stock price crash risk. Business Strategy and the Environment, 33, 4788–4805.

Boiral O, Heras-Saizarbitoria I (2017) Managing biodiversity through stakeholder involvement: Why, who, and for what initiatives? Journal of Business Ethics, 140, 403–421.

Boiral O, Heras-Saizarbitoria I, Brotherton MC (2019) Improving corporate biodiversity management through

employee involvement. Business Strategy and the Environment, 28, 688–698.

Cai QF, Yan WW, Shu SW (2024) The supply chain spillover of green innovation: From the perspective of the collaborative development for core enterprises and suppliers. Business and Management Journal, 46(6), 43–59. (in Chinese with English abstract) [蔡庆丰, 严唯唯, 舒少文 (2024) 绿色创新的供应链溢出——基于核心企业与供应商协同发展的视角. 经济管理, 46(6), 43–59.]

Chen YY, Yin L, Hu SY, Li X (2025) Biodiversity conservation and corporate environmental information disclosure: Evidence from a quasi-natural experiment in China. International Review of Financial Analysis, 102, 104069.

Deng HH, Liu YJ, Wang Q (2024) How does artificial intelligence influence supply chain resilience: Evidence from listed companies. Journal of Zhejiang University (Humanities and Social Sciences), 54(6), 5–23. (in Chinese with English abstract) [邓慧慧, 刘宇佳, 王强 (2024) 人工智能发展如何提升供应链韧性?——基于上市公司的经验证据. 浙江大学学报(人文社会科学版), 54(6), 5–23.]

Dong H, Yan Q (2025) Can supply chain stability achieve stable employment? Journal of Finance and Economics, 51(2), 123–137. (in Chinese with English abstract) [董浩, 闫晴 (2025) 供应链稳定性能否实现稳就业? 财经研究, 51(2), 123–137.]

Flammer C, Giroux T, Heal GM (2025) Biodiversity finance. Journal of Financial Economics, 164, 103987.

Freeman RE (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston.

Giglio S, Kuchler T, Stroebel J, Zeng XR (2023) Biodiversity risk. NBER Working Paper 31137, doi: 10.3386/w31137.

Gong XY, Quan XF, Liu XP (2022) Supply chain transparency and corporate tax avoidance. China Industrial Economics, (11), 155–173. (in Chinese with English abstract) [宫晓云, 权小锋, 刘希鹏 (2022) 供应链透明度与公司避税. 中国工业经济, (11), 155–173.]

Hambali A, Adhariani D (2024) Corporate biodiversity disclosure: The role of institutional factors and corporate governance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 31, 5260–5274.

Haque F, Jones MJ (2020) European firms' corporate biodiversity disclosures and board gender diversity from 2002 to 2016. The British Accounting Review, 52, 100893.

He F, Chen LX, Lucey BM (2024) Chinese corporate biodiversity exposure. Finance Research Letters, 70, 106275.

He F, Duan L, Lucey B, Hao J (2025) Biodiversity risk or climate risk? Which factor affects corporate ESG rating divergence. International Review of Financial Analysis, 104, 104302.

Hong YX, Wang KY (2024) Special research reports on new productive forces. Economic Research Journal, 59(6), 4–14. (in Chinese with English abstract) [洪银兴, 王坤沂 (2024) 新质生产力视角下产业链供应链韧性和安全性研究. 经济研究, 59(6), 4–14.]

Hu N, Xue FJ, Wang HN (2021) Does managerial myopia affect long-term investment? Based on text analysis and machine learning. Journal of Management World, 37(5), 139–156. (in Chinese with English abstract) [胡楠, 薛付婧, 王昊楠 (2021) 管理者短视主义影响企业长期投资吗?——基于文本分析和机器学习. 管理世界, 37(5), 139–156.]

Issa A, Zaid MAA (2023) Firm's biodiversity initiatives disclosure and board gender diversity: A multi-country analysis of corporations operating in Europe. Business Strategy and the Environment, 32, 4991–5007.

Jiang DC, Lu DY (2022) Changes of supply chain, financing constraints and enterprise innovation. Business and Management Journal, 44(10), 56–74. (in Chinese with English abstract) [蒋殿春, 鲁大宇 (2022) 供应链关系变动、融资约束与企业创新. 经济管理, 44(10), 56–74.]

Li Y, Wu YC, Tian XY (2023) Enterprise ESG performance and supply chain discourse power. Journal of Finance and Economics, 49(8), 153–168. (in Chinese with English abstract) [李颖, 吴彦辰, 田祥宇 (2023) 企业ESG表现与供应链话语权. 财经研究, 49(8), 153–168.]

Lu XX, Hu Y (2024) Digital peer effects and the resilience of industrial and supply chains. Industrial Economics Research, (5), 44–56. (in Chinese with English abstract) [卢现祥, 胡颖 (2024) 数字化同群效应与产业链供应链韧性. 产业经济研究, (5), 44–56.]

Meng YJ, He HL, Chen H, Dong FF (2025) Traditional culture and biodiversity disclosure: Empirical evidence from listed firms in China. Accounting and Economics Research, 39(5), 66–88. (in Chinese with English abstract) [孟怡珺, 何欢浪, 陈昊, 董菲凡 (2025) 传统文化与生物多样性信息披露——来自中国上市公司的经验证据. 会计与经济研究, 39(5), 66–88.]

Montecchi M, Plangger K, West DC (2021) Supply chain transparency: A bibliometric review and research agenda. International Journal of Production Economics, 238, 108152.

Pfeffer J, Salancik GR (1979) The external control of organizations: A resource dependency perspective. The Economic Journal, 89, 969–970.

Spence M (1973) Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, 355–374.

Su ZF, Wang TW, Bai YL, Li JZ (2025) Digital finance and the enhancement of supply chain resilience in manufacturing enterprises. Economic Review, (1), 87–101. (in Chinese with English abstract) [苏栝芳, 王婷伟, 白雨露, 李嘉政 (2025) 数字金融与制造业企业供应链韧性提升. 经济评论, (1), 87–101.]

Tang XM, Qin T (2025) Chinese enterprises' biodiversity disclosure index construction and financing effects. Biodiversity Science, 33, 24264. (in Chinese with English

abstract) [汤心萌, 秦涛 (2025) 中国企业生物多样性信息披露指数构建及融资效应. 生物多样性, 33, 24264.]

Tao F, Wang XR, Xu Y, Zhu P (2023) Digital transformation, resilience of industrial chain and supply chain, and enterprise productivity. China Industrial Economics, (5), 118–136. (in Chinese with English abstract) [陶锋, 王欣然, 徐扬, 朱盼 (2023) 数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率. 中国工业经济, (5), 118–136.]

Teece D, Pisano G (1994) The dynamic capabilities of firms: An introduction. Industrial and Corporate Change, 3, 537–556.

Treepongkaruna S (2024) Corporate sustainability and biodiversity reporting: A proactive business strategy to mitigate litigation and reputational risks. Business Strategy and the Environment, 33, 6640–6651.

Velte P (2023) Sustainable institutional investors and corporate biodiversity disclosure: Does sustainable board governance matter? Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30, 3063–3074.

Wang XY, Peng X (2016) Does stable relationship with customers improve the analyst forecasts about suppliers? Journal of Financial Research, (5), 156–172. (in Chinese with English abstract) [王雄元, 彭旋 (2016) 稳定客户提高了分析师对企业盈余预测的准确性吗? 金融研究, (5), 156–172.]

Wang ZZ, Yuan PH, Zhou MS (2025) How the construction of a unified national market affects resilience of enterprise supply chains. Finance & Economics, (2), 74–89. (in Chinese with English abstract) [王珍珠, 袁平红, 周明生 (2025) 全国统一大市场建设如何影响企业供应链韧性. 财经科学, (2), 74–89.]

Xin DL, Qiu Y (2025) Artificial intelligence, industrial chain and supply chain stability, and export resilience of enterprises. Economic Theory and Business Management, (2), 37–54. (in Chinese with English abstract) [辛大楞, 邱悦 (2025) 人工智能、产业链供应链稳定与企业出口韧性. 经济理论与经济管理, (2), 37–54.]

Zhang BW, Ma FH (2024) How intelligent manufacturing enhances industrial chain and supply chain resilience: Theoretical mechanisms and empirical tests. Economic Perspectives, (11), 20–37. (in Chinese with English abstract) [张伯伟, 马凡慧 (2024) 智能制造如何提升产业链供应链韧性: 理论机制与实证检验. 经济学动态, (11), 20–37.]

Zhang SS, Gu C (2024) Supply chain digitization and supply chain resilience. Journal of Finance and Economics, 50(7), 21–34. (in Chinese with English abstract) [张树山, 谷城 (2024) 供应链数字化与供应链韧性. 财经研究, 50(7), 21–34.]

Zhao Y, Li HT (2022) Corporate biodiversity disclosure: Investigation, analysis and recommendation. Biodiversity Science, 30, 22049. (in Chinese with English abstract) [赵阳, 李宏涛 (2022) 企业生物多样性信息披露: 调查、分析与建议. 生物多样性, 30, 22049.]

Zhao YH, Qu XY, Lucey B (2025) Managerial myopia and biodiversity alignment: Evidence from China. International Review of Financial Analysis, 100, 103974.

Zhu YT, Carrasco LR (2025) Where is biodiversity in ESG? Environmental, social and governance (ESG) assessments largely overlook biodiversity. Resources, Conservation and Recycling, 217, 108187.

(责任编委: 徐靖　责任编辑: 李会丽)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25326, pages 1–12
doi: 10.17520/biods.2025326
cstr: 32101.14.biods.2025326

•研究报告•

广西防城季节性雨林凋落物量时空动态及驱动因素

高雅[1,2,3], 刘绮[3], 刘民峰[4], 马瑞霞[3], 黄甫昭[3], 李冬兴[3], 向悟生[3], 丁涛[3], 王斌[3], 李先琨[3], 郭屹立[2,3*]

1. 广西师范大学珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室, 广西桂林 541006; 2. 广西师范大学广西生态脆弱区环境过程与修复重点实验室, 广西桂林 541006; 3. 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所广西喀斯特植物保育与恢复生态学重点实验室, 广西桂林 541006; 4. 山东省地质测绘院, 济南 250003

摘要: 森林凋落物作为森林生态系统物质循环、能量流动和养分平衡的载体, 是森林生态系统的重要组成部分。本研究以广西防城金花茶国家级自然保护区1 ha森林动态监测样地为研究对象, 在其中布设了40个凋落物收集器, 通过6年的连续监测, 分析了该地区凋落物的组成、时空分布特征及驱动因素。结果表明: 广西防城金花茶国家级自然保护区2019–2024年连续6年平均年凋落物量为7,506.38 ± 766.94 kg/ha, 年际波动明显。各组分所占比例大小依次为叶(60.24%) > 枝(19.34%) > 杂物(17.70%) > 繁殖组织(2.72%)。凋落物总量及各组分凋落物量月动态变化规律相似, 均呈三峰型, 峰值分别出现在4月、8月和10月。凋落物收集器5 m邻域范围内, 坡向、土壤温度、树木多样性和胸高断面积之和是该地区森林凋落物总量的主要驱动因素, 且直接正向影响凋落物总量, 而土壤养分通过胸高断面积之和间接影响凋落物总量。连续6年监测结果显示: 广西防城金花茶国家级自然保护区凋落物量季节变化明显, 生物、非生物和土壤因子共同影响着凋落物量的空间分布。

关键词: 季节性雨林; 凋落物量; 凋落物动态; 气候因子; 驱动因素

高雅, 刘绮, 刘民峰, 马瑞霞, 黄甫昭, 李冬兴, 向悟生, 丁涛, 王斌, 李先琨, 郭屹立 (2026) 广西防城季节性雨林凋落物量时空动态及驱动因素. 生物多样性, 34, 25326. doi: 10.17520/biods.2025326; cstr: 32101.14.biods.2025326.
Gao Y, Liu Q, Liu MF, Ma RX, Huang FZ, Li DX, Xiang WS, Ding T, Wang B, Li XK, Guo YL (2026) Spatiotemporal dynamics of litterfall production and driving factors in the Fangcheng seasonal rainforest, Guangxi. Biodiversity Science, 34, 25326. doi: 10.17520/biods.2025326; cstr: 32101.14.biods.2025326.

Spatiotemporal dynamics of litterfall production and driving factors in the Fangcheng seasonal rainforest, Guangxi

Ya Gao[1,2,3], Qi Liu[3], Minfeng Liu[4], Ruixia Ma[3], Fuzhao Huang[3], Dongxing Li[3], Wusheng Xiang[3], Tao Ding[3], Bin Wang[3], Xiankun Li[3], Yili Guo[2, 3*]

1 *Key Laboratory of Ecology of Rare and Endangered Species and Environmental Protection of Ministry of Education, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541006, China*
2 *Guangxi Key Laboratory of Environmental Processes and Remediation in Ecologically Fragile Regions, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541006, China*
3 *Guangxi Key Laboratory of Plant Conservation and Restoration Ecology in Karst Terrain, Guangxi Institute of Botany, Guangxi Zhuang Autonomous Region and Chinese Academy of Sciences, Guilin, Guangxi 541006, China*
4 *Shandong GEO-Surveying and Mapping Institute, Jinan 250003, China*

ABSTRACT

Aims: Forest litterfall, serving as a vector for material cycling, energy flow, and nutrient balance within forest ecosystems, is a vital component of these systems. This study aims to investigate the seasonal dynamics of litterfall production and the drivers of its spatial distribution in the seasonal rainforest of Fangcheng, Guangxi.

Methods: Utilizing a 1-ha forest dynamics plot in Guangxi Fangcheng Golden Camellia National Nature Reserve, as the study site, 40 litterfall collectors were deployed. Through 6 years of continuous monitoring data, we analyzed the region's litterfall composition, spatiotemporal distribution characteristics, and influencing factors.

收稿日期 Received: 2025-08-18; 接受日期 Accepted: 2025-12-17
基金项目: 国家自然科学基金(32560288; 32071540; 31760141)和广西自然科学基金(2022GXNSFDA035076) Supported by the National Natural Science Foundation of China (32560288; 32071540; 31760141) and Guangxi Natural Science Foundation (2022GXNSFDA035076)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: yiliguo810414@163.com

Results: The results indicate that the average annual forest litterfall production over the six consecutive years (2019–2024) in Guangxi Fangcheng Golden Camellia National Nature Reserve was 7,506.38 ± 766.94 kg/ha, exhibiting significant interannual fluctuations. The proportion of each component was as follows: leaf (60.24%) > twig (19.34%) > debris (17.70%) > reproductive structures (2.72%). The monthly dynamics of total litterfall and each component showed similar patterns, all exhibiting a tri-modal distribution with peaks observed in April, August, and October. Within a 5 m neighborhood of the litterfall collectors, aspect, soil temperature, tree diversity, and sum of basal area were identified as the primary drivers of forest total litterfall production in this region. These factors exert a direct positive influence on the total litterfall production. In contrast, soil nutrients indirectly impact total litterfall production through their relationship with the sum of basal area.

Conclusion: Continuous 6-year monitoring results reveal that forest litterfall production in Guangxi Fangcheng Golden Camellia National Nature Reserve undergoes pronounced seasonal variation, and that biotic factors, abiotic factors, and soil factors collectively influence the spatial distribution of litterfall.

Key words: seasonal rainforest; litterfall production; litterfall dynamics; climatic factors; driving factors

森林凋落物是全球碳循环和养分循环的重要组成部分(Sun et al, 2021), 包括林内乔木和灌木的枯叶、枯枝、树皮及繁殖器官、野生动物残骸及其代谢产物, 以及林下枯死的草本植物及枯死植物的根(林波等, 2004), 是森林生态系统物质生产与分解循环的核心环节。森林凋落物产量约占森林净初级生产力的35%–47% (Chen et al, 2017), 其物质构成呈现多元化特征。这些生物质残体承载着大量有机质与矿质元素, 通过分解者的作用构建起生态系统物质循环的关键通道, 在防止水土流失、维持土壤肥力、促进物质循环和能量流动方面发挥着枢纽作用(Ahirwal et al, 2021; Liu et al, 2024)。凋落物层通过形成物理阻隔层, 可有效调节地表微环境——既作为缓冲带减缓雨水直接冲刷力度, 降低水土流失风险, 又作为腐殖质前体物质库, 持续为土壤生态系统输入碳源与营养元素(Berg, 2000)。这种双重生态功能使其成为维系森林群落结构稳定和生态系统服务功能的重要生物屏障。在森林生态系统的养分循环中, 植物群落、凋落物和土壤形成了三位一体的循环模式(Liu et al, 2023), 森林凋落物作为连接植被与土壤的关键物质, 对生态系统的碳储量以及碳循环具有重要意义。

森林凋落物研究很早就受到国内外学者的广泛关注, 不同气候区森林生态系统因物种组成、群落结构等的差异导致凋落物量存在较大的变异性(Xuluc-Tolosa et al, 2003)。前人研究发现, 海拔、物种多样性、凹凸度、胸高断面积、胸径变异系数是影响喀斯特森林凋落物产量的主要驱动因素, 而坡度则通过物种多样性间接影响凋落物总量(Guo et al, 2019; 熊松等, 2024)。树种丰富度通过增加群落资源与利用性状的多样性来提高凋落物产量, 从而增加森林地表有机质的积累(Wan et al, 2023)。也有研究认为, 长期N、P添加会显著提高森林生态系统的地上凋落物产量(赵晓雅等, 2020)。此外, 大量研究表明, 温度、降水和风速等气候因子是影响森林凋落物动态过程的关键气候因素(张新平等, 2008; 兰光飞等, 2024; Liu et al, 2024), 而不同的林分结构和生物特征也可能导致凋落物产量的差异。Zhang等(2024)研究发现黄土高原地区不同林分的季节和年凋落物产量存在显著差异, 而且温度是影响森林凋落物动态过程的关键气候因素。Dai等(2022)发现热带和亚热带常绿阔叶林植物会通过自适应策略诱导凋落物增加或减少, 从而应对土壤水分胁迫或大气干旱胁迫。这些发现为我们理解森林凋落物量时空动态提供了重要见解, 有助于理解和预测森林生态系统生产和功能的变化趋势, 对理解全球气候变化条件下亚热带森林生态系统的碳和养分循环具有潜在意义。

当前, 有关森林凋落物量动态变化及其影响因素的研究已有大量报道, 但针对特定区域开展连续多年凋落物动态监测的研究仍较为缺乏。本文以广西防城金花茶国家级自然保护区(以下简称金花茶保护区) 1 ha森林动态监测样地为研究平台, 以样地内布设的40个凋落物收集器所收集的凋落物为研究对象, 分析了2019–2024年凋落物量的时空动态变化及其影响因素。其目的是: (1)探讨广西防城季节性雨林各组分凋落物量(总量、叶、枝、杂物)的季节性动态变化规律; (2)分析生物、非生物和土壤因子如何影响广西防城季节性雨林凋落物总量的空间分布; (3)为进一步揭示季节性雨林净初级生

产力及其时空分布格局与形成机制等深层次研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

金花茶保护区(21°43′–21°49′ N, 108°2′–108°12′ E)位于广西防城港市防城区境内, 地处十万大山南麓蓝山支脉, 东起深坊岭下的防城江, 西至小峰水库边, 北起松柏屯旁的防城江, 南至那梭村的那他屯, 总面积为9,098.6 ha。保护区地质构造主要是印支期褶皱, 地貌总体格局为南陡北缓的单斜地形, 以山地、丘陵为主, 地势起伏明显, 沟壑纵横交错, 雨水汇集冲刷形成了众多中小河流, 较著名的有西南面的东山江和东北面的防城江。保护区属十万大山南坡的山前丘陵地带, 北热带季风气候类型, 冬短夏长, 雨量充沛, 水热同期。保护区年日照时数约1,525 h, 年平均温度22℃, 1月平均温度14.3℃, 7月平均温度27.7℃, 年平均降水量约1,800 mm, 主要集中在3–10月, 其总降水量达1,600 mm以上(图1), 偶有山洪暴发, 平均相对湿度为80%。保护区内海拔跨幅大, 土壤垂直分布明显, 地带性土壤有砖红壤、红壤和黄壤, 主要成土母岩有花岗岩、砂岩和页岩。

2015年7月, 根据金花茶保护区典型植被类型的分布情况, 研究人员在其中建立了面积1 ha的森林动态监测样地。样地东西长100 m, 南北长100 m, 最大海拔高差73.9 m, 其中心点坐标为21°45′ N, 108°5′ E。该样地位于山脊顶部附近, 包含较陡的坡地地形和一条沟谷, 土壤类型为砖红壤。样地内植物群落结构复杂、物种组成丰富。经调查, 样地内DBH ≥ 1 cm的植株个体有6,530株, 分属于49科97属139种, 主要优势种有鹅掌柴(*Schefflera heptaphylla*)、九节(*Psychotria asiatica*)、肉实树(*Sarcosperma laurinum*)、银柴(*Aporosa dioica*)、黄樟(*Cinnamomum parthenoxylon*)等。

1.2 研究方法

1.2.1 凋落物收集器布设方案

基于样地的地形特征和群落类型, 研究人员在样地内布设了40个凋落物收集器(图2)。凋落物收集器的具体设置原则为: (1)能代表样地内所有的群落类型和生境类型; (2)基本保证同一株母树的凋落物不会自然凋落到两个收集器内, 即根据树种冠幅, 确保样地内任意两个收集器之间的距离不小于10 m; (3)为避免边缘效应, 同时也尽可能地保证凋落物都来自样地内母树, 因此, 样地边缘20 m内不设置凋落物收集器。但由于该地区地形地貌复杂, 实际操作中并不能严格按照上述规定架设凋落物收集器, 只能尽可能的选择合适的地点。

1.2.2 凋落物收集方案

凋落物收集器由白色聚氯乙烯管(PVC管)和尼龙网制成, 收集面积为0.5 m^2 (0.71 m × 0.71 m)。结合当地的北热带季风气候类型, 于每月月中和月末各收集1次凋落物。如遇大风、降水等不适合野外工作的天气则适当推迟收集日期。每次收集的凋落物以凋落物收集器为单位进行编号, 按花、果实、种子、枝干(直径 < 2 cm)、叶片及其他杂物进行分




图1 广西防城金花茶国家级自然保护区2019–2024年月平均降水量、温度和风速的变化

Fig. 1 Temporal variation in monthly average precipitation, temperature, and wind speed at Guangxi Fangcheng Golden Camellia National Nature Reserve from 2019 to 2024




图2 广西防城金花茶国家级自然保护区1 ha森林动态监测样地凋落物收集器分布图

Fig. 2 Distribution of litterfall collectors within 1-ha forest dynamics plot in Guangxi Fangcheng Golden Camellia National Nature Reserve

类, 并对花、叶片和果实进行物种鉴定。在80℃烘箱中烘干至恒重(连续烘干48 h以上)后, 用精度为0.01 g的电子天平称重, 记录凋落物收集器编号、收集日期、各组分重量等信息。

1.3 影响因子获取

基于样地每木调查数据计算群落生物因子, 包括以凋落物收集器为中心, 5 m × 5 m范围内所有胸径(DBH) ≥ 1 cm林木的胸高断面积之和(sum of basal area)、物种丰富度(species richness)和Shannon-Wiener多样性指数, 本文数据为2016年调查所得。非生物因子(这里不包括土壤因子)主要为地形因子、土壤温度和土壤水分。其中, 地形因子包括海拔、坡度、坡向、凹凸度、地形湿润度指数(topographic wetness index, TWI)、干旱度指数(altitude above channel, ACH), 其定义和计算方法可参考郭屹立等(2016)。土壤温度(Soil_temp)和水分(Soil_moisture)使用土壤水分仪TDR300测定。土壤因子于2019年采样测定, 包括土壤全碳(Soil_TC)、全氮(Soil_TN)、全磷(Soil_TP)、全钾(Soil_TK)、全钙(Soil_TCa)和全镁(Soil_TMg)含量。在凋落物收集器周围随机选取3个采样点, 采集0–10 cm表层土壤样品, 充分混合。样品经过去除碎屑、实验室风干、研磨、过筛和装袋储存等处理。土壤全碳和全氮含量采用元素分析仪(vario MICRO cube)测定, 全磷含量采用H_2SO_4-$HClO_4$消解-钼锑抗比色法测定, 全钾含量采用HF-$HClO_4$消煮法测定, 全钙和全镁含量采用电感耦合高频等离子体光谱法(ICP-AES)测定。

1.4 数据分析

为量化上述生态因子(生物、非生物和土壤因子)对凋落物总量的相对贡献大小, 本研究以每个凋落物收集器年均凋落物总量为因变量, 以该收集器所在样方的上述生态因子为自变量进行分析, 共40个样本量。计算公式如下: 凋落物量(kg/ha) = 凋落物总质量(kg)/收集器总面积(ha)。月凋落物量为当月凋落物各组分之和, 年凋落物量为12个月凋落物量之和。采用k = 4的k邻近准则构建空间权重矩阵, 并计算全局Moran's *I*统计量, 以检验研究数据的空间自相关性。采用空间自回归模型(spatial autoregressive models, SAR)中的空间滞后模型(lagsarlm)进行建模, 并利用R包spatialreg.hp中的spatialreg.hp函数(Lai et al, 2023)定量解析空间结构与生态因子对凋落物总量变异的独立贡献, 同时使用该包进行变差分解分析。为避免多重共线性对模型稳定性和解释度的影响, 使用方差膨胀因子(VIF)剔除土壤因子中共线性高的变量(VIF阈值设置为5), 采用主成分分析(PCA)对物种丰富度和Shannon-Wiener多样性指数进行降维, 以树木多样性(tree diversity)代表第一轴主成分进行后续分析; 使用R中的glmm.hp包(Lai et al, 2022)量化各个生态因子的相对重要性并进行排序, 所有变量均进行*Z*-score标准化; 选择对凋落物总量相对重要性较高的影响因子进行回归分析, 明确各影响变量对凋落物总量的影响; 为确定影响凋落物总量的因素及其相互关系, 在一定理论基础上构建假设模型(郭屹立等, 2017), 模型中考虑了凋落物总量与非生物因子、土壤因子和生物因子之间的关系, 根据重要性变量的筛选结果, 最终以坡向和土壤温度代表非生物因子, 以土壤全碳和全钙含量为土壤因子, 以树木多样性和胸高断面积之和代表生物因子, 构建偏最小二乘结构方程模型(partial least squares structural equation modeling, PLS-SEM)进行分析。

2 结果

2.1 凋落物量组分特征

金花茶保护区2019–2024年连续6年平均年凋落物量为: 7,506.38 ± 766.94 kg/ha, 其多年变异系数为0.26, 表明凋落物总量存在明显的年际间波动。凋落物的不同组分中, 叶的年均凋落物量(4,521.60 kg/ha)约占凋落物总量的60.24%, 枝(1,451.97 kg/ha)和杂物(1,328.60 kg/ha)所占比率次之, 分别为19.34%和17.70%, 而繁殖组织所占比例最小, 仅2.72% (表1)。鉴于繁殖组织(花、果及种子)产生的凋落物在总量中占比极小, 且其脱落时间、数量及分布受环境的非周期性波动影响较大, 为确保研究的焦点和数据的可比性, 故在后续分析中未将繁殖组织凋落物量纳入分析范围。

2.2 凋落物组分月际动态

金花茶保护区凋落物总量及各组分凋落物量呈现出较为明显的季节变化, 从各组分动态来看, 凋落物总量以及叶、枝和杂物的月凋落物量均在4

月、8月和10月达到高峰, 整体呈三峰型的季节动态(图3)。总量的3个峰值分别为669.94 kg/ha (出现在4月)、828.83 kg/ha (8月)和847.88 kg/ha (10月), 其中1月凋落物总量最少, 为409.74 kg/ha。落叶在凋落物总量中占比最大, 叶的月凋落物量对凋落物总量月凋落强度的动态具有决定性影响。叶的月凋落物量3个峰值分别为407.47 kg/ha (4月)、453.22 kg/ha (8月)和475.80 kg/ha (10月), 最小值出现在1月, 为255.57 kg/ha。枝和杂物的月凋落物量3个峰值分别为117.88 kg/ha和120.46 kg/ha (4月)、208.56 kg/ha和154.83 kg/ha (8月)、194.68 kg/ha和157.55 kg/ha (10月), 并且最小值均出现在1月, 分别为71.93 kg/ha和70.72 kg/ha。

表1 广西防城金花茶国家级自然保护区2019–2024年凋落物各组分年均产量(平均值 ± 标准误)

Table 1 Annual average production of each litterfall component in Guangxi Fangcheng Golden Camellia National Nature Reserve from 2019 to 2024 (mean ± SE)

组分 Components	凋落物量 Litterfall production (kg/ha)	比例 Proportion (%)
叶 Leaf	4,521.60 ± 413.30	60.24
枝 Twig	1,451.97 ± 245.09	19.34
繁殖组织 Reproductive structure	204.21 ± 32.80	2.72
杂物 Debris	1,328.60 ± 166.86	17.70
总计 Total	7,506.38 ± 766.94	100.00

2.3 凋落物量空间分布的驱动因素

因Moran's I检验显示数据存在极显著的正空间自相关(I = 0.29, P = 0.001), 所以我们采用空间滞后模型进行建模。变差分解的独立贡献(图4)显示, 空间结构对凋落物总量的独立效应相对较弱(R^2 < 0.10), 而生态因子解释度较高, Venn图(图5)也印证了这一结论, 其中生态因子和空间结构的独自效应分别为51%和3%, 二者的共同效应为28%, 表明在研究区内影响凋落物量空间分布的因子中生态因子的解释度远高于空间距离。为聚焦影响凋落物总量的核心生态驱动机制, 后续分析仅保留生态因子进行模型构建与解释。

基于线性回归的层次分割分析(图6)表明, 生




图3 广西防城金花茶国家级自然保护区2019–2024年凋落物各组分和凋落物总量月动态

Fig. 3 Monthly dynamics of the total and each component litterfall production in Guangxi Fangcheng Golden Camellia National Nature Reserve from 2019 to 2024




图4　广西防城金花茶国家级自然保护区凋落物总量的生态因子与空间结构独立效应加性分解分析

Fig. 4　Additive decomposition analysis of independent effects from ecological factors and spatial structure on total litterfall production in Guangxi Fangcheng Golden Camellia National Nature Reserve




图5　凋落物总量与生态因子和空间结构的变差分解分析

Fig. 5　Variance partitioning analysis of total litterfall production in relation to ecological factors and spatial structure




图6　生物和非生物因子对凋落物总量的相对重要性。BA: 胸高断面积之和; Aspect: 坡向; Soil_TC: 土壤全碳含量; Tree diversity: 树木多样性; Soil_TCa: 土壤全钙含量; Soil_temp: 土壤温度; ACH: 干旱度指数; Slope: 坡度; Elevation: 海拔; TWI: 地形湿润度指数; Convex: 凹凸度。

Fig. 6　Relative importance of biotic and abiotic factors for the total litterfall production. BA, Sum of basal area; Soil_TC, Soil total carbon content; Soil_TCa, Soil total calcium content; Soil_temp, Soil temperature; ACH, Altitude above channel; TWI, Topographic wetness index; Convex, Convexity.

态因子共同解释了凋落物总量变化的54%, 其中海拔、坡度、凹凸度、TWI和ACH对凋落物总量的解释度为负, 我们认为其对凋落物总量没有影响, 而对凋落物总量影响较大的因子为胸高断面积之和、树木多样性、坡向、土壤全碳和全钙含量以及土壤温度。其中胸高断面积之和是影响凋落物总量的最主要因素, 解释了56.18%的凋落物量变化。以层次分割分析结果中对凋落物总量相对重要性较高的影响因子为自变量, 凋落物总量为因变量进行回归分析, 结果表明, 随着胸高断面积之和、坡向、土壤全碳和全钙含量及土壤温度的增高, 凋落物总量均呈现极显著增加趋势(P < 0.01) (图7)。

排除层次分割分析中对凋落物总量重要性为负的因子以优化模型, 构建偏最小二乘结构方程模型验证假设路径(图8), 整体模型拟合优度为0.49。将潜在变量定义为非生物因子(坡向和土壤温度)、土壤养分(土壤全碳和全钙含量)、树木多样性和胸高断面积之和。纳入变量共解释凋落物总量方差的62%, 胸高断面积之和对凋落物总量产生极显著正向影响(P < 0.01), 其路径系数为0.487, 非生物因子和树木多样性会直接对凋落物总量产生显著正向影响(P < 0.05), 路径系数分别为0.295和0.252。土壤养分对凋落物总量的直接影响不显著, 而是通过影响胸高断面积之和间接影响凋落物总量。此外, 非生物因子对土壤养分的直接影响最显著, 其路径系数为0.624。




图7　各因子与凋落物总量的回归分析。阴影部分为拟合线的95%置信区间。
Fig. 7　Regression analysis of each factor and the total litterfall production. Shaded area represents 95% confidence intervals of the fitted line.

3　讨论

金花茶保护区2019–2024年连续6年平均年凋落物量为7,506.38 kg/ha, 在全球年凋落物量范围之内(3,000–11,000 kg/ha) (Zhang et al, 2014), 也介于中南地区的常绿阔叶林(6,362 kg/ha)和鼎湖山南亚热带常绿阔叶林(8,450 kg/ha)之间(官丽莉等, 2004), 高于东北地区温带落叶阔叶林(3,390–3,850 kg/ha) (申广荣等, 2017)和弄岗北热带季节性雨林(4,858–4,929 kg/ha) (郭屹立等, 2017), 低于哀牢山常绿阔叶林(7,700–9,460 kg/ha) (Dai et al, 2023)和西双版纳南亚热带非喀斯特季节性雨林(10,490 kg/ha) (Zhu et al, 2021)。这可能是因为广西防城季节性雨林水热条件良好, 其年平均温度和年平均降水量均高于中南地区的常绿阔叶林和东北地区的温带落叶阔叶林(朱茵等, 2023)。雨季时, 高温与高湿同步出现, 可促进植物的光合作用和蒸腾作用, 加速养分的吸收和运输, 提高了植物的生长速度和生物量积累, 使得凋落物量较高。此外, 研究区物种组成丰富, 不同植物种类占据不同的生态位, 形成了复杂的垂直结构, 这种分层现象能减少物种间的竞争, 提高资源利用效率, 有助于维持群落稳定性和生产力, 导致森林生产力和代谢水平提高。

凋落物量季节性波动显著, 凋落动态具有明显的节律性, 整体呈三峰型。这是因为金花茶保护区地属北热带季风气候区。在雨热同期的气候条件下, 光照强度和降水呈季节性正相关, 凋落物第一个峰值出现在3–4月, 此时常绿树种正处于换叶期, 不断增加的光照能促进新叶萌发, 老叶被代谢能力更强的新叶所替代, 这是植物最大程度利用光照来实现树木生长的自适应策略; 第二个峰值出现在8月, 此时为雨季最强期, 热带植物在雨季大量落叶, 以减少水分蒸发和能量消耗, 同时萌生新叶, 增强光合作用能力以储存养分; 第三个峰值出现在旱季初期的10月, 此时树木落叶以降低蒸腾作用, 这是一种凋落老叶减少水分丢失来应对水分胁迫的自适应策略(Dai et al, 2022)。此外, 北热带季节性雨林在雨季易受台风、暴雨等极端天气影响, 导致森林生

态系统水分供应不稳定, 直接影响植被生长和凋落物产生, 并且随着天然阔叶林减少、人工林扩张所导致的次生植被演替以及人类干扰如毁林开荒、种植经济林等因素共同作用, 也会导致凋落物量在不同年份间出现大幅波动。

Guo等(2019)研究表明, 局域尺度上, 生物与非生物因子均会影响凋落物的形成。凋落物产量、分解速率和积累年限共同决定凋落物量的高低, 而气候、地形、土壤、植物群落组成和凋落物化学组成等则是影响凋落物现存量的重要因素(刘士玲等, 2017)。本研究显示, 影响凋落物季节性动态的主要驱动因素是月平均温度和月平均降水量(表2), 凋落物总量的空间分布受非生物因子、树木多样性和胸高断面积之和的直接显著影响, 而土壤养分通过影响胸高断面积之和间接影响凋落物总量(图8)。




图8 凋落物总量与其影响因素的偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)。箭头表示假设的变量间因果关系。实线表示作用路径显著, 虚线表示作用路径不显著。红色箭头表示正相关, 蓝色箭头表示负相关。箭头宽度表示该关系的强度。箭头旁边的值是具有相应统计意义的标准化路径系数。R^2表示模型解释的方差百分比。GOF值为模型的拟合优度。* P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001。

Fig. 8 Partial least square-structural equation model (PLS-SEM) of total litterfall production and its influencing factors. BA, Sum of basal area; Soil_TC, Soil total carbon content; Soil_TCa, Soil total calcium content; Soil_temp, Soil temperature. Arrows represent the hypothesized causal relationships between variables. The solid line indicates that the action path is significant, and the dashed line indicates that the action path is not significant. Red color indicates positive relationships. Blue color indicates negative relationships. The arrow width indicates the strength of the relationship. Values next to the arrows are the normalized pathway coefficients with the corresponding statistical significance. Values of R^2 represent the percentage of variance explained by the model. The GOF value represents the goodness-of-fit of the model. * P < 0.05; ** P < 0.01; *** P < 0.001.

在气候因子指标中, 凋落物各组分产量的季节性变化主要受月平均温度和月平均降水量的显著影响, 而风速的影响较小(表2)。这与郑征等(2005)的研究结果相符合, 即随温度上升, 凋落物总量呈线性增加(P < 0.05)。但与杞金华等(2013)关于哀牢山常绿阔叶林旱季凋落物总量与旱季降水量的结果不一致, 这可能是因为本研究地区常年雨水充沛, 温度较高, 充足的降水可以为植物提供足够的水分, 促进光合作用, 增加凋落物产生。有关东北林区和湖南森林凋落物的研究发现, 枝凋落物量主要与温度和降水有关, 繁殖器官凋落物量主要与树种的繁殖特性和年降水量有关(张新平等, 2008; 徐旺明等, 2013)。本研究结果表明, 叶凋落物量与月平均温度呈显著正相关关系。温度越高, 叶片越容易脱落, 这可能与抽枝物候这一现象有关(宋彦君等, 2016)。而枝凋落物量与月平均降水量呈显著正相关, 这可能源于降水促进植物快速生长和生物量积累, 导致内部枝条因光限制或资源竞争而被植物主动淘汰, 并且北热带季节性雨林在雨季常伴随强阵风和高强度降雨, 这会对枝条造成直接的机械性折断和损伤, 从而加速凋落物产生。

区域尺度内的凋落物总量与地带性气候和森林类型有关, 而局域尺度内的凋落物总量与立地条件有关。本研究发现, 防城季节性雨林凋落物总量的空间分布受坡向、土壤温度、土壤养分、树木多样性和胸高断面积之和等生态因子的显著影响。地形和土壤温度、土壤水分等非生物因子通过对太阳辐射、水热条件、土壤养分等资源的空间再分配对植物的生长和分布产生重要影响(Punchi-Manage et al, 2013), 是影响森林凋落物量的主要因素。在本研究中, 凋落物量与非生物因子呈显著正相关, 南坡位凋落物量较多, 北坡较少。这可能是因为该地区

表2 凋落物总量及各组分与气候因子间的相关性分析结果

Table 2 Correlation analysis between total litterfall and its components and climatic factors. * P < 0.05; ** P < 0.01

组分 Components	凋落物总量 Total litterfall production	叶 Leaf	枝 Twig	杂物 Debris
月平均降水量 Monthly average precipitation	0.26*	0.21	0.29*	0.27*
月平均温度 Monthly average temperature	0.30*	0.36**	0.14	0.29*
月平均风速 Monthly average wind speed	0.05	−0.01	0.05	0.20

的坡向为西南坡, 作为迎风坡, 其接收光照较多、温湿度较北坡更为适宜, 植物表现出较强的新陈代谢能力。而土壤温度对凋落物总量的影响可能是因为该研究样地西侧的沟壑产生了高差, 导致沟壑两侧的光照和土壤温度增加, 充足的光照和土壤温度有利于土壤微生物的生长繁殖, 将土壤中的有机态养分转化为植物可吸收的无机态养分(Li et al, 2021), 进而促进植物生长和新陈代谢, 加速凋落物产生, 沟渠两侧大树的增加也印证了这一观点。研究区沟渠两侧的坡度并不均匀, 这种坡向差异可能会影响土壤养分和物种丰富度, 进而影响凋落物量。通常认为, 森林凋落物总量随海拔的升高而减少(de Castilho et al, 2006), 而本研究中凋落物总量与海拔的关系并不明显, 一方面可能是因为研究样地内的相对海拔不高(171–245 m), 另一方面还可能与林分密度和平均胸径有关, 研究区中样地胸高断面积之和与海拔存在非线性关系。因此海拔与凋落物量的相关性并不明显, 二者可能表现出非线性关系。

树木多样性会显著提高凋落物产量, 并可以通过增加森林地表有机质的积累, 进而对森林生产力和土壤有机碳储存产生积极影响(Zheng et al, 2019)。戴雯笑等(2021)研究表明, 5 m邻域范围内较高的物种多样性可以显著提高百山祖常绿阔叶林凋落物产量。熊松等(2024)研究表明, 物种多样性和胸高断面积是影响木论常绿落叶阔叶混交林凋落物产量空间变异的关键生物因子。Zheng等(2019)在我国亚热带天然林的研究中发现, 树种丰富度通过树冠互补增加了凋落物产量。Wilcke等(2024)研究表明, 物种多样性增加有助于森林生态系统封闭养分循环, 减少养分流失, 提高林内养分利用效率, 从而显著增加林内凋落物量。本研究中的树木多样性和胸高断面积之和是影响防城季节性雨林凋落物总量空间变异的关键生物因子, 均对凋落物总量有显著的正向影响, 说明5 m邻域范围内树木株数越多、胸高断面积之和越大、物种组成越丰富, 产生的凋落物量越多。这可能是因为在物种丰富度高、胸高断面积大、林分密度高的地区, 物种竞争激烈, 会影响植物对养分和资源的利用策略, 这些竞争性相互作用增强了树种间的互补效应, 促进了树木多样性对凋落物量的显著影响。

土壤养分作为森林生态系统植物体营养元素的主要来源, 维持着植物的净初级生产力, 是调节植物器官光合产物分配的关键变量(Li et al, 2020), 在水热条件良好的情况下, 土壤微生物分解有机质的过程(矿质化)会释放出植物可吸收的无机养分, 为其提供持续、充足的营养供给。该研究区内, 凋落物总量与土壤的养分含量之间存在显著正相关关系(图7) ($P < 0.05$)。土壤有机质较高时, 能改善土壤的阳离子交换能力, 提高土壤对Ca^{2+}和Mg^{2+}等阳离子的吸附能力, 以抵抗微生物分解(Wiesmeier et al, 2019), 保证养分的可利用性, 加快植物新陈代谢速率。本研究区所在的季节性雨林中, 土壤养分中钙可能是植物生长的限制因子, 当其可用性提高时, 植物能够更有效地进行光合作用, 合成更多有机物质, 从而增加地上生物量。土壤中氮、磷、钾等关键养分的可利用性也会直接影响树木的光合效率和碳同化效率, 高养分环境促进植物根系吸收效率, 发达的根系能够更有效地吸收水分和养分, 加速光合产物向茎干的分配, 进一步增强植物生产力。此外, 凋落物分解也会影响土壤肥力, 进而影响植物对养分的利用策略(Liu et al, 2025), 本研究区域土壤养分高于喀斯特地区, 植物可能会采取“保守型”策略, 减缓分解速率, 导致地上部生产力较高。

综上, 本研究通过对广西防城季节性雨林凋落物量连续6年的动态监测, 揭示了不同组分凋落物的季节性变化规律及其空间分布的主要驱动因子。凋落物的季节性变化规律主要受控于树种物候节律和区域范围内水热因子的变化; 温度和降水是影响凋落物季节性动态的主要驱动因素, 台风也是引起森林凋落物出现剧烈波动的重要原因。影响季节性雨林凋落物总量空间分布的驱动因素为坡向、土壤温度、土壤养分、树木多样性和胸高断面积之和。由于本研究仅考虑了生态因子对凋落物量空间分布的影响, 而忽略了空间结构的变异特征, 在后续研究工作中, 选择更多的生物或非生物因子来扩充变差分解的协变量或许能有效降低统计学残差。同时, 凋落物收集器的布设尺度和布设数量差异对生态和空间变量解释度的影响也值得进一步探讨。研究区坡度较陡, 植物群落结构复杂, 凋落物作为连接植被、土壤、微生物、气候的桥梁, 对森林的净

初级生产力和全球碳循环发挥着至关重要的作用, 而凋落物与土壤微生物群落结构之间的相互关系以及凋落物分解如何影响土壤有机碳积累的机制仍需深入探讨。

ORCID

郭屹立 https://orcid.org/0000-0001-9265-130X

参考文献

Ahirwal J, Saha P, Nath A, Nath AJ, Deb S, Sahoo UK (2021) Forests litter dynamics and environmental patterns in the Indian Himalayan region. Forest Ecology and Management, 499, 119612.

Berg B (2000) Litter decomposition and organic matter turnover in northern forest soils. Forest Ecology and Management, 133, 13–22.

Chen HYH, Brant AN, Seedre M, Brassard BW, Taylor AR (2017) The contribution of litterfall to net primary production during secondary succession in the boreal forest. Ecosystems, 20, 830–844.

Dai SY, Wei T, Tang J, Xu ZX, Gong HD (2023) Temporal changes in litterfall and nutrient cycling from 2005–2015 in an evergreen broad-leaved forest in the Ailao Mountains, China. Plants, 12, 1277.

Dai WX, Lou CY, Xu DM, Zhang YF, Huang GD, Luo ZR (2021) Spatial distribution of litter yield in an evergreen broadleaf forest and its effects on the heterogeneity of soil nutrients. Acta Ecologica Sinica, 41, 513–521. (in Chinese with English abstract) [戴雯笑, 楼晨阳, 许大明, 张亚芬, 黄国栋, 骆争荣 (2021) 浙西南常绿阔叶林凋落物空间分布及其对土壤养分的影响. 生态学报, 41, 513–521.]

Dai YH, Gong FX, Yang XQ, Chen XZ, Su YX, Liu LY, Wu JP, Liu XD, Sun QL (2022) Litterfall seasonality and adaptive strategies of tropical and subtropical evergreen forests in China. Journal of Plant Ecology, 15, 320–334.

de Castilho CV, Magnusson WE, de Araújo RNO, Luizão RCC, Luizão FJ, Lima AP, Higuchi N (2006) Variation in aboveground tree live biomass in a central Amazonian forest: Effects of soil and topography. Forest Ecology and Management, 234, 85–96.

Guan LL, Zhou GY, Zhang DQ, Liu JX, Zhang QM (2004) Twenty years of litter fall dynamics in subtropical evergreen broad-leaved forests at the Dinghushan forest ecosystem research station. Acta Phytoecologica Sinica, 28, 449–456. (in Chinese with English abstract) [官丽莉, 周国逸, 张德强, 刘菊秀, 张倩媚 (2004) 鼎湖山南亚热带常绿阔叶林凋落物量20年动态研究. 植物生态学报, 28, 449–456.]

Guo YL, Chen HYH, Mallik AU, Wang B, Li DX, Xiang WS, Li XK (2019) Predominance of abiotic drivers in the relationship between species diversity and litterfall production in a tropical karst seasonal rainforest. Forest Ecology and Management, 449, 117452.

Guo YL, Li DX, Wang B, He YL, Xiang WS, Jiang YL, Li XK (2017) Composition and spatio-temporal dynamics of litter fall in a northern tropical karst seasonal rainforest in Nonggang, Guangxi, southern China. Biodiversity Science, 25, 265–274. (in Chinese with English abstract) [郭屹立, 李冬兴, 王斌, 何运林, 向悟生, 蒋裕良, 李先琨 (2017) 北热带喀斯特季节性雨林凋落物组分构成及时空动态. 生物多样性, 25, 265–274.]

Guo YL, Wang B, Xiang WS, Ding T, Lu SH, Huang FZ, Wen SJ, Li DX, He YL, Li XK (2016) Responses of spatial pattern of woody plants' basal area to topographic factors in a tropical karst seasonal rainforest in Nonggang, Guangxi, southern China. Biodiversity Science, 24, 30–39. (in Chinese with English abstract) [郭屹立, 王斌, 向悟生, 丁涛, 陆树华, 黄甫昭, 文淑均, 李冬兴, 何运林, 李先琨 (2016) 喀斯特季节性雨林木本植物胸高断面积分布格局及其对地形因子的响应. 生物多样性, 24, 30–39.]

Lai JS, Zou Y, Zhang S, Zhang XG, Mao LF (2022) glmm.hp: An R package for computing individual effect of predictors in generalized linear mixed models. Journal of Plant Ecology, 15, 1302–1307.

Lai JS, Zhu WJ, Cui DF, Mao LF (2023) Extension of the glmm.hp package to zero-inflated generalized linear mixed models and multiple regression. Journal of Plant Ecology 16, rtad038.

Lan GF, Zhang Q, Chen XB, Chen SD, Xiong DC, Liu XF, Yang ZJ, Yang YS (2024) Seasonal dynamics of litterfall of a *Castanopsis kawakamii* evergreen broadleaf forest in mid-subtropical China and their influencing factors. Chinese Journal of Plant Ecology, 48, 1589–1601. (in Chinese with English abstract) [兰光飞, 张强, 陈相标, 陈仕东, 熊德成, 刘小飞, 杨智杰, 杨玉盛 (2024) 中亚热带格氏栲林凋落物季节动态特征及其影响因素. 植物生态学报, 48, 1589–1601.]

Li JQ, Pei JM, Dijkstra FA, Nie M, Pendall E (2021) Microbial carbon use efficiency, biomass residence time and temperature sensitivity across ecosystems and soil depths. Soil Biology and Biochemistry, 154, 108117.

Li Q, Zhang MH, Geng QH, Jin CS, Zhu JQ, Ruan HH, Xu X (2020) The roles of initial litter traits in regulating litter decomposition: A "common plot" experiment in a subtropical evergreen broadleaf forest. Plant and Soil, 452, 207–216.

Lin B, Liu Q, Wu Y, He H (2004) Advances in the studies of forest litter. Chinese Journal of Ecology, 23, 60–64. (in Chinese with English abstract) [林波, 刘庆, 吴彦, 何海 (2004) 森林凋落物研究进展. 生态学杂志, 23, 60–64.]

Liu Q, Chen XL, Huang FZ, Li JX, Chen T, Lu F, Li XK, Li DX, Xiang WS, Wang B, Zhao HM, Ma RX, Wang SQ, Guo YL (2025) Divergent drivers of litter decomposition in karst and non-karst tropical rainforests: A comparison.

Catena, 258, 109316.

Liu SG, Plaza C, Ochoa-Hueso R, Trivedi C, Wang JT, Trivedi P, Zhou GY, Piñeiro J, Martins CSC, Singh BK, Delgado-Baquerizo M (2023) Litter and soil biodiversity jointly drive ecosystem functions. Global Change Biology, 29, 6276–6285.

Liu SL, Zheng JP, Fan CN, Yang BG, Guo ZL (2017) Research progress in litter accumulation of forest ecosystem in China. World Forestry Research, 30(1), 66–71. (in Chinese with English abstract) [刘士玲, 郑金萍, 范春楠, 杨保国, 郭忠玲 (2017) 我国森林生态系统枯落物现存量研究进展. 世界林业研究, 30(1), 66–71.]

Liu XD, Feng YJ, Zhao XY, Cui ZJ, Liu PL, Chen XZ, Zhang QM, Liu JX (2024) Climatic drivers of litterfall production and its components in two subtropical forests in South China: A 14-year observation. Agricultural and Forest Meteorology, 344, 109798.

Punchi-Manage R, Getzin S, Wiegand T, Kanagaraj R, Savitri Gunatilleke CV, Nimal Gunatilleke IAU, Wiegand K, Huth A (2013) Effects of topography on structuring local species assemblages in a Sri Lankan mixed dipterocarp forest. Journal of Ecology, 101, 149–160.

Qi JH, Zhang YJ, Zhang YP, Liu YH, Lu ZY, Wu CS, Wen HD (2013) The impacts of the Southwest China drought on the litterfall and leaf area index of an evergreen broadleaf forest on Ailao Mountain. Acta Ecologica Sinica, 33, 2877–2885. (in Chinese with English abstract) [杞金华, 章永江, 张一平, 刘玉洪, 鲁志云, 武传胜, 温韩东 (2013) 西南干旱对哀牢山常绿阔叶林凋落物及叶面积指数的影响. 生态学报, 33, 2877–2885.]

Shen GR, Xiang QQ, Chen DM, Wu Y, Liu CJ (2017) Spatio-temporal distribution characteristics of forest litterfall in China. Chinese Journal of Applied Ecology, 28, 2452–2460. (in Chinese with English abstract) [申广荣, 项巧巧, 陈冬梅, 吴裕, 刘春江 (2017) 中国森林凋落量时空分布特征. 应用生态学报, 28, 2452–2460.]

Song YJ, Tian WB, Liu XY, Yin F, Cheng JY, Zhu DN, Arshad A, Yan ER (2016) Associations between litterfall dynamics and micro-climate in forests of Putuoshan Island, Zhejiang, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 40, 1154–1163. (in Chinese with English abstract) [宋彦君, 田文斌, 刘翔宇, 尹芳, 程浚洋, 朱丹妮, Ali Arshad, 阎恩荣 (2016) 浙江普陀山岛森林凋落物动态与微气候的关联性. 植物生态学报, 40, 1154–1163.]

Sun XF, Liu F, Zhang QZ, Li YC, Zhang LF, Wang J, Zhang HY, Wang CK, Wang XC (2021) Biotic and climatic controls on the interannual variation in canopy litterfall of a deciduous broad-leaved forest. Agricultural and Forest Meteorology, 307, 108483.

Wan XH, Joly FX, Jia H, Zhu M, Fu YR, Huang ZQ (2023) Functional identity drives tree species richness-induced increases in litterfall production and forest floor mass in young tree communities. New Phytologist, 240, 1003–1014.

Wiesmeier M, Urbanski L, Hobley E, Lang B, Von Lützow M, Marin-Spiotta E, van Wesemael B, Rabot E, Ließ M, Garcia-Franco N, Wollschläger U, Vogel HJ, Kögel-Knabner I (2019) Soil organic carbon storage as a key function of soils—A review of drivers and indicators at various scales. Geoderma, 333, 149–162.

Wilcke W, Zimmer V, Bauhus J, Schöning I, Schrumpf M, Michalzik B, Siemens J (2024) Disentangling the effects of region, forest-management intensity and plant diversity on litterfall quantity, quality and turnover in temperate forests. Plant and Soil, 497, 397–412.

Xiong S, Gan J, Xie YJ, Deng XZ, Qin GL, Peng WX, Zeng FP, Zhan ZL, Tan WN, Huang GQ, Du H (2024) Dynamics of litter production and its determinants in a subtropical mixed evergreen and deciduous broad-leaved forest in a karst ecosystem. Biodiversity Science, 32, 24248. (in Chinese with English abstract) [熊松, 淦江, 谢彦军, 邓晰朝, 覃国乐, 彭晚霞, 曾馥平, 占志立, 谭卫宁, 黄国勤, 杜虎 (2024) 喀斯特常绿落叶阔叶林凋落物产量动态及影响因素. 生物多样性, 32, 24248.]

Xuluc-Tolosa FJ, Vester HFM, Ramírez-Marcial N, Castellanos-Albores J, Lawrence D (2003) Leaf litter decomposition of tree species in three successional phases of tropical dry secondary forest in Campeche, Mexico. Forest Ecology and Management, 174, 401–412.

Xu WM, Yan WD, Li JB, Zhao J, Wang GJ (2013) Amount and dynamic characteristics of litterfall in four forest types in subtropical China. Acta Ecologica Sinica, 33, 7570–7575. (in Chinese with English abstract) [徐旺明, 闫文德, 李洁冰, 赵晶, 王光军 (2013) 亚热带4种森林凋落物量及其动态特征. 生态学报, 33, 7570–7575.]

Zhang HC, Yuan WP, Dong WJ, Liu SG (2014) Seasonal patterns of litterfall in forest ecosystem worldwide. Ecological Complexity, 20, 240–247.

Zhang LL, Yadav V, Zhu HC, Shi YY, Hu XX, Wang XX, Zhou XP, Subhash B, Kang YX (2024) Climate drivers of litterfall biomass dynamics in three types of forest stands on the Loess Plateau. Ecological Indicators, 163, 112088.

Zhang XP, Wang XP, Zhu B, Zong ZJ, Peng CH, Fang JY (2008) Litter fall production in relation to environmental factors in Northeast China's forests. Journal of Plant Ecology (Chinese Version), 32, 1031–1040. (in Chinese with English abstract) [张新平, 王襄平, 朱彪, 宗占江, 彭长辉, 方精云 (2008) 我国东北主要森林类型的凋落物产量及其影响因素. 植物生态学报, 32, 1031–1040.]

Zhao XY, Guan MR, Sun MY, Wang ZF, Xu XN (2020) Effects of nitrogen and phosphorus additions on litterfall production and nutrient dynamics in evergreen broad-leaved forests. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 44(6), 55–62. (in Chinese with English abstract) [赵晓雅, 关梦冉, 孙孟瑶, 王泽夫, 徐小牛 (2020) 氮磷添加对亚热带常绿阔叶林凋落物产量及其养分含量的影响. 南京林业大学学报(自然科学版), 44(6),

55–62.]
Zheng LT, Chen HYH, Yan ER (2019) Tree species diversity promotes litterfall productivity through crown complementarity in subtropical forests. Journal of Ecology, 107, 1852–1861.
Zheng Z, Li YR, Liu HM, Feng ZL, Gan JM, Kong WJ (2005) Litterfall of tropical rain forests at different altitudes, Xishuangbanna, Southwest China. Acta Phytoecologica Sinica, 29, 884–893. (in Chinese with English abstract) [郑征, 李佑荣, 刘宏茂, 冯志立, 甘建民, 孔维静 (2005) 西双版纳不同海拔热带雨林凋落量变化研究. 植物生态学报, 29, 884–893.]
Zhu XA, Zou X, Lu EF, Deng Y, Luo Y, Chen H, Liu WJ (2021) Litterfall biomass and nutrient cycling in karst and nearby non-karst forests in tropical China: A 10-year comparison. Science of the Total Environment, 758, 143619.
Zhu Y, Yang YC, Zhou LH, Long YX, Huang L, Chen H (2023) Litterfall amount and dynamic characteristics of evergreen broad-leaved forest in Jinyun Mountain. Science of Soil and Water Conservation, 21(3), 110–118. (in Chinese with English abstract) [朱茵, 杨永川, 周礼华, 龙宇潇, 黄力, 陈华 (2023) 缙云山常绿阔叶林凋落物量及动态特征. 中国水土保持科学, 21(3), 110–118.]

(责任编委: 赖江山　责任编辑: 黄祥忠)

生物多样性 BIODIVERSITY SCIENCE

2026, 34 (1): 25040, pages 1–10
doi: 10.17520/biods.2025040
cstr: 32101.14.biods.2025040

•保护与治理对策•

中国国家公园人兽冲突解决的法治路径

孙啸宇*

浙江工商大学杭州商学院, 杭州 311508

摘要: 在生态文明法治背景下, 国家公园作为生态保护制度的核心载体, 其建设过程中人兽冲突问题却日益凸显。现行以“事前预防+事后补偿”为主导的冲突解决机制在操作上虽具简便性, 却难以从根本上缓解人与野生动物之间的深层次矛盾, 且原住民在成本分担与利益分配方面较为不利。一方面, 地方财政和技术条件对事前预防措施的落实构成制约, 另一方面, 事后补偿在金额、时效与标准方面往往无法回应原住民的实际损失与期待。同时, 当前制度多聚焦于野生动物行为本身, 忽视因国家公园建设与生态保护带来的社会结构与人群利益重构, 对原住民实质性参与的制度安排相对不足。《国家公园法》的颁布为我国国家公园建设提供了法制基础。在《国家公园法》相关规定的指引下, 或可进一步探索构建以生态补偿机制为基础的综合制度体系, 强化原住民的社区治理能力, 并形成公私联动的动态补充机制, 丰富参与路径, 以实现生态保护责任与利益的均衡调配。此外, 公益诉讼等法治手段可为原住民权益提供外部监督路径与制度纠偏机制。唯有通过法治化手段统筹生态保护与社会公正, 国家公园制度方能真正实现人与自然和谐共生的治理目标, 推动生态文明法治体系的完善与落实。

关键词: 生态文明法治; 国家公园; 《国家公园法》; 人兽冲突; 原住民

孙啸宇 (2026) 中国国家公园人兽冲突解决的法治路径. 生物多样性, 34, 25040. doi: 10.17520/biods.2025040; cstr: 32101.14.biods.2025040.
Sun XY (2026) Legal approaches to resolving human–wildlife conflicts in national parks of China. Biodiversity Science, 34, 25040. doi: 10.17520/biods.2025040; cstr: 32101.14.biods.2025040.

Legal approaches to resolving human–wildlife conflicts in national parks of China

Xiaoyu Sun*

Zhejiang Gongshang University Hangzhou College of Commerce, Hangzhou 311508, China

ABSTRACT

Background & Aims: Under the framework of the rule of law for ecological civilization, national parks have emerged as central mechanisms for biodiversity conservation and ecological restoration in China. However, their establishment has been accompanied by increasingly frequent and complex human-wildlife conflicts, particularly affecting indigenous communities. These conflicts not only disrupt local livelihoods but also reveal underlying tensions between conservation goals and social justice. This study aims to critically examine the institutional logic and limitations of current human-wildlife conflict management within Chinese national parks. It further explores the extent to which the National Park Law and associated regulations address the rights, participation, and compensation entitlements of indigenous communities affected by such conflicts.

Method: It adopted a multidisciplinary approach combining legal analysis, institutional theory, and empirical policy review. It first conducted a doctrinal analysis of the National Park Law, related administrative regulations, and judicial interpretations to identify normative gaps in conflict management. Second, through policy document analysis and case studies from representative national parks such as Three-River-Source National Par and Giant Panda National Park, the study evaluated the practical implementation of preventive and compensatory mechanisms for managing human-wildlife conflict. Particular attention was paid to the institutional positioning of local governments, fiscal arrangements, and the procedural inclusion of indigenous populations. Finally, comparative insights were drawn from

收稿日期 Received: 2025-01-24; 接受日期 Accepted: 2025-10-11
基金项目: 司法部国家法治与法学理论研究重点项目(19SFB1010) Supported by the Key Program of the Ministry of Justice on National Rule of Law and Research on Legal Theory (19SFB1010)
* 通讯作者 Author for correspondence. E-mail: 2202020151@cupl.edu.cn

international experiences in countries with established national park systems to inform policy innovation.
Review & Results: The current mechanism is operationally expedient but structurally inadequate. Fiscal and technical constraints severely limit the implementation of effective preventive measures, while compensation schemes are often delayed, under-calculated, and administratively rigid. This institutional design disproportionately burdens indigenous communities living within or near national parks, who not only endure the direct impacts of wildlife incursions but also face restrictions on traditional land use and limited access to participatory governance. The analysis reveals that the law primarily focuses on managing wildlife behavior, rather than addressing the broader redistributional effects brought about by conservation initiatives. Moreover, the role of local communities remains largely passive, with insufficient institutional mechanisms to ensure their substantive involvement in decision-making, benefit-sharing, or legal redress.
Prospect: To achieve a more balanced integration of ecological protection and social equity under the National Park Law, a recalibration of institutional arrangements is necessary. The paper proposes a multidimensional reform strategy: the establishment of a vertically and horizontally coordinated ecological compensation framework to address human-wildlife conflict-related cost imbalances; the creation of a dynamic benefits-cost adjustment mechanism with public-private collaboration; and the strengthening of indigenous capacity through ecological knowledge training and participatory governance. Furthermore, external legal oversight, including the expansion of environmental public interest litigation, should be leveraged to safeguard the rights of indigenous communities. Ultimately, advancing the rule of law in ecological governance requires institutional innovation that aligns national conservation objectives with localized justice claims, ensuring that national parks contribute not only to environmental sustainability but also to inclusive development.
Key words: rule of law for ecological civilization; national parks; National Parks Law; human–wildlife conflicts; indigenous communities

人兽冲突是人与自然矛盾的集中体现。人类文明史是一部人与自然关系的发展史, 人类将生态空间改造为生产空间和生活空间, 建立以人类为中心的空间秩序。在生态层面, 以人类为中心的空间秩序, 主要体现在一定空间内, 由城市生态系统和农业生态系统等人工生态系统协调的人与生物和非生物因子的关系中。随着人工生态系统的逐渐扩张, 自然生态系统被分割、退缩。人兽冲突反映在土地及空间利用上, 正是以人为主体要素的生产空间和以野生动物为主体要素的生态空间发生冲突(王亚辉等, 2023)。近年来, 全球范围内人兽冲突加剧, 一方面是由于野猪(*Sus scrofa*)、猕猴(*Macaca mulatta*)等野生动物对农村、城市等人类改造后的环境表现出较强的适应性(Schley et al., 2008; 李毅等, 2024), 在生态空间已然碎片化的背景下进入人类生产生活空间获取食物等资源的频率增加(王原等, 2025)。另一方面, 作为利益相关者的居民群体, 基于本地知识和社会规范管理野生动物相关行为时, 误伤受保护野生动物的可能性及相应的法律制裁后果, 成为制约居民群体行动的主要风险。例如, 在中国裁判文书网"(2025)鄂0624刑初98号"刑事判决书中, 被告人唐某以保护庄稼为目的, 布设的用于猎杀野猪的陷阱误猎小灵猫(*Viverricula indica*)、猪獾(*Arctonyx collaris*)各1只, 构成危害珍贵、濒危野生动物罪, 被追究刑事责任。正如该案例所示, 野生动物保护的刑事过度化已然成为影响野生动物保护和合理控制之间平衡的重要因素, 特别是以野生动物数量和价值为标准的入罪模式忽略了对行为是否具有严重的社会危害性、是否破坏野生动物资源的实质判断(蒋兰香, 2024)。法律的刚性约束对居民群体行为容错度的压缩极大地约束了其主观能动性, 最终迫使居民群体"主动"成为人兽冲突中的受害方。因此, 在人与野生动物生存空间高度重叠的现实背景下, 引导人与野生动物的关系从冲突转向共存, 需要维护野生动物及自然生态保护与利益相关者正当权益的相关机制的共同作用(马奔和雷硕, 2024)。在伴随人类开展的生态保护活动而生的"自然保护地人兽冲突"问题的解决中, 这显得尤为必要。

在自然保护地的发展历程中, 随着野生动物种群的增加(Massé, 2016), 生存空间和食物等资源的有限性(黄元等, 2021)以及社会和政治因素的相互作用(Dixon et al., 2009), 导致人类与野生动物的冲突和对抗, 这一现象即被称为自然保护地人兽冲突(闫京艳等, 2019)。解决人兽冲突问题、促进人与自然共存的关键, 或正是在生态保护和人类需求间尽可能取得平衡(Nyhus, 2016)。随着我国自然保护地

建设逐渐全面转向以国家公园为主体的自然保护地体系建设, 根据《国务院关于国家公园空间布局方案的批复》和《国家公园法》的相关内容, 如何正确处理生态保护与居民生产生活的关系, 成为以国家公园为主体的自然保护地体系建设中的关键问题。以专门机制在国家公园建设和保护的进程中有效应对人兽冲突问题则是解决上述关键问题的重要方面。有研究指出, 2021年在三江源国家公园、东北虎豹国家公园、武夷山国家公园和大熊猫国家公园中, 受访者遭受过野生动物损害的占比分别约为80%、80%、50%和70% (刘诗琦和刘佳欢, 2024)。国家公园等自然保护地建设进程中人兽冲突问题的产生, 一方面体现出近年来生态保护的相关实践在野生动物种群恢复方面取得的成效, 另一方面, 亦反映出生态文明建设需要对国家公园原住民群体等利益相关方的正当利益诉求给予更多关切和回应。本研究将通过对现行的以成本共担为主要特征的问题解决机制的考察, 在生物多样性保护的框架下, 立足原住民正当权益保障需求, 综合运用规范分析、价值分析、案例分析等研究方法, 根据我国法律法规、政策文件、司法案例以及实践情况, 对我国国家公园法治建设中人兽冲突在成本分担和利益分配方面的问题进行探讨, 深入分析其成因, 并尝试给出相应的解决方案。

1 人兽冲突解决机制的实践现状

既往研究和现行机制中, 国家公园等自然保护地的人兽冲突问题的解决方案主要以冲突为中心, 从预防和补偿两方面入手, 将野生动物造成的直接损失转变为治理成本, 并由全社会分担。此类模式以由“事前预防”和“事后补救”组成的冲突解决型机制为中心, 为解决人兽冲突问题发挥了巨大贡献, 但是在实践中也暴露了一些问题。

1.1 事前预防机制

事前预防方面, 国家公园管理机构可以通过区域化的野生动物防范方案, 减少冲突发生的可能性(程一凡等, 2019)。此类方案通常包括监测预警和物理隔离等措施, 旨在最大程度地减少人与野生动物产生空间交集的可能性。设置监测工具实现预警防范, 正是世界范围内广泛采用的一类事前预防措施(Dickman, 2010), 东北虎豹国家公园编制并执行的《物理围栏项目技术方案》, 则在人与野生动物之间建起安全屏障。但无论是监测预警还是物理围栏, 即便可充分实现其设计目标, 却并不能从根本上解决人兽冲突问题, 并可能造成原住民生活上的不便。由此产生的对生态保护工作的负面主观认知, 反而会加剧人兽冲突发生的风险。

我国国家公园及其他自然保护地分布地域广泛, 各区域经济发展水平存在较大差异。事前预防机制受国家公园所在地域的自然条件、技术水平和经济状况影响, 其可靠性和有效性亦存在不足。以甘肃白水江国家级自然保护区为例, 该保护区曾与全球环境基金(Global Environment Facility)合作实施减轻野生动物危害项目, 但此类活动的可持续性与野生动物保护组织、社会公益基金和社会公众的外部支持密切相关。在相关项目结束后, 该保护区对人兽冲突应对的相关研究和探索随即转入低谷, 除管理局和保护站为村民购买铁网和设置提醒标识标牌外, 该保护区的防护措施大多依靠原住民自发采用的防护行为, 如现场看管、家犬看管、声光电等, 但相关时间成本、经济成本与实际取得的防护效果不相匹配, 进而导致耕地撂荒的可能性上升(乔明等, 2023)。《野生动物保护法》第十八条规定, 预防野生动物造成危害的责任主体为地方人民政府, 县级以上人民政府野生动物保护主管部门可以通过种群调控措施保障人身财产安全、生态安全和农业安全。结合该法第五条第一款的规定, 相应开支或也应作为野生动物保护经费的一部分, 纳入该级政府预算。现行法律法规对事前预防机制较为原则性的规定, 不足以为不同地区的事前预防机制实践提供较为统一的规范指引和经济保障, 高度依赖地方财政的现状亦加剧地区间预防机制的差异。虽然国家林业和草原局与多部委联合出台了《野猪等陆生野生动物致害防控工作方案》, 要求“依法推动制定、修订相关补偿办法”, 以及依照事权落实所需经费的法定支出责任。但是“依照事权”的经费开支规定并未有效减轻地方人民政府的财政负担, 而《国家公园法》“相关经费按照规定由中央财政予以补助”的规定则较为笼统, 有待进一步细化明确细则。

1.2 事后补救机制

事后补救是当前立法和研究的重要方向。针对

野生动物致害, 以现金给付为主要方式的, 包括行政补偿和保险赔偿在内的补偿方案发挥了较大的作用(宋蕊等, 2022)。《野生动物保护法》第十九条和《国家公园法》第四十八条对野生动物损害补偿制度和野生动物致害赔偿保险制度的规定, 为事后补救机制的实践探索提供了法律依据和行为指引。《吉林省重点保护陆生野生动物造成人身财产损害补偿办法》《东北虎豹国家公园野生动物造成损失补偿办法》《青海省重点保护陆生野生动物造成人身财产损失补偿办法》《青海省陆生野生动物造成人身财产损失保险赔偿试点方案》等, 则是东北虎豹国家公园和三江源国家公园在建设实践中针对野生动物致害问题, 在补偿的标准和依据方面作出的重要探索。但事后补偿提升原住民对野生动物致害行为容忍度功能长效性的实现, 既需要提高法律规范的周延性以提供静态支撑, 更需要基于制度系统逻辑, 将事后补救机制与生态保护补偿、生态环境损害赔偿等制度有效衔接起来, 从而形成在经济上可行的制度合力(秦鹏和向往, 2023)。《国家公园法》等各项法律法规对事后补救机制的规定, 或尚可通过中央和地方立法的协同为国家公园内的事后补救机制的可持续性提供一定保障。但对于国家公园相邻的, 并不具有生态保护政策和法制倾斜的地区, 野生动物致害事后补救机制的有效性和可持续性仍将存疑。

事后补救机制对受害者的保障力度, 则是影响有效性的又一重要因素。现阶段无论是行政补偿还是保险赔偿, 事后补救机制在理赔周期、赔偿金额乃至定损标准等方面均未能达到原住民的主观预期, 这无疑进一步制约了实效(刘诗琦等, 2024)。特别是野生动物致害赔偿保险制度, 以县级财政为主的保费来源现状导致地方政府压力较大, 进而威胁到保险机制的长期可持续性。同时, 保险发展以各地自主探索为主的现状导致在全国范围尚无统一的产品体系, 在定价机制、查勘定损程序等方面亦不能满足风险管理的需求(秦涛等, 2024)。

总之, 无论是事前预防还是事后补救, 冲突解决型机制仅是针对野生动物致害行为的一个对策, 难以成为解决国家公园人兽冲突问题的长效方案。通过明确国家公园人兽冲突中的利益关系, 构建以国家公园的原住民为中心的人兽关系协调方案或具有一定可行性。

2 现行人兽冲突解决机制的不足与反思

以国家公园原住民为中心构建人兽冲突解决机制, 并非是对现行机制的全盘否定, 而是在对现行机制的问题和不足作出针对性回应的同时, 基于我国国家公园的实践需求与法治现状提出更为系统、全面的对策。现有国家公园人兽冲突问题的解决方案主要以冲突解决机制为出发点, 由此提出的对国家公园相关机制的完善建议极具对策性, 实用主义色彩较强。但也造成问题的解决方案在法治层面拘泥于冲突, 亦难以引导原住民主动参与。

2.1 现行人兽冲突解决机制不足的直接表现

以应对冲突为中心的现行机制, 为人兽冲突的解决提供了较为高效且易于操作的矛盾缓解方案。然而国家公园人兽冲突的成因在于国家公园自身, 冲突解决型机制聚焦于冲突的工作范式看似对症下药, 但难以彻底解决问题。

2.1.1 原住民利益关切的不足

国家公园人兽冲突的本质是由于国家公园设立而造成的不同利益间的碰撞。正如国家公园之父约翰·缪尔所记录的, “……在华盛顿曾掀起一阵反对设立保护区的声浪, 指责无数的农场、市镇和村庄被划入了保护区, 并声称所有商务活动都因保护区的设立而受到了威胁和阻滞……” (Muir, 1981)。为了恢复自然生态空间, 国家公园建设必然会对人类生产空间和生活空间作出限制。在当前的国家公园建设模式下, “人退”成为“兽进”的基础, 原住民的社区运行和发展被设限也由此成为必然。《国家公园法》第二十九条规定, 国家公园区域内原住民迁出后的安置由有关地方人民政府负责, 并在第三十七条规定合理建设周边社区。将原住民迁出国家公园的做法看似可以一劳永逸地解决国家公园人兽冲突问题, 但是对于如何在节约成本的同时保护原住民合法权益存在较大困难。钱江源–百山祖国家公园候选区、武夷山国家公园、海南热带雨林国家公园曾分别以征收、置换、赎买等方式将原住民所有的集体土地转换为国有土地, 用于国家公园建设。但是较高的经济成本和原住民对基本生产资料丧失的抵触情绪, 使得上述方式的可持续性和可推广性受到限制钱江源–百山祖国家公园候选区亦尝

试以保护性地役权的方式, 以相对较少的支出, 将土地相关的部分权利从原住民手中流转, 提高原住民对野生动物致害的容忍度, 从而在相对不损害原住民利益的基础上, 推进自然保护地建设, 但是其适用范围较为局限, 亦缺少上位法依据(王天蔚, 2024)。

现有的冲突解决型机制以人兽冲突发生的现实可能性为实践基础, 旨在最大程度地减少野生动物致害行为发生的可能性, 并对原住民在经济和人身安全等方面遭受的损失提供经济补偿。但经济补偿能否“填平”相应损失尚且存疑。与此同时, 在现行的国家公园及自然保护地法治框架下, 绝大多数国家公园的周边社区在国家公园的发展过程中, 已然损失了部分既得利益或牺牲了部分发展权利, 原住民可从保护地中受益的更是寥寥无几(杜群, 2018)。在法律法规层面对原住民利益关切不足的直观体现, 正是以管理和惩戒为主要策略的规范体系对原住民实际诉求的回应不足, 对原住民生产生活需求制约过多, 进而引发原住民对生态保护制度的抵触和违抗(童瑶等, 2025)。

2.1.2 原住民参与渠道的不足

《国家公园法》以“加快推进人与自然和谐共生的现代化”为立法目的。人兽冲突问题的解决方案, 应当以充分调动原住民参与为重要手段。然而, 在现有法律法规框架下的人兽冲突问题的冲突解决型机制中, 原住民被定位为野生动物致害的受害方和“事前预防+事后补偿机制”的被动参与者, 难以为其自身采取主动行动提供动力及支持。原住民的被迫缺席既是现代法治对原住民传统知识实践约束的结果, 又是公权力主导的国家公园建设模式下原住民对话和参与机制缺位的直接体现。

如前文中甘肃白水江国家级自然保护区案例所展示的, 原住民所能采用的防范措施极为有限, 且需负担较高的人力和经济成本。以务农为主要经济来源的原住民群体对野生动物致害的容忍度亦低于有其他经济收入者。在农业生产成本和损失双高的情形下, 耕地撂荒的风险或将上升, 从粮食安全的角度审视, 无疑是较为不利的。又如在野生动物致害赔偿保险制度中, 现阶段政府采购仍然是各地区购买保险的主要方式, 保险公司通过参与投标等方式为原住民提供保险服务。虽然原住民是保险的受益者, 但是对于保险的赔偿额度、索赔程序、定损程序、索赔标准等与原住民利益密切相关的内容, 以及在制定或磋商时原住民能否参与、如何参与, 目前尚无明确的规范指引。亦如中国裁判文书网公布的“(2025)鄂0624刑初98号” “(2025)甘7508刑初8号” “(2023)陕0727刑初90号”等刑事判决书所载, 在原住民采取防范措施却误杀其他野生动物时, 虽然法院会根据其以保护庄稼为主要目的的主观故意, 在追究刑事责任时相对宽容, 体现了“宽严相济”的司法理念, 但通过事前的教育、沟通避免产生刑事责任将会更符合刑事法律的“谦抑性”理念。

2.2 国家公园利益空间格局再塑中的成本分担失衡

国家公园的建设不仅是为特定生态空间的生态利益提供特别保护, 更是对社区间利益空间格局的重塑。或可在更为全面地认知原住民综合利益损失的基础上, 从国家公园建设对利益空间格局的影响出发, 反思人兽冲突成本分担的“人间”失衡。

2.2.1 被人兽冲突损害补偿掩盖的成本共担需求

对于原住民, 人兽冲突问题带来的损失, 应当是其以减少负面互动发生为目的的行动所造成的损失, 而非仅为野生动物致害行为造成的损失。基于国家公园建设对相关利益关系的影响, 有研究分析指出, 人兽冲突的治理目标应当从减少野生动物对农产品造成的经济损失, 转向通过综合性利益补偿减少各类负面互动所造成的野生动物保护利益、公共利益、私人财产利益、人身安全等方面的损失(Messmer, 2000; 张瑞萍和曾雨, 2021)。综合性利益补偿通过建立长效化的经济补偿制度(Johnson et al., 2018; 魏辅文等, 2021), 能够更好地分配冲突所造成的成本(Khumalo & Yung, 2015)。相较于“事前预防+事后补偿”, 其能覆盖的损失更加全面, 且突破了以技术和行政活动为主要手段的传统治理模式。但原住民的损失并不仅是遭受了野生动物的致害行为, 更是因为人类社会为获取国家公园的生态利益, 集体对原住民施加了额外的约束且未能有效实现成本共担。

国家公园的生态利益本是社会共享之物, 因此社会本就应共担成本。人类与非人类自然世界的所有互动, 包括对环境和资源的利用和影响, 发生在一个单一的生物物理现实中。公平分享地球上可持续供人类使用的自然资源和环境服务总量是每个

人的基本权利, 自然生态空间则是这一“总量”的主要载体(Hayward, 2007)。国家公园建设通过对自然生态空间提供特别保护, 保障了全社会自然资源和环境服务供应的可持续性。公民作为社会的组成分子, 在享受国家公园的生态利益时承担相应成本正是应有之义, 而成本分担的公平与否, 攸关生态利益供给的可持续性。公平分担并非平均分担, 公平性实现的前提是对差异性的关注。这无疑是以冲突为中心的现行机制未能有效回应的。因此, 国家公园建设中人兽冲突治理的目标定位, 需要从补偿原住民因野生动物致害行为蒙受的直接损失, 转向补偿原住民为国家公园建设和保护而遭受的损失, 亦即分担其额外负担的国家公园生态利益的“成本”。

2.2.2 基于生态利益普惠性的治理成本社会化分担诉求

在生态利益供应上, 国家公园受客观规律所限, 向不同社区实际供给的生态利益必然存在差异, 但或可分为普遍性生态利益和特殊性生态利益。原住民之外的社区应基于其实际获取的生态利益类型, 以货币支付、就业岗位等方式, “偿还”原住民替其承担的成本。作为人类“栖息地”的社区本即为广义的生态系统的组成部分(Foster, 2006), 不同社区所面临的环境压力因素及环境风险, 受其所处空间的自然禀赋和人类活动的影响存在差异, 气候变化等全球性生态环境问题则将进一步加剧差异(Kaswan, 2012; Fox, 2019)。因此, 基础性生态利益应当是国家公园为维护生态安全所提供的普遍性价值, 并为社会中绝大多数社区所享用。国家公园具有重要的生态安全价值, 其在缓解全球性环境问题的同时, 亦可帮助社区缓解环境压力、降低环境风险。虽然国家公园等自然保护地及相应的自然生态空间, 难以对社区以自我维系为目的的生态利益的差异性诉求作出针对性回应, 但其作为国家生态安全格局的重要组成部分, 为社区存续提供了最基础的生态安全保障。这或可被视为国家公园生态利益的一般性、间接性分配。由于这一分配活动的受益方, 即广泛的间接受益社区, 是作为国家的组成部分而普遍受益的, 因此, 其对原住民成本的偿还义务, 也应由国家代为履行, 即由中央政府作为国家整体的代表, 为原住民群体提供专门保障。在此类社区之中, 亦存在部分由于行政区划等因素影响, 生产空间和生活空间与国家公园有着较为密切联系, 但不需与原住民群体直接共担成本的社区。其在国家公园生态利益的分配中, 所享受的“待遇”是特殊且直接的。换言之, 其是原住民成本负担行为的直接受益社区。因此, 其在“偿还”原住民成本的过程中, 也应发挥更为直接的作用, 即在国家代为履行之外, 基于其获得的特殊性生态利益向原住民提供专门“补偿”。

3 国家公园人兽冲突问题解决的法治方案

《国家公园法》将“实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一”作为法律原则之一, 为形成公平与可持续的利益分配机制提供了重要指引。基于国家公园建设对社区利益格局的影响, 解决人兽冲突问题的长效方案应以成本共担机制为基础, 以推动原住民主动参与为主要路径。在综合补偿和强化参与的基础上, 构建更具灵活性和响应性的公私联动机制, 则有利于应对突发情况并保障制度的持续优化。

3.1 以综合性生态保护补偿机制实现成本共担

构建面向原住民的综合性生态保护补偿机制是解决国家公园人兽冲突问题的关键。《生态保护补偿条例》的出台为综合性生态保护补偿机制的构建提供了指引。具体来看, 综合性生态保护补偿机制以中央政府开展的纵向生态保护补偿为基础, 即由中央政府通过转移支付、专项预算等方式, 为地方政府和国家公园管理机构保障原住民的正当权益提供物质基础。再以相关地区地方政府开展的横向生态保护补偿为关键, 即由生态受益地区地方政府及民间团体开展, 旨在补偿原住民在发展等方面受到的限制。

在纵向生态保护补偿方面, 《国家公园法》第四十七条规定, “国家健全国家公园生态保护补偿机制, 根据国家公园规模和管护成效等合理确定财政转移支付规模”, 为建立以原住民这一特定集合为补偿对象的综合性利益补偿制度提供了指引。通过将管护成效作为确定标准, 开展经济补偿, 以确保补偿规模与原住民因生态保护作出的贡献和牺牲相当, 或可减轻原住民对国家公园建设可能存在的负面情绪。同时, 国家公园的生态利益的一般性、间接性分配通过广泛作用于一般的社区, 最终实现

了国家环境抗风险能力的提升, 由国家开展的纵向生态补偿, 正是其作为间接受益社区的集合, 承担相应成本分担责任的重要方式。而从用途上看, 纵向生态保护补偿或可成为原住民完善和维护事前预防机制的物质基础。

在横向生态保护补偿方面, 《生态保护补偿条例》第十四条规定, “国家鼓励、指导、推动生态受益地区与生态保护地区人民政府通过协商等方式建立生态保护补偿机制, 开展地区间横向生态保护补偿。” 国家公园作为典型的生态保护地区, 更是重要生态环境要素所在区域以及其他生态功能重要区域, 符合横向生态保护补偿的基本要求。在确定生态受益地区和生态保护地区的关系时, 则应当以国家公园保护目标及相关的主要环境要素的关联性为主要标准, 以达成直接受益社区对其成本分担责任的承担效果。在这一过程中, 中央政府应当发挥其监督、引导的作用, 既要促进生态受益地区地方政府能够充分承担相应责任, 又要监督生态保护地区地方政府将横向补偿所供应的资源有效应用到原住民的发展之中。新安江流域的横向生态补偿实践便可作为典范。2023年, 浙江和安徽两省签署《共同建设新安江–千岛湖生态保护补偿样板区协议》, 使得原本单一的资金激励型生态补偿转变为综合性生态补偿。基于该协议, 两地以生态效益为基础, 合作发展文化旅游、生态农业等产业, 仅安徽歙县的绿色食品产业产值就突破68亿元(于文轩和孙啸宇, 2024)。

3.2 强化原住民参与国家公园建设的主观能动性

构建综合利益补偿机制的目的在于引导原住民接受国家公园建设对其作出的限制性要求, 并有效避免人兽冲突矛盾因原住民的负面认知而激化。在此基础上, 则应在相关法律法规中重新定位原住民在国家公园中的角色, 将其从被动的利益受损者转变为生态保护的合作伙伴, 从而保障其采取行动的空间。在原住民的利益诉求符合国家公园保护目标的基础上, 着力于提升原住民在人兽冲突发生时的事中应对能力或具有可行性。具体来看, 一方面, 可通过教育和培训项目, 增加原住民对野生动物保护法律、野生动物行为以及如何安全共存的知识, 并通过社区内的宣传, 增强原住民对野生动物的保护意识, 形成原住民应对人兽冲突的主观基础。另一方面, 则应以基层工作人员为枢纽, 引导原住民参与健全社区内和社区间的信息收集和反馈机制, 以及时掌握人兽冲突发生情况并采取应对措施, 避免危害结果的扩大化。

《国家公园法》对原住民参与国家公园建设工作、共享国家公园建设成果亦有规定。根据《国家公园法》第三十六、三十八条的规定, 通过指导、支持原住民提供与国家公园保护目标一致的生态产品和服务, 以及生态管控岗位优先聘用原住民, 有利于引导原住民的利益诉求与国家公园保护目标趋向一致。但受现实情况所限, 可从生态管控岗位和生态产品、服务供给中受益的原住民是有限的, 因此, 强化原住民在事前预防中的能动性也格外重要。

在事前预防层面, 发挥原住民能动性的关键是明确赋予其开展防御的权利空间。有研究认为, 或可通过明确野生动物犯罪的限制使用条件, 避免以“慷他人之慨”的方式过度拔高野生动物保护水准(陈金林, 2024)。而在实践中, 地方政府野生动物保护部门或国家公园管理机构应当为原住民采取预防措施提供指引。一方面, 原住民应当享有在“不得已”的情形下紧急避险的权利, 且应当根据原住民的文化水平、认知程度和地方政府野生动物保护部门或国家公园管理机构的作为情况, 综合判断其是否“不得已”。且司法机关或行政机关在否定原住民行为必要性的同时, 应当主动提供具有可操作性的替代方案。替代方案应优先采用原住民具有的传统知识、方法, 且由野生动物保护部门或国家公园管理机构根据辖区划分, 承担替代方案之成本。另一方面, 应当完善原住民采取预防措施时向行政机关或基层自治组织报备的渠道, 并对报备行为提供支持, 特别是将报备行为作为原住民误杀《刑法》规定的“珍贵、濒危野生动物”时不追究刑事责任的法律依据。行政机关和司法部门则应对原住民采取的预防措施进行监督和指导, 以确保预防措施不超出必要的限度。

3.3 构建公私联动的动态补充机制

构建公私联动的动态补充机制拓宽了原住民提出利益诉求的具体渠道, 强化了有利于保障原住民应对人兽冲突时的积极性。一方面, 应当建立动态的利益分配机制, 引导原住民与国家公园管理机构合

作。原住民知识在旅游、放牧、野生动物利用等自然资源可持续利用活动中的充分应用, 对国家公园建设以及生态空间良好连通性的维护能起到重要作用(Locke et al., 2019)。国家公园管理机构对原住民在旅游、放牧、野生动物利用等方面正当利益诉求的及时回应, 有利于在帮助原住民合理改善生产生活条件的同时, 促进原住民知识成为国家公园的有机组成, 保障生态系统和人类社会的和谐发展。

另一方面, 原住民、司法机关和其他社会主体应实时监督国家公园管理机构的履职行为。公私联动的动态补充机制的关键在于为“动态”提供足够的动力。这一动力既可以是来自原住民利益诉求的直接表达, 又可以是来自检察机关、民间组织的监督。公益诉讼可作为检察机关、民间组织通过外在监督, 推动利益分配机制在效益反馈过程中的实效性和及时性的主要工具。特别是公益诉讼活动具有的价值宣示和问题警示功能, 对诉讼之外的类似的公权力履职行为均能够起到较好的督促作用。原住民利益诉求的直接表达, 则需要国家公园管理方在致害保险等机制中“配合”回应。保险作为原住民损失赔偿的重要工具, 在其磋商和合同签订过程中, 原住民并未作为甲方或乙方被载明权利和义务。因此, 作为甲方的公权力机关应尽最大可能保障原住民这一“第三人”的正当权益。根据在各地政府采购网检索收集到的政府采购合同, 原住民群体因野生动物致害导致人身伤亡或财产损失的保险限额不统一的问题较为突出, 如北京市延庆区自然保护地管理处采购的“生物多样性防治项目——2025年野生动物肇事补偿资金”的合同约定累计限额500万元, 每人死亡伤残限额100万元; 四川省青川县林业局采购的“国家公园野生动物肇事保险补偿项目”的合同约定累计限额1,000万元, 每次事故每人死亡赔偿限额60万元; 钱江源-百山祖国家公园候选区百山祖管理局和丽水市林业局共同采购的“2024年钱江源-百山祖国家公园候选区百山祖园区野生动物肇事公众责任保险项目”的合同约定累计赔偿限额4,000万元, 每人赔偿限额30万元。保险限额的差异对于原住民的影响是较为直观的, 其或可成为原住民参与合同磋商过程的一个突破口。特别是根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二、十五条对残疾赔偿金和死亡赔偿金的规定, 一般情况下死亡赔偿金为受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准的20年总金额, 残疾赔偿金则根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级计算。参考国家统计局公布的2024年城镇居民人均可支配收入, 即54,188元, 上述合同的保险限额或并不足以将之完全覆盖, 而在保险未能完全覆盖的情形下, 原住民及其亲属或可向有关公权力主体通过诉讼索赔, 相应差额或可由国家公园管理机构先行承担。

4 结论

作为国家公园建设中难以回避的现实问题, 解决人兽冲突问题的关键不在于解决人兽冲突, 而是解决人类因冲突产生的矛盾。以冲突解决为出发点的应对机制, 是将野生动物作为生态要素开展专门保护的生态保护立法和实践产物。随着“坚持以人民为中心的发展思想”作为法律原则在《国家公园法》中确立, 人兽冲突的解决机制从调整人与野生动物的利益空间格局, 向调整国家公园建设中原住民与原住民之外的社会群体的利益空间格局的转变所需的法制基础初步形成。明确国家公园建设活动对原住民及其他利益主体的利益格局的影响, 则是引导原住民的主观能动性和参与积极性, 构建人兽冲突问题长效解决法律机制的关键。生态环境立法以人与自然和谐共生为出发点的应对机制既将人类作为一个整体, 推动人与自然关系的良性发展, 又能以原住民正当权益诉求的特性为重点, 调整社会利益关系, 实现成本分担的公平性, 避免“慷他人之慨”。具体来看, 首先, 构建综合利益补偿机制, 通过纵向和横向生态补偿, 确保原住民的利益可得到合理补偿。其次, 推动原住民的主动参与, 通过教育、培训和社区参与, 提升原住民对野生动物保护的意识和能力。最后, 构建公私联动的动态补充机制, 以强化原住民维护自身权益、表达自身诉求的能力, 保障生态系统和人类社会的和谐发展。这些策略的实施, 将有助于实现国家公园内人与自然和谐共生的目标, 促进国家公园的可持续发展。通过法律、政策和社会参与的多维度合作, 或将有效地缓解人兽冲突, 保护生物多样性, 促进生态文明建设。

参考文献

Chen JL (2024) Conflict and its reconciliation between wild

animal protection and human well-being. Journal of National Prosecutors College, 32(6), 60–75. (in Chinese with English abstract) [陈金林 (2024) 野生动物刑法保护与民生的冲突及其协调. 国家检察官学院学报, 32(6), 60–75.]

Cheng YF, Xue YD, Dai YC, Zhang Y, Gao YY, Zhou J, Li DQ, Liu HJ, Zhou Y, Li L (2019) The research of human–wildlife conflict's current situation and the cognition of herdsmen's attitudes in the Qinghai area of Qilian Mountain National Park. Acta Ecologica Sinica, 39, 1385–1393. (in Chinese with English abstract) [程一凡, 薛亚东, 代云川, 张宇, 高雅月, 周杰, 李迪强, 刘洪江, 周跃, 李丽 (2019) 祁连山国家公园青海片区人兽冲突现状与牧民态度认知研究. 生态学报, 39, 1385–1393.]

Dickman AJ (2010) Complexities of conflict: The importance of considering social factors for effectively resolving human–wildlife conflict. Animal Conservation, 13, 458–466.

Dixon AB, Hailu A, Semu T, Taffa L (2009) Local responses to marginalisation: Human–wildlife conflict in Ethiopia's wetlands. Geography, 94, 38–47.

Du Q (2018) Research on Legislation for China's National Park System. China Environmental Publishing Group, Beijing. (in Chinese) [杜群 (2018) 中国国家公园立法研究. 中国环境出版集团, 北京.]

Foster SR (2006) The city as an ecological space: Social capital and urban land use. The Notre Dame Law Review, 82, 527–582.

Fox S (2019) Environmental gentrification. University of Colorado Law Review, 90, 803–866.

Hayward T (2007) Human rights versus emissions rights: Climate justice and the equitable distribution of ecological space. Ethics & International Affairs, 21, 431–450.

Huang Y, Yang J, Zhang H, Su KW, Wen YL (2021) A comparative study of human–wildlife conflicts management in nature reserves at home and abroad. World Forestry Research, 34(6), 27–32. (in Chinese with English abstract) [黄元, 杨洁, 张涵, 苏凯文, 温亚利 (2021) 国内外自然保护地人兽冲突管控现状比较. 世界林业研究, 34(6), 27–32.]

Jiang LX (2024) The criminal excessive of wildlife protection in China and its reasonable limitation and control. Journal of Social Science of Hunan Normal University, 53(1), 57–66. (in Chinese with English abstract) [蒋兰香 (2024) 我国野生动物保护刑事过度化及其合理限控. 湖南师范大学社会科学学报, 53(1), 57–66.]

Johnson M, Karanth K, Weinthal E (2018) Compensation as a policy for mitigating human–wildlife conflict around four protected areas in Rajasthan, India. Conservation and Society, 16, 305–319.

Kaswan A (2012) Domestic climate change adaptation and equity. Environmental Law Reporter News & Analysis, 42, 11125–11143.

Khumalo K, Yung L (2015) Women, human–wildlife conflict, and CBNRM: Hidden impacts and vulnerabilities in Kwandu Conservancy, Namibia. Conservation and Society, 13, 232–243.

Li Y, Wang YK, Luo C, Ye XL, Wu ZR, Kuang ZF, Zhao XM (2024) Spatiotemporal distribution of human–monkey conflict in Guiyang. Acta Theriologica Sinica, 44, 449–455. (in Chinese with English abstract) [李毅, 王奕凯, 骆畅, 叶秀林, 吴忠荣, 匡中帆, 赵序茅 (2024) 贵阳市人猴冲突及其时空分布. 兽类学报, 44, 449–455.]

Liu SQ, Liu JH (2024) How should China resolve the human–wildlife conflict in its natural protected areas? Environmental Economy, (17), 38–41. (in Chinese) [刘诗琦, 刘佳欢 (2024) 我国自然保护地人兽冲突矛盾该怎么解决? 环境经济, (17), 38–41.]

Liu SQ, Liu JH, Zhang LM, Lin J, Gao Y (2024) The current status, issues, and mitigation strategies of human–wildlife conflicts in national parks. National Park, 2, 383–391. (in Chinese with English abstract) [刘诗琦, 刘佳欢, 张灵曼, 林进, 高媛 (2024) 国家公园人兽冲突现状、问题与缓解路径. 国家公园(中英文), 2, 383–391.]

Locke H, Ellis EC, Venter O, Schuster R, Ma KP, Shen XL, Woodley S, Kingston N, Bhola N, Strassburg BBN, Paulsch A, Williams B, Watson JEM (2019) Three global conditions for biodiversity conservation and sustainable use: An implementation framework. National Science Review, 6, 1080–1082.

Ma B, Lei S (2024) Research progress and prospect of human and wildlife coexistence. Acta Ecologica Sinica, 44, 885–892. (in Chinese with English abstract) [马奔, 雷硕 (2024) 人与野生动物共存研究进展. 生态学报, 44, 885–892.]

Massé F (2016) The political ecology of human–wildlife conflict: Producing wilderness, insecurity, and displacement in the Limpopo National Park. Conservation and Society, 14, 100–111.

Messmer TA (2000) The emergence of human–wildlife conflict management: Turning challenges into opportunities. International Biodeterioration & Biodegradation, 45, 97–102.

Muir J (1981) Our National Parks. University of Wisconsin Press, Madison.

Nyhus PJ (2016) Human–wildlife conflict and coexistence. Annual Review of Environment and Resources, 41, 143–171.

Qiao M, Hou P, Huang J (2023) Analysis of human–wildlife conflict in Gansu Baishuijiang National Nature Reserve. Chinese Journal of Wildlife, 44, 640–648. (in Chinese with English abstract) [乔明, 侯平, 黄建 (2023) 甘肃白水江国家级自然保护区人兽冲突现状分析. 野生动物学报, 44, 640–648.]

Qin P, Xiang W (2023) Legislative perfection of wildlife damage compensation system from the perspective of biodiversity protection. China Soft Science, (4), 201–212.

(in Chinese with English abstract) [秦鹏, 向往 (2023) 生物多样性保护视域下野生动物致害补偿制度的立法完善. 中国软科学, (4), 201–212.]

Qin T, Cui RH, Song R, Fu LS (2024) Chinese public liability insurance for wildlife accidents: Development models, realistic dilemmas, and optimization strategy. Biodiversity Science, 32, 23431. (in Chinese with English abstract) [秦涛, 崔荣赫, 宋蕊, 富丽莎 (2024) 我国野生动物肇事公众责任保险: 发展模式、现实困境与优化策略. 生物多样性, 32, 23431.]

Schley L, Dufrêne M, Krier A, Frantz AC (2008) Patterns of crop damage by wild boar (*Sus scrofa*) in Luxembourg over a 10-year period. European Journal of Wildlife Research, 54, 589–599.

Song R, Deng J, Qin T (2022) Development dilemma and optimization path of public liability insurance for wildlife accidents. Biodiversity Science, 30, 22291. (in Chinese with English abstract) [宋蕊, 邓晶, 秦涛 (2022) 野生动物肇事公众责任保险发展困境与优化路径. 生物多样性, 30, 22291.]

Tong Y, Xue XJ, Xu DP, Liu N, Lu QL (2024) Evolution of the relationship between protected areas and communities. Journal of West China Forestry Science, 54(1), 144–150. (in Chinese with English abstract) [童瑶, 薛小杰, 徐冬平, 刘楠, 路秋玲 (2025) 自然保护地与社区关系演进研究. 西部林业科学, 54(1), 144–150.]

Wang TW (2024) Introduction of conservation easement system to nature reserves construction in China. World Forestry Research, 37(2), 131–137. (in Chinese with English abstract) [王天蔚 (2024) 保护地役权制度的引入——以我国自然保护地建设为背景. 世界林业研究, 37(2), 131–137.]

Wang Y, Wang YH, Yang AX, Fan H, Xie F (2025) Land use transition and its driving mechanisms in China's human–elephant conflict areas. Resources Science, 47, 125–139. (in Chinese with English abstract) [王原, 王亚辉, 杨遨郗, 樊辉, 谢菲 (2025) 中国"人–象"冲突区的土地利用转型及其驱动机制. 资源科学, 47, 125–139.]

Wang YH, Yang AX, Yang QY, Kong XB, Fan H (2023) Spatiotemporal characteristics of human-boar conflicts in China and its implications for ecosystem "anti-service". Acta Geographica Sinica, 78, 163–176. (in Chinese with English abstract) [王亚辉, 杨遨郗, 杨庆媛, 孔祥斌, 樊辉 (2023) 中国人–野猪冲突时空特征及对生态系统"反服务"的启示. 地理学报, 78, 163–176.]

Wei FW, Ping XG, Hu YB, Nie YG, Zeng Y, Huang GP (2021) Main achievements, challenges, and recommendations of biodiversity conservation in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 36, 375–383. (in Chinese with English abstract) [魏辅文, 平晓鸽, 胡义波, 聂永刚, 曾岩, 黄广平 (2021) 中国生物多样性保护取得的主要成绩、面临的挑战与对策建议. 中国科学院院刊, 36, 375–383.]

Yan JY, Zhang Y, Cai ZY, Chen JR, Qin W, Zhang JJ, Lian XM, Zhang TZ (2019) Analysis on the human–wildlife conflict in the Sanjiangyuan Region. Acta Theriologica Sinica, 39, 476–484. (in Chinese with English abstract) [闫京艳, 张毓, 蔡振媛, 陈家瑞, 覃雯, 张婧捷, 连新明, 张同作 (2019) 三江源区人兽冲突现状分析. 兽类学报, 39, 476–484.]

Yu WX, Sun XY (2024) Three major implementation mechanisms of ecological protection compensation. China Development Observation, (5), 41–46. (in Chinese) [于文轩, 孙啸宇 (2024) 生态保护补偿的三大实现机制. 中国发展观察, (5), 41–46.]

Zhang RP, Zeng Y (2021) On realization of ecological compensation mechanism in national park from the perspective of stakeholder balance. Social Sciences in Guangxi, (9), 118–123. (in Chinese) [张瑞萍, 曾雨 (2021) 国家公园生态补偿机制的实现——以利益相关者均衡为视角. 广西社会科学, (9), 118–123.]

(责任编委: 肖凌云　责任编辑: 李会丽)